<36635356020010
<36635356020010
Bayer. Staatsbibliothek

C.
8. III.
175. e.

Zool 128 (212
Donndorff

Histor. naturalis. Regnum animale
De animalibus in genere. System. 268.

Zool. No. 97.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

ZOOLOGISCHE
BEYTRÄGE
ZUR
XIII. AUSGABE
DES LINNEISCHEN
NATURSYSTEMS

VON
JOHANN AUGUST DONNDORFF.

ZWEYTEN BANDES ZWEYTER THEIL
HÜHNER- UND SPERLINGSARTIGE VÖGEL.

Leipzig,
in der Weidmannischen Buchhandlung.
1795.

ORNITHOLOGISCHE BEYTRÄGE

ZUR

XIII. AUSGABE

DES LINNEISCHEN

NATURSYSTEMS

VON

JOHANN AUGUST DONNDORFF.

ZWEYTER BAND

HÜHNER- UND SPERLINGSARTIGE VÖGEL.

Leipzig,

in der Weidmannischen Buchhandlung.

1795.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

FÜNFTE ORDNUNG

GALLINAE. *(Hühnerartige Vögel.)*

95. GESCHLECHT. OTIS. *Der Trappe.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 441. Gen. XCV.
Leske, Naturgeſch. p. 218. Gen. II.
Borowsky, Thierreich III. p. 114. Gen. LIX.
Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 207. Gen. XLVIII.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 453. Gen. LIV.
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 277. Gen. XXXIII.
Halle, Vögel, p. 94. Gen. III.
Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 107.
Onomat. hiſt. nat. V. p. 815.
Klein, av. p. 17. Gen. III.
Briſſon, ornith. II. p. 216. Gen. LXVI.
Batſch, Thiere, I. p. 402. Gen. CIV.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 658. Gen. LIX.
Hermann, tab. affin. anim. p. 138.
Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 313. Gen. LXI.

1. TARDA. *Der gemeine Trappe.* (1)

Müller, Naturſyſt. II. p. 441. n. 1. *der Trappe.*
Leske, Naturgeſch. II. p. 218. n. 1. *der gemeine Trappe.*

Borowsky,

(1) Flügelweite 6. Fuſs. Gewicht an 30 Pfund. Ein ſcheuer, furchtſamer und vorſichtiger Vogel Auſser einem dumpfen Knurren und Brummen im Zorn, und zur Falzzeit, hört man keine

Borowsky, Thierreich, III. p. 115. n. 1. *der Trappe.* Tab. 59.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 208. n. 1. Otis (Tarda) maris capite iuguloque utrinque criſtato; *der Trappe.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 454. n. 1. *der groſse Trappe.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 278. n. 1. *der groſse Trappe*, p. 288. *gemeiner Trappe; Trappgans; Ackertrappe.*

Funke, Naturgeſch. I. p. 284. *der Trappe.*

Ebert, Naturl. II. p. 104 *der gemeine Trappe.*

Halle, Vögel, p. 94. n. 4. *die gemeine Trappe.* Fig. 3.

Meyer, Thiere, I. p. 19. Tab. 18. 19.

Beckmann, Naturhiſt. p. 48. n. 5. *der Trappe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 299. ad n. 102. *der groſse Trappe.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 181. n. 170. *die Trappe.*

Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 107. *Trappe.*

Onomat. hiſt. nat. V. p. 819. *die gemeine Trappe.*

Handb. der Naturgeſch. II p. 43. *die Trappe.*

Handb. d. deutſch. Thiergeſch. p. 113. *der Trappe.*

Klein, av. p. 18. n. 1. Tarda ſimpliciter.

Klein, Vorbereit. p. 33. n. 1. *Ackertrappe oder Trapgans.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 18. n. 1. *Ackertrappe.*

Klein,

keine Stimme von ihm. Lebt bis zur Falzzeit, die gegen das Ende des Märzes fällt, in Geſellſchaft, dann aber beiſsen die Männchen einander ab, und jeder ſucht ſich zum Beſitzer von 2. bis zu 6. Hennen zu machen. In Deutſchland ſind die Trappen nicht Zug-, ſondern höchſtens Strichvögel, denn man findet ſie zu allen Jahreszeiten. Das Weibchen brütet 30 Tage, verläſst aber die Eyer, ſo bald ſie ein Menſch berührt hat. Die Hähne bekommen erſt nach dem erſten Mauſern die Bartfedern.

Klein, ſtemmat. av. p. 3. tab. 2. fig. 1—3.
Klein, Vögeleyer, p. 16. tab. 3. fig. 1.
Briſſon, ornith. II. p. 216. n. 1. Outarde.
Büffon, Vögel, III. p. 5. *der Trappe*, m. e. Fig.
Gesner, Vögelb. p. 221. *Trappe.* fig. p. 222.
Batſch, Thiere, I. p. 403. *der gemeine Trappe.*
Latham, Syſt. ornith. II. p. 658. n. 1. Otis (Tarda) nigro rufoque undulato-maculata, ſubtus albida, capite (maris) iuguloque utrinque criſtato.
Seligmann, Vögel, III Tab. 41. *der Trapphahn.*
Seligmann, Vögel, III. Tab. 43. *die Trapphenne.*
Friſch, Vögel, Suppl. p. 106. *der Trapphahn.* Tab. 106 iſt ein altes Weibchen.
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 51. n. 1. *der gemeine Trappe.*
Bock, N. G. von Preuſs. IV. p. 367. *der Trappe.*
Fiſcher, Livl. p. 88. n. 117. *Ackertrappe.*
Taube, Slavon. p. 22. *Trappen.*
Leem, Finnm. p. 130 ** *Trappen.*
Pallas, Reiſ. III. p. 220. *Trappe.*
Rytſchkow, orenb. Topogr. p. 243. *Drachwa, Dudak, Tudak.*
Lepechin, Tageb. d. ruſſ. Reiſ. I. p. 309. *Trappen.*
Pallas, nord. Beytr. III. p. 16. *die Trappen.*
Pennant, britt. Zool. (von Murr) p. 91. tab. 43.
Günther, Neſt. u. Ey. tab. 43.
Perrault, *Charras* u. *Dodart*, Abh. a. d. N. G. II. p. 45. anatomiſche Beſchreib. von 6. Trappen. tab. 52. *der Trappe.* tab. 53. *die Zergliederung.*
Naturforſch. XIII. p. 221. n. 137. *der Trappe.*
Grillo: Naturforſch. XXII. p. 130. *Trappe.*
Götz, Naturgeſch. einig. Vögel, p. 25. *der Trappe.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 46. *Trappe.*
Naumann, Vogelſteller, p. 174. *Trappe.*

Anweiſ. Vögel zu fang. p. 561. *der Trappe.*
Oekonom. Zool. p. 79. n. 21. *der gemeine Trappe.*
Beckmann, Beſchr. d. Kurmark, I. p. 809.
Eberhard, Thiergeſch. p. 109. *der Trappe.*
Göze, Nat. Menſchenl. u. Vorſeh. V. p. 531. *der Trappe.*
Hiſt. phyſ. u. geogr. Mancherley, II. p. 156.
Bechſtein, Muſt. ſchädl. Thiere, p. 132. n. 1. *der Trappe.*
Husſty v. Raſſynya: ungariſch. Magaz. I. p. 466. m. e. ill. Fig.
Jablonsky, allgem. Lex. p. 1226. *Trappe.*
Beckmann, phyſ. oekonom. Bibl. VI. p. 379. *der Trappe.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 127. n. 159. *der Ackertrappe.*
Loniceri, Kräuterb. p. 659. *Trapp.*
Lemmery, Materiallex. p. 804.
Zückert, Speiſ. a. d. Thierreich, p. 97.
Geoffroy, mater. med. VII. p. 565. *der Trappe.*
Onomatol. foreſtal. III. p. 702.
Gothaiſch. Hoſkalender, 1780. p. 60.
Friſch, ſeltſam. Geſchicht. II. p. 727.
Linné, Syſt. Nat. Ed. II. p. 55. Tarda.
Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 1. Tarda.
Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 154. n. 1. Otis (Tarda) iugulo utrinque criſtato.
Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 355. Tarda Recent. *Trappe.*
Charleton, onom. zoic. p. 73. n. 8. Otis, Tarda et Biſtarda.
Charleton, exercitat. p. 82. n. 8.
Moehring, av. gen. p. 58. n. 58. Otis.
Rzaczynsk, hiſt. nat. Polon. p. 289. Otis ſeu Tarda Iſidori et Aldrovandi, Biſtarda Alberti magni.

Rzacz.

Rzacz. auct. histor. nat. Polon. p. 401. Anser Trappa.
Sibbald, Scot. illustr. P. II. L. 3. c. 16. Otis, Tarda.
Barrere, ornith. Cl. III. gen. 9. sp. 1. Tarda pyrenaica fulva, maxillis nigricantibus, marginibus pennarum roseis.
Belon, hist. des oif. p. 236. portr. des oif. p. 56.
Jonston, av. p. 63. Otis sive Tarda.
Hermann, tab. affin. anim. p. 138. Otis Tarda.
Raji, catal. plantar. Cantabrig. p. 34.
Aristot. histor. anim. II. c. 16. ωτις.
Athen. Deipnosoph. L. IX. c. 10. p. 330.
Aelian. de nat. anim. L. V. c. 24. ωτις.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 22. Aves tardae; Otides.
Schaefer, element. ornithol. tab. 51.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 314. n. 1. *der gemeine Trappe.*

β. Otis tectricibus alarum albis. *
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. 288.

3. ARABS. *Der arabische Trappe.*
Müller, Natursyst. II. p. 444. n. 2. *die arabische Trappe.*
Leske, Naturgesch. p. 219. n. 2. *der arabische Trappe.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 120. *der Arabische Trappe; der Lohong.*
Ebert, Naturl. II. p. 105. *der arabische Trappe.*
Halle, Vögel, p. 98. n. 6. *die Arabische Trappe.*
Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 119. n. 2. *arabische Trappe.*
Onomat. hist. nat. V. p. 818. *die Arabische Trappe.*
Klein, av. p. 18. n. 3. Tarda Mechaensis, Arabica.
Klein, Vorbereit. p. 34. n. 3. *der Araber.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 18. n. 3. *Arabische Trappe.*

Briſſon, ornith. II. p. 219. n. 3. Outarde d'Arabie.
Batſch, Thiere, I. p. 404. *der Lohong.*
Büffon, Vögel, IV. p. 63. *der Afrikaniſche geſchopfte Trappe.* m. e. Fig.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 659. n. 4. Otis (Arabs) rufeſcens, nigricante ſtriata, ſubtus alba, auribus erecto-criſtatis.
Latham, ſyn. ſuppl. p. 226. Arabian Buſtard.
Seligmann, Vögel, I. Tab. 23. *der arabiſche Trappe.*
Lepechin, Tageb. d. ruſſ. Reiſ. I. p. 309. *arabiſche Trappen; ruſſ. Strepet.*
Linne, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 154. n. 2. Otis (Arabs) auribus erecto-criſtatis.

3. Tetrax. *Der Trappenzwerg.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 444. n. 3. *die kleine Trappe.*
Leske, Naturgeſch. p. 219. n. 3. *der Zwergtrappe.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 118. n. 2 *der Trappenzwerg.*
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 455. n. 2. *der kleine Trappe.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 288. n. 2. *der kleine Trappe*, p. 292. *Zwergtrappe; Trappenzwerg; Trieltrappe; Grieltrappe.*
Ebert, Naturl. II. p. 105. *der kleine Trappe; Feldente.*
Halle, Vögel, p. 97. n. 5. *der Trappenzwerg.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 185. n. 171. *der Trappenzwerg.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 299. A. *der kleinere Trappe.*
Neuer Schaupl. der Nat. IX. p. 119. n. 3. *kleine Trappe.*
Onomat. hiſt. nat. V. p. 823. *die kleine Trappe.*
Klein, av. p. 18. n. 2. Tarda nana.

Klein,

Klein, Vorbereit. p. 34. n. 2. *Trieltrappe; Griel- oder kleine Trappe.*
Klein, verb. Vögelhiſt. p. 18. n. 2. *Trieltrappe.*
Briſſon, ornith. II. p. 218. n. 2. petite Outarde, appellée vulgairement Canne-petiere.
Büffon, Vögel, IV. p. 48. *der Trappenzwerg*, m. e. Fig.
Batſch, Thiere, I. p. 404. *der Trappenzwerg.*
Latham, Syn. Suppl. p. 226. Little Buſtard.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 659. n. 3. Otis (Tetrax) nigro rufo alboque variegata, ſubtus alba, capite iuguloque laevi.
Beſeke, Vögel Kurl. p. 68. n. 143. *die kleine Trappe.*
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 53. n. 2. *der Zwergtrappe.*
Seligmann, Vögel, VII. tab. 41. *der kleine Trappe.*
Bock, N. G. v. Preuſſ. IV. p. 371. *der kleine Trappe.*
Cetti, Sardin. II. p. 119. *der Trappenzwerg.*
Pallas, Reiſ. Ausz. III. p. 474. *kleine Trappen.*
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *das Steppenhuhn.*
Pontoppidan, Dännem. p. 171. n. 1. *Trappegaas.*
Pontoppidan, Norweg. II. p. 139. *Trappegiäs.*
Adanſon, Senegal. p. 63. Gros-Yeux?
Leem, Finnm. p. 130. ** Otides Tetraces.
Linné, Abhandl. II. p. 295. n. 89. *der Trappenzwerg.*
Naturforſch. XIII. p. 223. n. 138. *die kleine Trappe.*
Bechſtein, Muſt. ſchädl. Th. p. 132. n. 2. *kleine Trappe.*
Beckmann, Bibl. VI. p. 384. *der kleine Trapp.*
Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. 154. n. 3. Otis (Tetrax) capite iuguloque laevi.
Müller, zool. dan. prodr. p. 27. n. 200. Otis (Tetrax) capite iuguloque laevi.
Charleton, exerc. p. 83. n. 9. Anas campeſtris.

Charleton, onom. zoic. p. 74. n. 9. Anas campestris; Canne-petiere.

Jonston, av. p. 64. Anas campestris Bellonii.

Hermann, tab. affin. anim. p. 138. Otis Tetrax.

Salerne, ornithol. p. 155.

Dict. des anim. I. p. 390. Canard de Pré de France. Anas pratensis Galliae, p. 403. Canne-petiere.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 314. n. 2. *der Trappenzwerg.*

4. AFRA. *Der afrikanische Trappe.*

Müller, Natursyst. II. p. 445. n. 4. *die aethiopische Trappe.* Tab. 18. Fig. 1.

Borowsky, Thierreich, III. p. 120. n. 4. *der aethiopische Trappe.*

Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 119. n. 4. *Aethiopische Trappe.*

Onomat. histor. nat. V. p. 817. *die Aethiopische Trappe.*

Büffon, Vögel. IV. p. 66. *der Aethiopische oder Afrikanische Trappe.*

Batsch, Thiere, I. p. 404. *der aethiopische Trappe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 227. White-eared Bustard.

Latham, Syst. ornith. II. p. 659. n. 5. Otis (Afra) nigra, dorso cinereo-undulato, auribus albis.

Sparrmann, Reis. p. 148. *Korrhahn, oder Knorrhahn.*

Adanson, Seneg. p. 244. *fliegende Strauß?*

Voy. de le *Moine* aux Isles Canaries, Cap verd, Senegall etc. à Par. 1695. p. 106. Autruche volante?

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 315. n. 3. *der afrikanische Trappe.*

5. BENGALENSIS. *Der Churge.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 162. *Indianische Trappe.*

 Brisson,

Brisson, ornith. II. p. 231. n. 13. grand Pluvier de Bengale.

Büffon, Vögel, IV. p. 69. *der Indianische mittlere Trappe. Der Churge*, m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 228. Indian Bustard.

Latham, Syst. ornith. II. p. 660. n. 6. Otis (Bengalensis) nigra, subtus fulvo-fusca, dorso maculis, cauda fasciis nigris, tectricibus alarum albis.

Seligmann, Vögel. VII. Tab. 40. *der indianische Trappe.*

Adanson, Seneg. p. 63. Gros-yeux, *Grossaugen?*

Hermann, tab. affin. anim. p. 130. Otis indica.

6. Houbara. *Der Hubara.*

Büffon, Vögel, IV. p. 73. *der kleine Afrikanische gehäubte Trappe mit der Halskrause, oder Hubara.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 121. n. 5. *der Trappe mit der Halskrause.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 660. n. 8. Otis (Houbara) flavescens, fusco-maculata, collo pennis elongatis, albidis, rachibus nigris, remigibus nigris, medio macula alba.

Shaw, Reise, p. 162. *der Houbaara, oder Houbaary*, Tab. 11.

Gentl. Magaz. XIX. tab. p. 499.

Voy. en Barbarie, I. p. 267.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 315. n. 4. *der Hubara.*

7. Rhaad. *Der Rhaad.*

Büffon, Vögel, IV. p. 76. *der kleine gehaubte Afrikanische Trappe, ohne Halskrause.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 660. n. 9. Otis (Rhaad) cristata flavescens, fusco maculata, subtus alba, capite nigro, cauda fusca, fasciis nigris.

Shaw, Reiſ. p. 163. *der Rhaad oder Saf-ſaf.* tab. 11.
Voy. en Barbar. p. 267.

8. INDICA. *Der indianiſche Trappe.*
Latham, Syſt. ornith. II. p. 661. n. 10. Otis (Indica) fuſca, nigro-undulata, ſubtus fuſco-albida, gula alba, vertice nigro, lateribus capitis faſcia nigra.

9. CHILENSIS. *Der chineſiſche Trappe.*
Latham, Syſt. ornith. II. p. 658. n. 2. Otis (Chilenſis) capite iuguloque laevi, corpore albo, vertice rectricibusque cinereis, remigibus primoribus nigris.
Vidaure, Chile, p. 71. *der Pinquen.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.*

Das Geſchlecht iſt mit *fünf* Gattungen vermehrt. In der XII. Edition war dies Geſchlecht unter den *Grallis.*

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der indianiſche geöhrte Trappe.*
Latham, Syn. Suppl. p. 228. Paſſarage Buſtard.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 660. n. 7. Otis (Aurita) nigra, corpore ſupra fuſco-reticulato, occipite pennis utrinque 4. capillaribus apice rhombeis, macula alarum auriumque alba.

96. GESCHLECHT. STRUTHIO. *Der Strauß.*
Müller, Naturſyſt. II. p. 446. Gen. XCVI.
Leske, Naturgeſch. p. 217. Gen. I.
Borowsky, Thierreich, III. p. 121. Gen. LX.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 208. Gen. XLIX.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 448. Gen. LIII.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 186. Gen. LXIV.
Onomat. hist. nat. VII. p. 354.
Brisson, ornith. II. p. 209. Gen. LXII. p. 211. Gen. LXIII. p. 212 Gen. LXIV.
Batsch, Thiere, I. p. 402. Gen. CV.
Latham, Syst. ornith. II. p. 663. Gen. LXI. p. 664. Gen. LXII. p. 665. Gen. LXIII.
Hermann, tab. affin. anim. p. 131. 136.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 315. Gen. LXII.

1. Camelus. *Der gemeine Strauß.* (²)

Müller, Natursyst. II. p. 446. n. 1. *der Kameelstrauß.*
Leske, Naturgesch. p. 217. n. 1. *der gemeine Strauß.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 122. n. 1. *der Kameelstrauß*, tab. 60.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 208. Struthio (Camelus) pedibus didactylis, digito exteriore parvo mutico, spinis alarum binis; *der Strauß.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 448. n. 1. *der gemeine Strauß.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 186. *der gemeine Strauß.*
Funke, Naturgesch. I. p. 307. *der Strauß.*
Ebert, Naturl. II. p. 106. *der eigentlich so genannte Strauß*, tab. 27.
Halle, Vögel, p. 85. n. 1. *der Strauß; Kameelvogel.*
Meyer, Thiere, I. Tab. 60. *der Strauß*, Tab. 61. *das Gerippe.*

Gatterer,

(²) *Latham* hat mit *Brisson* aus dieser, und den beyden folgenden Gattungen, drey besondere Geschlechter gemacht.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 227. n. 225. *der Strauß, Straußvogel; Kameelstrauß; Kameelvogel; Struuß; Struz.*

Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 660. *Strauß.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 354. *der Strauß, Cameelstrauß.*

Handb. d. N. G. II. p. 153. *der Strauß.*

Klein, Av. p. 16. Struthio. Struthio-Camelus autorum.

Klein, Vorbereit. p. 30. *der Strauß oder Strutz.*

Klein, verb. Vögelh. p. 16. *Strauß.*

Klein, Stemmat. av. p. 1. tab. 1. fig. 1. 2.

Klein, Vögeleyer, p. 15. tab. 1.

Gesner, Vögelb. p. 496. Strauss, fig. p. 497. mittelm.

Brisson, ornith. II. p. 209. n. 1. Autruche.

Büffon, Vögel, III. p. 124. *der Strauß*, tab. 77.

Batsch, Thiere, I. p. 405. *der gemeine Strauß.*

Beckmann, Naturhist. p. 48. *der Strauß.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 663. Struthio Camelus.

Fermin, Surin. II. p. 123. *der Strauß.*

Niebuhr, Beschr. von Arabien, p. 168. *Strauß.*

Shaw, Reise, p. 386. *der Strauß.* (Naamah.)

Le Vaillant, Reis. n. Afr. II. p. 209. 334. *Strauß.*

Sparrmann, Reis. p. 126. 429. *Strauß.*

Byron, Reis. um d. Welt, p. 182. *die Straußen.*

Ludolf, Aethiop. I. c. 12. n. 1. II. p. 161. n. 89. Struthio.

Kolbe, Vorgeb. der guten H. edit. in 4. p. 389. *Strauß.*

Pokock, Beschr. des Morgenl. I. p. 311.

Allgem. Reis. II. p. 289. 493. III. p. 96. V. p. 79. 202. XI. p. 201.

Adanson, Senegall. p. 70. *Straußvögel.*

Leon. Afr. descrip. Afr. p. 765. Struthiocamelus.

Perrault,

Perrault, Charras u. Dodart, Abh. a. der N. G. II. p. 61. anatom. Beſchr. von 8 Strauſsen Tab. 54. bis 57.
Guyons Reiſ. n. Oſtind. p. 192.
De la Porte, Reiſ. I. p. 165.
Valentin, muſ. muſeor. I. p. 460. Struthio, m. c. fig.
Hamb. Magaz. X. p. 442. XX. p. 140. XII. p. 66. 147.
Goeze, nützl. All. I. p. 148. *der Strauſs.*
Mannigfalt. II. p. 620. — Neue Mannigfalt. I. p. 362.
Hamb. Journ. II. p. 734.
Dresd. Magaz. II. p. 778.
Beckmann, Bibl. IV. p. 433. VI. p. 59. XVI. p. 87. 415.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 128. n. 160. *gemeiner afrik. Strauſs.*
Willich. obſ. de Struthio-Camelo, Frcf. 1587. 8.
Oekonomiſch. Zool. p. 80. n. 1. *der afrikaniſche Strauſs.*
Ludovici, Kaufmannslex. II. p. 1503. IV. p. 2233.
Eberhard, Thiergeſch. p. 110. *der Strauſs.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 490. 706.
Jablonsky, allgem. Lex. p. 1150. *Strauſs.*
Loniceri, Kräuterb. p. 660. *Strauſs.*
Merklein, Thierreich, p. 381. *Strauſs.*
Bern. Gallegaris Lo Struccero, Venez. 1646. 8.
Scaliger, de Struthiocamelo; exercit. 230. p. 723.
Erreurs populaires, I. L. 3. c. 22. p. 356. Autruche.
Acta erud. ſuppl. I. p. 250. — *Manget* bibl. I. P. I. p. 479.
Phil. transact. XXXIII. p. 223. XXXIV. p. 113. XXXV. p. 275.
Vallisnieri, notom. dello Struzzo; in Oper. T. I. p. 239. c. f.

Velſchius,

Velschius, de pulvere metallico nigro ex ventriculo Struthionis. — Eph. nat. cur. Dec. I. an. 3. obs. 37. p. 52.

Amman, differt. Σιδηροπεψια Struthionis, Lipf. 1657. 4.

Cardan. de subtil. L. 10. p. 335. Struthiocamelus.

Mem. de l'acad. d. Sc. 1735. p. 146.

Thevenot, voyages, I. p. 313. Ed. germ. Fcf. a. M. 1693. p. 223.

Derham, Physicotheol. p. 578.

Marmol, descr. de l'Afrique, I. p. 64.

Voy. du *Fr. Philippe*, Carme-dechaussé, p. 379.

Chesfeld. Anatom. c. 5. (Scelet.)

Geoffroy, mater. med. VII. p. 673. *der Straufs.*

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 55. Struthio-Camelus.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 1. *Struthio Camelus.*

Linné, Syst. Nat. Ed. XII. p. 155. n. 1. Struthio (Camelus) pedibus didactylis.

Kramer, Austr. p. 354. n. 1. Struthio-Camelus, *Strauß.*

Charleton, onom. zoic. p. 71. n. 10. Struthio; Struthio-camelus.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 350. Struthiocamelus, *Strausvogel.*

Moehring, av. gen. p. 56. n. 54. Struthio.

Knorr, delic. natur. II. Tab. I. 1. p. 81.

Barrere, orn. Cl. III. gen. 40. Struthio.

Hermann, tab. affin. anim. p. 131. 136. Struthio-Camelus.

Gerin. ornithol. II. p. 29. tab. 137. 138. 139.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 3. L. 11. c. 37. L. 29. c. 5. Struthiocamelus.

Aelian. de nat. anim. L. 2. c. 27. Στρουθος.

Aristot.

Aristot. hist. anim. L. 4. c. 14. L. 9. c. 32. Στρουθος ὁ λιβυκος.

Jes. XIII. v. 21. — Jerem. Klagl. IV. v. 3. — Mich. I. v. 8. — 3. Mos. XI. v. 16. — 5. Mos. XIV. v. 15. — Hiob. XXXIX. v. 18. 19.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 315. n. 1. *der gemeine Strauß.*

2. CASUARIUS. *Der Casuar.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 450. n. 2. *der Casuar.*

Leske, Naturgesch. p. 217. n. 2. *der Kasuar.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 128. n. 3. *der Kasuar.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 209. n. 2. Struthio (Casuarius) pedibus tridactylis, galea palearibusque nudis, remigibus spinosis; *der Casuar, Emeu.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 451. n. 2. *der Kasuar.*

Funke, Naturgesch. I. p. 311. *der Kasuar.*

Ebert, Naturl. II. p. 107. *der Casuar.*

Halle, Vögel, p. 91. n. 3. *der Kasuar.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 236. n. 227. *der Kasuar.*

Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 59. *Casuar.*

Onomat. hist. nat. II. p. 660. *Casuar.*

Beckmann, Naturhist. p. 48. n. 6. *b. der Casuar.*

Handb. d. N. G. II. p. 156. *der Casuar.*

Klein, av. p. 17. Casuarius, Casuaris, Emeu, Eme.

Klein, Vorbereit. p. 32. *Casuar.*

Klein, verb. Vögelh. p. 17. *Casuar.*

Klein, Stemmat. av. p. 2. c. fig.

Klein, Vögeleyer, tab. 2.

Brisson, ornith. II. p. 212. n. 1. *Casoar.*

Büffon, Vögel, III. p. 209. *der Kasuar.* tab. 76.

Batsch, Thiere, I. p. 407. *der Kasuar, Eme.*

Latham,

(3) Ist vor dem Jahre 1597. nicht in Europa gesehen.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 664. n. 1. Caſuarius (Emeu) niger, vertice galeato, corpore ſetoſo, capite colloque ſupremo nudis.

Sparrmann, Reiſ. p. 434. *der Kaſuar.*

Guyon, Oſtind. p. 202.

Keyßler, Reiſ. p. 23. Tab. 13. fig. 2.

Allgem. Reiſ. VIII. p. 52. *Eme.*

Franziſci oſt-u. weſtind. Luſtgarten, p. 315.

Verricht. d. niederl. oſtind. Geſellſch. 2te Geſandſch. p. 48. fig. p. 49.

Valentin, muſ. muſeor. I. p. 460. Caſuarius, c. f.

Muſ. Wormian. p. 292. Emeu.

Perrault, Charras, u. Dodart, Abh. a. d. N. G. II. p. 111. anatomiſche Beſchr. von 4. Caſuaren, tab. 57. *der Caſuel*, tab. 58. die Zergliederung.

Mannigfalt. III. p. 145. *der Kaſuar*, fig. p. 176.

Eberhard, Thiergeſch. p. 108. *Emeu.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 212. *Caſuar.*

Beckmann, Bibl. VI. p. 60. *der Caſuar.*

Mem. pour ſerv. à l'hiſt. des anim. II. p. 157.

Linné, Syſt. Nat. Ed. II. p. 55. Emeu.

Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 1. Emeu.

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 155. n. 2. Struthio (Caſuarius) pedibus tridactylis, vertice palearibusque nudis.

Kramer, Auſt. p. 354. n. 1. Caſuarius.

Charleton, onom. zoic. p. 71. n. 1. Emeu.

Moehring, av. gen. p. 57. n. 56. Cela.

Barrere, ornith. gen. 38. Emeu pennis ſetoſis, nigricantibus, craſſa cervice.

Ludolf, Aethiop. L. 10. c. 12. n. 2. II. p. 162. n. 89. Caſuarius.

Hermann, tab. affin. anim. p. 131. 132. Str. Caſuarius.

Gerin, ornithol. II. p. 28. tab. 136.

Donn-

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 316. n. 2. *der Kasuar.*

3. Rhea. *Der amerikanische Strauß.*

Müller, Natursyst. II. p. 452. n. 3. *der amerikanische Strauß.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 127. *der amerikanische Strauß.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 209. *Suri, Tuju.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 453. n. 3. *der Straußkasuar.*

Ebert, Naturl. II. p. 108. *der Straußbastard.*

Halle, Vögel, p. 89. n. 2. *Strauskasuar; ungeschwänzter Strauß.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 235. n. 226. *der Straußkasuar.*

Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 668. *Straußbastard; grauer Casuar mit Straußenschnabel; Ohnschwanz.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 823. *der amerikanische Strauß.*

Klein, av. p. 17. Struthio nothus.

Klein, Vorbereit. p. 31. *Strausbastard.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 17. *Straußbastard, Ohnschwanz.*

Brisson, ornith. II. p. 211. n. 1. Thouyou.

Büffon, ornith. I. p. 452. Touyou.

Büffon, Vögel, III. p. 195. *der Südamerikanische, Okzidentalische, Magellanische oder Guianische Strauß.*

Batsch, Thiere, I. p. 407. *der amerikanische Strauß.*

Latham, Syn. III. 1. p. 23. *.

Latham, Syst. ornith. II. p. 665. n. 1. Rhea Americana.

Vidaure, Chile, p. 71. *Straußvogel.*

Molina, l. c. *der Cheuque oder amerikanische Strauß.*

Eberhard, Thiergesch. p. 108. *der amerikanische Strauß.*

Beckmann, Bibl. VI. p. 60. *der Touyou.*

Goeze, Allerl. III. p. 124. n. 8. *der Strauß.*

Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorf. V. p. 345. *der Touioniou?*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 613. *der Touioniou?*

Allgem. Reis. XVI. p. 296. *Salian.*

La Maine, navigations austr. p. 129.

Hist. des Incas. Tom. II. p. 274.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 155. n. 3. Struthio (Americanus) digito postico rotundato mutico.

Moehring, av. Gen. p. 57. n. 55. Rhea.

De Laet nov. orb. p. 616. Yandou.

Barrere, Franc. equinox. p. 133. Grus cinerea ferrivora.

Jonston, av. p. 186. Nhanduguacu.

Charleton, onom. zoic. p. 115. n. 20. Jandou.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 317. n. 3. *der amerikanische Strauß.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

In der XII. Edition stand dies Geschlecht unter den *Grallis.*

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der neuholländische Kasuar.*

Phillips Reis. n. Botany-Bay, p. 170. tab. 7.

White, Reis. n. Neu Süd Wallis; in dem Magaz. merkw. Reisebeschr. V. p. 124. m. e. Fig.

Latham,

Latham, Syſt. ornith. II. p. 665. n. 2. Caſuarius (N. Hollandiae) nigricans, vertice plano, corpore ſetoſo, capite colloque pennaceis, tibiis poſtice ſerratis.

97. GESCHLECHT. Didus. *Der Strauſskaſuar.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 455. Gen. XCVII.
Leske, Naturgeſch. p. 219. Gen. III.
Borowsky, Thierreich, II. p. 160. Gen. XXV.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 209. Gen. L.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 456. Gen. LV.
Briſſon, ornith. II. p. 214. Gen. LXV. Raphus.
Batſch, Thiere, I. p. 402. Gen. CVI.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 662. Gen. LX.
Hermann, tab. affin. anim. p. 132. 163.
Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 317. Gen. LXIII.

1. Ineptus. *Der Dronte.* (4)

Müller, Naturſyſt. II. p. 455. *der Tölpel.*
Leske, Naturgeſch. p. 219. *der Dronte.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 161. *der Dronte.*
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 209. n. 1. Didus (Ineptus) pedibus ambulatoriis, cauda breviſſima, pennis incurvis; *der Dudu*, *Dronte*, *Walghvogel.*
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 456. *der Tölpel.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 186. *der Tölpel.*
Funke, Naturgeſch. I. p. 326. *der Dronte.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 236. n. 228. *der Dronte*, *Ebelvogel*, *Mönchsſchwan.*
Onomat. hiſt. nat. III. p. 663. *Dronte.*

(4) Soll, nach dem Bericht neuerer Reiſenden, jetzt gar nicht mehr exiſtiren, cf. *Blumenb.* l. c.

Handb. d. Naturgesch. II. p. 158. *der Dronte.*
Brisson, ornith. II. p. 214 n. 1. *Dronte.*
Büffon, Vögel, III. p. 230. *der Dronte.* tab. 77.
Batsch, Thiere, I. p. 409. *der Dronte.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 662. n. 1. Didus (Ineptus) griseus, remigibus rectricibusque flavo-cinereis, capite cucullato.
Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 84. *der Dodo.*
Beckmann, Bibl. VI. p. 60. *der Dronte.*
Neue Mannigfalt. III. p. 1. fig. p. 16.
Charleton, onom. zoic. p. 113. n. 15. Dodo Lusitanorum; Cygnus cucullatus.
Moehring, av. Gen. p. 58. n. 57. Raphus.
Bont. Ind. orient. p. 30. tab. 70. *Dronte.*
Jonston, av. p. 176. Cygnus cucullatus, s. gallus gallinaceus peregrinus Clusii.
Voy. des Holland. aux Ind. orient. II. p. 214.
Hermann, tab. affin. anim. p. 132. 163. Didus ineptus.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 317. *der Dronte.*

2. Solitarius. *Der Einsiedler.* (5)

Borowsky, Thierreich, II. p. 162. *der Einsiedler.*
Batsch, Thiere, I. p. 408. *der Einsiedler.*
Büffon, Vögel, III. p. 238. *der Einsiedler.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 662. n. 2. Didus (Solitarius) griseo fuscoque varius, alis abbreviatis, alulis gibbosis.
Beckmann, Bibl. VI. p. 61. *der Einsiedler.*
Allgem. Reis. X. p. 3. *der Einsiedler.*

3. Naza-

(5) Soll, nach *Büffon*, 45 Pfund schwer seyn, und das Eine Ey, welches das Weibchen legt, 7 Wochen bebrütet werden; auch das Fleisch der Jungen schmackhaft seyn.

3. Nazarenus. *Der Vogel von Nazareth.* (6)

Borowsky, Thierreich, II. p. 162. *der Nazarvogel.*

Batſch, Thiere, I. p. 409. *der Nazarvogel.*

Büffon, Vögel, III. p. 247. *der Vogel von Nazareth.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 663. n. 3. Didus (Nazarenus) toto corpore tomentoſo nigro.

Beckmann, Bibl. VI. p. 61. *der Vogel von Nazare.*

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.

Das Geſchlecht iſt mit zwey Gattungen vermehrt.

98. GESCHLECHT. Pavo. *Der Pfau.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 457. Gen. XCVIII.

Leske, Naturgeſch. p. 221. Gen. IV.

Borowsky, Thierreich, II. p. 163. Gen. XXVI.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 207. Gen. XLVII.

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 457. Gen. LVI.

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 293. Gen. XXXVII.

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 216.

Batſch, Thiere, I. p. 411. Gen. CXII.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 616. Gen. XLIX.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168.

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 318. Gen. LXIV.

(6) *Beckmann* vermuthet, daſs ſo wohl dieſe, als die vorhergehende Gattung mit dem Dronte wohl einerley ſeyn mögen.

1. Cristatus. *Der gemeine Pfau.* (7)

Müller, Naturſyſt. II. p. 457. n. 1. *der gemeine Pfau.*

Leske, Naturgeſch. p. 221. n. 1. *der gemeine Pfau.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 164. n. 2. *der gemeine Pfau.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 207. n. 1. Pavo (Criſtatus) capite criſta compreſſa, calcaribus ſolitariis. *Der Pfau, Pageluhn.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 457. n. 1. *der gemeine Pfau.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 293. n. 1. *der gemeine Pfau.* p. 304. *Phau; Paw; Pagelun, Pawlun, Junovogel, Pau.*

Funke, Naturgeſch. I. p. 218. *der Pfau.*

Ebert, Naturl. II. p. 112. *der Pfau.*

Halle, Vögel, p. 429. n. 449. *der Pfau.*

Meyer, Thiere, II. p. 1. tab. 1. *der Pfau.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 237. n. 229. *der Pfau.*

Beckmann, Naturhiſt. p. 49. n. 1. *der Pfau.*

Neuer Schaupl. d. Nat. VI. p. 445. *Pfau.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 217. *der gemeine Pfau.*

Handb. d. N. G. II. p. 50. *der Pfau.*

Handb. d. deutſch. Thiergeſch. p. 113. *der Pfau; Pacheluhm.*

Klein, av. p. 112. B. Pavo.

Klein, Vorbereit. p. 208. B. *Pfau, Paw.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 115. *Pfau.*

Klein, Vögeleyer, p. 32. tab. 14. fig. 1. 2.

Geſner, Vögelb. p. 396. *Pfaw.* M. e. zieml. guten Fig.

Siemſsen,

(7) Iſt erſt zu Alexanders des Groſsen Zeiten in Europa bekannt geworden. Das Männchen wird wohl 25. Jahr alt. Soll ſich mit Truthühnern begatten.

Siemſsen, meklenb. Vögel, p. 238. n. 1. *der gemeine Pfau.*
Briſſon, ornith. p. I. p. 79. n. 7. Paon.
Büffon, Vögel, V. p. 144. *der Pfau.* M. e. Fig.
Batſch, Thiere, I. p. 424. *der gemeine Pfau.*
Latham, Syſt. ornith. II. p. 616. n. 1. Pavo (Criſtatus) capite criſta compreſſa, calcaribus ſolitariis.
Bock, N. G. von Preuſs. IV. p. 372. *der Pfau.*
Wolf, Ceyl. II. p. 135. *der Pfau.*
Kolbe, Vorgeb. der guten H. Ed. in 4. p. 388. *Pfauen.*
Knox, Ceyl. p. 57. *die Pfauen.*
Valentin. muſ. muſeor. I. p. 462. Pavo. M. e. Fig.
Allgem. Reiſ. IV. p. 528. V. p. 79. *Pfauen.*
Pontoppidan, Norweg. II. p. 149. *Pfau.*
Beckmann, Bibl. VI. p. 396. *der Pfau.*
Eberhard, Thiergeſch. p. 65. *der Pfau.*
Meidinger, Vorleſ. I. p. 139. n. 1. *der gemeine Pfau.*
Oekonom. Zool. p. 82. n. 23. *der gemeine Pfau.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 17. 18. 506. 605.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 130. n. 162. *der gemeine Pfau.*
Anweiſ. Vögel zu fang. etc. p. 423. *der Pfau.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 799. *Pfau.*
Geoffroy, mat. med. VII. p. 609. *der Pfau.*
Allgem. Magaz. VII. p. 352. *Pfau.*
Naturforſch. XVII. p. 66. n. 139. *der gemeine Pfau.*
Neue Mannigfaltigk. III. p. 290.
Mannigfaltigk. IV. p. 529.
Merklein, Thierreich, p. 324. *Pfau.*
Zückert, Speiſ. a. d. Thierreich, p. 42.
Ludovici, Kaufmannslex. p. 626 ff.
Gothaiſch. Hofkalend. 1776. N. G. des Pfaues.

Lemmery, Materiallex. p. 846.
Hannöv. Magaz. 1769. p. 704.
Büchoz, Abhandl. vom Federvieh, p. 18.
Loniceri, Kräuterb. p. 661. *Pfau.*
Allgem. Haushalt. und Landwissensch. I. p. 861. *Pfau.*
Borkhausen, Magaz. I. p. 212. n. 89.
Sperling, diss. de Pavone, Witteb. 1643. 4.
Friederici, diss. de avium pulcherrima, Pavone, Lips. 1676. 4.
Bartholin. obs. ex anatome pavonis, Act. Haffn. I. obs. 114. p. 285.
Scaliger, exercitat. 238. p. 735.
Paullini, zeitverkürz. erbaul. Lust, III. n. 64. p. 421.
Aldrovand. pavonis elogium; in Dornav. Amphith. I. p. 436.
Libavii pavonis elogium; in Oper. Tom. II. p. 713.
Mandeslo, voy. aux Indes, Tom. II. Liv. I. p. 147.
Thevenot, voy. au Levant, III. p. 18.
Tavernier, voy. Tom. III. L. I. p. 57.
Pyrard, voyag. Tom. I. p. 426.
Lintscot, navigatio in Orientem, p. 39.
Second. voyag. de Siam. p. 75.
Gemelli Careri, voy. autour du monde, V. p. 270.
Hist. des Incas, Tom. II. p. 329.
Charlevoix, hist. de St. Domingue, I. p. 28—32.
Bruyer, de re cibaria, L. 15. c. 28.
Augustin. de civitat. Dei, L. 21. c. 4.
Mem. de l'Acad. des Inscript. XX. p. 636.
Menestrier, traité des Tournois, p. 40.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. Pavo.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 1. Pavo cauda longa.

Linne,

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 156. n. 1. Pavo (Criſtatus) capite criſta erecta.

Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 325. Pavo. *Pfaw; Paw.*

Charleton, onom. zoic. p. 72. n. 1. Pavo.

Belon, hiſt. des oiſeaux, p. 233. Paon.

Muſ. Wormian. p. 297. Pavo.

Moehring, av. gen. p. 50. n. 45. Pavo.

Rzaczynsk. hiſt. nat. Polon. p. 243. Pavo ſ. Pavus; Avis medica Varroni, Iunonia avis Ovidio.

Dict. des animaux, III. p. 324. Paon.

Bomare, dict. Tom. VII. p. 487. VIII. p. 205. Paon, oiſeau de Junon, ou de Medie ou de Perſe.

Encykl. oeconom. XI. p. 401. *Paon.*

Cours d'hiſt. nat. III. p. 80. Paon.

Zinnan. Uov. p. 25. tab. 1. Pavone.

Gerin. ornithol. II. p. 73. tab. 217.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168. Pavo criſtatus.

Ariſtot. hiſt. animal. L. 6. c. 2. n. 28. Ταως.

Aelian. de nat. anim. L. 5. c. 32. L. 11. c. 33. L. 13. c. 18. L. 16. c. 2. Ταως.

Plin. hiſt. nat. L. 10. c. 20. L. 11. c. 37. L. 29. c. 6. Pavo.

Sueton. Vitell. c. 13. Pavo.

Palladius, de re ruſt. L. 1. c. 28. Pavones.

Varro, de re ruſt. L. 3. c. 6. Pavo.

Gellii noct. attic. L. 7. c. 16. Pavones.

Columella, de re ruſt. L. 8. c. 11. Pavones.

Athenaei Deipnoſoph. L. 23. c. 13.

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 318. n. 1. *der gemeine Pfau.*

β. Pavo varius. *Der bunte Pfau.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 116. *a. der bunte Pfau.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 305. n. 2. *der bunte Pfau.*

Brisson, ornith. I. p. 81. A. Paon panaché.

Büffon, Vögel, V. p. 200. *der bunte Pfau*, m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 671.

Latham, Syst. ornith. II. p. 816. β. Pavo varius.

Merklein, Thierreich, p. 326.

γ. Pavo albus. *Der weiße Pfau.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 167. *b. der weiße Pfau.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 304. n. 1. *der weiße Pfau.*

Brisson, ornith. I. p. 81. B. Paon blanc.

Büffon, Vögel, V. p. 195. *der weiße Pfau*, m. e. Fig.

Merklein, Thierreich, p. 325. *schneeweiße Pfauen.*

Büchoz, Abhandl. vom Federvieh, p. 16.

Geoffroy, mater. med. VII. p. 618.

Klein, Vögeleyer, p. 32. *weißer Pfau.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 327. Pavo candidus.

Charleton, onom. zoic. p. 72. n. 1. Pavo albus.

Aldrovand. ornithol. p. 32. Pavo albus.

Linné, fn. Suec. II. p. 71. n. 197. β. Pavo colore albo.

Latham, Syn. II. 1. p. 672.

Latham, Syst. ornith. II. p. 617. β Pavo albus.

Gerin. ornithol. II. p. 74. tab. 218.

Zinnan. Uov. p. 26. tab. 1. fig. 1. Pavone bianco.

Diction. des animaux, III. p. 327.

Jonston, av. p. 58. Pavo albus.

2. Bicalcaratus. *Der doppelt gespornte Pfau.*

Müller, Natursyst. II. p. 459. n. 2. *der chinesische Doppelsporn.*

Leske,

Leske, Naturgeſch. p. 221. n. 2. *der Pfau mit doppelten Sporen.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 163. n. 1. *der doppelt geſpornte Pfau*, tab. 26.

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 458. n. 2. *der Pfaufaſan.*

Ebert, Naturl. II. p. 113. *ein Pfau in China, der zwey Sporen über einander hat.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 277. *der Pfaufaſan.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 218. *der Chineſiſche Pfau-Faſan.*

Klein, av. p. 114. n. 5. Phaſianus pavonius.

Klein, Vorbereit. p. 212. n. 5. *Pfaufaſan.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 118. *Faſan mit blauen Flecken, Pfaufaſan.*

Klein, av. p. 114. n. 6. Phaſianus fuſcus.

Klein, Vorbereit. p. 212. n. 6. *der braune Faſan.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 118. n. 6. *ſchwarzbrauner Faſan.*

Briſſon, ornithol. I. p. 82. n. 9. Paon de la Chine.

Büffon, Vögel, V. p. 275. *der chineſiſche Pfauenfaſan; Spornvogel*, m. 2. figg.

Batſch, Thiere, I. p. 424. *Pfauenfaſan.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 617. n. 3. Pavo (Bicalcaratus) capite ſubcriſtato, calcaribus binis.

Seligmann, Vögel, III. tab. 29. *der chineſiſche Phaſanenpfau.*

Seligmann, Vögel, III. tab. 33. *die Henne des Phaſanenpfauen aus China.*

Sonnerat, Reiſ. n. Oſtind. II. p. 135. tab. 99. *der kleine Pfau aus Malacca.*

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 156. n. 2. Pavo (Bicalcaratus) capite laevi, calcaribus duobus.

Bomare, Dictionn. IV. p. 349.

Dictionn. des animaux, II. p. 151.

Hermann,

Hermann, tab. affin. anim. p. 168. Pavo bicalcaratus.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 319. n. 2. *der doppelt gespornte Pfau.*

4. Tibetanus. *Der tibetische Pfau.*

Müller, Natursyst. II. p. 459. ad n. 2. *Chin-Tchien-Khi*, tab. 19. fig. 1.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 121. n. 4. *der Chinquis.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 219. *Chin-Tchien-Khi.*

Brisson, ornith. I. p. 83. n. 10. Paon de Tibet.

Büffon, Vögel, V. p. 269. *der Chinquis oder Tibetische Pfau.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 617. n. 4. Pavo (Tibetanus) dorso superiore tectricibusque caudae maculis splendide caerulais, calcaribus binis.

Linné, Syst. Nat. Ed. XII. I. p. 268. n. 2. β Pavo tibetanus.

3. Muticus. *Der Pfau ohne Sporen.*

Müller, Natursyst. II. p. 460. n. 3. *der japanische Pfau*, tab. 24. fig. 2.

Leske, Naturgesch. p. 221. n. 3. *der Pfau ohne Sporen.*

Borowsky, Thierreich, p. 167. n. 3. *der Japanische Pfau.*

Ebert, Naturl. II. p. 113. *der japanische Pfau.*

Halle, Vögel, p. 430. n. 450. *der geschuppte Pfau, mit Livreistreifen.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 219. *der Japanische Pfau.*

Brisson, ornith. I. p. 81. n. 8. Paon du Japon.

Büffon, Vögel V. p. 272. *der Japanische geschopfte Pfau; der Aehrenträger.*

Batsch, Thiere, I. p. 424. *der japanische Pfau.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 617. n. 2. Pavo (Muticus) capite criſta ſubulata, calcaribus nullis.

Charleton, onom. zoic. p. 72. n. 2. Pavo Japonenſis.

Diction. des animaux, III. p. 328.

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 319. n. 3. *der Pfau ohne Sporen.*

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 268. n. 2. β Pavo tibetanus.	p. 731. n. 4. Pavo tibetanus.

Das Geſchlecht iſt alſo mit *einer* Gattung vermehrt, welche vorher als Spielart von der zweyten angenommen wurde.

99. GESCHLECHT. MELEAGRIS. *Das Truthuhn.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 461. Gen. XCIX.

Leske, Naturgeſch. p. 222. Gen. V.

Borowsky, Thierreich, II. p. 167. Gen. XXVII.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 206. Gen. XLVI.

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 459. Gen. LVII.

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 306. Gen. XXXVIII.

Briſſon, ornith. I. p. 41. Gen. II. Gallo-pavo.

Batſch, Thiere, I. p. 410. Gen. CVIII.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 618. Gen. L.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 319. Gen. LXV.

1. GALLOPAVO. *Der Puter.* (8)

Müller, Naturfyft. II. p. 463. *der wilde Truthahn aus Neuengland.*

Leske, Naturgefch. p. 222. n. 1. *das Puterhuhn.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 207. n. 1. Meleagris (Gallopavo) maris pectore barbato; *der Kalekuter; Truthahn; Puder.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 169. *die wilden Puter.*

Bechftein, Naturgefch. Deutfchl. II. p. 330. n. 1. *das wilde Truthuhn.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 273. n. 94. *das wilde Puterhuhn.*

Ebert, Naturl. II. p. 113. *die Truthühner.*

Halle, Vögel, p. 433. n. 451. *das Indianifche Huhn.*

Meyer, Thiere, II. p. 1. tab. 3.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 242. n. 230. *der Kalekuter.*

Neuer Schaupl. der Nat. IV. p. 351. *Kalekutifcher Hahn.*

Onomat. hift. nat. V. p. 135. *der welfche Hahn.*

Klein, av. p. 112. n. 1. Meleagris vulgaris.

Klein, Vorbereit. p. 208. n. 1. *gemeiner Kalekut.*

Klein, verb. Vögelh. p. 116. n. 1. *gemeiner Kalekuter.*

Klein,

(8) Ift 1530. zuerft nach Deutfchland gebracht. — Die erfte genaue Befchreibung von diefem Vogel hat *Oviedo* ums Jahr 1525. gegeben — Im wilden Zuftande, wo fie in Herden von 500. angetroffen werden, fteigen fie bis auf den Gipfel der höchften Bäume, und werden von dem Genufs der kleinen rothen Eicheln fo fett, dafs fie nur noch eine kurze Strecke fliegen können, und bald von einem Reuter überjagt werden. Sie follen alsdenn oft an 40. Pfund fchwer werden. Das Weibchen brütet 26—27. Tage. — In den bewohnten Gegenden von Amerika find die *wilden* Puter aufserordentlich felten geworden, und finden fich nur haufenweife an den entfernteften und unbefuchteften Oertern.

Klein, Vögeleyer, p. 32. tab. 13. fig. 4.
Briſſon, ornith. I. p. 43. B. Dindon ſauvage.
Büffon, Vögel, IV. p. 224. *die wilden Puter.*
Batſch, Thiere, I. p. 418. *gemeine Puter.*
Latham, Syſt. ornith. II. p. 618. n. 1. Meleagris (Gallopavo) capite caruncula frontali gularique, maris pectore barbato.
Linné, Syſt. Nat. Ed. II. p. 56. Gallopavo.
Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 1. Gallopavo.
Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 156. n. 1. Meleagris (Gallopavo) capite caruncula frontali, criſtaque gulari, maris pectore barbato.
Charleton, onom. zoic. p. 72. n. 2. Gallopavo; Gallus Indicus, Meleagris.
Moehring, av. gen. p. 51. n. 47. Cenchramus.
Schaefer, element. ornithol. tab. 37.
Zinnan. Uov. p. 27. Gallina indiana.
Hermann, tab. affin. anim. p. 168. Meleagris Gallopavo.
Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 319. *der Puter.*

β. *Der zahme Puter.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 461. n. 1. *der kalekutſche Hahn.* tab. 24. fig. 3.
Borowsky, Thierreich, II. p. 168. n. 2. *der kalekutſche Hahn.*
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 459. *das Truthuhn.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 306. n. 1. *das gemeine Truthuhn.* p. 330. *Puterhuhn; Kalekuter; kalekutiſcher Hahn; gemeiner Kalekut; Truthahn; Puter; Puder; wälſcher Hahn; türkiſcher Hahn; Kuhnhahn; indianiſcher Hahn; Puthe; Kalkun; Knurre; Putchen; Pipe.*
Funke, Naturgeſch. I. p. 203. *das Trut'uhn.*

Briſſon,

Briſſon, ornith. I. p. 1. n. 1. Dindon.
Büffon, Vögel, IV. p. 190. *der kalekutiſche Hahn, oder Puter.* Tab. 95. 96.
Siemſſen, meklenb. Vögel, p. 240. n. 1. *der gemeine Kuhnhahn.*
Eberhard, Thiergeſch. p. 63. *der welſche Hahn.*
Meidinger, Vorleſ. I. p. 140. n. 1. *das Puterhuhn.*
Handb. d. N. G. II. p. 38. *der Kalekuter.*
Handb. d. deutſch. Thiergeſch. p. 114. *Puterhahn.*
Beckmann, Naturhiſt. p. 49. n. 2. *der Kalekutiſche Hahn.*
Gesner, Vögelb. p. 218. *Indianiſch Hun.* fig. p. 219. zieml. gut.
Bock, N. G. von Preuſſ. IV. p. 373. *der Kalkaun; Truthahn.*
Cetti, Sardin. II. p. 109. *das Puterhuhn.*
Molina, Chil. p. 210. *Puter.*
Wolf, Zeil. p. 160. *der kalekutiſche Hahn.*
Taube, Slavon. u. Syrm. I. p. 4. *wälſche Hühner.*
Georgi, Ruſsl. p. 442. *welſche Hühner.*
Fermin, Surin. II. p. 143. *der Puter.*
Kolbe, Vorgeb. d. g. H. ed. in 4. p. 388. *Indianiſche Hühner.*
Knox, Ceyl. p. 57. *calecutiſche Hähne.*
Adanſon, Senegall. p. 250. *kalekutiſche Hähne.*
Pontoppidan, Dännem. p. 172. *Kalkon; Truthahn.*
Naturforſch. XVII. p. 66. n. 140. *der kalekutiſche Hahn.*
Neue ſchwed. Abhandl. X. p. 221. 224.
Lichtenberg, Magaz. für das Neueſte, etc. II. 1. p. 234. *das kalekutiſche Huhn.*
Lichtenb. u. Voigt, Magaz. VII. 2. p. 154. *calecutiſcher Hahn.*
Andre u. Bechſtein, Spazierg. III. p. 268. 273. *Puter.*
Olla potrida. 1786. 2. St. p. 87.

Beckmann,

Beckmann, Bibl. V. p. 505. VI. p. 391. *der kalekutische Hahn.*
Oekonom. Zool. p. 83. *der kalekutsche Hahn.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 1332. *Truthahn.*
Loniceri, Kräuterb. p. 643. *Indianischer Hahn.*
Dan. Beckherr, preuss. Messerschlucker, 1636. p. 22. f.
Beckmann, Beytr. zur Gesch. d. Erfind. III. p. 244. *Kalekuter.*
Kramer, Austr. p. 355. n. 1. Meleagris; *Indianisch Piphun.*
Schwenkfeld, av. Siles. p. 279. Gallopavus; *Calecutisch Hun.*
Du Tertre, hist. des Antill. II. p. 265. Poule d'Inde.
Salerne, ornithol. p. 132.
De Lery, voyag. au Brésil. p. 171.
Lawson, hist. Carol. p. 27. und 149.
Du Pratz, Louisian. II. p. 85.
Russel, Alepp. p. 63.
Tavernier, voyag. p. 146.
Purchas, Pilgr. III. p. 995.
Dampier, voyag. Vol. III. P. II. p. 65. 85. 114.
De Laet, descr. Ind. p. 74. 83. 91. 491.
Lopez de Gomara, Hist. de Mexico. p. 343. *Gallipavos.*
Anderson, Gesch. des Handels, III. p. 518. IV. p. 131. 189.
Borkhausen, Magazin, I. p. 213. n. 90.
Bomare, Diction. III. p. 313. Coq d'Inde.
Encycl. Oeconom. VI. p. 329. Coq et Poule d'Inde; Paon d'Inde.
Cours d'hist. nat. III. p. 58. Coq d'Inde.
Diction. des animaux I. p. 699.
Chardin, voyag. III. c. 9. p. 38.
Gerin. ornithol. II. p. 75. tab. 222 — 226.

Hannöv. Magaz. 1777. p. 1246. hartes Leben eines Truthhahns.

Petit, deſcript. anatomique de l'Oeil du Coq d'Inde. Mem. de l'Acad. de Par. 1735. p. 163. Mit Abbild.

Gahrliep, de ovo Gallo-pavi, ut raro ſic monſtroſo. — Eph. nat. cur. Dec. III. an. 5. et 6. obſ. 164. p. 374.

Zink: Leipzig. Samml. VIII. p. 959. von welſchen Hühnern.

Hannöv. Magaz. 1776. p. 767. u. 1470. vom Brüten des Puterhahns.

Nachr. d. Schleſ. patriot. Geſellſch. I. p. 306. III. p. 4. von Erziehung der Puter.

Journ. Encycl. 1768. V. 2. p. 129. — Berlin. Samml. IV. p. 574. Schwediſche Art, die jungen Puter zu erziehen.

Stutg. ökonom. phyſ. Ausz. II. p. 529. *vom Mäſten* der welſchen Hühner.

Phyſik. ökonom. Patriot. III. p. 314.

Allgem. Haushalt. u. Landwiſſenſch. I. p. 837. ff.

Zückert, Speiſ. a. d. Thierreich, p. 91.

Allgem. Harzmagaz. I. p. 33. ff. 103. ff.

Preuſſ. Sammler, I. p. 152.

γ. *Der gehäubte Puter.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 464. *b. der Haubentruthhahn.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 332. n. 5. *das Puterhuhn mit dem Federbuſche.*

Halle, Vögel, p. 433. n. 452. *das Indianiſche Huhn, mit weißem friſirten Federbuſche auf dem Kopfe.*

Klein, av. p. 113. n. 2. Meleagris, Gallo-pavo criſtatus.

Klein,

Klein, Vorbereit. p. 210. n. 10. *Kurre mit Straußfedern.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 117. n. 2. *Kurre mit Straußfedern.*

Briſſon, ornith. I. p. 43. A. Dindon hupé.

Büffon, Vögel, IV. p. 225. *der gehäubte Puter.*

Wöchentl. Danzig. Erfahrungen, 1746.

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 157. γ. Gallopavo criſtatus.

δ. *Der kupferfarbene Puter.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 331. n. 4. *das kupferfarbene Truthuhn.*

ε. *Der weiße Puter.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 331. n. 3. *das weiße Truthuhn mit rothem Kopfe und ſchwarzem Haarbüſchel auf der Bruſt.*

ζ. *Das Baſtardtruthuhn.* *

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 332. n. 6.

η. *Eine eigene Spielart von zahmen ſchwarzen, verwilderten Truthühnern.* *

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 331. n. 2.

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 269. n. 2. Meleagris Criſtata	p. 733. n. 2. Penelope Criſtata.
p. 269. n. 3. Meleagris Satyra.	p. 733. n. 1. Penelope Satyra.

In der XII. Edit. beſtand dies Geſchlecht aus *drey* Gattungen; da aber die beyden letztern in der XIII. zum folgenden Geſchlechte gezählt worden ſind, ſo hat erſteres nun um ſo viel weniger. Bey der erſten Gattung ſind die Varietäten δ und ε hinzugekommen.

 * EIN-

* EINGESCHOBENES GESCHLECHT.

PENELOPE. *Die Penelope.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 461. Gen. LVIII.
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 187. Gen. LXVIII.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 619. Gen. LI.
Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 320. Gen. LXVIII.

1. SATYRA. *Der Napaul.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 464. n. 3. *der bengaliſche Truthahn.*
Leske, Naturgeſch. p. 222. n. 3. *der gehörnte Truthan; der Napol.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 168. n. 2. *das gehörnte Truthuhn*, Tab. 27.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 461. *Napol.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 187. *der Napol.*
Ebert, Naturl. II. p. 112. *der gehörnte indianiſche Faſan.*
Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 769. n. 7. *gehörnter Faſan.*
Onomat. hiſt. nat. V. p. 139. *der gehörnte Faſan.*
Klein, verbeſſ. Vögelhiſtor. p. 118. n. 7. *gehörnter Faſan.*
Briſſon, ornith. I. p. 86. n. 17. Faiſan cornu de Bengale.
Büffon, Vögel, V. p. 259. *der gehörnte Faſan oder Napaul*, m. e. Fig.
Batſch, Thiere, I. p. 418. *das gehörnte Truthhuhn.*
Latham, Syn. Suppl. p. 203. Horned Turkey.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 619. n. 2. Meleagris (Satyra) capite cornibus geminis, corpore rubro, punctis ocellatis.

Selig-

Seligmann, Vögel, V. tab. 2. *der gehörnte indianische Fasan.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 157. n. 3. Meleagris (Satyra) capite cornibus duobus, corpore rubro, punctis nigris, albo foetis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 169. Meleagris Satyra.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 320. n. 1. *der gehörnte Fasan.*

2. CRISTATA. *Der Quan.* (9)

Müller, Natursyst. II. p. 464. n. 2. *der brasilianische Truthahn.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 122. n. 2.

Leske, Naturgesch. p. 222. n. 2. *das brasilianische Truthun.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 170. n. 3. *das Brasilianische Truthuhn.*

Halle, Vögel, p. 435. n. 454. *der dunkelbraune Fasan; Jacupema.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 96. *Guan; der dunkelbraune Fasan.*

Klein, av. p. 112. n. 4. Alector Brasiliensis, Quan s. Guan Indis.

Klein, Vorbereit. p. 207. n. 4. *brasilianischer Hahn.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 115. n. 4. *Brasilianer.*

Klein, av. p. 114 n. 2. Phasianus fuscus brasiliensis.

Klein, Vorbereit. p. 211. n. 2. *der braune Brasilianische.*

Klein, verb. Vögelh. p. 118. n. 2. *brauner Brasilianer.*

Brisson, ornith. I. p. 43. n. 2. Dindon du Brésil.

Büffon, Vögel, V. p. 302. 304. *der Guan oder Quan.*

 Batsch,

(9) Nach *Büffon* eine Spielart von der folgenden Gattung.

Batsch, Thiere, I. p. 418. *das brasilianische Truthuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 619. n. 1. Penelope (Cristata) capite pennis erectis cristato, temporibus violaceis.

Seligmann, Vögel, I. tab. 25. *der in Westindien so genannte Quan, oder Guan; der brasilianische Fasan.*

Schlözer, Erdbeschr. von Amer. p. 685. der Quan.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 157. n. 2. Meleagris (Cristata) capite pennis erectis cristato, temporibus violaceis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168. Meleagris Cristata.

Jonston, av. p. 194. Jacupema.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 321. n. 2. *der brasilianische Fasan.*

3. Cumanensis. *Der Jaku.*

Büffon, Vögel, V. p. 300. *der Jaku*, m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 620. n. 3. Penelope (Cumanensis) nigricans, capite cristato, temporibus gulaque caeruleo-nigricantibus.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 603. *Jaku, Cujovit.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 321. n. 3. *der weißgehaubte Fasan.*

4. Pipile. *Die schwarzbäuchige Penelope.*

Latham, Syn. Suppl. p. 205. Piping Curassow.

Latham, Syst. ornith. II. p. 620. n. 2. Penelope (Pipile) caruncula gulari caerulea, ventre atro, dorso fusco atro maculato.

5. Marail. *Der Maraye.* (10)

Müller, Natursyst. Suppl. p. 125. n. 10. Marail.

Büffon,

(10) *Büffon* vermuthet, er sey das Weibchen oder eine Abänderung vom *Jaku.* (Cr. Cumanensis.)

Büffon, Vögel, V. p. 306. *der Marail, oder grünliche Kayennische Fasan*, m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 620. n. 4. Penelope (Marail) capite subcristato, temporibus gulaque incarnatis carunculatis.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 602. *der Maraye.*

Fermin, Surin. p. 129. *Maray.*

Barrere, Fr. equinox. p. 139. Phasianus niger, aburus, viridi rostro.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 321. n. 4. *der grünliche cayennische Fasan.*

6. Vociferus. *Der Schreyvogel.*

Büffon, Vögel, V. p. 312. *der Schakamel oder Chakamel.*

Onomat. histor. nat. II. p. 802. Chachalacametl, p. 802. *Schreyvogel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 625. n. 5. Crax (Vociferans) fusca, rostro pedibusque cyaneis, abdomine albido.

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das ganze Geschlecht ist hier neu. Die *erste* und *zweyte* Gattung sind aus dem vorhergehenden Geschlechte hieher versetzt; die übrigen *vier* sind neu hinzu gekommen.

100. GESCHLECHT. Crax. *Der Hoko. (Buschhuhn.)*

Müller, Natursyst. II. p. 465. Gen. C.

Leske, Naturgesch. p. 223. Gen. VI.

Borowsky, Thierreich, II. p. 170. Gen. XXVIII.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 206. Gen. XLV.

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 461. Gen. LIX.
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 187. Gen. LXIX.
Onomat. hiſt. nat. III. p. 458.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 622. Gen. LIII.
Batſch, Thiere, I. p. 411. Gen. CXI.
Hermann, tab. affin. anim. p. 168. 169.
Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 322. Gen. LXVII.

1. Alector. *Der Curaſſo.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 464. n. 1. *der guajaniſche Pauwis.*
Leske, Naturgeſch. p. 223. n. 1. *der Hoko von Guiana.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 170. n. 1. *der guianiſche Hokko*, tab. 28.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 206. n. 1. Crax (Alector) cera flava, corpore nigro, ventre albo; *der Curaſſo.*
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 462. *der guianiſche Hocko.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. I. p. 187. *der guianiſche Hocko.*
Onomat. hiſt. nat. III. p. 460. Crax Gujanenſis.
Halle, Vögel, p. 424. n. 445. *das ſchwarze dünnleibige Huhn aus Indien.*
Klein, av. p. 111. n. 3. Alector Curaſſaus? Mituporanga.
Klein, Vorbereit. p. 206. n. 3. *Indianiſcher Hahn.*
Klein, verb. Vögelhiſt. p. 115. n. 3. *Kuraſſauer.*
Briſſon, ornithol. I. p. 84. n. 12. Hocco de la Guiane.
Büffon, Vögel, V. p. 281. der eigentlich ſo genannte Hokko. M. e. Fig.
Batſch, Thiere, I. p. 423. *der guianiſche Hokko.*

Latham,

Latham, Syſt. ornith. II. p. 622. Crax (Alector) cera flava, corpore nigro, ventre albo. (*mas*).
Bankroft, N. G. von Guian. p. 104. *der Pfauenfaſan von Guiana.*
Schlözer, Erdbeſchr. von Amer. p. 228. Curaſoe.
Schneider, zool. Abh. p. 139. *indianiſche Hahn.*
Perrault, *Charras u. Dodart*, Abhandl. a. d. N. G. I. p. 259. anatomiſche Beſchr. dreyer indianiſcher Hähne, tab. 34. *der indianiſche Hahn;* tab. 35. die Zergliederung.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 131. n. 163. *der ſchwarze indianiſche Hahn.*
Neue Mannigfalt. III. p. 608. *Kuraſſovogel; Kuraſſaviſche Pfauenfaſan*, *Kuſkovogel*, fig. p. 624.
Linné, Syſt. Nat. Ed. II. p. 55. Crax.
Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 1. Crax niger, corolla albo nigroque varia.
Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 157. n. 1. Crax (Nigra) nigra.
Moehring, av. gen. p. 51. n. 46. Crax.
Jonſton, av. p. 191. Mituporanga.
Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 322. n. 1. *Der Curaſſo.*

β. MITU. *Der braſilianiſche Hoko.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 466. n. 3. *der braſilianiſche Pauwis.*
Onomat. hiſt. nat. III. p. 458. *der braſilianiſche Nachtwächter.*
Klein, av. p. 112. Alector Mitu vel Mutu.
Klein, Vorbereit. p. 207. *Mitu oder Mutu.*
Klein, verb. Vögelhiſt. p. 115. *Mitu.*
Briſſon, ornith. I. p. 83. n. 11. Hocco du Bréſil.
Büffon, Vögel, V. p. 285. *braſilianiſcher Hokko*, p. 286. *Mitu.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 623. β. Cr. cera rubra, corpore nigro, abdomine fuſco.

Latham, Syn. II. 2. p. 691. Var. A.

Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 27. n. 3. Crax niger corolla atra, roſtro rubro.

Barrere, ornithol. p. 83. Crax niger, criſta tota atra, roſtro cinnabrino.

Jonſton, av. p. 180. Mutu.

γ. *Der Curaſſo mit weißer Schwanzſpitze.*

Latham, Syn. II. 2. p. 692. Var. B.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 623. γ.

δ. *Der Curaſſo mit weißem, ſchwarz geſpitztem Federbuſch.*

Latham, Syn. II. 2. p. 692. Var. C.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 623. δ. Cr. cera flava, corpore nigro, criſta alba, apice nigra, collo albo nigroque faſciato.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 131. α.

b. Rubra. *Der* (ſo genannte) *peruvianiſche Hoko.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 466. n. 2. *der Peruvianiſche Pauwis.*

Halle, Vögel, p. 426. n. 446. *das rothe Huhn aus Indien.*

Klein, av. p. 112. ad. n. 4. Albini Gallina.

Briſſon, ornith. I. p. 86. n. 16. Hocco du Perou.

Büffon, Vögel, V. p. 283. *peruaniſche Hokko.*

Latham, Syn. II. 2. p. 693.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 623. n. 1. Crax (Alector) rubra, capite caeruleſcente, criſta alba, apice nigra. *(femina.)*

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 157. n. 2. Crax (Rubra) rubro capite caeruleſcente.

Gerini, ornithol. II. p. 77. tab. 227. Gallopavo braſilienſis.

ε. *Latham*,

ε. *Latham*, Syn. II. 2. p. 693. Var. A.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 624. β. Cr. corpore rubro, collo albo nigroque annulato, abdomine albo, cauda fuſca.

ζ. *Latham*, Syn. II. 2 p. 693. Var. B.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 624. γ. Cr. corpore toto fuſco-rubro, luteſcenteque faſciato.

η. *Latham*, Syn. II. 2. p. 693. Var. C.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 624. δ. Cr. corpore fuſco-rubro, collo albo nigroque annulato, cauda faſciis novem luteis nigro marginatis.

4. Globicera. *Der ſchwarzbläuliche Curaſſo, mit kirſchförmiger Kugel auf dem Stirnbein.* (1)

Müller, Naturſyſt. II. p. 467. n. 4. *der Curaſſauiſche Pauwis.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 171. n. 2. *der Curaſſaoſche Hokko.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 459. Crax curaſſavicus.

Klein, av. p. 111. ad n. 3. Gallus alius indicus. p. 112. Gallina indica.

Klein, Vorbereit. p. 207. *die indianiſche Henne.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 115. ad n. 3. Gallus indicus. Gallina indica.

Briſſon, ornith. I. p. 85. n. 13. Hocco de Curaſſow.

Büffon, Vögel, V. p. 282. 286. 291.

Batſch,

(1) Mit dieſem Vogel ſcheint es noch nicht ſo ganz aufs Reine zu ſeyn, ob er wirklich eine eigene Gattung ausmache oder nicht. *Briſſon* und *Büffon*, u. a. m. halten ihn ohne Bedenken mit dem *Alector* für einerley; und *Edwards* ſagt ſelbſt, daſs ſein *Curaſſow Bird* der *Mituporanga* des *Marcgr.* ſey. Auch finde ich bey *Seligmann*, *Dodart* mem. III. p. 223. als Synonym citirt. Hiezu kommt, daſs, wie Edw. ſagt, der Knopf auf dem Schnabel erſt nach dem erſten Jahre erſcheint, und *Fernandez* an ſeinem *Tepetoto'l* ebenfalls einen Höker auf dem Schnabel wahrgenommen, der vielleicht eben dieſen in der erſten Bildung begriffnen Knopf vorſtellete.

Batſch, Thiere, I. p. 423. *der Kuraſſaoſche Hokko.*
Lathami, Syſt. ornith. II. p. 624. n. 2. Crax (Globicera) flava, narium gibbere globoſo, corpore nigro-caeruleſcente, abdomine imo albo.
Seligmann, Vögel, VIII. tab. 85. *der Curaſſovogel.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 132. b. *das indianiſche Huhn.*
Jonſton, av. p. 84. Gallus indicus alter.
Gerin. ornithol. II. p. 79. tab. 229.

5. Pauxi. *Der Pauxi.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 468. n. 5. *der mexicaniſche Pauwis.*
Leske, Naturgeſch. p. 223. n. 2. *der Pauxi, Kuſko.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 172. n. 3. *der Mexikaniſche Hokko.*
Onomat. hiſt. nat. III. p. 460. *der Hocco-Vogel von Mexico.*
Klein, av. p. 112. Pauxi Nierembergii.
Klein, Vorbereit. p. 207. *der Pauxi.*
Klein, verb. Vögelhiſt. p. 115. ad n. 3. *Pauxi.*
Briſſon, ornith. I. p. 85. n. 14. Hocco du Mexique.
Büffon, Vögel, V. p. 293. *der Pauxi, Kusko, Steinvogel von Kayenne.* M. e. Fig.
Batſch, Thiere, I. p. 423. *Kusko.*
Latham, Syſt. ornith. II. p. 624. n. 3. Crax (Pauxi) cera caerulea, narium gibbere criſtato, corpore nigricante, abdomine apiceque caudae albis.
Seligmann, Vögel, VIII. tab. 85. *der Cuſco.*
Murr, Reiſ. d. Miſſionar. p. 230. *der Pauxi.*
Neue Mannigfalt. III. p. 601. *der Kuſkusvogel, oder mexikaniſche Pfauenfaſan.* M. e. Fig.
Jonſton, av. p. 84. Gallina indica altera.

Donn-

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 322. n. 2. der Pauxi.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.	Edit. XIII.
p. 270. n. 2. Crax rubra.	p. 736. *b.* Cr. Alector. Femina.
p. 270. n. 3. Crax Mitu.	p. 736. *β.* Cr. Alector. Var.

Auf diese Art hat das Geschlecht jetzt drey Gattungen weniger, als vorhin. Bey der ersten sind die Var. *β.* bis *η.* hinzugekommen.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der Hoko mit hornartigem Gewächs auf dem Scheitel.*

Brisson, ornith. I. p. 87. n. 18. Crax vertice cono corneo onusto, *Hocco à tête calleuse.*

Latham, Syn. Suppl. p. 206. Galeated Curassow.

Latham, Syst. ornith. II. p. 624. n. 4. Crax (Galeata) vertice corneo, corpore nigro, crisso albo.

101. GESCHLECHT. PHASIANUS. *Der Fasan.*

Müller, Natursyst. II. p. 469. Gen. CI.

Leske, Naturgesch. p. 223. Gen. VII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 173. Gen. XXIX.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 204. Gen. XLIV.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 463. Gen. LXI.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 333. Gen. XXXIX.

Onomat. hist. nat. VI. p. 431.

Brisson, ornith. I. p. 44. Gen. III.

Batsch,

Batsch, Thiere, I. p. 410. Gen. CX.
Latham, Syst. ornith. II. p. 625. Gen. LIV.
Hermann, tab. affin. anim. p. 168.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 322. Gen. LXVIII.

1. Gallus. *Der Hahn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 625. n. 1. Phasianus (Gallus) caruncula compressa verticis geminaque gulae, auribus nudis, cauda compressa adscendente, pennis colli linearibus elongatis, apice membranaceis.
Sonnerat, Reis. nach Ostind. u. China. II. p. 116. *der wilde Hahn und die wilde Henne.* tab. 94. 95.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 395. *der wilde Hahn.*

β. Domesticus. *Der gemeine Haushahn; gemeine Huhn.*

Müller, Natursyst. II. p. 469. n. 1. *der Haushahn.*
Leske, Naturgesch. p. 224. n. 1. *das gemeine Huhn.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 177. n. 5. *der Haushahn.*
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 204. n. 1. Phasianus (Gallus) caruncula compressa verticis geminaque gulae, auribus nudis, cauda compressa adscendente.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 463. n. 1. *das gemeine Huhn.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 334. n. 1. *das gemeine Haushuhn.*
Funke, Naturgesch. I. p. 194. *das Huhn.*
Halle, Vögel, p. 418. n. 437. *das Haushuhn.*
Meyer, Thiere, I. Tab. 75. *das Huhn*, — tab. 76. das Gerippe von Färberröthe roth, — tab. 77. Gerippe weiss von einem vierfüssigen *Huhn*, — tab. 78. dreyfüssige *Hahn* mit dem Gerippe.

Gatterer,

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 244. n. 233. *der Haushahn.*
Neuer Schaupl. d. Nat. III. p. 622. *Hahn.*
Onomat. hiſt. nat. VI. p. 437. *der Haushahn.*
Beckmann, Naturhiſt. p. 49. n. 3. *a. der gemeine Haushahn.*
Handb. d. Naturgeſch. II. p. 27. *der Hahn.*
Handb. d. deutſch. Thiergeſch. p. 114. *der Haushahn; Gockel, Geker.*
Sander, oekon. Naturgeſch. II. p. 14. *der Haushahn.*
Walther, oekon. N. G. Deutſchl. p. 135. *Haus-Hahn.*
Klein, av. p. 111. A. 1. Alector.
Klein, Vorbereit. p. 206. n. 1. *Nachtwächter.*
Klein, verb. Vögelhiſt. p. 114. n. 1. *Haushahn; Kräher.*
Klein, Vögeleyer, p. 31. tab. 13. fig. 1.
Gesner, Vögelb. p. 160. *Han*, fig. p. 161. gut. p. 177. *Capaun, oder Caphan.* M. e. gut. Fig. p. 180. *Henne.* M. e. gut. Abbild.
Briſſon, ornith. I. p. 45. n. 1. Le coq et la Poule.
Büffon, Vögel, IV. p. 78. *der Haushahn und die Henne.* M. 2. Figg.
Batſch, Thiere, I. p. 420. *der gemeine Hahn.*
Latham, Syn. II. 2. p. 700. Domeſtic Cock.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 626. n. 1. β. Gallus *domeſticus*, caruncula compreſſa verticis geminaque gulae, auribus nudis, cauda compreſſa adſcendente, pennis colli linearibus elongatis.
Bock, N. G. von Preuſſ. IV. p. 379. *das zahme Huhn.*
Cetti, Sardin. II. p. 101. *das Huhn.*
Molina, Chili, p. 209. *die Haushühner.*
Niebuhr, Beſchr. von Arab. p. 168. *Hüner.*

Wolf,

Wolf, Ceyl. p. 137. *der Hahn.*
Olaffen, Isl. I. p. 118. *Hüner.*
Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffn. Ed. in 4. p. 388. *Hahnen und Hühner.*
Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 1. *Hane.*
Pontoppidan, Norweg. II. p. 148. *Höns.*
Fermin, Surin. II. p. 138. *Haushuhn.*
Taube, Slavon. I. p. 40. *Hennen.*
Adanſon, Senegall. p. 250. *Hühner.*
Allgem. Reiſ. IV. p. 265. 388.
Bosmann, Reiſ. n. Guinea, p. 240.
Borkhauſen, Magaz. I. p. 213. n. 91.
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 240. n. 1. *der Haushahn.*
Eberhard, Thiergeſch. p. 63. n. 1. *der Haushahn.*
Merklein, Thierreich, p. 283. *Hänne.*
Meidinger, Vorleſ. p. 141. n. 1. *das gemeine Huhn.*
Naturforſch. XVII. p. 68. *der Haushahn.*
Krünitz, ökonom. Encykl. XXVI. p. 1. *Huhn.*
Oekonom. Zool. p. 84. n. 25. *der Haushahn.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 424. *Hahn.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 133. n. 164. *der Haushahn.*
Beckmann, Bibl. VI. p. 385. *der Haus-Hahn.*
Allgem. Haushalt. u. Landwiſſenſch. I. p. 824.
Beckmann, deutſche Landwirthſch. p. 471.
Linné, Syſt. Nat. Edit. II. p. 56. Gallina.
Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 1. Gallus gallinaceus.
Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 158. n. 1. Phaſianus (Gallus) cauda compreſſa aſcendente.
Kramer, Auſtr. p. 355. n. 1. Gallus cauda compreſſa aſcendente. *Han.*
Charleton, onom. zoic. p. 75. n. 17. Gallus Gallinaceus.

Charle-

Charleton, exercit. p. 84. Gallus Gallinaceus.

Belon, hiſt. nat. des Oiſ. p. 242. Coc, Coq, Gau, Geau, Gal, Gog.

Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 264. *Gallus domeſticus.* Han. p. 266. Gallina villatica; *Henne*, *Hun.*

Moehring, av. gen. p. 52. n. 49. Gallus.

Rzaczynsk. hiſt. nat. Polon. p. 432. Gallus gallinaceus.

Jonſton, av. p. 72. Gallus gallinaceus.

Schäfer, element. ornithol. tab. 38.

Gerini, ornithol. II. tab. 207. 208.

Ariſtot. hiſt. anim. L. 6. c. 1. n. 58. c. 2. n. 1. 28. c. 3. n. 39. 45. c. 4. n. 49. Ἀλεκτορίδες.

Aelian. de nat. anim. L. 4. c. 29. Ἀλεκτρυών. L. 3. c. 38. L. 4. c. 16. Ἀλεκτορίδες.

Plin. hiſt. nat. L. 10. c. 21. c. 50. c. 56. Gallus; Gallina.

Varro, de re ruſt. L. 3. c. 9. Gallinae villaticae.

Columella, de re ruſt. L. 8. c. 2. Gallina ruſtica.

Palladius, de re ruſt. L. 1. c. 27. Gallina.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 323. n. 1. *der Haushahn.*

γ. Cristatus. *Das Haubenhuhn.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 470. a. *Haubenhuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 178. a. *der Haubenhahn; geſchopfte Hahn.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 398. n. 2. *das Haubenhuhn.*

Briſſon, ornith. I. p. 45. A. Coq hupé.

Büffon, Vögel, IV. p. 154. *der Haubenhahn, oder die gehäubte Henne.* tab. 86.

Latham, Syn. II. 2. p. 703. Creſted Cock.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 626. n. 1. γ. Gallus domeſt. *criſtatus*, criſta in vertice plumoſa denſiſſima.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 11. n. 2. *Haubenhahn, Buschhahn.*

Siemßen, meklenb. Vögel. p. 243. a. *der Haubenhahn.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 440. n. 1. *die gehaubte Henne.*

Pontoppidan, Dännem. p. 172. *Tophöns.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 214. *β.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 158. *β.* Gallus *cristatus*, crista in vertice plumosa densissima.

Linné, fn. Suec. II. p. 72. *β.* Gallina crista in vertice plumosa densissima, et undequaque diffusa spectabilis.

Gerin. ornithol. II. tab. 216.

a. *Das weiße Huhn mit schwarzem Federbusche.* *

b. *Das schwarze Huhn mit weißem Federbusche.* *

c. *Das goldfarbige Goldlackhuhn.* *

d. *Das silberfarbige Silberlackhuhn.* *

e. *Das achat- oder chamoisfarbige.* *

f. *Das schieferblaue.* *

g. *Das geschupte oder hermelinartige.* *

h. *Die Wittwe, mit kleinen weißen Perlen auf bräunlichem Grunde.* *

i. *Das feuerfarbige.* *

k. *Das steinfarbige Huhn.* *

l. *Das weiße Huhn mit dem großen Barte.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 401. 402.

δ. PENTADACTYLUS. *Das fünfzehige Huhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 410. n. 11. *das fünfzehige Huhn.*

Brisson, ornith. I. p. 46. B. Coq à cinq doigts.

Büffon, Vögel, IV. p. 169. *das fünfzeeige Huhn.*

Latham, Syn. II. 2. p. 703. Darking Cock.

Latham, Syst. ornith. II. p. 626. n. 1. *δ.* Gallus *pentadactylus*, domesticus, quinque digitis in utroque pede.

Krünitz,

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 17. n. 17. *das fünfzehige Huhn.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 214. γ.

ε. CRISPUS. *Das Strupphuhn.* (2)

Müller, Natursyst. II. p. 470. e. *das Kraushuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 180. f. *der Straubhahn.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 205. c. *das krause Huhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 405. n. 5. *das Strupphuhn, Straubhahn, Krullhahn, frisirter Hahn, türkischer Hahn; friesländischer Hahn mit krausen lockigen Federn.*

Halle, Vögel, p. 422. n. 443. *das krause Huhn mit umgekehrten Federn.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 441. n. 8. *das Kraushuhn.*

Gesner, Thierb. p. 220. *Hüner, so da Wollen tragen*, m. e. mittelm. Fig.

Eberhard, Thiergesch. p. 63. n. 3. *die straubige Henne.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 243. β. *der Strupphahn.*

Brisson, ornith. I. p. 46. n. 3. Coq frisé.

Büffon, Vögel, IV. p. 163. *der Straubhahn, Kraushahn*, tab. 87.

Latham, Syn. II. 2. p. 704. Crisped Cock.

Latham, Syst. ornith. II. p. 626. n. 1. ε. Gallus *crispus*, pennis sursum reflexis.

Pontoppidan, Dännem. p. 172. *Purrhöns.*

Cetti, Sardin. II. p. 101. *das Straubhuhn.*

Bankroft, Guian. p. 106. *Hüner mit schuppichten und ungleichen Federn.*

Neue Mannigfaltigk. III. p. 308. *Hüner mit gekräuselten Federn.*

 Linné,

(2) Nach *Brisson* eine eigene Gattung.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 158. δ. Gallus crispus.

Linné, fn. Suec. II. p. 72. δ. Gallina crispa, nostratibus Frislandica, pennis reflexis caput versus et velut inversis, *Krullhaena.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 269. Gallina lanigera?

Gerin. ornithol. II. p. 71. tab. 215. Gallus cincinnatus.

ζ. Ecaudatus. *Das Kluthuhn.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 470. *b. das ungeschwänzte Huhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 181. n. 1. *der Kluthahn.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 505. *b. der Kluthahn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 402. n. 3. *das Kluthuhn; ungeschwänzte Huhn; Kaularsch; persische und virginische Huhn.*

Halle, Vögel, p. 421. n. 439. *das ungeschwänzte Huhn.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 441. n. 5. *das ungeschwänzte oder persische Huhn.*

Brisson, ornithol. I. p. 48. n. 5. Coq sans croupion, ou de Perse.

Büffon, Vögel, IV. p. 167. *der Kluthahn*, tab. 91.

Latham, Syn. II. 2. p. 705. Rumpless or persian Cock.

Latham, Syst. ornith. II. p. 627. ζ. Gallus *ecaudatus*, cauda seu uropygio carens.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 16. n. 16. *der Kluthahn.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 243. γ. *der Kluthahn, Bollihes.*

Pontoppidan, Dännem. p. 172. *Gomphön.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 215. ε. *Gumbert.*

(3) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 158. γ. Gallus ecaudatus.

Linné, fn. Suec. II. p. 72. γ. Gallina cauda sive uropygio carens, *Gumphöns*.

η. Pumilio. *Das Zwerghuhn.* (4)

Müller, Natursyst. Suppl. p. 123. *d. das Kriechhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 403. n. 4. *das Zwerghuhn; holländische Hühnchen; Canishühnchen.*

Brisson, ornith. I. p. 46. n. 2. Coq nain.

Büffon, Vögel, IV. p. 157. *das kleine Javanische Zwerghuhn.*

Latham, Syn. II. 2. p. 705. Dwarf Cock.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 627. η. Gallus *pumilio*, pedibus brevissimis.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 12. n. 5. *das kleine Javanische Zwerghuhn.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 243. δ. *der Zwerghahn; Krüper.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 215. ξ. *Kruphahn.*

Gerin. ornithol. II. p. 70. tab. 214.

ϑ. Pusillus. *Das englische Zwerghuhn.*

Müller, Natursyst. II. p. 470. *f. das Zwerghuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 179. *c. das englische Zwerghuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 404. *c. Bantamhühner.*

Halle, Vögel, p. 420. n. 438. *das kriechende Huhn, mit ganz kurzen Schenkeln.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 442. n. 9. *das Zwerghuhn.*

Brisson, ornith. I. p. 47. B. Coq de Bamtam.

Büffon, Vögel, IV. p. 158. *der Hahn von Bantam; englische Zwerghahn.*

Latham, Syn. II. 2. p. 706. Bantam Cock.

 Latham,

(4) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

Latham, Syst. ornith. II. p. 627. ϑ. Gallus *pusillus*, tibiis pennatis, pennis posticis elongatis.
Krünitz, Encykl. XXVI. p. 13. n. 8. *der Hahn von Bantam; gestiefelte, rauchfüßige Hahn; Kriechhahn; Kruphahn.*
Borkhausen, Magaz. I. p. 215. η. *Zwerghahn.*
Linné, Syst. Nat. Ed. X. 1. p. 158. ε. Gallus *pusillus*, tibiis pennatis.
Gerin. ornithol. II. tab. 212.

ι. Plumipes. *Das rauchfüßige Huhn.*
Brisson, ornith. I. p. 47. A. Coq patu.
Latham, Syn. II. 2. p. 706. Roughfooted Cock.
Latham, Syst. ornith. II. p. 627. ι. Gallus *plumipes*, pedibus ad digitos usque plumosis.
Gerin. ornithol. II. tab. 212.
Borkhausen, Magaz. I. p. 216. ϑ.

κ. Turcicus. *Das türkische Huhn.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 180. *e. das türkische Huhn.*
Halle, Vögel, p. 421. n. 440. *das Türkische Huhn.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 407. n. 8. *das Türkische Huhn.*
Onomat. hist. nat. VI. p. 440. n. 3. *das türkische Huhn.*
Brisson, ornith. I. p. 46. D. Coq de Turquie.
Büffon, Vögel IV. p. 161. *der Türkische Hahn.*
Latham, Syn. II. 2. p. 707. Turkish Cock.
Latham, Syst. ornith. II. p. 627. *k.* Gallus *turcicus*, pulchris coloribus variegatus.
Krünitz, Encykl. XXVI. p. 14. n. 11. *der türkische Hahn.*
Borkhausen, Magazin, I. p. 216. ι.

λ. Patavinus. *Das paduanische Huhn.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 181. *k. das paduanische Huhn.*

Bechstein,

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 408. n. 9. *das Paduanische Huhn; große welsche Huhn; Hahn von Caux.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 440. n. 2. *das große welsche Huhn.*

Brisson, ornith. I. p. 46. C. Coq de Padoue.

Büffon, Vögel, IV. p. 170. *das Paduanische Huhn.*

Latham, Syn. II. 2. p. 707. Paduan Cock.

Latham, Syst. ornith. II. p. 628. λ. Gallus Patavinus corpore duplo maiore.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 17. n. 19. *der paduanische Hahn.*

Gerin. ornithol. II. p. 66. tab. 209. 210.

Encycl. oecon. XIII. p. 27. Poule de Mirebalais.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 266. Gallus maior exoticus, *Paduanischer Hahn.*

μ. Morio. *Das Mohrenhuhn.* (5)

Müller, Natursyst. II. p. 470. *c. das Mohrenhuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 180. *h. das Mohrenhuhn.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 205. *ε. das Negerhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 408. n. 10. *das Mohrenhuhn.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 441. n. 7. *das schwarze oder Mohrenhuhn.*

Brisson, ornith. I. p. 48. n. 4. Coq negre ou de Mozambic.

Büffon, Vögel, IV. p. 165. *das Mohrenhuhn.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 216 *k.* Gallus Aethiops.

Latham, Syn. II. p. 708. Negro Cock.

Latham, Syst. ornith. II. p. 628. *μ.* Gallus *Morio*, crista et palearibus nigris.

(5) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 16. n. 15. *das ſchwarze oder Mohrenhuhn.*

Naturforſch. XVIII. p. 239. *Mohrenhühner.*

Iſenflamm, pract. Anmerk. über die Muſkeln, p. 398.

ν. Niger. *Das ſchwarze Huhn.*

Iſt, nach *Latham*, mit dem vorhergehenden einerley. Ich habe auch auſser dem Gmelinſchen, kein Synonym weiter finden können.

ξ. Tophaceus. *Das beulenſtirnige Huhn.*

Pallas, N G. merkw. Th. IV. p. 20. *Hühner mit Beulen auf dem Scheitel*, tab. 3.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 628. *ν.* Gallus *tophaceus*, vertice tuberoſo.

o. Lanatus. *Das Wollhuhn.* (6)

Müller, Naturſyſt. II. p. 470. *d. das Straubhuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 180. *g. das Japaniſche Huhn.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 205. *d. das Wollhuhn.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 406. n. 6. *das Wollhuhn.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 441. n. 6. *das Straubhuhn.*

Briſſon, ornith. I. p. 48. n. 6. Coq du Japon.

Latham, Syn. II. 2. p. 708. Silk-Cock.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 628. *o.* Gallus *lanatus*, pennis pilorum aemulis.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 15. n. 14. *das japaniſche Huhn.*

Folgender, vielleicht noch hieher gehörigen Varietäten finde ich in unſrem Syſtem nicht gedacht.

a. *Der aſiatiſche wilde Hahn.*

Büffon, oiſ. ed. in 8. p. 166. Coq ſauvage de l'Aſie.

(6) Nach *Briſſon* eine eigne Gattung.

Büffon,

Büffon, Vögel, IV. p. 156. *der asiatische wilde Hahn.*

b. *Der Akoho.*

Büffon, l. c. p. 167. Acoho, ou Coq de Madagascar.

Büffon, Vögel, IV. p. 157. *der Akoho; der Hahn von Madagascar.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 410. n. 14. *der Hahn von Madagaskar.*

Krünitz, Encykl. XXVI. n. 4. *der Acoho.*

c. *Das Huhn aus der Meerenge von Darien.*

Büffon, l. c. p. 168. Poule de l'Isthme de Darien.

Büffon, Vögel, IV. p. 158. *das Huhn aus der Meerenge von Darien.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 411. n. 15.

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 12. n. 6.

d *Das Huhn von Camboge.*

Büffon, l. c. p. 168. Poule de Camboge.

Büffon, Vögel, IV. p. 158. *das Huhn von Camboge.*

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 12. n. 7.

e. *Das indianische Halbhuhn.*

Büffon, l. c. p. 170. Demi-poule d'Indes.

Büffon, Vögel, IV. p. 160. *das Indianische Halbhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 411. n. 17. *das Indische Halbhuhn.*

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 13. n. 9.

Allgem. Reis. VIII. p. 93. *Indianische Halbhühner.*

f. *Das englische Huhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 179. *d. der Englische Hahn.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 205. *a. der Englische Hahn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 407. n. 7. *das Englische Huhn.*

Halle, Vögel, p. 421. n. 441. *das Englische Huhn.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 441. n. 4. *das Englische Huhn.*

Brisson, ornith. I. p. 46. E. Gallus Anglicanus, *Coq d'Angleterre.*

Büffon, loc. c. p. 171. Coq d'Angleterre.

Büffon, Vögel, IV. p. 161. *der englische Hahn.* M. 2. Figg.

Frisch, Vögel, tab. 129. *der englische Hahn*, tab. 130. *die englische Henne*, (cf. *Bechstein* l. c. p. 675. 676.)

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 14. n. 10. *der englische Hahn.*

g. *Das hamburgische Huhn.*

Büffon, l. c. p. 172. Coq de Hambourg.

Büffon, Vögel, IV. p. 162. *der Hamburgische Hahn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 397. *c. der Hamburgische Hahn.*

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 14. n. 12. *Sammethosen.*

h. *Das Huhn von Sansevarre.*

Büffon, l. c. p. 172. Poules de Sansevare.

Büffon, Vögel, IV. p. 170. *die Hühner von Sansevarre.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 451. n. 16. *die Sansevarrischen Hühner.*

Krünitz, Encykl. XXVI. p. 17. n. 18.

i. *Der gehörnte Hahn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 628. ξ. Gallus *cornutus*, vertice cornibus donato.

Worm, de cornuto Gallo. — Bartholin. epist. Cent. I. ep. 38. p. 112.

Severin,

Seaerin, de gallis cornutis, ib. ep. 60. p. 245.
Lochner, gallus cornutus. — Eph. nat. cur. Dec. II. an. 8. obſ. 26. p. 74. c. f.
Francus, pullus cornutus, ibid. Vol. I. obſ. 147. p. 317. c. f.
Gerin. ornithol. II tab. 213.

k. *Das ſechszehige Huhn.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 410. n. 12.

l. *Die Spornhenne.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 410. n. 13.

m. *Das Baſtardentenhuhn.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 411. n. 18.
Taube, Naturk. von Zelle, II. p. 257.
Mannigfaltigk. II. p. 600.

n. *Die Hühner in Xenſi, mit Schafwolle auf dem Leibe?*
Dapper, China, p. 14.
Büffon, Vögel, IV. p. 164. n. 84.

* * *

Sonnini de Monancourt, über die Hühner des mittägigen Amerika, — in *Rozier* obſ. ſur la Phyſ. VI. p. 130.
Hannemann, de gallinae quibusd. mirabilibus. — Eph. nat. cur. Dec. III. an. 3. obſ. 60. p. 69.
Hanow, beurtheilte Seltenheiten, die man an Hühnern gefunden. — Merkwürdigk. d. Nat. I. p. 293.
Bemerk. bey Erziehung junger Hühner. — Han. növ. nützl. Samml. 1756. p. 1565.
Ob die Hühner in einer Stadt mehr zu erhalten koſten, als ſie eintragen? — Fränk. Samml. V. p. 442.
Naturgeſch. des Huhns. — Gothaiſch. Hofkal. 1777.

Eine

Eine wunderbare Geburt und Veränderung der Natur von einer Henne, Strasburg 1538. fol. 1. B.

Von monströsen Hühnern. — Bresl. Nat. und Kunstgesch. 19. Vers. p. 297.

Büchner, von einer Henne, welche zwey Küchlein ausgebrütet, mit doppelten Köpfen, vier Flügeln, und vier Füssen. — ibid. 1726. Sect. 36. p. 715.

Imago pulli gallinacei bicipitis. — *Lambec.* bibl. L. VI. app. p. 317.

Rommel, de pullo gallinaceo quatuor alis ac totidem pedibus praedito. — Eph. nat. cur. Dec. II. an. 5. obs. 148. p. 301. c. f.

Stolterfoht, descript. galli quadrupedis. — Nov. lit. maris Balth. 1703. p. 67. c. f.

Hoffmann, de pullo gallinaceo quadrupede. — Eph. nat. cur. Dec. III. an. I. obs. 142. p. 237. cum figg.

Graff, de pullo gallinaceo monstroso. ib. Vol. IV. obs. 106. p. 426.

Von der Missgeburt einer Henne. — Hamb. Magaz. II. p. 649.

Hühner mit Entenfüssen. — Bresl. Nat. und Kunstgesch. 21. Vers. p. 176.

Von Hühnern mit *rauhen Füßen.* — Neue Gesellschaftl. Erzähl. III. p. 337. IV. p. 286.

Hannemann, de mira metamorphosi plumarum in gallina. — Nov. lit. maris Balth. 1705. p. 27.

Hannemann, coloris plumarum in gallina mutatio. — Eph. nat. cur. Dec. II. an. 8. obs. 163. p. 371.

Harder, gallina ex carbonibus devoratis fatua, et anatome gallinae subito enectae. — in Obs. thesaur. obs. 16. et 17. p. 67. c. f.

Harder,

Harder, de gallinarum ductibus cholodochis, vesicula lactea, etc. ib. obs. 18. p. 72.

Peyer, exercit. de glandulis intestinorum, acc. anatome ventriculi gallinacei. Schafhus. 1677. 8.

Brickmann, de gallo, cuius ossa crassa et spongiosa. — Commerc. Norib. 1742. p. 175. c. f.

Verdries, de medulla in ossibus femoris gallinae lapidea. — Eph. nat. cur. Dec. III. an. 9. obs. 252. p. 434.

Gahrliep, de cystide monstrosa in gallina domestica. ib. Dec. II. an. 8. obs. 195. p. 494. c. f.

Borrich. de iecore gallorum monstrosae magnitudinis. — Act. Hafn. Vol. I. obs. 92. — Manget. bibl. I. 2. p. 387.

Hartmann, de gallinae utero hydropico, de hernia pulli gallinacei, de hepate gallinaceo pingui. — Eph. nat. cur. Dec. III. an. 2. obs. 191 — 194. p. 302. ff.

Bukkii, obs. de hepate gallinae macilentae magno et ponderoso. — Nov. lit. mar. Balth. 1704. p. 361.

Ein Fleischgewächse im Magen einer Henne. Wittenb. Wochenbl. XVI. p. 29.

Strauß, diss. de Ovo galli. Giess. 1670. 4.

Relation von einem Hahne, der Eyer gelegt; — Tenzels monathl. Unterred. 1696. p. 884.

Gockelii, eyerlegender Hahn, sammt seinem gelegten Hahnen- oder Basiliskeney, nebst einem Anhange von allerhand seltsamen Eyern. Ulm. 1697. 8.

Bartholin. galli ovipari anatome. — Hist. anatom. Cent. I. hist. 99. p. 162.

Id. de gallo oviparo. — Epist. Cent. III. ep. 52. p. 212.

Henr. Scretae à Zavorziz, de gallo gallinaceo, ova ponente. — Eph. nat. cur. Dec. I. an. 3. obs. 177. p. 285.

Cleyer,

Cleyer, de ovo gallinaceo praegnante, et hepate gallinarum insigni. ib. Dec. II. an. 1. obs. 17. p. 38.

Ledel, de gallo gallinaceo oviparo. ib. Dec. II. an. 1. obs. 145. p. 359.

Gründel, de gallo gallinaceo oviparo. ib. Dec. II. an. 5. obs. 211. et 212. p. 435.

Gahrliep, notabilia quaed. circa formationem pulli gallinacei. — Eph. Nat. cur. Dec. II. an. 10. obs. 4 p. 13. c. f.

Hannaei gallina superfoetans. ib. Dec. II. an. 8. obs. 117. p. 259.

Lanzoni. gallina pullum pariens. ib. Dec. III. an. 1. obs 42. p. 60. cf. Dec. II. an. 4. append. obs. 28 — it. Bresl. Samml. 1717. Novemb. p. 326. — Journal des Sçav. 1678. Juill. p. 280.

J. Dan. Maior, de pullo gallinacio, pullis incubante ib. Dec. I. an. I. obs. 6 p. 9.

Kochansky, de gallina reviviscente. ib. Dec. II. an. 1. obs 132. p. 333.

Camerarius, caro gallinacea quomodo cocta facilis fiat. — Syll. memorab. Cent. XII. P. 43. p. 1011.

Ob man von vielen Hühneressen das Podagra bekomme: — *Schaarschmidt*, medic. chirurg. Nachr. II. Jahrg. p. 97.

Schröder, de gallorum vario apud veteres usu. Lips. 1743. 4.

Golzii, Alectromachia. Lub. 1709. 4.

Scaliger, gallinaceus et eius cantus. — de Subtil. ex. 239. p. 736.

Innichenhöfer, orat. de Gallicinio. Witt. 1623.

Vinding, diss. phys. phil. de Gallicinio. Hafn. 1674. 4.

Relànd, orat. de galli cantu, Hierosolymis audito. Traj. ad Rhen. 1718. 8.

Beson-

Besondere Freundschaft zweyer Hähne. — Neueste Mannigfalt. III. p. 193.

Hartmann, Anatome Caponis inedia enecti. — Eph. nat. cur. Dec. II. an. 7. obs. 17. p. 36.

Schröck, de podagra et ossium excrescentia in Capone. — ib. Dec. II. an. 4. obs. 174. p. 341.

Vom Ausbrüten der Hühner durch Capaunen. — Hannöv. Beytr. 1762. p. 395. 782. 1258.

Geissler, von einem im Bauche einer Henne gebildeten Küchlein. — Fränk. Samml. 1761. St. 31. p. 49.

Reaumur, art de faire eclorre et d'elever en toute saison des oiseaux domestiques de toutes especes, etc. II. p. 239. ff.

Eine Henne brütet Enteneyer. Hannöv. Magaz. 1780. p. 479.

Hühner über einer brennenden Lampe auszubrüten. Hannöv. gel. Anz. St. 72. 1751. p. 654.

Geöfnete Eyer auszubrüten, um die allmählige Bildung des Hühnchens zu beobachten. — Hamb. Magaz. XIX. p. 135.

Von künstlicher Ausbrütung der Eyer sind die Schriften verzeichnet, in *Krünitz* Encykl. III. p. 188.

Von Hühnereyern und Merkwürdigkeiten der Eyer überhaupt. S. *Krünitz* l. c. Art. Ey. — *Böhmer*, Handb. d. Naturgesch. II. 1. p. 533—543.

Berechnung über den Nutzen der Hühner. — *Leopolds* Landwirthsch. Sorau 1750. 4. p. 516.

Hühner mit Knochen, so schwarz wie Ebenholz. — *Lichtenbergs* Magaz. III. 2. p. 155.

Sonderbares Hühnerey. — ib. I. 2. p. 83.

Brütende Henne unterscheidet die faulen Eyer von den guten. Ib. I. 3. p. 65.

In

In der Leber eines Hahns Kieſel u. a. Steine. ib. I. 4. p. 218.

Wie das Hühnchen im Ey die Schale durchbricht. ib. II. 4. p. 216.

Wie die Küchlein in Cairo in Oefen ausgebrütet werden. — Schwed. Abhandl. I. p. 38. X. p. 253.

Wie die Chineſer ſie ausbrüten. ib. XXX. p. 202.

Von den Krankheiten, ſonderlich dem Pips der Hühner. *Zink:* Leipz. Samml. X. p. 964. et 1090. — Hannöv. gel. Anz. 1754. p. 473. 545. 758. — Hannöv. nützl. Samml. 1757. p. 222. — Phyſ. ökon. Patriot. II. p. 365. — Berlin. Samml. I. p. 364. — Witt. Wochenbl. X. p. 91.

Eine gute Fütterung für die Hühner: — Gaz. litt. de Berlin 1774. n. 552. Berlin. Samml. VIII. p. 277.

Küchlein in kurzer Zeit fett zu machen: Gaz. litt. de Berlin 1770. n. 349. Berlin. Samm. III. p. 396.

De ovo et pullo vid. *Blaſii* anat. animal. p. 258. m. K.

Garmanni, Oologia curioſa. Cygn. 1691. 4.

Libavii, diſſ. de ovo gallinarum et pulli ex eo generatione. Coburg 1610. 4.

Schoockii diſſ. de ovo et pullo. Ultraj. 1643. 12.

Anonymi diſſ. de ovo et pullo. Wratisl. 1661. 12.

Marcell. Malpighii, de formatione pulli in ovo liber. Lond. 1666. et 1672. 4. c. fig.

Aldes, obſervat. naturales in ovis factae. Amſt. 1673. 12.

2. Motmot. *Der Katraka.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 471. n. 2. *der ungeſpornte Hahn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 181. n. 6. *der ungeſpornte Hahn.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 442. *der amerikaniſche Faſan.*

Briſſon, ornith. I. p. 76. n. 3. Faiſan de la Guiane.

Büffon, Vögel, V. p. 262. *der amerikaniſche Faſan, oder Katraka.* M. e. Fig.

Batſch, Thiere, I. p. 422. *Katraka.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 632. n. 9. Phaſianus (Motmot) fuſcus ſubtus rufeſcens, cauda cuneata, rectricibus lateralibus rufis.

Schneider, zool. Abhandl. p. 142. *der amerikaniſche Faſan.*

Moehring, av. gen. p. 80 n. 103. Columbae adfinis.

8. Parraka. *Der Parraka.* (7).

Büffon, Vögel, V. p. 313. *der Parraka.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 632. n. 12. Phaſianus (Parraqua) ſubcriſtatus fuſcus, ſubtus fulvus, cauda elongata, apice integra.

Bankroft, Guian. p. 106 *Hannaquaw.*

Samml. zur Phyſ. u. N. G. II. p. 601. *der Parraka.*

Barrere, Fr. equinox. p. 140. Phaſianus vertice fulvo cirrato.

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 324. n. 2. *der Parraka.*

9. Mexicanus. *Der mexikaniſche Faſan.*

Büffon, Vögel, V. p. 313. *der Hoitlallotl.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 257. *der Hoitlallotl.*

Latham,

(7) Es ſcheint noch nicht ganz entſchieden zu ſeyn, ob nicht dieſe Gattung mit der vorhergehenden einerley iſt.

Latham, Syst. ornith. II. p. 632. n. 10. Phasianus (Mexicanus) fulvo-albus, cauda elongata, tectricibus viridi-nitentibus.

Raj. Synops. av. p. 158?

10. Cristatus. *Der Hoazin.*

Müller, Natursyst. suppl. p. 125. n. 9. *der Hoizin.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 172. n. 4. *der Hoizin; amerikanische Schlangenfresser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 255. *Hoactzin.*

Brisson, ornith. I. p. 86. n. 15. Hocco brun du Mexique.

Büffon, Vögel, V. p. 297. *der Hoizin, oder gehäubte Kayennische Fasan.* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 422. *der Hoizin.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 631. n. 7. Phasianus (Cristatus) fulvo-fuscus, capite cristato, fascia alarum duplici pallida, cauda apice lutea.

Charleton, onomast. zoic. p. 113. n. 10. *Hoactzin.*

Jonston, av. p. 172. *Hoactzin.*

Diction. des animaux II. p. 478.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 324. n. 3. *der Hoizin.*

3. Colchicus. *Der gemeine Fasan.* (8)

Müller, Natursyst. II. p. 472 n. 3. *der Fasan.*

Leske, Naturgesch. p. 224. n. 2. *der Fasan.*

Borowsky, Thierr. II. p. 173. n. 2. *der gemeine Fasan.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 206. n. 2. Phasianus (Colchicus) rufus, variegatus, capite viridi caerulescente, cauda cuneata, genis papillosis.

Bechstein,

(8) Wird etwa 7. höchstens 10. Jahr alt. Nährt sich von allerhand Getraide; frisst auch gern Mispeln und verschiedene Beeren. Begattet sich im März und April. Nimmt man der Henne die Eyer, so leget sie oft über dreyssig. Brütet 20 bis 25. Tage.

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 470. n. 2. *der gemeine Faſan.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 412. *der gemeine Faſan.* p. 440. *Phaſan; Faſanenvögel.*
Funke, Naturgeſch. I. p. 220. *der Faſan*
Ebert, Naturl. II. p. 110. *der Phaſan.*
Halle, Vögel, p. 433. n. 453. *der Faſan* Fig 30.
Meyer, Thiere, II. p. 1. tab. 2. *der Faſan* (mit dem Gerippe in 2. Vorſtellungen)
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 258. n. 234. *der Faſan.*
Beckmann, Naturhiſt. p. 50. c. *der Phaſan.*
Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 768. *Faſan.*
Onomat. hiſt. nat. VI. p. 432. *Faſan.*
Handb. d. Naturgeſch. II. p. 68. *der Faſan.*
Handb. d. deutſch. Thiergeſch. p. 114. *Phaſan.*
Walther, oekon. N. G. Deutſchl. p. 127. *Faſan.*
Klein, av. p. 114. n. 1. Phaſianus ſimpliciter.
Klein, Vorbereit. p. 211. n. 1. *Faſan.*
Klein, verb. Vögelhiſt. p. 118. n. 1. *gemeiner Faſan.*
Klein, ſtemmat. av. p. 25. tab. 29. B.
Klein, Vögeleyer, p. 32. tab. 14. fig. 7. 8.
Briſſon, ornithol. I. p. 73. n. 1. Faiſan.
Büffon, ornith. V. p. 201. *der Faſan;* m. 2. figg.
Gesner, Vögelb. p. 105. *Faſan.* fig. p. 106. ſchl.
Batſch, Thiere, I. p. 421. *der gemeine Faſan.*
Latham, Syſt. ornith. II. p. 629. n. 4. Phaſianus (Colchicus) rufus, capite caeruleo, cauda cuneata, genis papilloſis.
Bock, N. G. von Preuſſ. IV. p. 391. *der Faſan.*
Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 2. *Faſan.*
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 244. n. 2. *der gemeine Faſan.*
Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffn. Ed. in 4. p. 394. *Faſan.*
Pallas, nord. Beytr. III. p. 17. *der Faſan.*

Allgem. Reiſ. V. p. 202. VII. p. 632. XI. p. 692. *Faſanen.*

Naturforſch. XVIII. p. 69. *der Faſan.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. p. 135. n. 166. *der gemeine Faſan.*

Lichtenberg, Magaz. II. 1. p. 111. *der Faſan.*

Beckmann, Bibl. VI. p. 397. *der Faſan.*

Krünitz, Encykl. LII. p. 214. *Faſan.*

Eberhard, Thiergeſch. p. 65. n. 1. *der Faſan.*

Geoffroy, mater. med. VII. p. 633. *der Faſan.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 46. *Faſan.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 279. *der Faſan.*

Borkhauſen, Magaz. I. p. 218. n. 92.

Meidinger, Vorleſ. I. p. 141. n. 2. *der Faſan.*

Oekonom. Zool. p. 86. n. 26. *der Faſan.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 320. *Faſan.*

Anweiſ. Vögel zu fang. etc. p. 424. *der Phaſan.*

Loniceri, Kräuterb. p. 670. *Phaſan.*

Anonym. Naturgeſch. des Faſans. Lpz. 1780. 8.

Onomatol. foreſtal. I. p. 682.

Onomatol. oecon. pract. I. p. 1025.

Lemmery, Materialex. p. 867.

Regnard, voy. de Lapponie p. 105.

Ronnefort, deſcript. de Madagaſcar. p. 120.

Flaccourt, hiſt. de Madagaſcar. p. 165.

Hamel, relation de la Corée. p. 587.

Bosmann, deſcr. de la Guinée. p. 319.

Villault de Bellefond, relat. des Côtes d'Afrique. p. 270.

Linné, Syſt. Nat. Edit. II. p. 56. Phaſianus.

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 28. n. 1. Phaſianus vulgaris.

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 158. n. 3. Phaſianus (Colchicus) rufus, capite caeruleo.

Kramer, Auſtr. p. 356. Phaſianus cauda erecta, capite laevi.

Moehring.

Moehring, av. gen. p. 53. n. 50. Tetrao.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 331. Phasianus. *Fasan. Pasian.*
Charleton, onom. zoic. p. 72. n. 3. Phasianus; Phasidis ales.
Belon, hist. nat. des ois. p. 253. Faisan. c. f.
Jonston, av. p. 60. Phasianus.
Hermann, tab. affin. anim. p. 168. Phasianus Colchicus.
Zinnan. Uov. p. 28. tab. 2. fig. 5. Fagiano.
Bomare, Dictionn. IV. p. 343. Faisan.
Dictionn. des animaux. II. p. 146. Faisan.
Aristot. hist. anim. L. 6. c. 2. n. 19. *φασιαναι*
Aelian. de nat. anim. L. 13. c. 18. *φασιανοι.*
Plin. hist. nat. L. 10. c. 48. L. 11. c. 37. Phasianae aves.
Palladius, de re rust. L. 1. c. 29. Phasiani.
Sueton. Vitell. c. 13. Phasianus.
Sueton. Caligul. c. 29. Phasianae.
Petron. Satyr. 79. 1. Phasidos aves.
Lamprid. Alexand. c. 41. Phasianus.
Martial. epigr. L. 13. ep. 72. Phasis.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 325 n. 4. *der Fasan.*

β. Torquatus. *Der Fasan mit dem Halsringe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 441. n. 3. *der Fasan mit dem Halsringe.*
Latham, Syn. Suppl. p. 208. Ring Pheasant.
Latham, Syst. ornith. II. p. 629. β. Ph. rufus, capite caeruleo, cauda cuneata, collo torque albo.

γ. Varius. *Der bunte Fasan.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 175. *b. der bunte Fasan.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 441. n. 2. *der bunte Fasan; weißbunte Fasan.*

Brisson, ornith. I. p. 75. A. Faisan panaché.

Büffon, Vögel, V. p. 238. *der bunte Fasan;* m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 267. Variegated Pheasant.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 630. γ. Phasianus Varius.

Borkhausen, Magaz. I. p. 218. n. 92. β.

δ. Albus. *Der weiße Fasan.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 175. a. *der weiße Fasan; Silberfasan.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 440. n. 1. *der weiße Fasan* (fälschlich *Silberfasan*).

Brisson, ornith. I. p. 75. *b.* Faisan blanc.

Büffon, Vögel, V. p. 236. *der weiße Fasan.*

Latham, Syn. II. 2. p. 716. White Pheasant.

Latham, Syst. ornith. II. p. 630. δ. Phasianus albus.

Götz, Naturgesch. einig. Vögel. p. 20. *der weiße Phasan.*

Geoffroy, mater. med. VII. p. 645.

ε. Hybrida. *Der Fasanenbastard.*

Müller, Natursyst. II. p. 473. *Bastardfasane.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 175. c. *der Fasanenbastard.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 442. n. 5. *der Fasanenbastard.*

Brisson, ornith. I. p. 75. C. Faisan bastard.

Büffon, Vögel, V. p. 239. *der Bastardfasan, oder Fasanenbastard;* m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 716. Hybridal Pheasant.

Latham, Syst. ornith. II. p. 630. ε. Phas. hybridus.

Geoffroy, mater. med. VII. p. 642.

Onomat. forestal. I. p. 682.

Borkhausen, Magazin, I. p. 218. n. 92. γ.

ζ. Gal-

ζ. Gallopavonis. *Der türkische Fasan.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 441. n. 4. *der Türkische Fasan.*

Büffon, Vögel, IV. p. 222. *ein Bastard, der aus der Vermischung der Puter mit dem Fasanen entstanden seyn soll.*

Büffon, Vögel, V. p. 240. *der Fasanputer.*

Latham, Syn. II. 2. p. 717.

Latham, Syst. ornith. II. p. 630. ζ. Ph. Gallopavonis.

Philos. transact. LI. p. 883. tab. 19.

Anon. Precis de la nature d'élever les Faisans et les Perdreaux. Paris 1772. 12.

Berlin. Samml. V. p. 555.

Hunter, de rara Phasiani varietate. — Phil. transact. LXX. p. 527.

Camerarius, Phasianorum caro grata, eorum ornamentum naturale. — Syll. memorab. Cent. VII. P. 63. p. 473.

Unterricht, was bey Anlegung einer Phasanerey zu beobachten. — Oekon. Nachr. I. p. 891. VII. p. 417.

Chladenii dissert. de iure Phasianorum eorumque banno.

Von den, in Brandenb. Landen seit langen Zeiten her angelegten Fasanerien. — *Beckmann* Beschr. der Chur und Mark Brandenburg, I. p. 808.

Börner, Stadt- und Landwirthsch. p. 227.

Zückert, Speis. a. d. Thierreich. p. 92.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh. Münst. 1777. p. 185.

Bergius, Policey- und Cameral-Magaz. III. p. 5.

Von der Fasanenzucht — Neue oekonom. Nachr. Leipz. 1769. p. 611.

Von Anleg. der Fasanerien. — *Jungs* Forstwirthschaft, II. p. 236.

Strelins Realwörterbuch, art. *Fasan.*

4. ARGUS. *Der Argusfasan.*

Müller, Natursyst. II. p. 473. n. 4. *der Pfaufasan.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 176. n. 3. *der Argusfasan.*

Ebert, Naturl. II. p. 111. *Pfaufasan, Argus.*

Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 769. n. 5. *Fasan mit blauen Flecken.*

Onomat hist. nat. VI. p. 431. *der Pfaufasan.*

Büffon, Vögel, V. p. 257. *der Argusfasan.*

Martini, Naturlex. III. p. 185. *Argusfasan.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 629. n. 3. Phasianus (Argus) luteus, nigro punctatus, facie rubra, occipite cristato caeruleo.

Marsden, Beschr. von Sumatra, p. 134. *Kuh-Auh.*

Bomare, Diction. IV. p. 349. — Dict. des anim. II. p. 151.

5. PICTUS. *Der chinesische Goldfasan.* (9)

Müller, Natursyst. II. p. 474. n. 5. *der bunte Fasan.*

Leske,

(9) Wird etwa 10. höchstens 15. Jahr alt. Frisst Reis, Hanf, Weitzen, Gersten, braunen Kohl, Sallat, auch Laub von Hekken, besonders grüne Pflaumen und Birnen und verschiedene Insekten. Begattet sich im April. Das Weibchen legt zu Ende dieses Monats in einem Busch in ein rund gescharrtes Loch 12 —15 Eyer, etwas länglicher als die vom gemeinen Fasanen, hellrostfarben, oder schmutzig röthlichweiss. Brütet 23 Tage. Die jungen sind ganz grau, etwas gelblicher als ein gemeiner Fasan, und bleiben in dieser Kleidung ein ganzes Jahr. Die mehre-

Leske, Naturgeſch. p. 224. n. 3. *der bunte Faſan.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 173. n. 1. *der chineſiſche Goldfaſan*, tab. 29.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 206. n. 3. Phaſianus (Pictus) criſta flava, pectore coccineo, remigibus ſecundariis caeruleis, cauda cuneata.

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 472. n. 3. *der Goldfaſan.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 443. n. 3. *der Goldfaſan*, p. 450. *rother Faſan; dreyfarbiger Faſan aus China, gemahlter Faſan, bunter Faſan; chineſiſcher Blutfaſan; chineſiſcher Goldhahn.*

Ebert, Naturl. II. p. 111. *der bunte chineſiſche Faſan.*

Halle, Vögel, p. 436. n. 455. *der rothe Faſan; mit langen rothen Ohrenfedern.*

Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 769. n. 3. *blutrother Faſan.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 444. *der bunte Faſan.*

Klein, av. p. 114. n. 3. Phaſianus ſanguineus.

Klein, Vorbereit. p. 211. n. 3. *der rothe Sineſiſche Faſan.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 118. n. 3. *blutrother Faſan.*

Briſſon, ornithol. I. p. 76. n. 4. *Faiſan doré de la Chine.*

Büffon, Vögel, V. p. 245. *der chineſiſche dreyfarbige, rothe oder Goldfaſan* M. e. Fig.

Batſch, Thiere, I. p. 421 *der chineſiſche Goldfaſan.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 631. n. 5. Phaſianus (Pictus) criſta flava, pectore coccineo, remigibus ſecundariis caeruleis, cauda cuneata.

mehreſten Weibchen legen im erſten Jahre nicht. — *Büffon* will dieſen Vogel nur als eine Abänderung vom gemeinen Faſan betrachten.

Seligmann, Vögel, III. tab. 31. *der bunte chinesische Fasan.*

Götz, Naturgesch. einig. Vögel, p. 1. *der Goldfasan*, tab. 1.

Naturforsch. VII. p. 39. Phasianus aureus Sinensis *Briss.*

Berlin. Samml. X. p. 154. *der Goldfasan.*

Allgem. Reis. XI. p. 692. *die japanischen Fasanen?*

Kämpfer, Japan; in *Du Halde* Chin. IV. p. 141. *die Fasanen?*

Meidinger, Vorl. I. p. 151. n. 3. *der bunte Fasan.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 218. n. 93.

Beckmann, Bibl. VI. p. 397. *der chinesische Goldfasan.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 2. Phasianus crista flava, pectore coccineo.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 158. n. 4. Phasianus (Pictus) crista flava, pectore coccineo, remigibus secundariis caeruleis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168. Phasianus pictus.

Bomare, Dictionn. IV. p. 348. — Diction. des anim. II. p. 151.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 326. n. 5. *der chinesische Goldfasan.*

6. Nycthemerus. *Der chinesische Silberfasan.* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 474. n. 6. *der weiße Fasan.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 176. n. 4. *der schwarz und weiße Fasan.*

Blumen-

(10) Findet sich, wie der Goldfasan, jetzt auch in den Menagerien Deutschlands. Das Weibchen legt 18—20; — und die alten sehr häufig unfruchtbare Eyer. Sie haben die Gröſse kleiner Hühnereyer, sind fleischfarbig, mit vielen feinen weiſsen Puncten bestreuet. Ihre gröſste Schwere ist 3 1/4. Loth.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 206. n. 4. Phasianus (Nycthemerus) albus, crista abdomineque nigris, cauda cuneata.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 472. n. 4. *der Silberfasan.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 451. n. 4. *der Silberfasan.*

Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 769. n. 4. *weißer Fasan, mit abhangenden Kopffedern.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 443. *der weiß und schwarze Fasan.*

Klein, av. p. 114. n. 4. Phasianus Sinensis, albus, capite nigris pennis dependentibus.

Klein, Vorbereit. p. 211. n. 4. *weißer Sinesischer Fasan.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 118. n. 4. *weißer Fasan, mit abhangenden Kopffedern.*

Brisson, ornith. I. p. 77. n. 5. Faisan blanc de la Chine.

Büffon, Vögel, V. p. 252. *der schwarz und weisse Fasan aus China.* M. 2. Figg.

Batsch, Thiere, I. p. 422. *der schwarz und weisse Fasan.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 631. n. 6. Phasianus (Nycthemerus) albus, crista abdomineque nigris, cauda cuneata.

Seligmann, Vögel, III. tab. 27. *der schwarze und weiße chinesische Fasan aus China mit seiner Henne.*

Götz, Naturgesch. einig. Vögel, p. 14. *der Silberphasan;* tab. 2.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 136. n. 167. *der weiß und schwarze Fasan.*

Beckmann, Bibl. VI. p. 398. *der chinesische Silberfasan.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 219. n. 94.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 159. n. 5. Phasianus (Nycthemerus) albus, crista abdomineque nigris.

Hermann, tab. affin. anim. p. 168. Ph. Nycthemerus.

Bomar. Dictionn. IV. p. 348. — Dictionn. des anim. II. p. 149 151.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 326. n. 6. *der chinesische Silberfasan.*

7. Superbus. *Der rothe chinesische Fasan.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 124. n. 7. *der chinesische Fasan.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 628. n. 2. Phasianus (Superbus) muticus rufus viridi caeruleoque varius, caruncul is frontis subrotundis, palearium subulatis.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit *vier* Gattungen vermehrt. Bey der *erstern* Gattung sind die Varietäten β, δ, η, ϑ, $\varkappa$, λ, ν, ξ, bey der *dritten*, die Varietäten β bis ζ, hinzugekommen.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der afrikanische Fasan.*

Latham, Syn. Suppl. p. 210. African Pheasant.

Latham, Syst. ornith. II. p. 631. n. 8. Phasianus (Africanus) corpore caeruleo — cinereo subtus albo, capite cristato, rectricibus duabus intermediis apice, lateralibus toto nigris.

2. *Der purpurfarbene indianische Fasan.*

Latham, Syn. Suppl. p. 208. tab. 114. Impeyan Pheasant.

Latham,

Latham, Syſt. ornith. II. p. 632. n. 11. Phaſianus (Impejanus) criſtatus purpureus viridi — nitens, ſubtus niger, colli pennis aureo cupreo viridique verſicoloribus, cauda integra rufa.

3. *Der ſchwarz und weiße indianiſche Faſan.*

Latham, Syn. Suppl. p. 210. Coloured Pheaſant.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 633. n. 13. Phaſianus (Leucomelanos) criſtatus niger, corpore pennis albo - marginatis.

102. GESCHLECHT. NUMIDA. *Das Perlhuhn.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 476. Gen. CII.
Leske, Naturgeſch. p. 224. Gen. VIII.
Borowsky, Thierreich, II. p. 182. Gen. XXX.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 204. Gen. XLIII.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 462. Gen. LX.
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 455. Gen. XL.
Briſſon, ornith. I. p. 49. Gen. IV. Meleagris.
Buffon, Vögel, IV. p. 238. ff.
Batſch, Thiere, I. p. 410. Gen. CIX.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 621. Gen. LII.
Pallas, N. G. merkw. Thiere, IV. p. 12. ff.
Hermann, tab. affin. anim. p. 169.
Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 326. Gen. LXIX.

1. MELEAGRIS. *Das gemeine Perlhuhn.* (1)

Müller, Naturſyſt. II. p. 476. *das Perlhuhn.*
Leske, Naturgeſch. p. 225. *das Perlhuhn.*

Borows-

(1) Ein lebhafter, unruhiger, unter ſich geſelliger, ſonſt aber zänkiſcher Vogel, der ſo gar dem Truthahn furchtbar iſt. Wird etwa 10 bis 12. Jahr alt. In ihrem urſprünglichen Vaterlande ſieht man ſie zu 200 bis 300. In Tehama an der bergichten Gegend,

Borowsky, Thierreich, II. p. 182. n. 1. *das Perlhuhn.* tab. 30.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 204. n. 1. Numida (Meleagris) roſtro cera inſtructo, nares recipiente.

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 462. *das gemeine Perlhuhn.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 455. n. 1. *das gemeine Perlhuhn*, p. 467. *das Perlin*, *Pagati*, fälſchlich *Knarrhuhn*, *Knorrhuhn.* — *Afrikaniſches*, *numidiſches*, *fremdes*, *barbariſches*, *tuniſches*, *mauritaniſches*, *lybiſches*, *guineiſches*, *aegyptiſches Huhn*; *Pharaohuhn.* *Hühner aus Jeruſalem.*

Funke, Naturgeſch. I. p. 223. *das Perlhuhn.*

Ebert, Naturl. II. p. 109. *das Perlhuhn.*

Halle, Vögel, p. 422. n. 444. *das Perlhuhn.* fig. 28.

Meyer, Thiere, I. tab. 75. *das Perlhuhn*, mit dem Gerippe.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 264. n. 237. *das Perlhuhn.*

Neuer Schaupl. d. Nat. VI. p. 421. *Perlhuhn.*

Onomat. hiſt. nat. V. p. 644. *das Perlhuhn; die Henne aus Guinea.*

Handb. der deutſch. Thiergeſch. p. 115. *das Perlhuhn.*

Klein, av. p. 111. n. 2. Alector Guineenſis; Gallina Guineae; africana.

Klein,

Gegend, ſind ſie nach *Niebuhr* ſo häufig, daſs die Knaben ſie mit Steinen werfen, und nach der Stadt zum Verkauf bringen. Sie lieben wie die Pfauen erhabene Orter. Die Begattungszeit fällt in den März und Aprill. Das Weibchen legt bis 24. Eyer, welche etwas über 3. Wochen bebrütet werden. Das Fleiſch wird von den mehreſten als ſehr delicat angegeben, gleichwohl behauptet *Sparrmann*, es ſey ſehr trocken, und weit ſchlechter als gewöhnliches Hühnerfleiſch.

Klein, Vorbereit. p. 206. n. 2. *Perlhun.*
Klein, verb. Vögelhiſt. p. 115. n. 2. *Perlhuhn.*
Klein, ſtemmat. av. p. 25. tab. 26. fig. 1. a. b.
Klein, Vögeleyer, p. 32. tab. 13. fig. 5. 6.
Briſſon, ornith. I. p. 49. n. 1. Peintade.
Büffon, Vögel, IV. p. 237. *das Perlhuhn;* mit 2. Figg.
Geſner, Vögelb. p. 216. *ein frembder wilder Han, auß Africa oder Barbarien.* M. e. gut. Abbild.
Batſch, Thiere, I. p. 419. *das gemeine Perlhuhn.*
Latham, Syn. Suppl. p. 204. Guinea Pintado.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 621. n. 1. Numida (Meleagris) nigra, maculis rotundatis albis, remigibus extus albo transverſim ſtriatis, vertice corneo.
Bock, N. G. von Preuſſ. IV. p. 393. *das Perlhuhn.*
Siemſſen, meklenb. Vögel, p. 248. n. 1. *das gemeine Perlhuhn.*
Niebuhr, Beſchr. von Arabien, p. 168. *Perlhühner.*
Fermin, Surin. II. p. 139. *das Perlhuhn.*
Adanſon, Senegall. p. 250. *Perlhüner.*
Haßelquiſt, Paläſt. (ed. germ.) p. 317. n. 42. Gallina (Meleagris) vertice corneo.
Sparrmann, Reiſ. p. 346. *Perlhüner.*
Reiſ. nach d. Inſel Frankreich u. Bourbon. p. 186. *Pintadohüner.*
Allgem. Reiſ. III. p. 336. *Pintado oder guineiſche Henne.*
Pallas, N. G. merkw. Th. IV. p. 15. *das gemeine Perlhuhn.*
Perrault, Charras u. Dodart, Abhandl. a. d. N. G. II. p. 17. anatomiſche Beſchr. vieler Pintaden tab. 48. *Pintade, Art indianiſcher Hühner.* tab. 49. die Zergliederung.
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 135. n. 165. *das Perlhuhn.*

Eber-

Eberhard, Thiergesch. p. 64. *das Perlhuhn.*

Meidinger, Vorles. I. p. 141. *das Perlhuhn.*

Beckmann, Bibl. VI. p. 392. *das Perlhuhn*, XVI. p. 417. *das Perlhuhn.*

Le Vaillant, Reis. nach Afr. I. p. 230. *das Perlhuhn.*

Naturforsch. XVII. p. 69. n. 143. *das Perlhuhn.*

Beckmann, Beytr. zur Gesch. d. Erfind. III. p. 214. *Perlhühner.*

Döbel, Jägerprakt. III. p. 162. *Perlinen, oder Afrikanische Hüner.*

Hannöv. Magaz. 1769. p. 702.

Allgem. Harzmagazin, I. p. 39.

Borkhausen, Magazin, I. p. 220. n. 95.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 2. Gallus vertice corneo.

Charleton, onom. zoic. p. 75. n. 13 Gallina Africana sive Guineensis.

Kramer, Austr. p. 355. n. 2. Gallus vertice corneo. *Perlhun.*

Moehring, av. gen. p. 52. n. 48. Meleagris.

Barrere, ornithol. p. 79. Gallus niger maculis ovalibus et orbiculatis.

Belon, hist. nat. des ois. p. 246. Poule de la Guinée.

Jonston, av. p. 84. Gallinae Guineae.

Gerin. ornithol. II. p. 79. tab. 230.

Schaefer, element. ornithol. tab. 46.

Zinnan. Uov. p. 27. tab. 2. n. 4.

Bomar. Diction. d'hist. nat. VIII. p. 550. — Dict. des anim. III. p. 471.

Scylacis Periplus. p. 122. Meleagrides aves.

Kennet's, parochial. antiquit. p. 287. Aves africanae, afrae.

De la Mare, Comment. urban. lib. 25. p. 949.

Cauche, relat. de Madagascar. p. 133. *Acanques.*

Aristot.

Aristot. hist. anim. L. 6. c. 2. n. 19. Μελεαγϱιδαι.

Aelian. de nat. anim. Lib. 4. c. 42. Μελεαγϱιδαι.

Athen. Deipnosoph. Lugd. 1612. fol. p. 655. Μελεαγϱιδων γενος.

Plin. hist. nat. Lib. 10. c. 26. 48. 52. Meleagrides. — Numidicae aves?

Columella, de re rust. L. 8. c. 2. Meleagris.

Varro, de re rust. L. 3. c. 9. Gallinae africanae.

Martial. epigr. L. 3. ep. 58. Gallinae guttatae.

Sueton. Caligul. c. 22. Meleagrides.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 326. *das eigentliche Perlhuhn.*

β. *Das weißbrüstige Perlhuhn.*

Müller, Natursyst. II. p. 477.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 467. n. 2.

Brisson, ornith. I. p. 50. A. Peintade à poitrine blanche.

Büffon, Vögel, IV. p. 247. 254.

Latham, Syn. II. 2. p. 687.

Latham, Syst. ornith. II. p. 621. n. 1. β.

Borkhausen, Magaz. I. p. 221. γ.

γ. *Das ganz weiße Perlhuhn.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 467. n. 3.

Brisson, ornithol. I. p. 50. Meleagrides omnino albo.

Latham, Syst. ornith. II. p. 621. n. 1. δ.

Gerin. ornithol. II. tab. 231.

Edw. glan. III. p. 269.

Borkhausen, Magazin, I. p. 221. β.

δ. *Der Perlhuhnbastard.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 467. n. 4.

2. MITRATA. *Das gehaubte Perlhuhn.* (2)

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 126. n. 3. *das Kronenperlhuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 184. n. 3. *das gehaubte Perlhuhn.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 468. *das gehaubte Perlhuhn.*

Büffon, Vögel, IV. p. 241. *das Afrikaniſche Huhn.* p. 279. *das kleinhelmichte Perlhuhn.*

Batſch, Thiere, I. p. 419. *das gehaubte Perlhuhn.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 622. n. 2. Numida (Mitrata) nigra, maculis albis, vertice corneo, gula carunculata.

Pallas, N. G. merkw. Th. IV. p. 19. *das gehaubte Perlhuhn*, tab. 3. fig. I.

Columella, de re ruſt. L. 8. c. 2. Gallina Africana, quam plerique Numidicam dicunt; Meleagridi ſimilis.

Perrault, Charras u. Dodart, Abhandl. a. d. N. G. II. p. 22. *das afrikaniſche Huhn.*

3. CRISTATA. *Das buſchige Perlhuhn.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 126. n. 2. *das Haubenperlhuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 184. n. 2. *das buſchigte Perlhuhn.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 468. *das buſchige Perlhuhn.*

Büffon, Vögel, IV. p. 276. *das buſchigte Perlhuhn.*

Batſch, Thiere, I. p. 419. *das buſchige Perlhuhn.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 622. n. 3. Numida (Criſtata) nigra, albo maculata, vertice criſtato, collo caeruleſcente, ſubtus ſanguineo.

Pallas,

(2) Wird von *Büffon*, und den Pariſ. Academiſten für das Weibchen vom gemeinen Perlhuhn gehalten.

Pallas, N. G. merkw. Th. IV. p. 16. *das buſchichte Perlhuhn.* tab. 2.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.*

Das Geſchlecht iſt mit *zwey* Gattungen vermehrt. Bey der erſten Gattung iſt die Var. β. hinzugekommen.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Das ägyptiſche Perlhuhn.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 622. n. 4. Numida (Aegyptiaca) nigra caeruleſcente maculata, vertice criſtato, capite colloque rufis.

Gerini, ornithol. II. p. 80. tab. 232. Meleagris altera.

103. GESCHLECHT. Tetrao. *Das Berghuhn.* (Waldhuhn.)

Müller, Naturſyſt. II. p. 478. Gen. CIII.
Leske, Naturgeſch. p. 225. Gen. IX.
Borowsky, Thierreich, II. p. 185. Gen. XXX.
Blumenbach, Handb. der N. G. p. 202. Gen. XLII.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 473. Gen. LXII.
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 469. Gen. XLI.
Ebert, Naturl. II. p. 114. ff.
Halle, Vögel, p. 437—454.
Neuer Schaupl. d. Nat. IV. p. 68.
Onomat. hiſt. nat. VII. p. 509.
Klein, av. p. 114. E. p. 115. F. G.
Briſſon, ornith. I. p. 51. Gen. V. Lagopus. p. 61. Gen. VI. Perdix.
Büffon, Vögel, V. p. 7. ff. VI. p. 5. ff.

Batsch, Thiere, I. p. 410. Gen. CVII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 633. Gen. LV. Tinamus. p. 634. Gen. LVI. Tetrao. p. 643. Gen. LVII. Perdix.

Hermann, tab. affin. anim. p. 166.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 327. Gen. LXX.

* *Mit kahlem Fleck über den Augen, und befiederten Füßen.* *Berghühner.*

† *Mit vierzehigen Füßen.*

1. Urogallus. *Der Auerhahn.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 479. n. 1. *der Auerhahn.*

Leske, Naturgesch. p. 228. n. 6. *der Auerhahn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 186. n. 2. *der Auerhahn.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 204. n. 7. Tetrao (Urogallus) pedibus hirsutis, cauda rotundata, axillis albis; *der Auerhahn.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 473. n. 1. *der Auerhahn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 470. n. 1. *der Auerhahn* p. 482. *Urhahn; Ohrhahn; Aurhahn; Waldhahn; wilder Hahn; Gurgelhahn; Alphahn; Riethahn; Bergfasan; Spillhahn; Krugelhahn; Federhahn.*

Funke, Naturgesch. I. p. 225. *der Auerhahn.*

Ebert, Naturl. II. p. 114. *der Auerhahn.*

Halle, Vögel, p. 445. n. 469. *das Auerhuhn.*

Meyer,

(3) Flügelweite 3. Fuſs 10. Zoll. *Briss.* Gewicht bisweilen 14. Pfund. *Gesn. Penn.* Hat auſserordentlich scharfes Gehör und Gesicht. Fliegt niedrig. Läſst sich leicht zähmen. Hält sich am Tage mehr auf der Erde auf, und geht des Abends auf die Bäume schlafen. Das Weibchen brütet 4 Wochen, und bedeckt, wenn es Hungers halber aufsteigen muſs, die Eyer mit Blättern, Moos, u. d. gl.

Meyer, Thiere. I. p. 19. tab. 16. *der Auerhahn.* tab. 17. das Gerippe.
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 266. n. 241. *der Auerhahn.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 292. A. *der Auerhahn.*
Beckmann, Naturhist. p. 50. a. *der Auerhahn.*
Neuer Schaupl. d. Nat. I. p. 431. *Auerhahn.*
Onomat. hist. nat. IV. p. 636. *Auerhahn.*
Handb. der Naturgesch. II. p. 47. *der Auerhahn.*
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 115. *der Auerhahn.*
Klein, av. p. 115. n. 1. Lagopus maximus; Urogallus maior.
Klein, Vorbereit. p. 214. n. 1. *Auerhahn.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 120. n. 1. *Auerhahn; Orhahn; Bergfasan.*
Klein, Stemmat. av. p. 25. tab. 27. fig. 1. a. b.
Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 15. fig. 1.
Gesner, Vögelb. p. 223. *Orhan, Urhan; Awerhan.* fig. p. 224.
Brisson, ornith. I. p. 51. n. 1. Coq de Bruyeres, ou de Limoges.
Büffon, Vögel, V. p. 7. *der Auerhahn;* m. 2. Figg.
Martini, Naturlex. III. p. 508. *Auerhahn.*
Batsch, Thiere, I. p. 412. *der Auerhahn.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 634. n. 1. Tetrao (Urogallus) fusco-rufus, capite colloque cinereis, gula abdomineque nigris, axillis albis.
Bock, N. G. von Preuss. p. 393. *der Auerhahn.*
Beseke, Vögel Kurl. p. 69. n. 141. *der Auerhahn.*
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 47. *Auerhähne.*
Fischer, Liv. p. 89. n. 118. *Auerhahn.*
Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 306. *Auerhähne.*
Pontoppidan, Norweg. II. p. 191. *Tiur, Teer, Tödder.*
Leem, Finnm. p. 129. *Auerhähne.*

Scheffer, Lappl. p. 392. *Auerhahnen.*
Steller, Kamtſchatk. p. 193. *Auerhüner.*
Pennant, britt. Zool. p. 85. tab. 34. 35.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 137. n. 168. *der Auerhahn.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 44. *Auerhahn.*
Naturforſch. XVII. p. 70. n. 144. *der Auerhahn.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 277. *Auerhahn.*
Krünitz, Encykl. II. p. 710. *Auer-Hahn.*
Goeze, nützliches Allerl. II. p. 224. n. 27. *Auerhahn.*
Eberhard, Thiergeſch. p. 65. *Auerhahn.*
Loniceri, Kräuterb. p. 640. *Uhrhan.*
Lichtenberg, Magazin für das Neueſte, etc. II. 4. p. 176. VI. 1. p. 139. *Auerhahn.*
Linné, Abhandl. II. p. 298. n. 105. *der Auerhahn.*
Oekon. Zool. p. 87. n. 28. *der Auerhahn.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 82. *Auerhahn.*
Meidinger, Vorleſ. I. p. 143. n. 5. *der Auerhahn.*
Anweiſ. Vögel zu fang. p. 98. *Auerhahn.*
Beckmann, Bibl. V. p. 353. VI. p. 392. XVII. p. 156.
Schwed. Abhandl. 1751. p. 139.
Heppe, wohlred. Jäger. p. 40.
Altmann, Helvet. p. 221.
Lemmery, Marteriallex. p. 1203.
André u. Bechſtein, Spazierg. I. p. 158.
Schriften der berlin. Geſellſch. N. Fr. V. p. 469.
Zückert, Speiſ. a. d. Thierreiche, p. 93.
Onomatol. foreſtal. I. p. 147.
Borkhauſen, Magaz. I. p. 221. n. 96.
Linné, Syſt. Nat. Ed. II. p. 56. Urogallus.
Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 1. Urogallus.
Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 159. n. 1. Tetrao (Urogallus) pedibus hirſutis, rectricibus exterioribus ſubbrevioribus, axillis albis.

Müller,

Müller, zool. dan. prodr. p. 27. n. 221. Tetrao (Urogallus) pedibus hirſutis, cauda rotundata, axillis albis.

Kramer, Auſtr. p. 356. n. 1. Tetrao rectricibus exterioribus brev., alarum baſi alba macula. *Auerhan.*

Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 369. Urogallus maior. *Auer-Han; Ohr-Han.* p. 371. Urogallina maior. *Auer-Hähne; Grugel-Han.*

Charleton, onomaſt. zoic. p. 73. n. 4. Urogallus.

Sibbald, Scot. illuſtr. p. 16. tab. 14. 18. Capricalca.

Girald. topogr. hybern. p. 706. Pavo ſylveſtris.

Jonſton, av. p. 61. Urogallus maior; Tetrix Ariſtotelis.

Nieremb. hiſt. nat. p. 135. Tetrao.

Belon, av. p. 249. Urogallus ſ. Tetrao.

Hermann, tab. affin. anim. p. 166. Tetrao Urogallus.

Schäfer, element. ornithol. tab. 42.

Gerini, ornithol. II. p. 83. tab. 236. 237.

Plin. hiſt. nat. L. 10. c. 22. Tetraones.

Bomare, diction. III. p. 310. — Dict. des anim. I. p. 702.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 327. n. 1. *der Auerhahn.*

* * *

Kurze, jedoch zuverläſsige Nachricht von denen Auerhahnen, von M. F. J. M. P. A. in den Stuttg. Select. phyſ. Oeconom. 1750. St. 3. p. 239.

Hagſtrom, eſſai pour nourrir les Coqs de Bruyeres avec toutes ſortes de plantes. — Journ. oeconom. Mai 1765. p. 223.

Hoffmann, obſ. de capillis foliisque pini, in ventriculo urogalli repertis. — Eph. nat. cur. Cent. IX. et X. Append. p. 463.

Von der Nahrung des Auerhahns im rauhen Winter. — *Hanow* Seltenh. d. Nat. und Oecon. I. p. 270.

7. PHASIANELLUS. *Der Spitzschwanz.* (4)

Müller, Natursyst. II. p. 480. *der canadische fasanenartige Auerhahn.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 286. n. 97. *der Spitzschwanz.*

Büffon, Vögel, V. p. 138. *das langschwänzige Haselhuhn aus Hudsonsbay.* M. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 212. Long-tailed Grous.

Latham, Syst. ornith. II. p. 635. n. 2. Tetrao (Phasianellus) testaceus nigricante varius, rectricibus duabus intermediis elongatis, maculis ocellaribus notatis.

Martini, Naturlex. III. p. 560. *langschwänziges Haselhuhn a. d. Hudsonsbay.*

Seligmann, Vögel, V. tab. 12. *das langschwänzige Haselhuhn a. d. Hudsonsbay.*

Allgem. Reis. XVI. p. 651. *der Auerhahn?*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 160. n. 5. Tetrao (Phasianellus) pedibus hirsutis, cauda cuneiformi, rectricibus tribus lateralibus albis.

Linné, Syst. Nat. Ed. XII. p. 273. n. 1. *β.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 328. n. 2. *der Spitzschwanz.*

2. TETRIX. *Das Birkhuhn.* (5)

Müller, Natursyst. II. p. 480. n. 2. *das Birkhuhn.*

Leske, Natursyst. p. 327. n. 5. *das Birkhuhn.*

Borows-

(4) Flügelweite 24. Zoll. Gewicht 2. Pfund. *Penn.*

(5) Gewicht des Männchens 4 Pfund, des Weibchens 2. Pfund. *Penn.* Von dem Genuss der harzigen, stark riechenden Knospen der Balsampappel, erhält ihr Fleisch einen angenehmen Geruch und Geschmack. In Northumberland finden sie sich jetzt fast

Borowsky, Thierreich, II. p. 188. n. 3. *der Birkhahn.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 203. n. 6. Tetrao (Tetrix) pedibus hirſutis, cauda bifurcata, remigibus ſecundariis baſin verſus albis; *der Birkhahn; deutſche Faſan.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 475. n. 2. *der Birkhahn.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 483. n. 2. *das Birkhuhn*, p. 496. *der kleine Auerhahn; Heidelhahn; Laubhahn; Brennhahn; Spillhahn; Spielhahn; Maoshahn; Schildhahn; ſchwarze Waldhahn; Kurre, Moorhuhn.*

Funke, Naturgeſch. I. p. 227. *das Birkhuhn.*

Ebert, Naturl. II. p. 115. *das Birkhuhn.*

Halle, Vögel, p. 447. n. 472. *das Birkhuhn.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 269. n. 242. *der Birkhahn.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 293. C. *das ſchwarze Waldhuhn; Birkhuhn.*

Beckmann, Naturhiſt. p. 50. *b. der Birkhahn.*

Neuer Schaupl. d. Nat. I. p. 757. *Birkhahn.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 630. *das Birkhuhn.*

Handb. d. deutſch. Thiergeſch. p. 115. *das Birkhuhn.*

Gesner, Vögelb. p. 225. *Laubhan; Bromhan; kleiner Bergfaſan; kleiner Orhan*, fig. p. 226.

Klein, av. p. 116. n. 2. Lagopus, Urogallus minor.

Klein, Vorbereit. p. 215. *Birkhahn, Spielhahn, Laubhahn.*

Klein, verb. Vögelh. p. 120. n. 2. *Birkhahn.*

Klein, Stemmat. av. p. 25. tab. 27. Fig. 2. a. b.

faſt gar nicht mehr, ſeitdem man die Heide, die ihnen zum Futter und zum Schutze diente, weggebrannt hat; in Liefland hingegen ſind ſie ſo häufig, daſs ein bemittelter Handwerker jährlich weit über 100. verzehrt.

Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 15. Fig. 3.
Briſſon, ornithol. I. p. 52. n. 2. Coq-de-bruyeres à queue fourchue.
Büffon, Vögel, V. p. 32. *der Birkhahn*; m. 2. Figg.
Batſch, Thiere, I. p. 413. *Birkhuhn.*
Latham, Syn. Suppl. p. 213. Black Grous.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 635. n. 3. Tetrao (Tetrix) nigro-violacea, cauda bifurca, remigibus ſecundariis verſus baſin albis.
Beſeke, Vögel Kurl. p. 69. n. 145. *der Birkhahn.*
Siemſſen, meklenb. Vögel, p. 146. n. 1. *das Birkhuhn*, *Baarkhohn.*
Bock, N. G. von Preuſſ. IV. p. 395. *das Birkhuhn.*
Fiſcher, Livl. p. 90. n. 119. *Birkhahn.*
Taube, Slavon. I. p. 22. *Birkhühner.*
Leem, Finnm. p. 130. *
Scheffer, Lappl. p. 392. *Birkhüner.*
Pallas, Reiſ. II. p. 52. 226. 667. tab. 7. Ausz. II. p. 27. *Birkhühner.*
Pennant, Reiſ. d. Schottl. I. p. 125. *Birkhahn*, *(Capercalze*, *Auercalze*, *Capercally.)*
Pontoppidan, Dännem. p. 172. *Urhane.*
Pontoppidan, Norw. II. p. 121. *Aurfugl.*
Linné, Abhandl. II. p. 298. n. 106. *das Birkhuhn.*
Steller, Kamtſchatk. p. 193. *Birkhüner.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 139. n. 169. *der Birkhahn.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 48. *Birk-Hahn.*
Naturforſch. XVII. p. 70. n. 145. *das Birkhuhn.*
Martini, Naturlex. III. p. 526. *Birkhuhn.*
Krünitz, Encykl. V. p. 382. *Birkhahn*, *Berghahn.*
Eberhard, Thiergeſch. p. 65. *das Birkhuhn.*
Pennant, britt. Thiergeſch. p. 86. tab. 36. 37.
Meidinger, Vorl. I. p. 143. n. 4. *das Birkhuhn.*

Schwed.

Schwed. Abhandl. XIII. p. 139. XXI. p. 142. *Birkhähne.*

André und Bechstein, Spatzierg. III. p. 173. 178. *Birkhahn.*

Beckmann, Bibl. I. p. 338. VI. p. 394. IX. p. 581. X. p. 365. *Birkhahn*, *kleiner Auerhahn.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 145. *Birkhahn.*

Börner, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 233. *Birkhuhn.*

Heppe, wohlred. Jäg. p. 69. *Mooshahn.*

Oeconom. Zool. p. 88. n. 29. *das Birkhuhn.*

Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 93.

Onomatol. forestal. I. p. 331.

Weygand: Bresl. Samml. 34. Vers. Nov. 1725. Cl. 4. Art. 7.

Schreber, neue Kameralschrift. V. p. 286.

Borkhausen, Magazin, I. p. 222. n. 97.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. Tetrao.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 3. Tetrao minor.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 159. n. 2. Tetrao (Tetrix) pedibus hirsutis, cauda bifurcata, remigibus secundariis basin versus albis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 27. n. 222. Tetrao (Tetrix) pedibus hirsutis, cauda bifurcata, remigibus secundariis basin versus albis.

Kramer, Austr. p. 356. n. 2. Tetrao omnibus remigibus secundariis a medio basin versus albis, cauda bifurca. *Birkhan*, *Schildhan.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 372. Urogallus minor; *Birk-Han*, *Spilhan*, *Laubhan*, p. 373. Urogallina minor; *Birkhenne.*

Charleton, exercitat. p. 82. onom. zoic. p. 73. n. 14. Urogallus minor.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 422. Urogallus minor.

Jonston,

Jonston, av. p. 61. Urogallus minor.
Hermann, tab. affin. anim. p. 167. Tetrao Tetrix.
Gerin. ornithol. II. p. 82. tab. 233. 234. 235.
Salerne, ornithol. p. 137.
Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 328. n. 3. *der Birkhahn.*

β. Tetrix alba. *Das weiſse Birkhuhn.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 496. n. 1. *das weiſse Birkhuhn.*
Latham, Syſt. ornith. II. p. 636. n. 3. γ. Tetr. ſordide alba, ac obſolete ferrugineo undulata, roſtro nigro, pedibus ferrugineis.
Neue Schwed. Abhandl. VI. p. 224. *Beſchreib. eines ganz hell grauen, oder beynahe weiſsen Birkhuhns*, Tetrao Tetrix fem.
Muſ. Carlſon. faſc. III. tab. 66.

γ. Urogallus minor punctatus. *Das Baſtardbirkhuhn.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 497. *das Baſtardwaldhuhn.*
Batſch, Thiere, I. p. 413. *das Auerbirkhuhn.*
Halle, Vögel, p. 451. n. 474. *das Schnarchhuhn.*
Neuer Schaupl. d. Nat. I. p. 432. *Baſtardauerhähne.*
Onomat. hiſt. nat. IV. p. 632. *Eine Spielart vom Birkhuhn.*
Klein, Stemmat. av. p. 25. tab. 28. Fig. 1. a. b. c. Lagopus hybridus.
Klein, Vögeleyer, p. 33. Fig. 2. *Zwitter vom Auerhahn und Birkhenne.*
Briſſon, ornith. I. p. 53. A. Coq de Bruyeres piqueté.
Büffon, Vögel, V. p. 56. *das Auerbirkhuhn; After-oder Baſtardauerhahn.*

Martini,

Martini, Naturlex. I. p. 105. *Auerbirkhuhn.*
Latham, Syn. Suppl. p. 214. ſpurious Grous.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 636. n. 1. δ. Tetr. hybridus; cauda bifurca, ſubtus albo maculatus.
Pennant, arct. Zool. II. p. 293. E. *das Baſtardwaldhuhn.*
Beſeke, Vögel Kurl. p. 69. n. 145. *Rakkelhanar.*
Schwed. Abhandl. VI. p. 173. *Rackelhaner.*
Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 2. Grygallus.

δ. T. corpore nigro alboque variegato, macula pectorali maxima, atro nitente. *
Latham, Syſt. ornith. II. p. 636. n. 1. β.
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 497.
Muſ. Carlſon. faſc. III. tab. 65. Tetr. Tetrix mas, var.

ε. T. albo nigroque maculata. *
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 497. n. 2. *das bunte Birkhuhn.*

21. Nemesianus. *Das bunte Waldhuhn.* (*)
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 637. n. 4. Tetrao (Nemeſianus) corpore nigro rufoque vario, cauda rufa, apice nigra, nigroque maculata.
Scopoli, Bemerk. a. d. N. G. I. p. 141. n. 171. *der bunte Rauchfuß.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 516. n. 6. *das bunte Waldhuhn.*

22. Betulinus. *Das ſchwarzfüßige Waldhuhn.* (**)
Latham, Syſt. ornith. II. p. 637. n. 5. Tetrao (Betulinus) cauda nigra, maculis rufis transverſis varia, uropygio albido nigro faſciato.
Scopoli,

(*) Nach *Bechſtein* ein Haſelhuhn, deſſen Haut beym Ausſtopfen ſo erweitert worden, daſs es die Gröſse des Birkhuhns erreicht hat.

(**) Nach *Bechſtein* ein junges Haſelhuhn..

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 141. n. 172. *der kleine bunte Rauchfuß.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 518. *das kleine bunte Waldhuhn.*

3. Canadensis. *Das canadensische Waldhuhn.*

Müller, Natursyst. II. p. 482. n. 3. *das canadische Berghuhn.*

Halle, Vögel, p. 453. n. 477. *das dunkle Schneehuhn.*

Gatterer, vom Nutz. und Schad. d. Thiere, II. p. 276. n. 243. *das Sprossenhuhn, Waldrebhuhn.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 287. n. 89. *das gefleckte Waldhuhn.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 641. *das braune Haselhuhn von der Hudsonsbay.*

Klein, av. p. 117. n. 6. *Lagopus* e fusco et albo in inferiore corporis parte; e fusco et nigro in superiore; ad oculos duabus lineis albis varia, *freti Hudsonis.*

Klein, Vorbereit. p. 217. n. 6. *das braune Haselhuhn von der Hudsonsbay.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 121. n. 6. *Hudsons Haselhuhn.*

Brisson, ornith. I. p. 56. n. 6. Gelinote de la Baye de Hudson.

Büffon, Vögel, p. 121. *das kanadensische Berghuhn, oder dunkle Schneehuhn.*

Latham, Syn. Suppl. p. 214. Spotted Grous.

Latham, Syst. ornith. II. p. 637. n. 6. Tetrao (Canadensis) fulvus, cinereo varius subtus albus lunulis nigris, rectricibus nigris, apice fulvis, lituris duabus albis ad oculos.

Seligmann, Vögel, III. tab. 37. *das braune flekkigte Haselhuhn.*

Martini,

Martini, Naturlex. III. p. 524. *kanadensisches Berghuhn.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 159. n. 3. Tetrao (Canadensis) pedibus hirsutis, rectricibus nigris apice fulvis, lituris duabus albis ad oculos.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 329. n. 4. *das gefleckte Waldhuhn.*

b. Canace (Das Weibchen vom vorigen.)

Müller, Natursyst. II. p. 185. n. 7. *das weißgefleckte Huhn.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 640. *das kleinere Holzhuhn aus Canada.*

Brisson, ornith. I. p. 57. n. 7. Gelinote de Canada.

Latham, Syst. ornith. II. p. 637. n. 6. β. Tetr. cauda integra, macula alba pone aures naresque (femina).

Seligmann, Vögel, V. tab. 13. *das schwarzgefleckte Hasel- oder Birkhuhn.*

Ellis, Reis. n. Hudsonsmeerbus. p. 35. *das braune und fleckigte Birkhuhn.*

4. Lagopus. *Das Schneehuhn.*

Müller, Natursyst. II. p. 482. n. 4. *das Schneehuhn.*

Leske, Naturgesch. p. 227. n. 4. *das Schneehuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 189. n. 4. *das Schneehuhn.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 203. n. 5. Tetrao (Lagopus) pedibus lanatis, remigibus albis, rectricibus nigris, apice albis; intermediis albis; *das Schneehuhn; Rypen.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 477. n. 4. *das Schneehuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 508. n. 4. *das Schneehuhn*, p. 513. *das weiße Birkhuhn, Hasel-*

Haselhuhn, oder Rebhuhn; Rypen; Weißhahn; Schneehase; Ptarmigan.

Ebert, Naturl. II. p. 116. *das Schneehuhn, Steinhuhn, Hasenfuß.*

Halle, Vögel, p. 452. n. 475. *das Schneehuhn.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 276. n. 244. *das Schneehuhn.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 628. *das Schneehuhn.*

Klein, av. p. 116. n. 4. Lagopus simpliciter.

Klein, Vorbereit. p. 215. n. 4. *Schneehuhn.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 120. n. 4. *Schneehuhn, Hasenfuß.*

Gesner, Vögelb. p. 450. *Schneehuhn.* m. e. Fig.

Pennant, arct. Zool. II. p. 294. D. *der Ptarmigan; Schneehuhn von der Hudsonsbay.*

Brisson, ornithol. I. p. 60. n. 12. Gelinote blanche.

Büffon, Vögel, V. p. 101. *das Schneehuhn.*

Martini, Naturlex. III. p. 640. *Schneehuhn.*

Batsch, Thiere, I. p. 415. *das europäische Schneehuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 639. n. 9. Tetrao (Lagopus) cinereo alboque varius, pedibus lanatis, remigibus albis, rectricibus nigris apice albis, intermediis albis.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 396. *das Schneehuhn.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 70. n. 146. *das Schneehuhn.*

Fischer, Livl. p. 90. 120. *weißes Morasthuhn; Schneehuhn.*

Leem, Finnm. p. 130. *weiße Haselhühner.*

Olaffen, Isl. I. p. 309. i. *Riupa.*

Pallas, Reis. II. p. 226. — Ausz. I. p. 86. *das Schneehuhn.*

Pennant, Reisen d. Schottl. I. p. 71. 124. 306. *Schneehühner.*

Scheffer, Lappl. p. 392. *Schneehüner.*

Cranz,

Cranz, Grönl. p. 111. *Rypen.*
Egede, Grönl. p. 88. *Rypen; Schneehuhn.*
Pontoppidan, Norweg. II. p. 173. *Rype.*
Lichtenberg, Magaz. II. 1. p. 189. *Schneehuhn.*
Naturforſch. XVII. p. 71. n. 146. *das Schneehuhn.*
Götz, Naturgeſch. einiger Vögel, p. 51. tab. 3. *das Schneehuhn.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 140. n. 170. *das Schneehuhn.*
Neue ſchwed. Abhandl. III. p. 107. Tetrao Lagopus.
Beckmann, Bibl. VI. p. 475. *Schneehuhn.*
Roberg, et *Lithenius*, de Lagopede. Upſ. 1732. 4.
Börner, Stadt- und Landwirthſch. II. p. 234. n. 4.
Gött. gel. Anz. 75. p. 449. cf. 1772. p. 467.
Linné, Syſt. Nat. Edit. II. p. 56. Lagopus.
Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 4. Lagopus.
Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 159. n. 4. Tetrao (Lagopus) pedibus lanatis, remigibus albis, rectricibus nigris, apice albis, intermediis totis albis.
Linné, fn. Suec. I. n. 169. Tetrao rectricibus albis, intermediis nigris, apice albis.
Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 223. Tetrao (Lagopus) pedibus lanatis, remigibus albis, rectricibus nigris, apice albis, intermediis albis.
Kramer, Auſtr. p. 356. n. 3. Tetrao rectricibus albis, intermediis nigris, apice albis. *Schneehun.*
Sibbald, Scot. illuſtr. p. 76. Lagopus.
Charleton, onom. zoic. p. 74. n. 5. Perdix alba ſ. Lagopus.
Jonſton, av. p. 68. Perdix alba ſeu Lagopus.
Scheuchzer, phyſ. Sacr. L. 9. c. 48. p. 1009. Lagopedes.
Hermann, tab. affin. anim. p. 164. 167. Tetrao Lagopus.

Philos. transact. LXIII. p. 224. Tetr. Lagopus.
Martin: act. Soc. Lond. III. p. 55. Tetrao mutus.
Bomar. Diction. I. p. 355. VIII. p. 348. — Dict. des Anim. I. p. 367. III. p. 386. Arbenne; Orbaine; Perdrix blanche; Lagopede; Poule de neige.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 329 *das Schneehuhn.*

β. *Das bunte Schneehuhn.*

Müller, Natursyst. II. p. 483. *ein buntes Schneehuhn.*
Gesner, Vögelb. p. 452. *das Steinhuhn.* m. e. Fig.
Neue schwed. Abhandl. III. p. 108.
Gerin. ornithol. II. p. 85. tab. 240. Tetr. varius.

γ. *Das schottische Schneehuhn.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 633. *der Mur-Hahn.*
Gesner, Vögelb. p. 337. *Murhan.* Gallus palustris.
Brisson, ornith. II. p. 55. n. 5. Gelinote d'Ecosse.
Büffon, Vögel, V. p. 73. *das Schottische Haselhuhn; der Mur- oder Moorhahn.*
Martini, Naturlex. III. p. 577. *Schottisches Haselhuhn.*

δ. *Das rothe Schneehuhn.* (6)

Halle, Vögel, p. 453. n. 476. *das rothe Haselhuhn.*
Klein, av. p. 117. n. 5. Lagopus altera.
Klein, Vorbereit. p. 217. n. 5. *Rothes Holz-, Haselhuhn.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 121. n. 5. *Rothes Haselhuhn, Holzhuhn.*
Onomat. hist. nat. IV. p. 632. *die arabische Alchata.*

Brisson,

(6) Nach *Latham* eine eigne Gattung, zu welcher auch die Synonymen der vorhergehenden Varietät gehören sollen. *Brisson* und *Büffon* machen aus beyden besondere Gattungen.

Briſſon, ornith. I. p. 58. n. 9. Gelinote hupée.
Büffon, Vögel, V. p. 88. *das rothe Haſelhuhn;* m. e. Fig.
Latham, Syn. Suppl. p. 216. Red Grous.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 641. n. 15. Tetrao (Scoticus) rufo et nigricante transverſim ſtriatus, rectricibus 6. utrinque exterioribus nigricantibus.
Martini, Naturlex. III. p. 569. *rothes Haſelhuhn.*
Pennant, britt. Thiergeſch. p. 87. tab. 38.
Friſch, Vögel, tab. 112. *das Haſelhuhn?* (Weibchen).
Sibbald, Scot. illuſtr. p. 16. Lagopus altera.
Charleton, onom. zoic. p. 73. n. 7. Attagen; Perdix Aſclepia.
Belon, hiſt. nat. des oiſ. p. 241. Francolin.
Jonſton, av. p. 62. Attagen.
Bomare, Diction. IV. p. 573. — Dicton. des anim. I. p. 707.

23. Albus. *Das weiſſe Waldhuhn.* (7)
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 477. n. 5. *das weiſſe Waldhuhn.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 513. n. 5. *das weiſſe Waldhuhn.*
Büffon, Vögel, V. p. 115. *das Schneehuhn, oder weiſſe Rebhuhn von Hudſonsbay;* m. e. Fig.
Martini, Naturlex. III. p. 652. *Schneehuhn von Hudſonsbay.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 288. n. 99. *das weiſſe Waldhuhn.* Titelkupf.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 639. n. 10. Tetrao (Albus) aurantius, faſciis atris et lituris albis varius,

(7) Sollte dies wohl eine eigne Gattung ſeyn? Die Synonymen dieſer und der vorhergehenden Gattung werden häufig verwechſelt. — Flügelweite, nach *Pennant*, 23. Zoll, Gewicht 24. Unzen.

rius, digitis hirſutis, rectricibus atris apice albis, intermediis totis albis.

Seligmann, Vögel, III. tab. 39. *das weiſse Birkhuhn.*

Ellis, Reiſ. nach Hudſonsmeerbuſ. p. 36. *das weiſse Rebhuhn.*

Schlözer, Erdbeſchr. von Amer. p. 112. *das weiſse Rebhuhn.*

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 330. n. 6. *das weiſse Waldhuhn.*

24. Rupestris. *Das Felſenhuhn.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 291. n. 100. *das Felſenhuhn.*

Latham, Syn. Suppl. p. 217. Rock Grous.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 640. n. 11. Tetrao (Rupeſtris) aurantius, faſciis atris et lituris albis varius, digitis plumoſis, rectricibus atris apice albis, intermediis totis albis, loris nigris.

25. Lapponicus. *Der Rehuſak.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 295. E. *der Rehuſak.*

Latham, Syn. Suppl. p. 216. Rehuſak Grous.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 640. n. 12. Tetrao (Lapponicus) dorſo nigro ferrugineo vario, collo ferrugineo nigro maculato, pectore criſſoque albis.

5. Cupido. *Der Schneemerkur.* (8)

Müller, Naturſyſt. II. p. 483. n. 5. *der Penſylvaniſche Faſan.* Tab. XIX. Fig. 3.

Borowsky, Thierreich, II. p. 190. n. 5. *der Schneemerkur.*

Ebert, Naturl. II. p. 117. *der penſylvaniſche Faſan.*

Halle,

(8) *Büffon* ſcheint dieſe Gattung mit dem *Kragenhuhn* für einerley zu halten.

Halle, Vögel, p. 454. n. 478. *Das dunkelbraune Birkhuhn, mit Merkursflügeln am Kopfe. Schneemerkur.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 278. n. 245. *Schneemerkur; gefiederte Cupido.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 185. n. 96. *der Schneemerkur.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 625. *der kleinere Auerhahn.*

Klein, av. p. 117. n. 7. Lagopus s. Urogallus minor, americanus.

Klein, Vorbereit. p. 217. n. 7. *der kleinere Auerhahn aus Amerika.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 121. n. 7. *amerikanischer Birkhahn; Gaukler.*

Brisson, ornith. I. p. 59. n. 10. Gelinote hupée d'Amerique.

Büffon, Vögel, V. p. 235. *der Schneemerkur.*

Martini, Naturlex. III. p. 645. *Schneemerkur.*

Batsch, Thiere, I. p. 412. *der Schneemerkur.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 638 n. 8. Tetrao (Cupido) subcristatus fusco-rufescens, nigro et albicante transversim striatus, alis succenturiatis cervicalibus.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 104. *der amerikanische Birkhahn.*

Schöpf, Reis. d. Nordamer. II. p. 8. Tetrao Cupido.

Neue Mannigfaltigk. I. p. 3. *der Schneemerkur.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 106. n. 6. Tetrao (Cupido) pedibus hirsutis, alis succenturiatis cervicalibus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 166. Tetrao Cupido.

6. Umbellus. *Das Kragenhuhn.*

Müller, Natursyst. II. p. 485. n. 6. *das Kragenhuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 185. n. 1. *der Auerhahn mit der Halskrause*, tab. 31.

Halle, Vögel, p. 454. n. 480. *das Birkhuhn mit dem Kragen.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 627. *der pensylvanische Auerhahn.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 169. *Birkhahn mit dem Kragen.*

Brisson, ornith. I. p. 59. n. 11. Gelinote hupée de Pensylvanie.

Büffon, Vögel, V. p. 118. *das Kragenhuhn; Mandelhuhn;* m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 581. *das Kragenhuhn.*

Batsch, Thiere, I. p. 412. *das Kragenhuhn.*

Latham, Syn. Suppl. p. 215. Ruffed Grous.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 638. n. 7. Tetrao (Umbellus) fusco rufo nigroque variegatus, subtus fulvo-albus, rectricibus nigro fasciatis apice cinereis, cervicali umbone exstante.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 38. *der Auerhahn mit der Halskrause.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 282. n. 95. *das Kragenhuhn.*

Schöpf, Reisen durch Nordamer. II. p. 8. Tetrao umbellus. *Phasanen.*

Neue Mannigfaltigk. III. p. 211. *das Kragenhuhn.* Fig. p. 224.

Hermann, tab. affin. anim. p. 166. Tetrao Umbellus.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 331. n. 7. *das Kragenhuhn.*

8. Togatus. *Das Mantelhuhn.* (9)

Müller, Natursyst. II. p. 485. n. 8. *das Mantelhuhn.*

Onomat.

(9) Nach *Latham* das Weibchen von *Tetrao Umbellus.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 639. *das groſse Holzhuhn aus Canada.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 638. n. 7. *β.* Tetr. pennis axillaribus maioribus nigris azureis.

Briſſon, ornith. I. p. 57. n. 8. groſse Gelinote de Canada.

Hermann, tab. affin. anim. p. 166. Tetrao Togatus.

9. BONASIA. *Das Haſelhuhn.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 485. n. 9. *das Haſelhuhn.*

Leske, Naturgeſch. p. 272. n. 3. *das Haſelhun.*

Borowsky, Thierr. II. p. 191. n. 6. *das Haſelhuhn.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 203. n. 4. Tetrao (Bonaſia) pedibus hirſutis, rectricibus cinereis, punctis nigris faſcia nigra: exceptis intermediis duabus; *das Haſelhuhn.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 476. n. 3. *das Haſelhuhn.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 500. n. 3. *das Haſelhuhn*, p. 507. *Haſelwildpret; Rothhun; Jerpe.* tab. 18.

Funke, Naturgeſch. I. p. 228. *das Haſelhuhn.*

Ebert, Naturl. II. p. 116. *das Haſelhuhn.*

Halle, Vögel, p. 449. n. 473. *das Haſelhuhn.*

Meyer, Thiere, II. p. 25. tab. 89. *das Haſelhuhn*, mit dem Gerippe.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 278. n. 247. *das Haſelhuhn.*

Neuer Schaupl. d. Nat. III. p. 670. *Haſelhuhn.*

Onomat. hiſt. nat. II. p. 461. IV. p. 634. *das Haſelhuhn.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 296. *das Haſelhuhn.*

Handb. d. deutſch. Thiergeſch. p. 116. *das Haſelhuhn.*

Klein, av. p. 116. n. 3. Lagopus Corylorum.
Klein, Vorbereit. p. 215. n. 3. *Hasel-*, *Hasselhuhn*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 120. n. 3. *Haselhuhn; Rotthuhn.*
Klein, stemmat. av. p. 25. tab. 26. fig. 3. a. b.
Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 15. fig. 4.
Gesner, Thierb. p. 335. *Haselhun;* m. e. Fig.
Brisson, ornith. I. p. 53. n. 3. Gelinote.
Büffon, Vögel, V. p. 62. *das Haselhuhn;* mit 2. Figg.
Martini, Naturlex. III. p. 552. *Haselhuhn.*
Batsch, Thiere, I. p. 413. *das Haselhuhn.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 640. n. 14. Tetrao (Bonasia) rufescens fusco-maculatus, rectricibus cinereis punctis nigris fascia nigra, exceptis intermediis duabus.
Beseke, Vögel Kurl. p. 70. n. 147. *das Haselhuhn.*
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 397. *das Haselhuhn.*
Fischer, Liv. p. 90. n. 121. *Haselhuhn.*
Taube, Slavon. I. p. 22. *Haselhühner.*
Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 71. *Haselhühner.*
Pallas, Reis. Ausz. I. p. 87. *das Haselhuhn.*
Naturforsch. XVII. p. 71. n. 147. XVIII. p. 235. *Haselhuhn.*
Linné, Abhandl. II. p. 298. n. 107. *das Haselhuhn.*
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 142. n. 173. *das Haselhuhn.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 48. *Haselhuhn.*
Loniceri, Kräuterb. p. 676. *Haselhuhn.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 280. *das Hassel-Hun.*
Krünitz, Encykl. XXII. p. 191. *Hasel-Hun.*
Heppe, wohlred. Jäger. p. 185. *Haselhuhn.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 301. *Haselhuhn.*
Merklein, Thierreich. p. 294. *Hasel-Hun.*
Beckmann, Bibl. VI. p. 395. *das Haselhuhn.*

Schwed.

Schwed. Abhandl. 1751. p. 142. *Haſelhuhn.*
Eberhard, Thiergeſch. p. 65. n. 3. *das Haſelhuhn.*
Meidinger, Vorl. I. p. 142. n. 3. *das Haſelhuhn.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 434. *Haſelhuhn.*
Fiſcher, livländ. Landwirthſch. p. 634. *Haſelhuhn.*
Friſch, Vögel, tab. 112. *das Haſelhuhn.*
Zückert, Speiſ. a. d. Thierreich, p. 92.
Borkhauſen, Magazin, I. p. 223. n. 98.
Onomatol. foreſtal. II. p. 58.
Onomatol. oeconom. pract. II. p. 40.
Linné, Syſt. Nat. Ed. II. p. 56. Bonaſia.
Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 5. Bonaſia.
Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 160. n. 7. Tetrao (Bonaſia) pedibus hirſutis, rectricibus cinereis, punctis nigris faſcia nigra, exceptis intermediis duabus.
Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 224. Tetrao (Bonaſia) pedibus hirſutis, rectricibus cinereis, punctis nigris faſcia nigra, exceptis intermediis duabus.
Kramer, Auſtr. p. 356. n. 4. Tetrao rectricibus cinereis punctis nigris faſcia lata nigra, exceptis intermediis duabus. *Haſelhun.*
Charleton, onom. zoic. p. 73. n. 6. Gallina Corylorum.
Charleton, exercitat. p. 82. n. 7. Gallina Corylorum.
Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 277. Gallina Corylorum. *Haſelhun*, *Rotthun.*
Rzaczynsky, auct. hiſt. nat. Polon. p. 366. Attagen.
Jonſton, av. p. 63. Gallina Corylorum.
Gerin. ornithol. II. p. 84. tab. 238.
Hermann, tab. affin. anim. p. 164. Tetrao Bonaſia.
Bomare Diction. V. p. 59. — Diction. des anim. II. p. 258.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 331. n. 8. *das Haselhuhn.*

26. CANUS. *Das graue Waldhuhn.*

Latham, Syn. Suppl. p. 217. Helsingian Grous.

Latham, Syst. ornith. II. p. 640. n. 13. Tetrao (Canus) corpore cano fusco undulato, rostro pedibusque nigris.

11. ALCHATA. *Das pyrenäische Haselhuhn.*

Müller, Natursyst. II. p. 487. n. 11. *das pyrenäische Haselhuhn.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 192. n. 7. *das Pyrenäische Haselhuhn*, tab. 31. B.

Halle, Vögel, p. 441. n. 463. *der Feldengel.*

Halle, Vögel, p. 454. n. 479 *das Afrikanische Waldhuhn.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 282. n. 249. *der Feldengel.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 632. *die Arabische Alchata.*

Klein, av. p. 115. n. 5. Perdix Alchata seu Filacotoa.

Klein, Vorbereit. p. 213. n. 5. *arabische Alchata.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 119. n. 5. *arabisches Rebhuhn*, p. 121. n. 8. *afrikanischer Rauchfuß*, p. 169. n. 2. *kleiner Birkhahn mit zwey laugen Schwanzspitzen.*

Brisson, ornith. I. p. 54. n. 4. Gelinote des Pyrénées.

Büffon, Vögel, V. p. 76. *das Pyrenäische Haselhuhn; Feldengel; Ganga.* M. 2. Figg.

Martini, Naturlex. III. p. 561. *das pyrenäische Haselhuhn.*

Batsch, Thiere, I. p. 214. *das pyrenäische Haselhuhn.*

Latham,

Latham, Syſt. ornith. II. p. 641. n. 16. Tetrao (Alchata) olivaceo-flavicante nigro rufoque varius, abdomine albo, rectricibus duabus intermediis duplo longioribus ſubulatis.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 39. *der kleine Auerhahn mit zwey nadelförmigen Federn in dem Schwanz.*

Shaw, Reiſe, p. 163. *der Kitawiah.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 22. Tetrao Alchata.

Neue Schwed. Abhandl. III. p. 108. Tetrao Alchata.

Belon, hiſt. nat. des oiſ. p. 259. Perdrix de Damas ou de Syrie.

Hiſt. Prov. I. p. 354. Grandoule.

Hermann, tab. affin. anim. p. 164. Tetrao Alchata.

β. *Das Senegalliſche Berghuhn.* (10)

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 127. n. 9. a. *das Senegalliſche Berghuhn.*

Büffon, Vögel, V. p. 83. *Senegaliſches Berg- oder Haſelhuhn.* M. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 526. *Senegaliſches Berghuhn.*

Latham, Syn. II. 2. p. 749. n. 14. A. Senegal Grous.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 642. n. 17. Tetrao (Senegalus) pedibus hirſutis teſtaceus, rectricibus duabus mediis duplo longioribus.

γ. *Das langgeſchwänzte Berghuhn.*

Büffon, Vögel, V. p. 87. *das langgeſchwänzte Waldhuhn.*

27. NAMAQUA. *Das afrikaniſche Waldhuhn.*

Latham, Syn. Suppl. p. 215. Namaqua Grous.

Latham,

(10) Nach *Latham* eine eigne Gattung.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 642. n. 19. Tetrao (Namaqua) pedibus hirſutis, dorſo caſtaneo, abdomine nigricante, rectricibus duabus mediis longioribus ſubulatis.

Sparrmann, Reiſ. n. d. Vorgeb. d. g. H. p. 147.

28. Indicus. *Das indianiſche Waldhuhn.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 650. n. 23. Perdix (Indica) mutica rufa faſciolis nigris, ſincipite albo lunula nigra, remigibus ſecundariis albo nigroque alternatim faſciatis, medio rufis.

Sonnerat, Reiſ. n. Oſtind. u. Chin. II. p. 128. *das indiſche Haſelhuhn*, p. 129. *die chineſiſche Wachtel*, tab. 96.

29. Arenarius. *Das ruſſiſche Sandhuhn.*

Büffon, Vögel, V. p. 142. *das ruſſiſche Sand-oder Steppenhuhn.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 642. n. 18. Tetrao (Arenarius) torque, abdomine et criſſo atris, rectricibus fuſco et griſeo faſciatis apice albis, intermediis 2. fulveſcentibus.

Pallas, Reiſ. Ausz. III. Anh. p. 10. n. 27. Tetrao arenaria, Tataris *Dſherdk*.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 17. *das langſchwänzige Berghuhn.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 164. T. arenaria.
Comment. Lipſ. XXII. p. 665.

†† *Mit dreyzehigen Füßen.*

30. Paradoxus. *Das Baſtardberghuhn.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 127. n. 9. *b. das Baſtardhuhn.*

Büffon, Vögel, V. p. 140. *das Baſtardberghuhn.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 643. n. 20. Tetrao (Paradoxus) pedibus tridactylis hirſutis, dorſo

griſeo

grifeo nigroque undulato, abdomine nigro maculis pallidis latioribus, colli macula fulva.

Pallas, Reif. Ausz. II. Anh. p. 13. n. 25. Tetrao paradoxus, tab. F.

Hermann, tab. affin. anim. p. 163. Tetr. paradoxus.

Donndorff, Handb. d. Thiergefch. p. 332. n. 9. *das Baſtardberghuhn.*

** *Mit warziger Haut um den Augen, und nackten Füßen.*

† *Mit Sporen an den Füßen, bey dem Männchen: Rebhühner.*

10. Francolinus. *Der Frankolin.*

Müller, Naturfyft. II. p. 486. n. 10. *das indianiſche Huhn.*

Halle, Vögel, p. 441. n. 464. *das Cipriſche Rebhuhn.*

Onomat. hift. nat. VII. p. 513. *der Frankolin.*

Klein, verb. Vögelhift. p. 168. *Cypriſches Rebhuhn.*

Briſſon, ornith. I. p. 68. n. 13. Francolin.

Büffon, Vögel, VI. p. 59. *der Frankolin.* M. 2. Figg.

Martini, Naturlex. III. p. 543. *Frankolin.*

Batſch, Thiere, I. p. 415. *der Frankolin.*

Latham, Syft. ornith. II. p. 644. n. 6. Perdix (Francolinus) calcarata, corpore vario, abdomine gulaque atris, cauda cuneata.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 36. *das Haſelhuhn.*

Haſſelquiſt, Palaeft. (ed. germ.) p. 330. n. 43. Tetrao orientalis.

Linné, Syft. Nat. Ed. X. I. p. 161. n. 12. Tetrao (Orientalis) pedibus antice pilofis, abdomine gulaque atris, collari ferrugineo, cauda cuneiformi.

Zinnan, Uov. p. 28. tab. 3. Fig. 6. Francolino.

Bomare,

Bomare, Diction. IV. p. 573. — Dict. des anim. II. 219.

31. MADAGASCARIENSIS. *Das madagascarische Rebhuhn.*

Latham, Syn. Suppl. p. 219. Pintado Patridge.
Latham, Syst. ornith. II. p. 645. n. 8. Perdix (Madagascariensis) calcarata, supra varia, abdomine nigro, maculis albis, fascia per oculos alteraque infra nigris.

32. RUFUS. *Das rothe Rebhuhn.*

Müller, Natursyst. II. p. 488. n. 12. *das rothe Rebhuhn*, tab. 24. Fig. 4.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 479. n. 7. *das Rothhuhn.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 519. n. 8. *das Rothhuhn*, p. 524. *rothes Rebhuhn; griechisches Rebhuhn; Berghuhn, Steinhuhn; rothes europäisches Rebhuhn; italiänisches Rebhuhn; welsches Rebhuhn; rothfüßiges Rebhuhn; Pernise; Cottorna.* — cf. p. 672.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 525. *a. das griechische Rothhuhn.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 192. n. 8. *das rothe Rebhuhn.*
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 203. n. 3. Tetrao (Rufus) pedibus nudis calcaratis rostroque sanguineis, gula alba cincta fascia nigra, albo punctata.
Ebert, Naturl. II. p. 118. *das rothbeinige oder spanische Rebhuhn.*
Halle, Vögel, p. 440. n. 462. *das Rothhuhn.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 283. n. 250. *das rothe Rebhuhn.*
Onomat. hist. nat. VII. p. 517. *das Rothhuhn.*

Klein,

Klein, av. p. 115. n. 4. Perdix graeca.

Klein, Vorbereit. p. 212. n. 4. *das feuerrothe Feldhuhn aus Griechenland.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 119. n. 4. *griechisches Rebhuhn.*

Brisson, ornithol. I. p. 67. n. 12. *Bartavelle.*

Büffon, Vögel, V. p. 37. *das rothe Rebhuhn, oder griechische Feldhuhn.*

Martini, Naturlex. III. p. 620. *rothes Rebhuhn.*

Batsch, Thiere, I. p. 416. *das rothe Feldhuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 647. n. 12. Perdix (Rufa) pedibus calcaratis rostroque sanguineis, gula alba cincta fascia nigra albo punctata.

Frisch, Vögel, tab. 117. *das rothe italiänische Rebhuhn.*

Altmann, Helvetien, p. 224.

Anweis. Vögel zu fang. p. 602. *rothe Rebhühner.*

Onomatol. forestal. III. p. 145.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 28. n. 6. Perdix rufa.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 160. n. 8. Tetrao (Rufus) rostro pedibusque sanguineis, gula alba cincta fascia nigra albo punctata.

Kramer, Austr. p. 357. n. 5. Tetrao rectricibus cinereis superiore medietate hinc inde rufis.

Charleton, onom. zoic. p. 74. n. 12. Perdix graeca.

Jonston, av. p. 68. Perdix graeca.

Zinnan, Uov. p. 29. tab. 3. Fig. 7. *Pernice.*

Bomare, Dictionn. VIII. p. 349. — Diction. des anim. III. p. 388.

Belon, hist. nat. des oif. p. 257. Perdrix de Grece.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 332. n. 10. *das rothe Rebhuhn.*

β. Das

β. *Das rothe europäische Rebhuhn.* (1)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 519. und die p. 524. angeführten Synonymen. (s. vorher.)

Klein, av. p. 115. n. 4. Perdix rufa.

Brisson, ornith. I. p. 66. n. 10. Perdrix rouge.

Büffon, Vögel, VI. p. 51. *das rothe europäische Rebhuhn.*

Gesner, Vögelb. p. 415. *Rothun, oder Welsches Räbhun*, fig. p. 416. schl.

Martini, Naturlex. III. p. 632. *rothes europäisches Rebhuhn.*

Latham, Syn. Suppl. p. 220. Guernsey Patridge.

Latham, Syst. ornith. II. p. 647. n. 12. β.

Scopoli, Bemerk. a. d. N. G. I. p. 143. n. 174. *das Steinhuhn oder Berghuhn.*

Charleton, onom. zoic. p. 74. n. 2. Perdix rufa.

Jonston, av. p. 68. Perdix rufa.

γ. *Das weißbunte Rebhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 527. c. *das weißbunte Rebhuhn.*

Büffon, Vögel, p. 58. *das roth-und weiße Rebhuhn.*

Brisson, ornith. I. p. 66. n. 10. A. Perdrix rouge blanche.

δ. *Das Rebhuhn aus der Barbarey.* (2)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 525. b. *das barbarische Rothhuhn.*

Brisson, ornith. I. p. 67. n. 11. Perdrix rouge de Barbarie.

Klein, av. p. 115. n. 4. Perdix barbara.

Büffon, Vögel, VI. p. 73. *rothes Rebhuhn aus der Barbarey.* M. e. Fig.

Martini,

(1) Nach *Brisson* und *Büffon* eine eigne Gattung.

(2) Nach *Brisson* und *Büffon* eine eigne Gattung.

Martini, Naturlex. III. p. 632. *rothes Rebhuhn aus der Barbarey.*
Latham, Syn. II. 2. p. 770.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 647. n. 12. γ.
Seligmann, Vögel, III. tab. 35. *das rothfüßige Rebhuhn aus der Barbarey.*
Shaw, Reiſ. p. 163. *das Rebhuhn in der Barbarey.*
Cetti, Sardin. II. p. 111. *das große rothe italieniſche Rebhuhn?*

13. PERDIX. *Das gemeine Rebhuhn.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 488. n. 1. *das graue oder gemeine Rebhuhn.* tab. 24 fig. 5.
Leske, Naturgeſch. p. 226. n. 2. *das Rebhuhn.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 193. n. 9. *gemeine Rebhuhn.*
Blumenbach, Handb. der N. G. p. 202. n. 2. Tetrao (Perdix) pedibus nudis calcaratis, macula nuda coccinea ſub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo. *Das Rebhuhn.*
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 478. n. 6. *das gemeine Rebhuhn.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 527. n. 9. *das gemeine Rebhuhn*, p. 553. *Räbhuhn; Repphuhn; Rufhuhn; Feldhuhn; Wildhuhn; graues Rebhuhn.*
Funke, Naturgeſch. I. p. 228. *das Rebhuhn.*
Ebert, Naturl. II. p. 118. *das gemeine Rebhuhn.*
Halle, Vögel, p. 437. n. 459. *das gemeine Rebhuhn.*
Meyer, Thiere, II. p. 25. tab. 88. *das Rebhuhn;* mit dem Gerippe.
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 284. n. 252. *das Rebhuhn.*
Neuer Schaupl. d. Nat. VII. p. 68. *Rebhuhn.*
Onomat. hiſt. nat. VII. p. 515. *das Feldhuhn.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 68. *das Rebhuhn.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 116. *das Rebhuhn.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 298. A. *das gemeine Rebhuhn.*

Beckmann, Naturhist. p. 50. c. *das Rebhuhn.*

Klein, av. p. 114. n. 1. Perdix cinerea, vulgaris, nostras.

Klein, Vorbereit. p. 212. n. 1. *gemeines Feldhuhn.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 118. n. 1. *gemeines Rebhuhn.*

Klein, Stemmat. av. p. 25. tab. 26. fig. 2. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 32. tab. 15. fig. 5.

Gesner, Vögelb. p. 407. *Räbhun;* m. e. ziemlich guten Fig.

Brisson, ornith. I. p. 61. n. 1. Perdrix grise.

Büffon, Vögel, VI. p. 12. *das gemeine oder graue Rebhuhn,* m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 587. *das gemeine Rebhuhn.*

Batsch, Thiere, I. p. 416. *das gemeine Rebhuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 645. n. 9. Perdix (Cinerea) calcarata, cinereo rufo et nigro varia, macula nuda coccinea sub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo.

Beseke, Vögel Kurl. p. 71. n. 148. *das Feldhuhn.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 48. n. 2. *das Rebhuhn; Rapphohn.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 399. *das Rebhuhn.*

Fischer, Livl. p. 90. 122. *Rebhuhn.*

Taube, Slavon. I. p. 22. *Rebhühner.*

Pallas, Reisen, III. p. 296. *Rebhühner*, p. 473. (Rebhühnerfang.)

Stralenberg, Asien, p. 354. *Feld- oder Rebhühner.*

Pontop-

Pontoppidan, Dännem. p. 172. *Agerhöne.*
Pennant, britt. Thiergesch. p. 88. tab. 41. fig. 1. 2.
Pallas, nord. Beytr. III. p. 16. *Feldhühner.*
Boswell, Beschr. von Corsica p. 45. *Rebhühner.*
Borkhausen, Magaz. I. p. 224. n. 99.
Neue schwed. Abhandl. IV. p. 47. *Rebhühner.*
Linné, Abhandl. II. p. 298. n. 108. *das Rebhuhn.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 143. n. 175. *das Rebhuhn.*
Naturforsch. XVII. p. 72. n. 148. *das graue Rebhuhn.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 119. 281. 507. *das Feld- oder Rebhuhn.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 49. *Rebhuhn.*
Naumann, Vogelsteller, p. 176. *Feldhüner.*
Eberhard, Thiergesch. p. 65. *das Rebhuhn.*
Loniceri, Kräuterb. p. 675. *Rebhuhn.*
Walther, ökon. Naturgesch. Deutschl. p. 162. *Rebhuhn.*
André, *u. Bechstein*, Spazierg. III. p. 66. 70. 72. *Rebhuhn.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 444. *das Rebhuhn.*
Geoffroy, mater. med. VII. p. 625. *das gemeine Rebhuhn.*
Lichtenberg, Magazin für das Neueste, etc. III. 1. p. 63. 65. *das Rebhuhn.*
Meidinger, Vorles. I. p. 142. n. 2. *das Rebhuhn.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 879. *Rebhuhn; Wildhuhn.*
Merklein, Thierreich, p. 338. *Rebhun.*
Mannigfaltigk. I. p. 298. II. p. 623.
Börner, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 236.
Oekon. Zool. p. 88. n. 30. *das Rebhuhn.*
Beckmann, Beschr. der Kurm. Brandenb. I. p. 811.
Onomatol. forestal. III. p. 143.
Onomatol. oecon. pract. III. p. 39.

Lemmery, Materiallex. p. 854.
Hannöv. Beytr. 1759. p. 266.
Anon. Précis de la nature d'elever les Faiſans et les Perdreaux. Paris 1772. 12.
Aldrovand. encom. Perdicis: in Dornav. amphitheatr. I. p. 433.
Clodii, diſſ. de Perdice. Witteb. 1671. 4.
Linné, Syſt. Nat. Ed. II. p. 56. Perdix.
Linné, Syſt. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 7. Perdix cinerea.
Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 160. n. 9. Tetrao (Perdix) pedibus nudis, macula nuda coccinea pone oculos, cauda ferruginea, ſterno brunneo.
Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 125. Tetrao (Perdix) pedibus nudis calcaratis, macula nuda coccinea ſub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo.
Kramer, Auſtr. p. 357. n. 5. Tetrao macula nuda coccinea pone oculos, rectricibus ferrugineis. *Rebhun.*
Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 327. Perdix. *Räbhun; Wild-Hun.*
Charleton, onom. zoic. p. 74. Perdix cinerea. p. 75. n. 7. Perdix vulgaris.
Rzaczynsky, hiſt. nat. Polon. p. 147. Perdix.
Jonſton, av. p. 68. Perdix cinerea ſeu minor.
Forskål, fn. orient. p. VII. n. 11. Tetrao Perdix; turc. *Tjeklik;* ad Tor *Schingan;* Djiddae *Hädjal.*
Schaeffer, element. ornithol. tab. 54.
Zinnan. Uov. p. 30. tab. 3. fig. 8. Starna.
Bomare, Diction. VIII. p. 343. — Diction. des anim. III. p. 383.
Ariſtot. hiſt. anim. L. 9. c. 11. n. 123. 144. Περδικες.

2. B.

2. B. Mos. c. 16. v. 13. — Psalm 78. v. 26. — Jerem. c. 17. v. 1. — Sam. 26. v. 20.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 332. n. 11. *das gemeine Rebhuhn.*
Donndorff, Natur u. Kunst, III. p. 354. *das Rebhuhn.*

β. *Das grauweiße Rebhuhn.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 553. n. 1.
Brisson, ornith. I. p. 62. A. Perdrix grise blanche.
Buffon, Vögel, VI. p. 31. *das grauweiße Rebhuhn.*
Martini, Naturlex. III. p. 613. *grauweißes Rebhuhn.*
Latham, Syn. II. 2. p. 763.
Latham, Syst. ornith. II. p. 646. n. 9. β.

γ. *Das ganz weiße Rebhuhn.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 553. it. p. 672.
Frisch, Vögel, tab. 116. *das weiße Rebhuhn.*
Martini, Naturlex. III. p. 639. *weißes Rebhuhn.*
Scaliger, exerc. in Cardan. 59. Perdices albae?
Pontoppidan, Dännem. p. 172. not. 20. *ein weißes Rephuhn.*

δ. *Das Rebhuhn mit dem Halsbande.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 553. n. 3.
Latham, Syn. II. 2. p. 764.

ε. *Das bunte Rebhuhn.* *
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 553. n. 2.

52. DAMASCENUS. *Das Damaszener Rebhuhn.* (3)
Halle, Vögel, p. 439. n. 460. *das Damascenerfeldhuhn.*
Klein, av. p. 114. n. 2. Perdix Damascena.
Klein, Vorbereit. p. 212. n. 2. *Damascener.*

(3) Nach *Brisson* eine Varietät von *Tetr. Perdix.*

Klein, verb. Vögelhift. p. 118. n. 2. *Damaſcener.*

Briſſon, ornith. I. p. 62. B. Perdrix de Damas.

Büffon, Vögel, VI. p. 33. *das Damaſcener- oder kleine graue Rebhuhn.*

Martini, Naturlex. III. p. 610. *damaſzener Rebhuhn.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 646. n. 10. Perdix (Damaſcena) cauda ferruginea, pectore brunneo, pedibus flavis.

Charleton, onomaſt. zoic. p. 74. n. 4. Perdix Damaſcena.

Jonſton, av. p. 68. Perdix Damaſcena.

Bomare, Diction. VIII. p. 350. n. 6. Dict. des anim. III. p. 388.

33. Montanus. *Das Bergrebhuhn.* (4)

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 554. n. 4. *das Bergrebhuhn.*

Briſſon, ornithol. I. p. 62. n. 2. Perdrix de montagne.

Büffon, Vögel, VI. p. 36. *das Bergrebhuhn;* m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 608. *Bergrebhuhn; ſchwarzbraunes Rebhuhn.*

Latham, Syn. II. 2. p. 765. n. 10. Mountain Partridge.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 646. n. 11. Perdix (Montana) dilute caſtanea, capite et collo ſupremo fulvis, rectricibus ſeptem extimis pallide caſtaneis.

34. Rubricollis. *Das rothkehlige afrikaniſche Rebhuhn.*

Büffon, Vögel, VI. p. 69. *das rothe afrikaniſche Rebhuhn;* m. e. Fig.

Martini,

(4) Nach *Bechſtein* eine Varietät oder vielmehr ein ſehr altes Männchen des gemeinen Rebhuhns.

Martini, Naturlex. III. p. 590. *das rothe afrikanische Rebhuhn.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 643. n. 13. Perdix (Rubricollis) calcarata, corpore fuſco maculato, criſſo albo, orbitis gulaque nudis rubris.

35. Petrosus. *Das Felſenrebhuhn.*

Büffon, Vögel, VI. p. 74. *das Felſenrebhuhn; Rebhuhn von Gambia.*

Martini, Naturlex. III. p. 612. *Rebhuhn von Gambia.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 648. n. 14. Perdix (Petroſa) fuſca, roſtro, pedibus iridibusque rubris, macula pectoris ferruginea.

36. Perlata. *Das Perlrebhuhn.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 129. n. 23. *das Perlberghuhn.*

Briſſon, ornith. I. p. 65. n. 9. Perdix de la Chine.

Büffon, Vögel, VI. p. 75. *das Perlberghuhn, oder das geperlte Chineſiſche Rebhuhn.*

Martini, Naturlex. III. p. 586. *das Perlberghuhn.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 648. n. 15. Perdix (Perlata) calcarata fuſca, albido et rufeſcente maculata, dorſo rufeſcente ſtriato, gula alba, lateribus capitis faſciis duabus nigris, ſuperciliis rufis.

β. *Das afrikaniſche Perlrebhuhn.* (f)

Latham, Syn. III. 2. p. 773. n. 15. A.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 648. n. 16. Perdix (Afra) calcarata fuſca, faſciolis ſtriisque albidis, ſuperciliis colloque ſubtus, albo nigroque variis, remigibus caudaque lineolis transverſim albis.

(f) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

37. CAPENSIS. *Das Rebhuhn vom Cap.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 643. n. 1. Perdix (Capenſis) ſubbicalcarata cinereo-nigricans, griſeſcente transverſim lineata, pectore ſtrigis albis, pedibus rubris.

15. BICALCARATUS. *Das doppeltgeſpornte ſenegaliſche Rebhuhn.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 490. n. 15. *der Doppelſporn.*

Briſſon, ornithol. I. p. 65. n. 8. Perdrix du Senegal.

Büffon, Vögel, VI. p. 67. *der Doppelſporn*, m. c. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 542. *das Senegaliſche Rebhuhn.*

Batſch, Thiere, I. p. 416. *der Doppelſporn.*

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 511. *das Rebhun aus Senegal mit zwey Sporen.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 643. n. 2. Perdix (Bicalcarata) bicalcarata, rufo fuſco et albido varia, ſuperciliis nigris.

Adanſon, Senegal. p. 37. 38. 71. 217. *Rebhühner.*

Hermann, tab affin. anim. p. 168. Tetr. bicalcaratus.

38. ZEYLONENSIS. *Das doppeltgeſpornte zeilaniſche Rebhuhn.*

Latham, Syn. Suppl. p. 222. Chittygong Partridge? (das Weibchen?)

Latham, Syſt. ornith. II. p. 644. n. 3. Perdix (Ceylonenſis) bicalcarata, capite, collo corporeque antice albo nigroque vario, poſtice ferrugineo.

Neueſte Mannigfaltigk. I. p. 211. Fig. 1. 2.

39. SPA-

39. SPADICEUS. *Das rothbraune madagaſcariſche Rebhuhn.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 644. n. 4. Perdix (Spadicea) bicalcarata fuſco - rubra, roſtro flavo, pedibus rubris.

Sonnerat, Reiſ. n. Oſtind. u. Chin. II. p. 132. *das rothe madagaſcariſche Rebhuhn.*

40. NUDICOLLIS. *Das glattkehlige Rebhuhn.*

Büffon, Vögel, VI. p. 69. *die Glattkehle.*

Martini, Naturlex. III. p. 590. *die Glattkehle.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 644. n. 5. Perdix (Nudicollis) bicalcarata, corpore variegato, collo antice nudo rubro.

41. GINGICUS. *Das Rebhuhn aus Gingi.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 648. n. 17. Perdix (Gingica) rufo - griſea, ſuperciliis albo nigroque variis, uropygio tectricibusque alarum mediis nigro, minoribus griſeo maculatis.

Sonnerat, Reiſ. nach Oſtind. u. Chin. II. p. 130. *das Rebhuhn aus Gingi.*

42. PONDICERIANUS. *Das Rebhuhn von Pondichery.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 649. n. 18. Perdix (Ponticeriana) calcarata, rufa, nigro faſciata, ſubtus alba, lunulis nigris, rectricibus duabus mediis faſciis quatuor albidis, lateralibus intus nigro faſciatis.

Sonnerat, Reiſ. n. Oſtind. u. Chin. II. p. 129. *das Rebhuhn von Pondichery.*

β. Tetr. mutica fuſca, nigro faſciata, collo pectoreque albo maculis nigris, rectricibus faſciis nigris. *

Latham, Syn. Suppl. p. 221.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 649. n. 18. *β.* (An femina?)

43. NAEVIUS. *Der Okokolin.*

Klein, av. p. 58. n. 3. Corvus criſtatus.
Klein, Vorbereit. p. 110. n. 3. *Straußrabe.*
Klein, verb. Vögelh. p. 58. n. 3. *Straußrabe.*
Briſſon, ornith. I. p. 63. n. 3. Perdrix de montagne du Mexique.
Briſſon, ornith. I. p. 177. n. 10. Rollier hupé du Mexique.
Büffon, Vögel, VI. p. 142. *der Okokolin, oder das Mexikaniſche Bergrebhun.*
Martini, Naturlex. III. p. 609. *mexikaniſches Bergrebhuhn.*
Latham, Syſt. ornith. II. p. 649. n. 19. Perdix (Naevia) fuſco pallente et fulvo varia, capite, gutture et lateribus nigro maculatis, roſtro pedibusque incarnatis.

†† *Mit ungeſpornten Füßen: Wachteln.*

* *Mit vierzehigen Füßen.*

44. FERRUGINEUS. *Die große chineſiſche Wachtel.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 651. n. 26. Perdix (Ferruginea) rufo-fuſca, dorſo tectricibusque alarum lineis longitudinalibus flaveſcentibus, pennis elongatis mucronatis.
Sonnerat, Reiſ. n. Oſtind. u. Chin. II. p. 133. *die große chineſiſche Wachtel.*

45. JAVANICUS. *Die javaniſche Wachtel.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 651. n. 27. Perdix (Javanica) cinerea, lunulis obſcuris, genis nigris, fronte, ſincipite abdomineque fulvis, rectricibus maculis lunatis nigris.

46. VIRIDIS. *Die grüne Wachtel.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 650. n. 22. Perdix (Viridis) viridis, alis caſtaneis nigro punctulatis, roſtro pedibusque pallide rubris.

16. VIRGINIANUS. *Die virginiſche Wachtel.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 490. n. 16. *das virginiſche Rebhuhn.*

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 519. *das Virginiſche Rebhun.*

Klein, av. p. 115. n. 6. Perdix virginiana.

Klein, Vorbereit. p. 213. n. 6. *Amerikaner aus Virginien.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 119. n. 6. *Virginiſches Rebhuhn.*

Briſſon, ornith. I. p. 64. n. 7. Perdrix d'Amerique.

Martini, Naturlex. III. p. 591. *das amerikaniſche Rebhuhn.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 650. n. 24. Perdix (Virginiana) mutica nigro varia, ſupra fuſco-rufeſcens, ſubtus flaveſcens, faſcia nigra ſupra et infra oculos, linea verticali fulva.

Büffon, oiſ. II. p. 399. Perdrix d'Amerique.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 109. *das amerikaniſche Rebhuhn.*

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 161. n. 10. Tetrao (Virginianus) pedibus nudis, faſcia nudâ ſupra et infra oculos, linea verticali fulva.

17. MARILANDUS. *Die marylandiſche Wachtel.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 490. n. 17. *das mariländiſche Rebhuhn.*

Halle, Vögel, p. 439. *das Amerikaniſche Rebhuhn.* Fig. 31.

Onomat.

Onomat. hist. nat. VII. p. 514. *das Rebhun aus Neu-England.*

Klein, av. p. 115. n. 3. Perdix novae Angliae.

Klein, Vorbereit. p. 212. n. 3. *Neuengländer.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 119. n. 3. *Neuengländer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 297. n. 101. *das Rebhuhn von Maryland.*

Brisson, ornith. I. p. 64. n. 6. Perdrix de la nouvelle Angleterre.

Büffon, Vögel, VI. p. 77. *das Marilandische Rebhuhn.*

Martini, Naturlex. III. p. 619. *das Marilandische Rebhuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 651. n. 25. Perdix (Marilanda) rufa, nigro varia, subtus albida undulatim lineata, superciliis gulaque albida.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 161. n. 10. Tetrao (Marilandicus) pedibus nudis, cervice albo nigroque punctata.

Philos. transact. XVII. p. 992. American Partridge.

Du Pratz, Louis. II. p. 86.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 333. n. 12. *das Marylandische Rebhuhn.*

47. Kakelik. *Der Kakelik.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 655. n. 42. Perdix (Kakelik) rostro, palpebris pedibusque coccineis, pectore cinereo, dorso albo et cinereo undulato.

48. Caspius. *Die caspische Wachtel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 655. n. 43. Perdix (Caspia) cinerea, spadiceo-maculata, naribus, orbitis et temporibus calvis pedibusque luteis.

14. Mexi-

14. MEXICANUS. *Der Kolenikui.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 489. n. 14. *das mexicaniſche Rebhuhn.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 130. n. 26. *der Colenicui.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 128. Colcuicuiltic: *die roth geſtreifte mexicaniſche Wachtel.*

Briſſon, ornithol. I. p. 72. n. 20. Caille de la Louiſiane.

Büffon, Vögel, VI. p. 139. *der Kolenicui*, m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 616. *Kolenicui.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 653. n. 31. Perdix (Mexicana) mutica, roſtro pedibusque ſanguineis, corpore transverſim ſtriato, linea ſuperciliari gulaque albis.

Jonſton, av. p. 224. Colcuicuiltic.

49. FALKLANDICUS. *Die maluiniſche Wachtel.*

Büffon, Vögel, VI. p. 116. *die Maluiniſche Wachtel*, m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 691. *die Maluiniſche Wachtel.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 653. n. 32. Perdix (Falklandica) mutica, corpore ſupra fuſceſcente, iuguloque flaveſcente lunulis fuſcis, pectore imo abdomineque albis.

50. NOVAE HISPANIAE. *Die neuſpaniſche Wachtel.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 129. n. 24. *der Colin.*

Briſſon, ornith. I. p. 72. n. 19. grande Caille du Mexique.

Büffon, Vögel, VI. p. 136. *der groſse Kolin.*

Martini, Naturlex. III. p. 615. *Kolin.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 653. n. 33. Perdix (Novae Hiſpaniae) mutica, capite criſtato, corpore fulvo, remigibus apice albis.

Jonſton,

Jonston, av. p. 223. Coturnix alia omnium maxima fulvaque.

51. Coyolcos. *Der Koyolkos.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 129. n. 25. *der Cojolcos.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 454. *Coyolcozque.*

Briſſon, ornith. I. p. 71. n. 18. Caille du Mexique.

Büffon, Vögel, VI. p. 138. *der Koyolkos, oder Koyolkozque.*

Martini, Naturlex. III. p. 618. *Koyolkos.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 653. n. 34. Perdix (Coyolcos) mutica fulva, corpore ſupra fulvo albo nigroque vario, ſubtus fulvo.

Jonston, av. p. 223. Coyolcozque ſeu Colliſonalis.

52. Suscitator. *Der Wecker.*

Briſſon, ornith. I. p. 70. n. 15. Caille de Java.

Büffon, Vögel, VI. p. 122. *die Javaniſche Wachtel oder der Wecker.*

Martini, Naturlex. III. p. 688. *Javaniſche Wachtel.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 654. n. 35. Perdix (Suſcitator) flavicante rufo nigro et griſeo variegata, roſtro longiore.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 333. n. 13. *die javaniſche Wachtel.*

53. Striatus. *Die geſtreifte Wachtel.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 654. n. 36. Perdix (Striata) mutica, corpore variegato, pectore nigro, maculis albis, gula nigra, vitta ſupra oculos maxillarique albis.

54. Griseus. *Die graue Wachtel.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 654. n. 37. Perdix (Griſea) mutica, ſupra griſeo nigroque varia, ſubtus

ſubtus cinereo griſea, iugulo, pectore abdomineque faſciis nigris.

Sonnerat, Reiſ. n. Oſtind. u. Chin. II. p. 133. *die braune Wachtel aus Madagaſcar.*

55. Coromandelicus. *Die Wachtel aus Coromandel.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 654. n. 38. Perdix (Coromandelica) mutica corpore faſciolis lineisque pallidis, ſupra caſtaneo ſubtus flavo, faſcia per oculos flaveſcente, gula alba.

Sonnerat, Reiſ. n. Oſtind. u. Chin. II. p. 134. *die kleine Wachtel aus Gingi.*

56. Novae Guineae. *Dieneuguineiſche Wachtel.*

Büffon, Vögel, VI. p. 128. *die Neu-Guineiſche Wachtel*, m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 692. *Wachtel von Neu-Guinea.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 655. n. 39. Perdix (Novae Guineae) mutica, corpore fuſco, tectricibus alarum flaveſcente marginatis.

Sonnerat, Reiſ. n. Neuguinea, p. 61. *die neuguineiſche Wachtel.*

57. Manillensis. *Die kleine luzoniſche Wachtel.*

Büffon, Vögel, VI. p. 127. *die kleine Luzoniſche Wachtel.* m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 690. *kleine Luzoniſche Wachtel.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 655. n. 40. Perdix (Manillenſis) mutica, corpore ſupra nigricante, ſubtus flaveſcente, faſciis nigricantibus gula alba.

Sonnerat, Reiſ. n. Neuguin. p. 22. *die kleine Wachtel der Inſel Luçon*, m. e. Fig.

18. Cri-

18. Cristatus. *Die mexikanische Wachtel.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 491. n. 18. *die mexicaniſche Wachtel.*

Ebert, Naturl. II. p. 119. *die mexikaniſche Wachtel.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 453. *die gehaubte Wachtel von Mexico.*

Briſſon, ornith. II. p. 72. n. 21. Caille hupée du Mexique.

Büffon, Vögel, VI. p. 135. *der Zonekolin.*

Martini, Naturlex. III. p. 618. *Zonekolin.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 652. n. 30. Perdix (Criſtata) mutica, corpore variegato, criſta dependente gulaque fulvis.

Jonſton, av. p. 223. Colin genus Quauhtzonecolin nuncupatum.

19. Sinensis. *Die kleine chineſiſche Wachtel.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 491. n. 19. *die chineſiſche Wachtel.*

Halle, Vögel, p. 444. n. 467. *die chineſiſche Wachtel.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 304. n. 254. *die chineſiſche Wachtel.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 453. *die chineſiſche Wachtel.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 169. *chineſiſche Wachtel.*

Briſſon, ornith. I. p. 71. n. 17. Caille des Philippines.

Büffon, Vögel, VI. p. 117. *die Chineſiſche Wachtel;* m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 685. *chineſiſche Wachtel.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 652. n. 29. Perdix (Chinenſis) mutica, corpore griſeo maculato, iugulo nigro arcu albo.

Selig-

Seligmann, Vögel, VII. tab. 37. *die chinesische Wachtel.*

20. COTURNIX. *Die gemeine Wachtel.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 492. n. 20. *die gemeine Wachtel*, tab. 24 fig. 6.

Leske, Naturgesch. p. 226. n. 1. *die Wachtel.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 194. n. 10. *die Wachtel.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 202 n. 1. Tetrao (Coturnix) pedibus nudis, corpore griseo maculato, superciliis albis, rectricibus margine lunulaque ferruginea; *die Wachtel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 480. n. 8. *die Wachtel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 556. n. 10. *die Wachtel.* p. 580. *Schlagwachtel; Quakel.*

Funke,

(6) Ein scheuer Vogel, der sehr schnell, aber nicht gern fliegt, flach über der Erde hinstreicht, und wegen seiner Schwere und kurzen Flügel nur eine kurze Strecke fliegt. Kommt zu Anfang des Mayes, seltener zu Ende des Aprils, bey uns an, und zieht aufs späteste zu Anfang des Octobers wieder weg. Wahrscheinlich ziehen sie des Nachts, denn noch nie hat man sie am Tage auf ihren Wanderungen bemerkt, und gehen vermuthlich von uns nach dem südlichen Rusland, und von da in die asiatische Türkey; denn auf ihren Wanderungen werden sie im südlichen Rusland zu tausenden gefangen, und in Fässern nach Moskau und Petersburg geschickt. Sie ziehen nicht Trupp- sondern Familienweise, wie man sie im Herbst antrift. Das Weibchen legt nur einmal des Jahrs, und zwar sehr spât, mehrentheils erst zu Ende des Julius, 8, 14, bis 20 Eyer, mehrentheils auf einem Waizenacker, seltener auf einer Wiese, und brütet drey Wochen. Die Männchen sind im ersten Jahre fast gar nicht von den Weibchen zu unterscheiden, und bekommen erst im zweyten Jahre die beyden grossen rostfarbigen Flecke auf der Brust, die in der Jägersprache *das Schild* genannt werden.

Funke, Naturgesch. I. p. 229. *die Wachtel.*
Ebert, Naturl. II. p. 119. *die Wachtel.*
Halle, Vögel, p. 442. n. 466. *die Wachtel.*
Meyer, Thiere, II. p. 22. tab. 80. *Wachtel; Diccurhicvogel.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 305. n. 256. *die Wachtel.*
Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 396. *Wachtel.*
Onomat. hist. nat. III. p. 449. *die Wachtel.*
Handb. der Naturgesch. II. p. 73. *die Wachtel.*
Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 117. *die Wachtel.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 298. B. *die Wachtel.*
Klein, av. p. 115. n. 1. Coturnix vulgaris, nostras. Quiscula; Quisquila; Qualea; Quaquila.
Klein, Vorbereit. p. 213. n. 1. *Quakel.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 119. n. 1. *gemeine Wachtel.*
Klein, stemmat. av. p. 25. tab. 27. fig. 3. a. b.
Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 15. fig. 6.
Gesner, Vögelb. p. 538. *Wachtel;* m. e. gut. Abbildung.
Brisson, ornith. I. p. 69. n. 14. Caille.
Büffon, Vögel, VI. p. 79. *die Wachtel;* m. e. Fig.
Martini, Naturlex. III. p. 657. *die Wachtel.*
Batsch, Thiere, I. p. 417. *die Wachtel.*
Latham, Syn. Suppl. p. 222. Quail.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 651. n. 28. Perdix (Coturnix) mutica, corpore griseo-maculato, superciliis albis, rectricibus margine lunulaque ferruginea.
Beseke, Vögel Kurl. p. 71. n. 149. *die gemeine Wachtel.*
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 49. n. 3. *die Wachtel.*
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 400. *die Wachtel.*

Cetti,

Cetti, Sardin. II. p. 115. *die Wachtel.*
Fischer, Liv. p. 91. n. 123. *Wachtel; Schnarrwachtel.*
Pallas, Reis. Ausz. III. p. 296. *Wachteln.*
Molina, Chili, p. 209. *die Wachteln.* *
Taube, Slavon. I. p. 22. *Wachteln.*
Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffn. ed. in 4. p. 395. *die Wachteln.*
Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 3. *Wachtel.*
Pontoppidan, Norweg. II. p. 192. *Vagtel.*
Hasselquist, Paläst. ed. germ. p. 331. n. 44. Tetrao Israelitarum.
Pennant, britt. Thiergesch. p. 89. tab. 42.
Zorn, Petinotheol. I. p. 162. 360. 425. 542. II. p. 65. 82. III. p. 145. 186. 283. 556. 719. *die Wachtel.*
Lichtenberg, *u. Voigt*, Magaz. für das Neueste, etc. VII. 2. p. 115. *Wachteln.*
Le Vaillant, Reis. n. Afr. I. p. 74. *Wachteln.*
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 144. n. 176. *die Wachtel.*
Linné, Abhandl. II. p. 282. n. 32. p. 285. n. 49. p. 299. n. 109. *die Wachtel.*
Naturforsch. XVII. p. 73. n. 149. *die gemeine Wachtel.* XXII. p. 136. *Wachtel.*
Oekonom. Zool. p. 89. n. 31. *die Wachtel.*
Beckmann, Naturhist. p. 51. *die Wachtel.*
Eberhard, Thiergesch. p. 65. *die Wachtel.*
Geoffroy, mater. med. VII. p. 412. *die Wachtel.*
Naumann, Vogelsteller, p. 177. *die Wachtel.*
Meidinger, Vorles. I. p. 142. n. 1. *die Wachtel.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 51. *die Wachtel.*
Loniceri, Kräuterb. p. 676. *die Wachtel.*
Merklein, Thierreich. p. 405. *Wachtel.*
André, *u. Bechstein*, Spazierg. II. 162. *die Wachtel.*

Goeze, Nützl. Allerl. II. p. 225. n. 28. *die Wachtel.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 1314. *Wachtel.*

Hervieux, von Canarienvögeln. p. 180. *die Wachtel.*

Sander, Natur u. Relig. p. 226. *die Wachtel.*

Walther, ökonom. Naturgesch. Deutschl. p. 171. *Wachtel.*

Börner, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 237. n. 7.

Derham, Physicotheol. p. 572.

Anweis. Vögel zu fang. p. 562.

Neues Hamburg. Magaz. St. 84. p. 462.

Borkhausen, Magazin, I. p. 225. n. 100.

Zückert, Speis. a. d. Thierreich. p. 94.

Bresl. Natur- u. Kunstgesch. Vers. 28. p. 409.

Ventzky: Pommersche Nachr. 1748. n. 6.

Allgem. Reis. VII. p. 39. 616. *Wachteln.*

Mem. de Mathem. et de Phys. III. p. 91. 92.

Tournefort, voy. au Levant. p. 169. 281. 313.

De la Porte, Reisen, V. p. 386.

Onomatol. forestal. III. p. 772.

Lemmery, Materiallex. p. 360.

Hahn, diss. de Coturnicibus. Regiom. 1712. 4.

Zacutus Lusit. de coturnicibus earumque epilepsia; in Medic. Princip. hist. Lib. 5. edit. oper. Tom. I. p. 838.

Camerarius, Coturnicum esus an convulsiones pariat. Syll. memorabil. Cent. 16. Part. 16. p. 1303.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. Coturnix.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 28. n. 8. Coturnix.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 161. n. 13. Tetrao (Coturnix) pedibus nudis, corpore griseo-maculato, superciliis albis, rectricibus margine lunulaque ferruginea.

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 226. Tetrao (Coturnix) pedibus nudis, corpore griseo-maculato,

culato, superciliis albis, rectricibus margine lunulaque ferruginea.

Kramer, Austr. p. 357. n. 7. Tetrao pedibus nudis, corpore griseo-maculato, linea superciliorum alba. *Wachtel.*

Charleton, onom. zoic. p. 75. n. 15. Coturnix.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 247. Coturnix. *Wachtel; Quackel.*

Moehring, av. gen. p. 54. n. 51. Coturnix.

Heerkens, av. Fris. p. 151. Coturnix.

Belon, hist. nat. des ois. p. 264. Caille.

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 375. Coturnix.

Sibbald, Scot. illustr. p. 16. Coturnix.

Zinnan. Uov. p. 36. tab. 5. fig. 19. Quaglia.

Plin. hist. nat. L. 10 c. 23. Coturnices.

Varro, de re rust. L. 3. c. 5. Coturnices.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 6. n. 137. c. 10. n. 144. Ὀρτυγες.

Hermann, tab. affin. anim. p. 167. Tetrao Coturnix.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 334. n. 14. *die gemeine Wachtel.*

Donndorff, Natur und Kunst, III. p. 364. *die Wachtel.*

β. *Die große polnische Wachtel.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 196. *die große polnische Wachtel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 581. n. 4. *die große Wachtel.*

Brisson, ornith. I. p 70. A. grande Caille.

Büffon, Vögel, VI. p. 114. *die große Polnische Wachtel.*

Martini, Naturlex. III. p. 687. *große polnische Wachtel.*

Latham, Syn. II. 2. p. 782.

Latham, Syst. ornith. II. p. 652. n. 28. β.
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 277.

γ. *Die weiße Wachtel.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 581. n. 5. *die weiße Wachtel.*
Büffon, Vögel, VI. p. 115. *die weiße Wachtel.*
Martini, Naturlex. III. p. 692. *die weiße Wachtel.*

δ. *Die Sandwachtel.* *
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 580. n. 2.

ε. *Die Mohrenwachtel.* *
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 580. n. 3.

ζ. *Die bunte Wachtel.* *
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 581. n. 6.

η. *Die aschgraue Wachtel.* *
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 582. n. 7.

ϑ. *Die schwarze Wachtel.* *
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 582. n. 8.

** *Mit dreyzehigen Füßen.*

58. GIBRALTARICUS. *Die Wachtel von Gibraltar.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 656. n. 45. Perdix (Gibraltarica) tridactyla mutica, corpore supra fusco, nigro-fasciato, subtus flavescente albo, tectricibus alarum maculis, pectore lunulis nigris.

59. ANDALUSICUS. *Die Wachtel von Andalusien.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 656. n. 46. Perdix (Andalusica) tridactyla mutica, corpore ruso, nigro undulato, subtus flavescente.

60. NIGRICOLLIS. *Die schwarzhälsige Wachtel.*
Brisson, ornithol. I. p. 70. n. 16. Caille de Madagascar.

Büffon,

Büffon, Vögel, VI. p. 120. *die Madagaſkariſche Wachtel;* m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 690. *Madagaſkariſche Wachtel.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 452. *die Wachtel von Madagaſcar.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 656. n. 47. Perdix (Nigricollis) tridactyla mutica, corpore ſupra cinereo rufo et nigro vario, gutture et collo inferiore nigris.

61. Luzoniensis. *Die luzoniſche Wachtel.*

Büffon, Vögel, VI. p. 126. *die dreyzeeige Luzoniſche Wachtel;* m. e. Fig.

Martini, Naturlex. III. p. 686. *dreyzehige Luzoniſche Wachtel.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 656. n. 48. Perdix (Luzonienſis) tridactyla mutica, ſupra fuſca, ſubtus flava, capite albo nigroque vario, tectricibus alarum apice flavis, macula nigra.

Sonnerat, Reiſ. n. Neuguinea, p. 22. *die dreyzehigte Wachtel.*

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 335 n. 15. *die luzoniſche Wachtel.*

*** *Gegend um den Augen mit wenigen Federn bedeckt. Füße blos, ungeſpornt, vierzehig. Die Tinamus.*

62. Guianensis. *Der Tocro.* (7)

Büffon, Vögel, XIII. p. 244. *der Tocro oder das Guianiſche Rebhuhn.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 650. n. 21. Perdix (Guianenſis) rufo-fuſca, nigro maculata et varia, gula

(7) Dieſe Vögel halten ſich in Wäldern auf, und ſetzen ſich des Nachts auf die Sträucher. Das Weibchen legt 12—15. weiſse Eyer. Das Fleiſch iſt von vortreflichem Geſchmack.

gula cinerea, per oculos vitta fulva, remigibus extus maculis rufis.

Bankroft, Guian. p. 106. *das guianische Rebhuhn*. p. 107. *Mams?*

Samml. zur Phys. u. Naturgesch. III. p. 108. *der Tocro.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 165. Tocro.

63. Maior. *Der Macucagua.* (8)

Halle, Vögel, p. 98. n. 7. *die Brasilianische Trappe.*

Klein, av. p. 18. n. 4. Tarda Mucucagua.

Klein, Vorbereit. p. 35. n. 4. *die Trappe Mukukagua.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 19. n. 4. *Mucucagua.*

Brisson, ornith. I. p. 63. n. 4. Perdrix du Brésil.

Büffon, Vögel, XIII. p. 235. *der Macucagua*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 633. n. 1. Tinamus (Brasiliensis) fusco-olivaceus, fusco maculatus, abdomine albido vario, tibiis postice scabris.

Fermin, Surin. II. p. 169 *die erste Art Rebhühner.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 107. *der Magoua.*

Jonston, av. p. 180. Macucagua.

Barrere, Fr. equinox. p. 13. — Ornith. p. 81. Perdix maior olivacea longiusculo et nigro rostro.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 335. n. 16. *der Macucagua.*

64. Cinereus. *Der aschgraue Tinamus.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 239. *der aschgraue Tinamus.*

Latham,

(8) In der XII. Edit. hat Linné diesen Vogel noch zu *Psophia Crepitans* gerechnet. Auch *Brisson* verwechselt beyder Synonymen.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 633. n. 2. Tinamus (Cinereus) cinereo-fuſcus, capite cerviceque rufeſcentibus.

Samml. zur Phyſ. u. N. G. III. p. 107. *der aſchgraue Tinamou.*

65. VARIEGATUS. *Der bunte Tinamus.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 240. *der bunte Tinamus;* m. e. Fig.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 634. n. 3. Tinamus (Variegatus) rufo fuſco nigricanteque faſciatus, ſubtus rufus, pileo nigro, gula abdomineque medio albis.

Samml. zur Phyſ. u. N. G. III. p. 107. *der bunte Tinamou.*

Barrere, Fr. equinox. p. 319. Perdix minor cirrhata, roſtro atro. *Petite perdrix.*

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 335. n. 17. *der bunte Tinamus.*

66. SOVI. * *Der Soui.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 242. *der Tinamus Soui;* m. e. Fig.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 634. n. 4. Tinamus (Soui) fuſco-nebuloſus, ſubtus rufus, gula albo varia, capite ſupra colloque poſtice nigris.

Sammlung zur Phyſ. und N. G. III. p. 107. *der Soui.*

Barrere, Fr. equinox. p. 319. Perdix minor fulva. *Perdrix cul-rond.*

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 336. n. 18. *der Soui.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 273. n. 1. β. Phaſianellus.	p. 747. n. 7. Tetrao Phaſianellus.
p. 275. n. 7. Tetrao Canace.	p. 749. n. 3. *b.* Canace.

Das Geſchlecht iſt mit *ſechs und vierzig* Gattungen vermehrt. Bey der 2ten Gattung ſind *drey*, bey der 11ten *drey*, bey der 12ten *vier*, bey der 13ten *ſechs*, bey der 20ten *drey* Varietäten aus einander geſetzt, und bey der 4ten die Varietäten γ und δ. hinzugekommen.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Das arragoniſche Rebhuhn.*
Latham, Syn. Suppl. p. 223. Arragonian Partridge.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 645. n. 7. Perdix (Arragonica) calcarata, pedibus antice hirſutis, remigibus, abdomine femoribusque nigris.
Faun. Arragon. p. 81. 3. tab. 7. Fig. 3.

2. *Das aſiatiſche Rebhuhn.*
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 649. n. 20. Perdix (Aſiatica) rufo-flaveſcens, fuſco nigroque variegata, ſubtus albida, faſciolis nigris, pedibus obtuſe calcaratis.

3. *Die Wachtel von der Hudſonsbay.*
Latham, Syn. Suppl. p. 224. Hudſonian Quail.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 655. n. 41. Perdix (Hudſonica) mutica, corpore rufo-fuſceſcente pallido, cervice albo maculata, alis dorſo caudaque lineis transverſis diſtantibus albis.

4. *Die indianiſche Wachtel.*
Latham, Syſt. ornith. II. p. 655. n. 44. Perdix (Cambaienſis) rufo-flaveſcens; nebulis ſaturatioribus, digito poſtico mutico.

SECHSTE

SECHSTE ORDNUNG.

PASSERES. *(Singvögel. Sperlingsartige Vögel.)*

104. GESCHLECHT. COLUMBA. *Die Taube.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 496. Gen. CIV.
Leske, Naturgeſch. p. 253. Gen. XXXVI.
Borowsky, Thierreich, III. p. 205. Gen. LXXV.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 199. Gen. XLI.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 483. Gen. LXIII.
Ebert, Naturl. II. p. 121.
Halle, Vögel, p. 455.
Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 796.
Onomat. hiſt. nat. III. p. 175.
Pennant, arct. Zool. II. p. 300.
Klein, av. p. 118. Gen. XVII.
Briſſon, ornith. I. p. 12. Gen. I.
Büffon, Vögel, VI. p. 144.
Batſch, Thiere, I. p. 411. Gen. CXIII.
Latham, Syſt. ornith. II. p. 589. Gen. IV.
Hermann, tab. affin. anim. p. 208.
Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 336. Gen. LXXI.

* *Mit geradem, mittelmäßigem Schwanze.*

1. OENAS. *Die Holztaube.* (wilde Taube.) (9)
Müller, Naturſyſt. II. p. 496. n. 1. *die Feldtaube.* *
Leske, Naturgeſch. p. 253. n. 1. *die Feldtaube.* *
Borowsky, Thierreich, III. p. 207. n. 2. *die wilde Taube; Bergtaube.*
Blumenbach, Handb. d. N.G. p. 199. n. 1. Columba (Oenas) caeruleſcens, cervice viridi nitente,

(9) Die mit einem * bezeichneten Synonymen gehn auf dieſe und die folgende Gattung zugleich. S. die folgende Anmerk.

te, dorso postico albo, fascia alarum apiceque caudae nigricante, *Haustaube; Feldtaube; Holztaube.* *

Bechstein, Naturgesch. I. p. 483. n. 1. a. *die wilde Taube.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 679. *die wilde Taube.*

Halle, Vögel, p. 470. n. 497. *die Holztaube.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 315. n. 257. *die wilde Taube; Bergtaube, Holztaube; blaue Holztaube; kleine Holztaube; Lochtaube, Blochtaube; Blocktaube; Hohltaube; Waldtaube; Blautaube.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 306. A. *die Feldtaube.*

Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 798. *die Bergtaube.*

Onomat. hist. nat. V. p. 669. *Feldtaube.* *

Klein, av. p. 119. n. 8. Columba lignorum, proprie.

Klein, Vorbereit. p. 220. n. 8. *Holztaube.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 123. n. 8. *Holztaube.*

Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 16. Fig. 6.

Gesner, Vögelb. p. 524. *wilde Taube;* m. e. schl. Fig.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 117. *Holztaube.*

Brisson, ornith. I. p. 20. n. 5. Pigeon sauvage.

Büffon, Vögel, VI. p. 147. *die wilde Taube*, p. 158. *Holztauben.*

Batsch, Thiere, I. p. 427. *die Bergtaube.*

Latham, Syn. Suppl. p. 197. Stock Dove.

Latham, Syst. ornith. II. p. 589. n. 1. Columba (Oenas) caerulescens, cervice viridi nitente, dorso postico cinerascente, fascia alarum duplici apiceque caudae nigricante.

Beseke, Vögel Kurl. p. 71. n. 150. *die Feldtaube.*

Siemßen,

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 42. n. 1. *die gemeine Holztaube.*
Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 402. n. 150. *die Feldtaube.*
Fischer, Livl. p. 91. n. 124. *gemeine Taube, wilde Taube.*
Taube, Slavon. I. p. 23. *wilde Tauben.*
Leem, Finnm. p. 132. *Holztauben.*
Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 271. *wilde Tauben.*
Boswell, Beschr. von Corsica, p. 45. *wilde Taube.*
White, N. G. von Engl. p. 61. n. 8. p. 77. *Holztaube; Feldtaube.*
Linné, Abhandl. II. p. 299. n. 111. *die Feld-Taube.*
Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 1. a. *Waldtaube.*
Pontoppidan, Norw. II. p. 132. *Waldtauben.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 302. *die Hohl-Taube.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 152. *Hol-, oder Blau-Taube.*
Naumann, Vogelsteller, p. 160. *die gemeine Holztaube.*
Naturforsch. XVII. p. 74. n. 150. *die Feldtaube.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 557. *Hohltaube.*
Meidinger, Vorl. I. p. 145. n. 1. *die Feldtaube.*
Oekonom. Zool. p. 90. n. 32. *die Feldtaube.*
Neueste Mannigfaltigk. I. p. 570. *Holztauben.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 1183. *Taube.* *
Rozier, obs. sur la physique etc. XIX. p. 306. (Fang auf den Pyrenäen.)
Mem. d'Agriculture etc. 1787. p. 159. (An columba Livia Briss.?)
Borkhausen, Magazin, I. p. 208. n. 85. *Holztaube.*
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. Columba. *
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 1. Oenas.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 162. n. 1. Columba (Oenas) caerulescens, collo supra viridi nitente, fascia alarum apiceque caudae nigricante.

Müller,

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 227. Columba (Oenas) caerulescens, cervice viridi-nitento, dorso postico albo, fascia alarum apiceque caudae nigricante. *

Brünniche, ornith. bor. p. 60. n. 203. Columba Oenas. *

Kramer, Austr. p. 358. n. 1. Columba caerulescens, collo nitido, macula duplici alarum nigricante, *α.* Oenas, *Holtaube.*

Charleton, onom. zoic. p. 77. n. 3. Columba Cavernalis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 240. Columba fera arborea, *Holtaube; Koltaube; Blawe Taube; wilde Taube.*

Sibbald, Scot. illustr. p. 114. Oenas.

Forskål, fn. orient. p. VII. n. 13. *b.* Columba vulgaris, *Hudjaefa?*

Belon, hist. nat. des ois. p. 312. Pigeon fuyard.

Jonston, av. p. 92. Oenas seu Vinago.

Schaefer, element. ornithol. tab. 28.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 337. n. 1. *die Holztaube.*

2. DOMESTICA. *Die gemeine Haustaube.* (10)

Borowsky, Thierreich, III. p. 207. *die Feldtaube; Haustaube.*

Bech-

(10) Bey dem Taubengeschlecht findet man die gröste Verwirrung fast in der ganzen Ornithologie. Bald werden Gattungen zu Spielarten, bald wieder Spielarten zu Gattungen gemacht, u. s. w. und es wird sehr schwer halten, hierin zur völligen Gewissheit zu kommen. Die meisten neuern Ornithologen nehmen die gemeine Haustaube als *Spielart* von der wilden, oder als von ihr ursprünglich abstammend an. Die Fruchtbarkeit der Haustauben ist erstaunlich; denn ob sie gleich jedesmal nur 2 Eyer legen, so kann man doch, da sie mehrmahls brüten, von einem einzigen Paar binnen vier Jahren an funfzehntausend erhal-

Bechstein, Naturgesch. I. p. 284. b. *die zahme Taube; Feldflüchter.*

Funke, Naturgesch. I. p. 214. *die Taube.*

Ebert, Naturl. II. p. 121. *die Tauben.*

Halle, Vögel, p. 464. n. 481. *die gemeine Taube.*

Meyer, Thiere, I. p. 50. tab. 80. *die Taube.* (schlecht.)

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 320. n. 258. *die gemeine zahme Taube; Feldtaube; Haustaube; Hoftaube; Monatstaube; Bauertaube; Pastetentaube; Flugtaube; Schlagtaube; Feldflüchter.*

Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 800. 806. *eigentliche Haustaube.*

Onomat. hist. nat. III. p. 179. *die Haus-, oder Hof-Taube.*

Handb. d. Naturgesch. III. p. 55. *die Daube.*

Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 117. *Haustaube.*

Sander, oekonom. Naturgesch. II. p. 22. *die Taube.*

Walther, oekonom. N. G. Deutschl. p. 169. *Tauben.*

Klein, av. p. 118. n. 1. Columba rusticorum, vulgaris, arvorum.

Klein, Vorbereit. p. 218. n. 1. *Bauer-, Feld-, Pastetentaube.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 122. n. 1. *Feldtaube.*

Gesner, Vögelb. p. 507. *die gemeine Taube;* m. e. Fig.

Brisson, ornith. I. p. 13. n. 1. Pigeon domestique.

Büffon,

erhalten. Die Eyer werden von beyden Geschlechtern wechselsweise 17. Tage bebrütet. Das Alter der Tauben erstreckt sich auf 8 bis 12. Jahre. Doch hat man auch Beyspiele von einigen, die 20. Jahr alt geworden sind. In den deutschen Synonymen der verschiedenen Spielarten herrscht grosse Verwechselung.

Büffon, Vögel, VI. p. 144. *die Taube.* p. 147. *gemeine Haustaube.* p. 151. *Haustauben.* p. 165. *zahme Haustauben.*

Batsch, Thiere, I. p. 427. *die Haustaube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 589. n. 2. Columba (Domestica) minor versicolor, dorso inferiore albo.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 402. *die Haustaube.*

Cetti, Sardin. II. p. 128. *die zahme Taube.*

Knox, Ceyl. p. 57. *Tauben.*

Pennant, britt. Thiergesch. p. 92. tab. 44.

Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 1. *b. Monatstaube.*

Pontoppidan, Norweg. II. p. 132. *zahme Tauben.*

Naturforsch. XVII. p. 75. n. 151. *die Haustaube.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 147. n. 177. *die Feldtaube.*

Merklein, Thierreich, p. 390. *Taube.*

Loniceri, Kräuterb. p. 647. *Taube.*

Geoffroy, mater. med. VII. p. 386. 392. *die Taube.*

Oekon. Zool. p. 90. n. 32. *β. die Haustaube.*

Lemmery, Materiallex. p. 332. u. p. 1160.

Onomatol. forestal. III. p. 543.

Onomatol. oecon. pract. III. p. 508.

Preuss. Sammler, I. p. 166.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 239.

Börner, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 137.

Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 15.

Beckmann, Naturhist. p. 51. n. 1. a. *die gemeine Taube.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 204. n. 84.

Hannöv. Magaz. 1771. p. 95. 1773. p. 301.

Ludovici, Kaufmannslex. II. p. 1507.

André, *u. Bechstein*, Spazierg. VII. p. 257. 272. 334.

Aller-

Allerneueste Maunigfaltigk. II. p. 665. 683.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 2. Columba domestica.

Linné, Syst. nat. Ed. X. I. p. 162. n. 1. β. Col. domestica.

Kramer, Austr. p. 358. n. 1. β. Columba domestica s. vulgaris.

Charleton, onomast. zoic. p. 76. Columba domestica.

Brünniche, ornith. bor. p. 63. n. 219. Columba prolifera. Columba oenas domestica.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 237. Columba domestica. Columba cicur. Columba cellaris. *Heimische Taube; Schlagtaube.*

Moehring, av. gen. p. 54. n. 52. Columba.

Sibbald, Scot. illustr. p. 115. Columba domestica.

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 183 Columba.

Belon, hist. nat. des ois. p. 313. Pigeon.

Prosp. Alpin. Aegypt. I. p. 198. Columba.

Du Tertre, hist. des Antill. II. p. 266. Pigeon.

Jonston, av. p. 89. Columba domestica.

Bomare, Diction. VIII. p. 501. — Diction. des anim. III. p. 453.

Plin. hist. nat. L. 8. c. 27. L. 10. c. 34. 53. L. 18. c. 16. Columbae.

Varro, de re rust. L. 3. c. 7. Columba.

Columella, de re rust. L. 8. c. 8. Columba cellaris.

Palladius, de re rust. L. 1. c. 24. Columba.

Aelian. nat. anim. L. 3. c. 15. περιστεραι. c. 44. Λδονται.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 11. n. 119. περιστεραι.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 337. n. 2. *die Feldtaube.*

β. LIVIA. *Die Stocktaube.* (1)

Halle, Vögel, p. 471. n. 499. *die Bergtaube.*

Onomat. hist. nat. III. p. 184. *die italienische Strichtaube.*

Klein, av. p. 119. n. 10. Columba Livia.

Klein, Vorbereit. p. 220. n. 10. *Feldtaube; Feldflüchter.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 123. n. 9. *Stocktaube.*

Gesner, Vögelb. p. 525. *Lochtaube.*

Brisson, ornith. I. p. 18. n. 3. Biset.

Büffon, Vögel, VI. p. 155. *die Bergtaube; wilde Taube;* m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 605. n. 2. A. Biset Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 590. n. 1. β. Col. dom. *Livia*, cinereo-caerulescens, fascia alarum duplici nigra, dorso inferiore alba.

Fermin, Surin. II. p. 144. * *die sogenannte Holztaube.*

Charleton, onomast. zoic. p. 76. n. 1. Columba livia.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 240. Columba fera saxatilis?

Rom. orn. I. p. 83. — Hist. Prov. I. p. 490.

Jonston, av. p. 92. Columba livia.

γ. SAXATILIS. *Die Felsentaube.* (2)

Halle, Vögel, p. 470. n. 498. *die Felsentaube.*

Onomat. hist. nat. III. p. 188. *die Felstaube.*

Klein, av. p. 119. n. 9. Columba Rupicola.

Klein, Vorbereit. p. 220. n. 9. *Felsentaube.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 123. n. 11. *Felsentaube.*

Brisson, ornith. I. p. 19. n. 4. Pigeon de roche, ou Rocheraie.

Büffon,

(1) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

(2) Nach *Brisson* u. a. eine eigne Gattung. *Raj.* u. a. halten sie wieder mit *Col. Livia* für einerley.

Büffon, Vögel, VI. p. 158. *Felsen- oder Steintauben.*

Latham, Syn. II. 2. p. 608. Rock Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 590. n. 2. γ. Col. dom. *Rupicola*, cinerea, pectore dilute vinaceo, fascia alarum duplici fusco-nigricante, remigibus maioribus fuscis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 240. Columba fera saxatilis?

Charleton, onom. zoic. p. 77. n. 2. Palumbus Rupicola.

δ. HISPANICA. *Die spanische Taube.* (3).

Müller, Natursyst. II. p. 499. n. 2. *die spanische Taube.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 210. n. 4. *die Spanische Taube; Mondtaube.*

Bechstein, Naturgeschichte, I. p. 487. *die spanische Taube.*

Ebert, Naturl. II. p. 122. *die spanische oder römische Taube.*

Onomat. histor. natur. III. p. 182. *die Spanische Taube.*

Brisson, ornith. I. p. 13. n. 2. Pigeon romain.

Büffon, Vögel, VI. p. 176. *die Spanische Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 178. *die römische Taube*, m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 426. *die Mond- oder Monatstaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 608. Roman Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 590. n. 2. δ. Col. dom. *Hispanica*, versicolor, cera albido furfuracea.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 251.

(3) Nach *Brisson* eine eigne Gattung. Einige wollen auch die spanische Taube wieder von der römischen trennen.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 163. n. 10. Columba (Hispanica) cinerea, remigibus, rectricibus, plumis pedum rostroque albis.

ε. Dasypus. *Die Trommeltaube.*

Müller, Natursyst. II. p. 499. n. 3. *der Federfuß.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 210. n. 3. *die Trommeltaube.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 200. a. *die Trommeltaube.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 486 *die Trommeltaube.*

Ebert, Naturl. II. p. 122. *die Trommeltaube.*

Halle, Vögel, p. 464. n. 482. *die Trummeltaube.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 324. n. 260. *Trommeltaube; Rauchfuß; Rodler; Glugl.u.*

Klein, av. p. 118. n. 5. Tympanistae.

Klein, Vorbereit. p. 219. n. 5. *Trummeltauben.*

Klein, verb. Vögelhistor. p. 123. n. 5. *Trummeltauben.*

Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 16. fig. 5.

Brisson, ornith. I. p. 14. A. Pigeon patu.

Buffon, Vögel, VI. p. 179. *der ungehäubte Rauchfuß oder Trommeltaube;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 427. *die Trommeltaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 609. Rough-footed Pigeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 590. n. 2. ε. Col. dom. *Dasypus*, pedibus hirsuto-pennaceis.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 404. *der Federfuß.*

Naturforsch. XVII. p. 75. n. 152. *der Federfuß.*

Brünniche, ornith. bor. p. 62. n. 214. Columba (Tympanista) pennis in basi rostri recurvatis. *Trommel-Due.*

Kramer, Austr. p. 359. n. 1. λ. Columba crista duplici, una in fronte, altera in occipite. *Rodler; Trummeltaube.*

Chal-

Charleton, onomast. zoic. p. 77. n. 8. Columba pedibus hirsutis.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 239. Columbae dasypodes. *Rauhfüßige Tauben; gehöslete, oder Reussische Tauben.*
Zinnan. Uov. degl' Uccell. p. 32. tab. 4. fig. 12.
Rom. orn. I. p. 78.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 338. a.

ζ. CRISTATA. *Die Mohntaube.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 682. *die Mönchstaube.*
Brisson, ornith. I. p. 14. B. Pigeon hupé.
Buffon, Vögel, VI. p. 179. *der gehäubte Rauchfuß.* p. 180. *die gehäubte Monatstaube.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 324. n. 261. *die Mohntaube.*
Latham, Syn. II. 2. p. 609. Crested Pigeon.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 591. n. 1. ζ. Col. dom. *Cristata*, pedibus hirsuto-pennaceis, capite cristato.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 239. Columbae cristatae. *Köppichte Tauben.*
Jonston, av. p. 90. Columba cypria alia.

η. NORWEGICA. *Die norwegische Taube.* (4)

Brisson, ornith. I. p. 14. C. Pigeon de Norwege.
Buffon, Vögel, p. 201. n. 1. *Schwenkfelds Norwegische große Taube.*
Latham, Syn. II. 2. p. 609. Norway Pigeon.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 591. n. 1. η. Col. dom. *Norwegica*, capite cristato, corpore niveo, pedibus plumosis.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 239. Columba Norwegica.

(4) Soll, nach *Schwenkfeld*, fast die Größe eines Huhns haben.

Brünniche, ornith. bor. p. 62. n. 215. Columba (Mercurialis) corpore niveo, pileo capitis, pedibus pennatis, alisque unicoloribus? *Svalle Due?*

Jonston, av. p. 90. Columba norwegica, tota alba.

a. Alis glaucis. b. Nigris. c. Rufis. d. Flavis? *

ϑ. Barbarica. *Die Barbareytaube.*

Halle, Vögel, p. 467. n. 489. *die Barbareitaube.*
Onomat. hist. nat. III. p. 178. *die numidische Taube.*
Brisson, ornithol. I. p. 14. D. Pigeon de Barbarie.
Büffon, Vögel, VI. p. 201. *die Barbareytaube; kretische Taube, cyprische Taube.*
Latham, Syn. II. 2. p. 609. Barbary Pigeon.
Latham, Syst. ornith. II. p. 591. n. 2. ϑ. Col. dom. *Barbarica*, area oculorum nuda tuberculata, furfuracea, macula alarum duplici nigricante.
Kramer, Austr. p. 358. n. 1. ζ. Columba barbarica s. Numidica. *Indianer.*
Brünniche, ornith. bor. p. 62. n. 217. Columba (Turca) oculis magnis lucidis, palpebris nudis rubris, rostro minuto?

ι. Cucullata. *Die Schleyertaube.*

Müller, Natursyst. II. p. 505. n. 5. *die Haubentaube.*
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 200. e. *die Schleyertaube; Zopftaube.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 486. *die Schleyertaube.*
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 685. *Schleyertaube.*
Halle, Vögel, p. 466. n. 487. *die Jakobinertaube;* Fig. 34.

Gatterer,

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 335. n. 263. *Schleyertaube*, *Kappentaube; Kappennonne; Perückentaube; Dictertaube; Venustaube*, *cyprische*, *russische oder englische Taube.*

Onomat. hist. nat. III. p. 178. *die Mönchtaube.*

Klein, av. p. 118. n. 5. Columba cucullata.

Klein, Vorbereit. p. 219. n. 5. *Haubentaube.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 123. n. 5. *Venustaube.*

Brisson, ornith. I. p. 15. E. Pigeon nonain.

Gesner, Vögelb. p. 507. *Englische oder Reussische Taube*, m. e. Fig.

Büffon, Vögel, VI. p. 181. *die Jakobiner- und Nonnentaube*, m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 426. *die Perückentaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 610. Jacobine Pigeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 591. n. 2. *ι*. Col. domest. *Cucullata*, pennis occipitis reflexo-erectis.

Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 3. *Parykdue.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 404. *die Schopf- oder Haubentaube.*

Naturforsch. XVII. p. 75. n. 154. *die Haubentaube.*

Merklein, Thierreich, p. 391. *cyprische Tauben*; m. e. Fig.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 162. n. 3. Columba (Cucullata) pennis occipitis reflexo-erectis.

Linné, fn. Suec. p. 75. n. 207. *ζ*. Columba cucullata.

Charleton, onom. zoic. p. 76. n. 3. Columba cucullata.

Kramer, Austr. p. 358. n. 1. *ζ*. Columba cucullata s. Jacobea. *Paruckentaube.*

Brünniche, ornith. bor. p. 61. n. 211. Columba (Cucullata) colore vario, fasciis alarum corpori concoloribus, capite, oculis, remigibus pri-

 mori-

moribus et rectricibus albis, pennis occipitis in cucullum reflexo erectis; *Paryk Due.*

Jonston, av. p. 90. Columba cucullata.

Aldrovand, ornith. p. 254. Columba cypria cucullata.

Bomare, Diction. VIII. p. 509. — Dict. des anim. III. p. 452.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 338. c. *die Schleyertaube.*

κ. HISPIDA. *Die Strupptaube.*

Müller, Natursystem, II. p. 500. n. 6. *die rauhe Taube.*

Bechstein, Naturgeschichte I. p. 488. *die Strupptaube.*

Onomat. hist. nat. III. p. 182. *die Strobeltaube.*

Brisson, ornith. I. p. 15. G. Pigeon frisé.

Büffon, Vögel, VI. p. 202. *die wollichte Taube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 610. Laced Pigeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 591. n. 2. κ. Col. dom. *Hispida*, plumis minimis erectis, per dorsum alasque dispersis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 239. Columbae crispae.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 19. Columba (Hispida) plumis minimis erectis, per dorsum alasque dispersis.

λ. TURBITA. *Das Möwchen.*

Müller, Natursyst. II. p. 501. n. 7. *die Meewentaube.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 211. n. 7. *das Möwchen.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 200. c. *das Möwchen*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 487. *die Mövchentaube.*

Bechstein,

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 683. *das Mevchen.*

Halle, Vögel, p. 467. n. 488. *die Möventaube.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 325. n. 264. *die Mewentaube.*

Klein, verb. Vögelhist. p 123. *Mövchen.*

Brisson, ornith. I. p. 15. Pigeon à gorge frisée.

Buffon, Vögel, VI. p. 187. *das Mövchen; die Möventaube*, m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 611. Turbit pigeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 592. n. 2. λ. Col. dom. *Turbita*, pennis in pectore recurvis.

Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 4. *Mesike.*

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 247. n. 5. *Halskrausentaube.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 162. n. 4. Columba (Turbita) pennis in pectore recurvatis.

Kramer, Austr. p. 358. n. 1. δ. Columba turbita dicta. *Türkl.*

Brünniche, ornith. bor. p. 62. n. 216. Columba (Turbita) pennis in pectore recurvatis, rostro minuto. *Maefekke.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 338. d. *das Möwchen.*

a. Alis flavis. b. Rufis. c. Atris. d. Glaucis. e. Argenteis. f. Albis. g. Albis, rectricibus nigris. h. Fasciatis. aa. Fascia atra. bb. Fascia caerulea. cc. Fascia spadicea. *Brünn.* l. c.

μ. Laticauda. *Die Pfauentaube.*

Müller, Natursystem, II. p. 501. n. 8. *der Breitschwanz.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 211. n. 8. *die Pfauentaube, Schüttelkopf, Zittertaube.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 200. f. *die Pfauentaube; der Hühnerschwanz.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 487. *die Pfauentaube.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 685. *die Pfauentaube.*
Halle, Vögel, p. 465. n. 484. *die Pfauentaube.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 326. n. 265. *die Pfauentaube.*
Onomat. hist. nat. III. p. 191. *die Pfauentaube.*
Klein, av. p. 118. n. 3. Columba laticauda, tremula.
Klein, Vorbereit p. 219. n. 3. *Pfautaube.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 122. n. 3. *Pfautaube.*
Brisson, ornith. I. p. 18. P. Pigeon-Paon.
Brisson, ornithol. I. p. 18. Q. Pigeon Trembleur. *Columba tremula.*
Batsch, Thiere, I. p. 426. *die Pfautaube.*
Latham, Syn. II. 2. p. 611. Broad and narrow-tailed Shaker Pigeons.
Latham, Syst. ornith. II. p. 592. n. 2. μ. Col. dom. *Laticauda* cauda erecta multipenni patula.
Büffon, Vögel, VI. p. 183. *die Pfauentaube.*
Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 5. *Hoystiert.*
Büchotz, Abh. vom Federvieh, p. 247. 252.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 404. *Pfauentaube.*
Naturforsch. XVII. p. 75. n. 155. *Pfauentaube.*
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 162. n. 5. Columba (Tremula) cauda erecta multipenni patula.
Kramer, Austr. p. 359. n. 1. 9. Columba tremula laticauda, *Pfauentaube.*
Brünniche, ornith. bor. p. 61. n. 209. Columba (Tremula) cauda erecta multipenni patula, rectricibus 36. *Hoy-Stiert.*
Charleton, onom. zoic. p. 77. n. 7. Columba tremula; *Laticauda* vel *Acuticauda.*
Dictionn. des animaux, III. p. 451.

Donn-

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 338. e. *die Pfauentaube.*

a. Nivea, b. Variegata, *Brünn.* l. c. *

γ. GYRATRIX. *Der Tümmler.*

Müller, Natursyst. II. p. 502. n. 9. *der Taumler.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 292. n. 9. *die Tummeltaube; Tümmler.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 200. d. *der Tümler.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 487. *die Purzeltaube.*

Halle, Vögel, p. 468. n. 491. *die Taumeltaube.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 326. n. 266. *die Tummeltaube.*

Onomat. hist. nat. III. p. 181. *die Purzeltaube.*

Klein, av. p. 119. n. 6. Gyratrices.

Klein, Vorbereit. p. 220. n. 6. *Taumler.*

Klein, verb. Vögelh. p. 123. n. 6. *Taumler.*

Brisson, ornith. I. p. 17. N. Pigeon culbitant.

Büffon, Vögel, VI. p. 197. *der Tümmler;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 428. *die Tummeltaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 612. Tumbler Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 592. n. 2. ν. Col. dom. *Gyratrix*, sub volatu se gyrans.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 404. *Taumler.*

Naturforsch. XVII. p. 76. n. 156. *der Taumler.*

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 247. 254.

Kramer, Austr. p. 359. n. 1. κ. Columba Gyratrix, *Burzerl*, *Burzler.*

Charleton, onom. zoic. p. 76. n. 4. Columba Gyratrix.

Jonston, av. p. 90. Columbae gyratrices.

Brünniche, ornith. bor. p. 60. n. 205. Columba (Vertaga) iride lucida albida, pupilla atra, in volatu retrorsum volubilis, *Tumler.*

Donn-

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 338. f. *der Tümmler.*

a. Atra, alis totis et abdomine albis. * *(Skade.)*

b. Atra, alis ad dimidium et abdomine albis. * *(Knokkel-Skade.)*

c. Alba, pileo et rectricibus nigris; mandibula superior nigra, inferior alba. * *(Kalotte.)*

d. Nigra, remigibus septem primoribus albis. *

e. Nigra, remigibus septem primoribus rectricibusque omnibus albis. *

f. Atra rectricibus albis. *Hybrida.* *

g. Caerulea, h. Atra, i. Alba. } *Unicolores.* *
k. Rufa, l. Flava. }

m. Gutture alarumque fasciis flavis vel rufis. *

n. Cauda patula; corpore plerumque toto albo. * *(Huulrumped.)*

o. Atra, variis coloribus intertextis. * } *Gneyser.*
p. Alba, variis coloribus intertextis. * }

Brünniche, ornith. boreal. l. cit.

ξ. Galeata. *Die Helmtaube.*

Müller, Natursyst. II. p. 502. n. 10. *die Helmtaube.*

Halle, Vögel, p. 468. n. 492. *die Helmtaube.*

Onomat. histor. natur. III. p. 179. *die Helmtaube.*

Brisson, ornith. I. p. 18. O. Pigeon cuirassé.

Büffon, Vögel, VI. p. 191. *die Helmtaube; gehäubte Taube.*

Latham, Syn. II. 2. 612. Helmet Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 592. n. 2. ξ. Col. dom. *Galeata*, capite, remigibus rectricibusque concoloribus, a corpore diversicoloribus.

Pontoppidan, Dännem. p. 172. not. 21. *Crosonobel.*

Charle-

Charleton, onom. zoic. p. 76. n. 5. Columba galeata.

Brünniche, ornith. bor. p. 61. n. 210. Columba (Galeata) colore vario, fasciis alarum corpori concoloribus, capite, oculis, remigibus primoribus et rectricibus albis, pennis occipitis in galeam erectis, *Krossonobel.*

Dictionn. des anim. III. p. 452.

Jonston, av. p. 90. Columbae galeatae.

6. TURCICA. *Die türkische Taube.* (5)

Müller, Natursyst. II. p. 502. n. 11. *die türkische Taube.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 486. *die türkische, arabische, persische Taube.*

Klein, av. p. 118. n. 6. Columba turcica.

Klein, Vorbereit. p. 219. n. 6. *Kreiselschnäbler.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 123. n. 6. *Kreiselschnäbler.*

Brisson, ornithol. I. p. 16. H. Pigeon turc.

Büffon, Vögel, VI. p. 177. *die türkische Taube;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 427. *die türkische Taube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 612. Persian or turkish Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 593. n. 1. *o.* Col. dom. *Turcica*, cera papillosa rubra.

Charleton, onom. zoic. p. 76. n. 6. Columba turcica. (mit der folgenden verwechselt.)

Brünniche, ornith. bor. p. 62. n. 217. Columba (Turca) oculis magnis lucidis, palpebris nudis rubris, rostro minuto? *Tyrk?*

Jonston, av. p. 90. Columba turcica seu persica.

Bomare, Dictionn. VIII. p. 510. — Diction. des anim. III. p. 453.

7. TA-

(5) Hat viel Aehnlichkeit mit der folgenden; wird auch häufig damit verwechselt, und beyde von vielen für einerley gehalten.

π. TABELLARIA. *Die Brieftaube.*

Müller, Naturfyst. II. p. 503. n. 12. *die Posttaube.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 213. n. 11. *die Posttaube; Pavedette.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 200. g. *die Posttaube*, *türkische Taube.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 486. *türkische Taube.*

Ebert, Naturl. II. p. 123. *die Posttaube.*

Halle, Vögel, p. 465. n. 486. *die Pavedette, Brieftaube*, *Curiertaube.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 327. n. 269. *Brieftaube*, *Briefträger.*

Onomat. hist. nat. III. p. 190. *die Brieftaube*, *cyprische Taube.*

Klein, av. p. 118. n. 4. Columba tabellaria.

Klein, Vorbereit. p. 219. n. 4: *Pavedette.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 123. *Pavedette.*

Klein, Vögeleyer, p. 33 tab. 16. Fig. 5.

Brisson, ornith. I. p. 16. I. Pigeon Messager.

Büffon, Vögel, VI. p. 202. *die Brieftaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 613. Carier Pigeon.

Latham, Syst. ornith. I. p. 593. n. 2. π. Col. dom. *Tabellaria*, cera lata carunculata albida, palpebris nudis.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 405. *die Pavedette.*

Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 6. *Pavedette.*

Niebuhr, Reisebeschreibung durch Arabien, II. p. 239.

Volney, Voy. en Syrie et en Egypte, I. p. 85.

Beckmann, phys. ökon. Bibl. XV. p. 56.

Hamb. Magazin, XIX. p. 618.

Alb. Columbi, de columbis tabellariis, Regiom, 1714. 4.

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 227.

Leipzig. ökonom. Abhandl. II. p. 86. n. 7.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 163. n. 6. Columba (Tabellaria) cera lata verrucosa, palpebris nudis.

Kramer, Austr. p. 359. ι. Columba tabellaria, *Bancadeten*.

Brünniche, ornith. bor. p. 62. n. 213. Columba (Tabellaria) rostro longiore, cera lata verrucosa, ad dimidium tecto, palpebris nudis, *Pavedette*.

Diction. des anim. III. p. 452. Pigeon Cavalier, l'Porteur des Lettres.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 338. h. *die Brieftaube*.

ϱ. Gutturosa. *Die Kropftaube.*

Müller, Natursyst. II. p. 500. n. 4. *der Kropfer*.

Müller, Natursf. Suppl. p. 131. n. 4. *der Kropfer*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 210. n 5. *die Kropftaube*.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 200. *b. die Kropftaube*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 486. *die Kropftaube*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 683. *Kropftaube*, *Kröpper*.

Halle, Vögel, p. 465. n 483. *die Kropftaube*.

Onomat. hist. nat. III. p. 181. *die Kropftaube*.

Klein, av. p. 118. n. 2. Columba gutturosa.

Klein, Vorbereit. p. 219. n. 2. *Kropfer; Kropper, Krepper*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 122. n. 2. *Kropfer*.

Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 16. Fig. 5.

Brisson, ornith. I. p. 16. k. Pigeon grand gosier.

Büffon, Vögel, VI. p. 168. *Kropftaube;* mit einer Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 427. *die Kropftaube*.

Latham, Syn. II. 2. p. 613. Powter Pigeon.

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 593. n. 2. ϱ. Col. dom. *Gutturosa*, pectore inflato.

Börner, Stadt-und Landwirthsch. II. p. 137. n. 2.

Büchotz, Abh. von Federvieh, p. 247.

Merklein, Thierreich, p. 391. *holländische Tauben.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 162. n. 2. Columba (Gutturosa) pectore inflato.

Kramer, Austr. p. 358. n. 1. γ. Columba gutturosa.

Brünniche, ornith. bor. p. 62. n. 212. Columba (Gutturosa) gutture inflato. *Krop-Due.*

Charleton, onom. zoic. p. 76. n. 2. Columba gutturosa.

Jonston, av. p. 90. Columbae gutturosae.

Diction. des anim. III. p. 451.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 338. g. *die Kropftaube.*

a. Maior, *Heelkroppert*, b. Minor, *Halvkroppert.*
Brünniche, orn. bor. p. 62.

aa. Alba, rectricibus nigris. * *Brünn.* l. c. n. 1.

bb. Nigra, remigibus primoribus albis. * *Brünn.* l. c. n. 2.

cc. Rufa, remigibus primoribus albis. * *Brünn.* l. c. n. 3.

dd. Flava, remigibus primoribus albis. * *Brünn.* l. c. n. 4.

ee. *Die weinsuppenfarbige Kropftaube.* *
Müller, Natursyst. Suppl. p. 131. a.
Büffon, Vögel, VI. p. 169. n. 1. Pigeon Grossegorge soupe en vin.
Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 247.

ff. *Die bunte, Isabelfarbige Kropftaube.* *
Büffon, Vögel, VI. p. 169. n. 2. Pigeon Grossegorge chamois, panache.

Büchotz,

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 247.

gg. *Die schneeweiße Kropftaube.* *

Müller, Natursyst. Suppl. p. 131. b.

Büffon, Vögel, VI. p. 169. n. 3. Pigeon Grosse-gorge blanc comme un Cigne.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 247.

hh. *Die weiße rauchfüßige Kropftaube mit langen Flügeln.* *

Müller, Natursyst. Suppl. p. 131 c.

Büffon, Vögel, VI. p. 169. n. 4. Pigeon Grosse-gorge blanc pattu à ailes longues.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 247.

ii. *Die graue, gefleckte und sanftgraue Kropftaube.* *

Müller, Natursyst. Suppl. p. 131. d.

Büffon, Vögel, VI. p. 170. n. 5. Pigeon Grosse-gorge gris panaché et gris doux.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 248.

kk. *Die stahlgraue bandirte Kropftaube.* *

Müller, Natursyst. Suppl. p. 131. e.

Büffon, Vögel, VI. p. 170. n. 6. Pigeon Grosse-gorge gris de fer, gris barré et à rubans.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 248.

ll. *Die silberspiegelnde, graue gesprenkelte Kropftaube.* *

Müller, Natursyst. Suppl. p. 131. f.

Büffon, Vögel, VI. p. 170. n. 7. Pigeon Grosse-gorge gris piqué comme argenté.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 248.

mm. *Die Hyacinthen-Kropftaube.* *

Büffon, Vögel, VI. p. 170. n. 8. Pigeon Grosse-gorge jacinthe, de couleur bleue ouvragée en blanc.

Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 248.

nn. *Die feuerfarbige oder hochrothe Kropftaube.* *
Büffon, Vögel, VI. p. 170. n. 9. Pigeon Grosse-gorge couleur de feu.
Büchotz, Abhandl. vom Federvieh, p. 248.

oo. *Die nußholzfarbige Kropftaube.* *
Müller, Natursyst. Suppl. p. 132. h.
Büffon, Vögel, VI. p. 171. n. 10. Pigeon Grosse-gorge couleur de bois de noyer.
Büchotz, Abh. vom Federvieh, p. 248.

pp. *Die kastanienbraune Kropftaube; mit ganz weißen Schwungfedern.* *
Müller, Natursyst. Suppl. p. 132. i.
Büffon, Vögel, VI. p. 171. n. 11. Pigeon Grosse-gorge couleur de marron avec les pennes de l'aile toutes blanches.

qq. *Die Mohrenkropftaube.* *
Müller, Natursyst. Suppl. p. 132. k.
Büffon, Vögel, VI. p. 171. n. 12. Pigeon Grosse-gorge maurin d'un beau noir velouté, etc.
Büchotz, Abh. vom Federvieh, p. 248.

rr. *Die schieferfarbige Kropftaube, mit weißen Schwungfedern.* *
Büffon, Vögel, VI. p. 172. n. 13.

σ. EQUES. *Die Rittertaube.* (6)
Halle, Vögel, p. 468. n. 493. *die Rittertaube.*
Brisson, ornith. I. p. 17. L. *Pigeon Cavalier.*
Büffon, Vögel, VI. p. 205. *die Rittertaube.*
Latham, Syn. II. 2. p. 614. Horseman-Pigeon.
Latham, Syst. ornith. II. p. 513. n. 2. σ. Col. domest. *Eques*, pectore inflato, cera carunculata.
Kramer, Austr. p. 359. n. 1. *i.* Columba eques.

τ. PER-

(6) Bastard von der *Kropftaube* und *Brieftaube.*

τ. PERCUSSOR. *Die Wendetaube.* (7)

Halle, Vögel, p. 467. n. 490. *die Klatschtaube, Klatscher*.

Brisson, ornith. I. p. 17. M. Pigeon batteur.

Büffon, Vögel, VI. p. 200. *die Wendetaube*.

Latham, Syn. II. 2. p. 614. Smiter Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 593. n. 1. τ. Col. dom. *Percussor*, sub volatu se gyrans, ac alas velociter percussans.

Kramer, Austr. p. 358. n. 1. η. Columba percussor. *Plätscher*.

Brünniche, ornith. bor. p. 63. n. 218. Columba (Percussor) versicolor, varie et indeterminate volans. *Dreyert*.

Büchotz, Abh. vom Federvieh, p. 247. 254.

Diction. des anim. III. p. 452.

υ. JUBATA. *Die Mähnentaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 614. Turner Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 594. n. 2. υ. Col. dom. *Jubata*, cervice pennis iubae equinae instar reversis.

Halle, Vögel, p. 468. n. 494. *die mähnige Taube*.

φ. MACULATA. *Die Schnippentaube.* (8)

Büffon, Vögel, VI. p. 194. *die Maskentaube*.

Bechstein, Naturgeschichte, I. p. 485. *Maskentaube, Schnippentaube, Brilltaube*.

Halle, Vögel, p. 468. n. 495. *die Brilltaube*.

Latham, Syn. II. 2. p. 615. Spot Pigeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 594. n. 2. φ. Col. dom. *Frontalis*, corpore albo, macula frontis caudaque concoloribus.

Pontoppidan, Dännem. p. 172. not. 21. *Sneppert*.

(7) Schlägt im Fluge so stark mit den Flügeln, dass es ein Geräusch giebt, als ob zwey Bretter an einander schlügen.

(8) Ist nicht mit N. 52. p. 780. zu verwechseln.

Brünniche, ornith. bor. p. 61. n. 206. Columba (Fulicaria) corpore albo, fronte maculata, cauda fronti concolore. *Snippert.*

a. Macula frontali et rectricibus rufis, mandibula superiore alba. *

b. Macula frontali et rectricibus atris, mandibula superiore atra. *

Brünn. orn. bor. loc. cit.

* * *

Smellie, Philosoph der Naturgesch. II. p. 9.

Jac. Vaniere, de S. I. Columbae et Vites. Paris 1696. 8.

Anon. A Treatise on domestic pigeons.

Du pigeon; in Erreurs populaires, l. 2. c. 3. p. 241.

Memoire sur les pigeons, sur leurs colombiers, et sur la maniere d'y gouverner les oiseaux domestiques. — Journ. Oecon. 1761. p. 16.

Sur la maniere de rafraichir l'air des Colombiers. — Nouvel. Oecon. Tom. II. p. 110.

Erfahrungen, Versuche, und Anmerkungen über die Taubenzucht. — Hannöv. Beytr. 1761. p. 825. u. 866.

Ob es vortheilhaft sey, Tauben bey der Landwirthschaft zu halten. — Nachr. der Schles. patr. Gesellsch. 1781. p. 111.

Vom Halten der Tauben in den Städten. — Wittenb. Wochenbl. IX. p. 9.

Eine wohlfeile Art, die Tauben im Winter zu erhalten. — Hannöv. Magaz. 1771. p. 958.

Mittel wider die Raute der Tauben. — Berlin. Samml. IV. p. 263.

Tauben vor der Flucht zu bewahren. — Berlin. Samml. III. p. 618.

Salanders Tauben- und Bienenzucht. Frcft. 1723. 8.

Von

Von dem Schaden, den die Tauben in der Landwirthschaft verursachen. — *Schönfeld*, Landwirthsch. p. 195.

Nützliches und vollständiges Taubenbuch, m. e. K. Ulm 1790. 8.

Woher die Tauben die Pocken bekommen. Hamburg. Magaz. XV. p. 651. cf. *Universalregister.*

Böhmius, de columba bicipite. Eph. nat. cur. Dec. II. an. 6. obs. 57. p. 137. c. fig.

Borrich. anatom. Columbae. — Act. Hafn. Vol. I. Obs. 96. — *Manget*, Bibl. I. 1. p. 388.

Camerarii sanguinis Columbini vis in oculis sugillatis, columbarum usus medicus. — Syll. memorabil. Cent. 6. P. 94. p. 414.

Num pulli columbini bonis cibis sint annumerandi? in *Zacut. Lusit.* medic. princ. hist. L. 2. ed. oper. T. I. p. 265.

Ausführl. Geschichte der Tauben. — Leipz. ökonom. phys. Abhandl. II. p. 65. — *Büffons* Vögel, VI. p. 317. ff.

Allgemeine Haushalt. u. Landwissensch. I. p. 864.

Der kluge Landmann. Francf. u. Leipzig 1713. 4. p. 393.

Magazin für den Landmann, II. p. 57.

Halle, Magie, IV. p. 268.

13. Montana. *Die Bergtaube.* (9)

Müller, Natursyst. II. p. 504. n. 13. *die Bergtaube.*

Onomat. hist. nat. III. p. 186. *die Bergtaube.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 125. n. 27. *Rothe Bergtaube.*

Brisson, ornith. I. p. 32. n. 29. Pigeon roux de Cayenne.

L 3 *Latham*,

(9) In *Büffons* Vög. VI. p. 217. sind alle hieher und zu N. 24. p. 781. gehörige Synonymen unter einander geworfen.

Latham, Syn. Suppl. p. 197. Partridge Pigeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 594. n. 3. Columba (Montana) orbitis nudis sanguineis, corpore rufo, subtus flavo.

Seligmann, Vögel, V. tab. 14. *das Bergrebhuhn.*

Neue Mannigfaltigk. III. p. 293. *die rothen Tauben.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 163. n. 7. Columba (Montana) obscure rufa, subtus flava, orbita oculorum nuda sanguinea.

5. Tetraoides. *Die Steinhuhnähnliche Taube.*

Latham, Syn. IV. 2. p. 614. n. 4. Tetraoid Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 594. n. 4. Columba (Tetraoides) capite colloque nigris, margine nigro.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 149. n. 180. *die dem Steinhuhn* (Tetr. Rufus) *ähnliche Taube.*

14. Leucocephala. *Die weißgekrönte Taube.* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 504. n. 14. *der Weißkopf.*

Halle, Vögel, p. 478. n. 517. *die Taube mit weißer Platte.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 328. n. 271. *der Weißkopf.*

Onomat. hist. nat. III. p. 183. *die Taube mit der weißen Krone.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 305. n. 105. *die Taube mit dem weißen Scheitel.*

Klein, av. p. 120. n. 18. Columba capite albo.

Klein, Vorbereit. p. 221. n. 18. *Weißkopf.*

Klein,

(10) Nach *Buffon* eine Abänderung von der gemeinen wilden Taube.

Klein, verb. Vögelhistor. p. 124. n. 18. *Weiß-kopf.*

Brisson, ornithol. I. p. 34. n. 33. Pigeon de roche de la Jamaique.

Büffon, Vögel, VI. p. 235. *die weißgekrönte Taube;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 594. n. 5. Columba (Leucocephala) caerulescens, orbitis verticeque albis, remigibus rectricibusque fuscis.

Seligmann, Vögel, I. tab. 50. *die Taube mit der weißen Krone.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 13. Columba (Leucocephala) caerulescens, vertice depresso albo.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 339. n. 3. *die weißköpfige Taube.*

15. LEUCOPTERA. *Die weißflüglige Taube.* (1)

Müller, Natursyst. II. p. 504. n. 15. *der Weiß-flügel.*

Onomat. hist. nat. III. p. 177. *die braune indianische Taube.*

Klein, av. p. 120. n. 26. Columba indica fusca.

Klein, Vorbereit. p. 223. n. 26. *indianische braune Taube.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 125. n. 26. *braune indianische Taube.*

Brisson, ornith. I. p. 25. n. 15. Pigeon des Indes.

Büffon, Vögel, VI. p. 222. *die braune Indianische Taube;* m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 197. White-winged Pigeon.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 595. n. 6. Columba (Leucoptera) fusco-rufescens, orbitis nudis caeru-

(1) Nach *Büffon* eine Abänderung von der gemeinen wilden Taube.

caeruleis, rectricibus cinereis, apice albis, intermediis fuscis.

Seligmann, Vögel, III. tab. 47. *die braune indianische Taube.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 164. n. 14. Columba (Leucoptera) palpebris nudis caeruleis, iridibus oculorum fulvis.

4. Fusca. *Die braune Taube von Carthagena.*

Ist, nach *Latham*, mit der vorhergehenden einerley.

5. Novae Seelandiae. *Die neuseeländische Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 603. n. 37. Columba (Zealandica) rubra, abdomine albo, uropygio caeruleo, cauda nigra.

6. Caribaea. *Die ringelschwänzige madagascarische Taube.*

Halle, Vögel, p. 476. n. 511. *die Taube mit der dunkelbraunen Binde um den Schwanz.*

Klein, av. p. 120. n. 19. Columba cauda torquata, seu fascia notata.

Klein, Vorbereit. p. 222. n. 19. *Ringelschwanz.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 124. n. 19. *Ringelschwanz.*

Brisson, ornith. I. p. 35. n. 34. Pigeon à queue annelée de la Jamaique.

Büffon, Vögel, VI. p. 258. *der Ringelschwanz; die blaue madagascarische Ringeltaube*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 603. n. 36. Columba (Caribaea) caerulescens, abdomine albo, capite, collo inferiore pectoreque purpurascentibus, cauda fascia transversa nigra.

β. Col.

β. Col. cauda cuneata, orbitis denudatis flavescentibus, corpore caerulescente. *
Latham, Syn. Suppl. p. 199. — Syst. ornith. II. p. 603. n. 36. β.
Jacquin, Vög. p. 30. n. 24.

16. GUINEA. *Die guineische Taube.* (2)
Müller, Natursyst. II. p. 405. n. 16. *die guineische Taube.*
Halle, Vögel, p. 478. n. 515. *die graubraune Taube, mit rother Membrane um die Augen.*
Onomat. hist. nat. III. p. 180. *die Taube mit dreyeckigten Flecken.*
Klein, av. p. 120. n. 25. Columba Guineensis.
Klein, Vorbereit. p. 222. n. 25. *Taube von Guinea.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 125. n. 25. *guineische Taube.*
Brisson, ornith. I. p. 33. n. 30. Pigeon de Guinée.
Büffon, Vögel, VI. p. 254. *die Guineische Ringeltaube mit dreyeckigen Flecken;* m. e. Fig.
Latham, Syst. ornith. II. p. 602. n. 35. Columba (Guinea) orbitis nudis rufis, alis maculis albis triquetris, rectricibus apice nigris.
Seligmann, Vögel, III. tab. 45. *die Taube mit dreyeckichten Flecken.*
Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 139. *die Turteltaube vom Vorgebürge der guten Hoffnung.*
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 163. n. 9. Columba (Guinea) rectricibus cinereis apice nigris, orbita oculorum nuda rubra.

17. CORONATA. *Der Kronenvogel.*
Müller, Natursyst. II. p. 405. n. 17. *die große Kronentaube.*

(2) Nach *Büffon* eine Spielart von der *europäischen Ringeltaube.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 201. n. 2. Columba (Coronata) caerulescens supra cinera, orbitis nigris, crista erecta, humeris ferrugineis; *der Kronvogel.*

Brisson, ornith. I. p. 78. n. 6. Faisan couronné des Indes.

Büffon, Vögel, VI. p. 266. *der Kronenvogel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 596. n. 9. Columba (Coronata) orbitis nigris, crista erecta, corpore caerulescente, humeris ferrugineis.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 60. *die Kronentaube.*

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 65. *der Kronenvogel*, tab. 4.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 28. *große gekrönte indianische Taube.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 148. n. 179. *die grunzende oder blöckende Taube; die Taube mit aufrecht stehendem Federbusch.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 339. n. 4. *der Kronvogel.*

7. Cristata. *Der Rouloul.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 596. n. 10. Columba (Cristata) fusco-rufescens cristata, subtus capite colloque nigris, dorso caudaque viridibus, fronte setis sex longissimis erectis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 136. *der Rouloul aus Malacca*, tab. 100.

Mus. Carlson. fasc. III. tab. 64. Phasianus cristatus.

Philos. transact. LXII. p. 1. tab. 1. Uncommon Bird from Malacca.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 597. n. 10. β.

8. Albi-

8. Albicapilla. *Die grüne, grauköpfige Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 233. *die grüne, grauköpfige Taube der Insel Antigua.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 597. n. 11. Columba (Albicapilla) viridis, vertice cano, colli lateribus rufescente aureis, remigibus primoribus caudaque nigris.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 40. *die grüne, grauköpfige Taube der Insel Antigua.*

9. Pompadora. *Die Pompadurtaube.*

Latham, Syn. Suppl. p. 198.

Latham, Syst. ornith. II. p. 597. n. 12. Columba (Pompadora) viridis, alis purpurascentibus, remigibus nigris, genis gulaque flavis.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 597. n. 12. (*Femina.*)

10. Erythroptera. *Die rothflügelige Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 597. n. 15. Columba (Erythroptera) granatina, subtus, nucha, dorso remigibusque nigris, fronte superciliisque albis, cauda a medio ad apicem nigra.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 598. n. 15. β. Col. gutture et pectore albis, superciliis ferrugineis, remigibus caudaque nigricantibus.

γ. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 598. n. 15. γ. Col. nigro-rubescens, superciliis colloque subtus albis, pedibus rubris.

18. Striata. *Die gestreifte Taube.*

Müller, Natursyst. II. p. 506. n. 18. *die gestreifte Taube.*

Klein, av. p. 120. n. 21. Columba turtur Ind. orientalis, alis dorsoque ex cinereo seriatim quasi squamatis.

Klein,

Klein, Vorbereit. p. 222. n. 21. *graugeschupte Turteltaube.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 21. *graugeschuppte Turteltaube.*

Brisson, ornith. I. p. 26. n. 17. Tourterelle rayée des Indes.

Büffon, Vögel, VI. p. 303. 305. *die gestreifte Indianische Turteltaube;* m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 200. Barred Turtle.

Latham, Syst. ornith. II. p. 608. n. 53. Columba (Striata) orbitis lorisque candidis, corpore cinereo nigro fasciato, subtus rufo.

Seligmann, Vögel, I. tab. 31. *die quergestreifte Taube.*

19. PALUMBUS. *Die Ringeltaube.*

Müller, Natursyst. II. p. 506. n. 19. *die Ringtaube.*

Leske, Naturgesch. p. 254. n. 2. *die Ringeltaube.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 205. n. 1. *die Ringeltaube*, tab. 75.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 201. n. 3. Columba (Palumbus) rectricibus postice atris, remigibus primoribus margine exteriore albidis, collo utrinque albo, *Ringeltaube; große Holztaube; Schlagtaube; Blochtaube; Kohltaube; Holztaube.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 490. n. 2. *die Ringeltaube.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 779. *die Ringeltaube.*

Ebert, Naturl. II. p. 123. *die Ringeltaube.*

Halle, Vögel, p. 469. n. 496. *die große Ringeltaube.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 329. n. 273. *die Ringeltaube.*

Beckmann,

Beckmann, Naturhist. p. 51. *b. die Ringeltaube.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 307. *b. die Ringeltaube.*
Onomat. hist. nat. V. p. 3. *die Ringtaube.*
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 117. *die Ringeltaube.*
Klein, av. p. 119. n. 7. Columba torquata.
Klein, Vorbereit. p. 220. n. 7. *Ringeltaube.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 123. n. 7. *Ringeltaube.*
Klein, Stemmat. av. p. 27. tab. 29. Fig. 1. a—c.
Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 15. Fig. 2.
Gesner, Vögelb. p. 526. *Ringeltauben; Blochtauben.*
Brisson, ornith. I. p. 20. n. 6. Pigeon ramier.
Büffon, Vögel, VI. p. 238. *die Ringeltaube;* m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 428. *die Ringeltaube.*
Latham, Syn. Suppl. p. 198. Ring-Pigeon.
Latham, Syst. ornith. II. p. 601. n. 32. Columba (Palumbus) cinerea, rectricibus postice atris, remigibus primoribus margine exteriore albidis, collo utrinque albo.
Beseke, Vögel Kurl. p. 71. n. 151. *die Ringeltaube.*
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 43. n. 2. *die Ringeltaube.*
Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 405. *die Ringeltaube; Waldtaube.*
Fischer, Livl. p. 91. n. 125. *Ringeltaube; Waldtaube.*
Cetti, Sardin. II. p. 130. *die Holz- oder Ringeltaube.*
Molina, Chil. p. 208. *Ringeltauben?*
Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 7. *Ringeltaube.*
White, N. G. von Engl. p. 66. n. 6. *Ringeltaube.*

Adan-

Adanson, Senegal. p. 93. *Felsentauben.*
Leem, Finnm. p. 132. * *Ringeltauben.*
Pennant, britt. Thiergesch. p 94. tab. 45.
Linné, Abhandl. II. p. 299. n. 110. *die Ringeltaube.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 300. *Ringel-Taube.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 52. *Ringel-Taube.*
Naumann, Vogelsteller, p. 160. *Ringeltaube.*
Naturforsch. XVII. p. 76. n. 157. *die Ringtaube.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 556. *Ringeltaube.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 147. n. 178. *die wilde Taube*, *Ringeltaube.*
Lonniceri, Kräuterb. p. 649. *Holztaube*, *Blochtaube; Waldtaube.*
Neues hamburg. Magaz. St. 37.
Börner, Stadt-und Landwirthsch. p. 137. n. 3.
Angenehme Landluft, p. 311.
Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 97.
Borkhausen, Magazin, I. p. 208. n. 86.
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. Palumbus.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 3. Palumbus.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 163. n. 11. Columba (Palumbus) rectricibus postice atris, remigibus primoribus margine exteriore albidis, collo utrinque albo.
Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 228. Columba (Palumbus) rectricibus postice atris, remigibus primoribus margine exteriore albidis, collo utrinque albo.
Kramer, Austr. p. 359. n. 2. Columba collo utrinque albo, pone macula fusca, *Wildtaube; Ringltaube.*
Schwenkfeld, av. Siles. p. 313. Palumbus. *Ringel Taube.*
Charleton, onom. zoic. p. 77. n. 1. Palumbus torquatus.

Rzaczyns-

Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 143. Palumbus.
Sibbald, Scot. illustr. p. 109. Palumbus.
Zinnan. Uov. p. 32. tab. 4. Fig. 14. Colombaccio.
Olin. uc. p. 54. — Hist. Prov. I. p. 490. — Rom. orn. I. p. 84. tab. 14.
Bomare, Diction. VIII. p. 508. — Dict. des anim. III. p. 458.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 24. Palumbes.
Aristot. hist. anim. L. 9. c. 11. n. 119. 121. Φαττα.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 339. n. 5. *die Ringeltaube*.

11. Caerulea. *Die blaue mexicanische Taube*.

Brisson, ornith. I. p. 35. n. 35. Pigeon bleu du Mexique.
Büffon, Vögel, VI. p. 216. *der Tlacahoilotl*.
Latham, Syst. ornith. II. p. 601. n. 31. Columba (Caerulea) caerulea, subtus tectricibusque alarum rubris, capite colloque rubro variegatis.

12. Hoilotl. *Die mexicanische Bergtaube*.

Brisson, ornith. I. p. 32. n. 28. Pigeon de Montagne du Mexique.
Büffon, Vögel, VI. p. 215. *Hoilotl*.
Latham, Syst. ornith. II. p. 601. n. 30. Columba (Hoilotl) rufo-purpurea, tectricibus alarum minoribus albis.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 601. ad n. 30.

42. Naevia. *Die braune, schwarz gefleckte neuspanische Taube*.

Brisson, ornith. I. p. 23. n. 11. Pigeon sauvage du Mexique.
Latham, Syst. ornith. II. p. 601. n. 29. Columba (Naevia) fusca, supra nigro-maculata, subtus fulvescens, tectricibus caudae inferioribus cinereis.

43. Mexi-

43. MEXICANA. *Die braune mexicanische Taube.*

Brisson, ornith. I. p. 23. n. 10. Pigeon du Mexique.

Büffon, Vögel, VI. p. 215. *die braune Taube aus Neuspanien, Cehoilotl.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 601. n. 28. Columba (Mexicana) fusca, orbitis coccineis, pectore candido, alis extremis albis.

44. PACIFICA. *Die Taube von den Inseln des stillen Ocean.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 600. n. 27. Columba (Pacifica) dorso fusco-virescente, capite, collo, pectore abdomineque cinereo-albis, cauda nigricante.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 600. n. 27. Col. capite, collo, pectore abdomineque albidis, dorso, tectricibus alarum caudaque subviridibus, basi rostri gibba.

45. CURVIROSTRA. *Die krummschnäblige Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 600. n. 25. Columba (Curvirostra) viridis subtus flavescens, dorso castaneo, fascia alarum duplici rectricumque lateralium unica nigris.

46. ST. THOMAE. *Die Taube von der Insel St. Thomae.*

Halle, Vögel, p. 471. n. 500. *die grüne Papagaitaube.*

Klein, av. p. 119. n. 11. Columba ex insula St. Thomae sylvestris.

Klein, Vorbereit. p. 220. n. 11. *Papageytaube von der Insel St. Thomae.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 113. n. 10. *Thomastaube.*

Brisson,

Brisson, ornith. I. p. 38. n. 40. Pigeon verd de l'Isle de S. Thomas.

Büffon, Vögel, VI. p. 228. *die Papagaytaube.* (3)

Latham, Syst. ornith. II. p. 600. n. 24. Columba (St. Thomae) viridis, tectricibus caudae inferioribus flavis, remigibus et apice caudae viridi-fuscis.

Marcgr. hist. nat. Brasil. p. 213. Columbae sylvestris species ex Insula St. Thomae.

Jonston, av. p. 208. Columbae sylvestris species ex Insula S. Thomae allata.

47. AROMATICA. *Die olivenfarbige amboinische Taube.*

Brisson, ornith. I. p. 37. n. 39. Pigeon vert d'Amboine.

Büffon, Vögel, VI. p. 229. *Amboinische grüne Taube;* m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 631. n. 21. Aromatic Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 599. n. 23. Columba (Aromatica) viridi-olivacea, dorso castaneo, fascia alarum duplici flavicante et nigra, remigibus nigris, margine flavis.

20. CYANOCEPHALA. *Die blauköpfige Taube.* (*)

Müller, Natursyst. II. p. 507. n. 20. *der Blaukopf.*

Onomat. histor. natur. III. p. 179. *blauköpfichte Turteltaube.*

Halle, Vögel, p. 474. n. 506. *die mohrenköpfige Turteltaube.*

Klein,

(3) Hier sind alle zu dieser, der folgenden, und 69ten Gattung gehörige Synonymen, unter einander geworfen.

(*) Die Trivialbenennung *Cyanocephala* kömmt im System p. 781. n. 56. nochmals vor.

Klein, av. p. 119. n. 15. Columba capite nigro.

Klein, Vorbereit. p. 221. n. 15. *Jamaicanische Turteltaube, mit schwarzem Kopfe.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 15. *Jamaicanische Turteltaube.*

Brisson, ornith. I. p. 34. n. 2. Tourterelle de la Jamaique.

Büffon, Vögel, VI. p. 308. *Jamaizensische Turteltaube;* m. e. Fig. p. 311 *der Blaukopf.*

Latham, Syn. Supplem. p. 100. Blue - headed Turtle.

Latham, Syst. ornith. II. p. 608. n. 54. Columba (Cyanocephala) vinaceo - fusca, capite gulaque caeruleis, fascia suboculari alba.

Linné, Syst. nat. Ed. X. I. p. 163. n. 12. Columba (Cyanocephala) capite caeruleo.

48. Suratensis. *Die Taube von Surate.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 609. n. 55. Columba (Suratensis) grisea, collo supra nigro, nucha alba, vertice ruso - fasciata, tectricibus alarum cinereo - griseis, rachibus nigris.

Sonnerat, Reis. nach Ostind. und Chin. II. p. 39. *die Turteltaube von Surate.*

49. Cambayensis. *Die graue, weißbauchige Taube von Surate.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 609. n. 56. Columba (Cambayensis) grisea, subtus alba, capite subvinaceo, collo subtus nigro ruso vario, rectricibus lateralibus nigro griseoque dimidiatis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 140. *die graue Turteltaube von Surate.*

50. Malabarica. *Die malabarische Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 609. n. 57. Columba (Malabarica) cinerea, subtus alba, alis medio maculis

maculis ovatis, rectricibus lateralibus a basi ultra medium nigris, reliqua parte albis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 140. *die Taube von der Küste Malabar.*

21. MADAGASCARIENSIS. *Die blaue Madagascarische Taube.*

Müller, Natursyst. II. p. 507. *die madagascarische Taube.*

Brisson, ornith. I. p. 36. n. 36. Pigeon-ramier bleu de Madagascar.

Büffon, Vögel, VI. p. 259. *die blaue Madagaskarische Ringeltaube; der Funingo*, m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 604. n. 40. Columba (Madagascariensis) pedibus plumosis, cauda violacea, corpore caeruleo-nigro.

Bontecoë, voyag. aux Indes oriental. p. 16.

β. *Die grüne madagascarische Taube.* (t)

Müller, Natursyst. Suppl. p. 132. *der Gelbschwanz.*

Brisson, ornith. I. p. 36. n. 37. Pigeon-ramier verd de Madagascar.

Büffon, Vögel, VI. p. 260. *grüne Madagaskarische Ringeltaube; Founingo-maïtsu*, m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 641. n. 35. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 604. n. 41. Columba (Australis) viridis, abdomine, crisso, femoribusque maculatis, humeris violaceis.

Bont. Ind. orient. p. 62. Columba viridissimi coloris.

51. FRANCIAE. *Die holländische Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 604. n. 42. Columba (Franciae) caerulea, orbitis nudis, uropygio caudaque rubris, pennis colli angustis elongatis, apice acuminatis.

 Sonnerat

(t) Nach *Brisson* und *Latham* eine eigne Gattung.

Sonnerat, Reiſ. n. Oſtind. u. Chin. II. p. 137. *die holländiſche Taube.*

52. Maculata. *Die grüne, weißgefleckte Taube.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 605. n. 43. Columba (Maculata) ſaturate viridis, corpore ſupra albido maculato, abdomine nigricante, cauda nigra, apice ferruginea.

22. Aenea. *Die kupferfarbene Muſkattaube.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 508. n. 22. *die moluccische Taube.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 133. d. *die moluckiſche Taube.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 5. *die Mollucciſche Taube.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 330. n. 274. *die Muſkatringeltaube.*

Briſſon, ornith. I. p. 38. n. 41. Pigeon-ramier des Moluques.

Büffon, Vögel, VI. p. 251. *die Molukkiſche Ringeltaube;* m. e. Fig.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 602 n. 33. Columba (Aenea) pedibus plumoſis, roſtro pedibusque vireſcentibus, corpore aeneo.

β. *Büffon*, Vögel, VI. p. 253. n. 1. *die kupferfarbige Muſkatringeltaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 637.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 602. n. 33. β.

Sonnerat, Reiſ. n. Neuguin. p. 60. *die kupferfarbene Muſkattaube;* m. e. Fig.

53. Alba. *Die weiße Muſkattaube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 253. n. 2. *die weiße Muſkatringeltaube von Neu-Guinea.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 602. n. 34. Columba (Alba) corpore albo, remigibus primoribus caudaque ad apicem nigris.

Sonnerat,

Sonnerat, Reis. nach Neuguinea, p. 60. *die weiße Muskattaube.*

53. VIRIDIS. *Die grüne amboinische Taube.*

Müller, Natursyst. II. p. 508. n. 23. *die amboinische Taube.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 132. *die amboinische Taube.*

Brisson, ornith. I. p. 39. n. 43. Tourterelle verte d'Amboine.

Büffon, Vögel, VI. p. 296. *der Türvert.* n. 1. *purpurbrüstige amboinische Turteltaube;* m. e. Fig. p. 300. *amboinische grüne Turteltaube.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 609. n. 58. Columba (Viridis) aenea, collo subtus purpureo-violaceo.

54. MELANOCEPHALA. *Die schwarzkappige Taube.*

Müller, Natursyst. Supplem. p. 133. *die batavische Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 296. 297. *der Türvert.* n. 2. *batavische Turteltaube*, m. e. Fig. p. 300. *batavische Turteltaube.* p. 301. *schwarzgehäubte Javanische grüne Taube; Taube mit schwarzer Kappe.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 610. n. 59. Columba (Melanocephala) viridis, capite cinerascente, occipite nigro, gula, abdomine imo crissoque flavis, rectricibus tribus exterioribus purpureo coccineis.

Naturforsch. I. p. 269. n. 7. *die schwarzgehaubte Taube.*

Berlin. Samml. IX. p. 192. *die javanische Taube mit schwarzer Kappe.*

Neueste Mannigfaltigkeit. I. p. 189. n. 7.

55. JAVANICA. *Die javanische Taube.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 133. *der Grünrücken.*

Büffon, Vögel, VI. p. 296. 298. *der Türvert*, n. 3. *javanische Turteltaube*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 610. n. 60. Columba (Javanica) viridis, capite colloque vinaceo-rubris, abdomine obscuriore, remigibus primoribus fuscis.

56. CYANOCEPHALA. *Die blaugescheitelte chinesische Taube.* (5)

Latham, Syst. ornith. II. p. 610. n. 61. Columba (Caeruleocephala) viridis, subtus rubens, vertice caeruleo, remigibus rectricibusque caeruleo-nigricantibus.

24. MARTINICA. *Die martinikische Taube.*

Müller, Natursyst. II. p. 508. n. 24. *Die martinikische Taube.*

Brisson, ornith. I. p. 32. n. 27. Pigeon violet de la Martinique.

Büffon, Vögel, VI. p. 217. *die violette Martinikische Taube*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 595. n. 7. Columba (Martinica) subviolacea, abdomine rufescente, remigibus interius rufis.

Du Tertre, hist. des Antill. II. p. 254. Perdrix rousse?

β. *Brisson*, ornith. I. p. 25. n. 14. Pigeon de la Martinique.

Büffon, Vögel, VI. p. 217. *die Martinikische Taube*; *rothe Kayennische Taube.* (mit Col. Montana verwechselt.)

Latham, Syn. II. 2. p. 618. n. 7. Var. A.

Latham,

(5) Ist nicht mit n. 20. p. 778. zu verwechseln.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 595. n. 7. β. Col. fusco-rufescens, torque violaceo-aureo, alis nigro-maculatis, rectricibus lateralibus nigro terminatis, apice summo albo.

25. Jamaicensis. *Die jamaicaische Taube.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 508. n. 25. *die jamaicaische Taube.*

Brisson, ornithol. I. p. 33. n. 31. Pigeon de la Jamaique.

Büffon, Vögel, VI. p. 236. *eine andere Jamaizensische Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 595. n. 8. Columba (Jamaicensis) fusco-purpurascens, subtus alba, rectricibus caeruleis, linea alba terminatis.

26. Senegalensis. *Die senegalische Taube ohne Halsband.*

Müller, Natursystem, II. p. 509. *die Senegalische Taube.*

Brisson, ornith. I. p. 31. n. 25. Tourterelle à gorge tachetée du Sénegal.

Büffon, Vögel, VI. p. 289. *die senegalische Turteltaube mit gefleckter Kehle*, m. e. Fig. p. 290. *die senegalische Turteltaube ohne Halsband.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 610. n. 62. Columba (Senegalensis) fusco-rufescens, subtus alba, collo subtus nigro-maculato, rectricibus tribus extimis, ultima medietate albis.

7. Vinacea. *Die senegalische Taube mit dem Halsbande.* (7)

Brisson, ornith. I. p. 30. n. 24. Tourterelle à collier du Senegal.

(6) Wird häufig mit *Columba Leucocephala*, p. 772. n. 14. verwechselt

(7) Nach *Büffon* eine Varietät von der vorigen.

Büffon, Vögel, VI. p. 290. *die senegalische Turteltaube mit schwarzem halben Ring auf dem Halse;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 611. n. 63. Columba (Vinacea) griseo-fusca, subtus alba, collo superiore torque nigro, remigibus fuscis albido extus marginatis.

27. NICOBARICA. *Die nikobarische Taube.*

Müller, Natursystem, II. p. 509. n. 27 *die nicombarische Taube.*

Halle, Vögel, p. 477. n. 513. *die Hahnentaube.*

Onomat. histor. natur. III. p. 187. *die nicobarische Taube.*

Klein, av. p. 120. n. 23. Columba Nincombar.

Klein, Vorbereit. p. 222. n. 23. *indianische Taube von Ninkombar.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 23. *Nincombar.*

Brisson, ornithol. I. p. 40. n. 44. Pigeon de Nincombar.

Büffon, Vögel, VI. p. 264. *die Taube von der Insel Nicobar;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 605. n. 44. Columba (Nicobarica) cauda alba, corpore nigro, remigibus caeruleis, dorso viridi-nitente, pennis colli elongatis.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 15. Columba (Nicobarica) cauda alba, corpore nigro, remigibus caeruleis, dorso viridi-nitente, pennis colli elongatis.

Bomare, diction. VIII. p. 510. n. 2. — Dict. des Anim. III. p. 460.

58. SPECIOSA. *Die cayennische Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 263. *die Kayennische Ringeltaube;* m. e. Fig.

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 605. n. 45. Columba (Speciosa) ferruginea, cauda nigricante, collo inferiore pectoreque rufo albo purpureoque undulatis.

59. Corensis. *Die graue südamerikanische Taube.*

Latham, Syn. Suppl. p. 201. Grey Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 605. n. 46. Columba (Corensis) cauda aequali, orbitis denudatis atro-punctatis, corpore griseo.

28. Sinica. *Die gestreifte chinesische Taube.*

Müller, Natursyst. II. p. 509. n. 28. *die chinesische Taube.*

Halle, Vögel, p. 476. n. 512. *die Turteltaube aus China; von kurzer Taille.*

Onomat. hist. nat. III. p. 189. *die chinesische Taube.*

Klein, av. p. 120. n. 22. Columba sinensis, elegans.

Klein, Vorbereit. p. 222. n. 22. *Sinesische Taube.*

Klein, verb. Vögelh. p. 124. n. 22. *chinesische Taube.*

Brisson, ornith. I. p. 26. n. 16. Tourterelle rayée de la Chine.

Büffon, Vögel, VI. p. 302. 305. *die gestreifte Chinesische Taube;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 608. n. 52. Columba (Sinica) fusca, nigro fasciata, abdomine subsanguineo, remigibus nigris, rostro nigro.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 17. Columba (Sinica) rectricibus dorsoque fuscis, abdomine sanguineo, alis flavis, remigibus nigris.

60. Eimeensis. *Die purpurbrüstige Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 599. n. 21. Columba (Eimensis) fusco-virescens, fronte colloque

subtus vinaceis, pectore tectricibusque alarum fusco-rubris, fascia pectorali alba.

61. PURPUREA. *Die grüne purpurköpfige Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 599. n. 20. Columba (Purpurea) viridis, capite colloque purpurascentibus, pectore fulvo, crisso rubro.

62. RUBRICAPILLA. *Die violette, rothköpfige Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 234. *die violette rothköpfige Taube von Antigua.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 599. n. 19. Columba (Rubricapilla) atro-violacea, pileo orbitisque nudis rubris, collo, dorso superiore pectoreque grisescentibus.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 41. *die violette rothköpfige Taube.*

63. JAMBU. *Die Taube von Sumatra.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 598. n. 18. Columba (Jambos) viridis, supra rubra, pectore albo.

64. PURPURATA. *Die Taube mit purpurfarbenem Scheitel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 598. n. 17. Columba (Purpurata) viridis, pileo coccineo, crisso fulvo, capite, collo pectoreque albis.

29. INDICA. *Die grüngeflügelte indianische Taube.* (8)

Müller, Natursyst. II. p. 509. n. 29. *die indianische Taube.*

Onomat. hist. nat. III. p. 182. *die grüngeflügelte Taube.*

Halle, Vögel, p. 475. n. 507. *die rosenrothe Turteltaube, mit grünen Flügeln.*

Klein,

(8) *Büffon* hält sie für das Weibchen von seiner *Tourterelle de la Jamaique.* (Col. cyanocephala, p. 778. n. 20.)

Klein, av. p. 120. n. 20. Columba turture nostrate minor; principibus coloribus superbiens Indiae orientalis.

Klein, Vorbereit. p. 222. n. 20. *Scharlattaube. aus Ostindien.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 20. *Scharlattaube.*

Brisson, ornith. I. p. 39. n. 42. Pigeon-ramier d'Amboine.

Büffon, Vögel, VI. p. 308. 311. *die grüngeflügelte Indianische Taube.*

Latham, Syn. Suppl. p. 198. Green-winged Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 598. n. 16. Columba (Indica) corpore purpureo, humeris viridibus, pileo caerulescente, remigibus primoribus rectricibusque nigris.

Seligmann, Vögel, I. tab. 27. *die grüngeflügelte Taube.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 18. Columba (Indica) corpore purpureo, humeris viridibus, superciliis albis.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 598. n. 16. β. Col. tectricibus alarum violaceis, remigibus viridibus.

30. Canadensis. *Die canadische Taube.*

Müller, Natursyst. II. p. 510. n. 30. *die canadische Taube.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 303. n. 106. *die Canadische Taube.*

Brisson, ornithol. I. p. 29. n. 21. Tourterelle de Canada.

Büffon, Vögel, VI. p. 285. *die Kanadensische Turteltaube, mit langem Schwanze;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 613. n. 72. Columba (Canadensis) cauda cuneata, corpore griseo-fusco

fusco subtus albido, remigibus primoribus apice flavicantibus, rectricibus extimis albis.

65. Sanguinea. *Die weiße, blutfleckige Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 299. *die weiße blutflekkichte Turteltaube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 611. n. 66. Columba (Sanguinea) corpore toto albo, macula pectorali, rostro pedibusque sanguineis.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 21. *die weiße blutfleckigte Turteltaube.*

66. Cruenta. *Die graue blutfleckige Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 298. *die graue blutflekkichte Turteltaube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 611. n. 65. Columba (Cruenta) grisea, collo subtus albo, cervice violacea, fasciis alarum tribus grisescentibus, macula pectoris sanguinea.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 21. *die graue blutfleckigte Turteltaube.*

31. Afra. *Die afrikanische Taube.*

Müller, Natursyst. II. p. 510. n. 31. *die africanische Taube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 289. *Senegalische Turteltaube;* m. e. Fig.

Brisson, ornithol. I. p. 30. n. 23. Tourterelle du Senegal.

Latham, Syst. ornith. II. p. 611. n. 64. Columba (Afra) griseo-fusca subtus albida, maculis tectricum alarum violaceo azureis, rectricibus extimis basi exteriore maculaque apicis albis.

32. Turtur. *Die Turteltaube.*

Müller, Natursyst. II. p. 510. n. 32. *die Turteltaube.*

Leske,

Leske, Naturgesch. p. 254. n. 3. *die Turteltaube.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 192. n. 10. *die Turteltaube.*
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 201. n. 4. Columba (Turtur) rectricibus apice albis, dorso griseo, pectore incarnato, macula laterali colli nigra lineolis albis; *die Turteltaube; Wegetaube.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 491. n. 3. *die Turteltaube.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 680. *die Turteltaube.*
Ebert, Naturl. II. p. 123. *die Turteltaube.*
Halle, Vögel, p. 472. n. 501. *die Turteltaube.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 332. n. 275. *die Turteltaube.*
Onomat. hist. nat. VII. p. 640. *die Turteltaube.*
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 117. *die Turteltaube.*
Klein, av. p. 119. n. 12. Columba Turtur.
Klein, Vorbereit. p. 220. n. 12. *Turteltaube.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 12. *Turteltaube.*
Klein, Stemmat. av. p. 27. 29. Fig. 3. a. b.
Klein, Vögeleyer, p. 33. tab. 16. Fig. 3. 8.
Gesner, Vögelb. p. 529. *Turteltaube*; m. e. zieml. gut. Fig.
Brisson, ornith. I. p. 21. n. 7. Tourterelle.
Büffon, Vögel, VI. p. 271. 281. *die Turteltaube*, m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 428. *die Turteltaube.*
Latham, Syn. Suppl. p. 199. Common Turtle.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 605. n. 47. Columba (Turtur) rectricibus apice albis, dorso griseo, pectore incarnato, macula laterali colli nigra lineolis albis.
Frisch, Vögel, tab. 140. *die Turteltaube.*

Beseke,

Beseke, Vögel Kurl. p. 71. n. 153. *die Turteltaube.*
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 44. n. 3. *die Turteltaube.*
Cetti, Sardin. II. p. 136. *die Turteltaube.*
Fischer, Livl. p. 91. n. 126. *Turteltaube.*
Molina, Chil. p. 208. *Turteltaube.*
Niebuhr, Beschr. von Arab. p. 168. *Turteltauben.*
Boswell, Beschr. von Corsic. p. 45. *die Turteltaube.*
White, N. G. von Engl. p. 59. n. 13. *die Turteltaube.*
Taube, Slavon. I. p. 23. *Turteltauben.*
Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *die Turteltauben.*
Georgi, Reis. p. 173. *Turteltaube.*
Forskål faun. Orient. p. VII. n. 12. a. Columba Turtur. *Djahleb.* — Descr. animal. p. 4. n. 14. Columba *Turtur;* rectricibus fuscis: extimis apice et extrorsum, reliquis apice albis, intermediis exceptis.
Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 8. *Turteltaube.*
Pennant, britt. Thiergesch. p. 94. tab. 44.
Boßmann, Reis. n. Guinea, p. 390. *Turteltauben.*
Allgem. Reis. IV. p. 388. *Turteltauben.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 149. n. 181. *die Turteltaube.*
Merklein, Thierreich, p. 392. *Turteltaube.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 303 *die Turtel-Taube.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 52. *Turteltaube.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 557. *Turteltaube.*
Naumann, Vogelsteller, p. 161. *die Turteltaube.*
Meidinger, Vorl. I. p. 145. n. 3. *die Turteltaube.*
Börner, Stadt-und Landwirthsch. II. p. 137. n. 4.
Hamb. Magazin, XIX. p. 58.
Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 97.
Geoffroy, mater. med. VII. p. 397. *Turteltaube.*

Lemmery,

Lemmery, Materiallex. p. 1160.
Neue Mannigfaltigk. III. p. 293.
Neueste Mannigfaltigk. I. p. 570.
Loniceri, Kräuterb. p. 650. *Turtel-Taube.*
André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 26. *Turteltaube.*
Lichtenberg, Magaz. für das Neuste, etc. III. 1. p 63.
Borkhausen, Magazin, I. p. 209. n. 87.
Naturforsch. XVII. p. 76. n. 158. *Turteltaube.*
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. Turtur.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 4. Turtur.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 20. Columba (Turtur) rectricibus apice albis, dorso griseo, pectore incarnato, macula laterali colli.
Kramer, Austr. p. 359. n. 3. Columba area oculorum nuda coccinea laevi, collo postice semicirculo nigro; *wilde Turteltaube.*
Charleton, onom. zoic. p. 77. n. 5. Turtur.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 362. Turtur, *Turtel-Taube.*
Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 302. Turtur.
Sibbald, Scot. ill. p. 179. Turtur.
Jonston, av. p. 92. Turtur.
Zinnan. Uov. p. 33. tab. 4. Fig. 15. Tortora.
Schlichten, obs. phil. de Turture eiusque qualitatibus, usu antiquo et emblemate, ad illustranda varia S. S. loca, Hal. 1739. 4.
Riedlinus, Turturum dubia castitas. — Eph. nat. cur. Dec. III. an. 5. et 6. obs. 129. p. 260.
Hartmann, anatome Turturis, pinguedine suffocatae, — ibid. Dec. II. an. 7. obs. 32. p. 69.
Camerarius, Turtur sapientum caro, dysenteriae et strabismi remedium. — Syll. memorab. Cent. VIII. P. 89. p. 621.
Second. Voyage de Siam. p. 248.
Geronier, hist. nat. et polit. de Siam. p. 35.

Dampier,

Dampier voy. I. p. 406. II. p. 83. III. p. 155. IV. p. 139.

Voyage de *Frésier*, p. 74. p. 111.

Le Gentil, voy. I. p. 94.

Charlevoix, hist. de St. Domingue, I. p. 28.

Histoir. des Navigations aux terres australes, II. p. 52.

Nouv. voy. aux Isles de l'Amerique, II. p. 67.

Bomare, Diction. XI. p. 439. — Diction. des anim. IV. p. 410.

Plin. hist nat. L. 10. c. 24. Turtur.

Varro, de re rust. L. 3. c. 5. et 8. Turtures.

Columella, de re rust. L. 8. c. 9. Turtures.

Palladius, de re rust. L. 1. c. 25. Turtures.

Aristot. hist. anim. L. 6. c. 6. n. 65. L. 9. c. 2. n. 22. L. 9. c. 11. n. 127. τρυγονες.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 340. n. 6. *die Turteltaube.*

β. *Die Turteltaube mit schwarzen, weißgefleckten Seitenholsfedern.*

Latham, Syn. II. 2. p. 645. n. 4. A. Spotted-necked Turtle.

Latham, Syst. ornith. II. p. 606. n. 1. β.

γ. *Die portugiesische Turteltaube.* (g)

Halle, Vögel, p. 474. n. 505. *die Portugiesentaube.*

Klein, av. p. 119. n. 14. Columba Portugallensis.

Klein, Vorbereit. p. 221. n. 14. *Portugallische Taube.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 14. *Portugiesische Taube.*

Brisson, ornith. I. p. 23. n. 9. Pigeon de Portugal.

Büffon, Vögel, VI. p, 302. 305. *die portugiesische Taube.*

Latham,

(g) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

Latham, Syn. II. 2. p. 646. Portugal Turtle.

Latham, Syst. ornith. II. p. 606. n. 47. γ. Col. fusca, macula laterali colli albo nigroque varia, rectricibus cinereis, lateralibus latere exteriore, omnibus apice albis.

δ. *Die aschgraue Turteltaube von der Insel Luçon.*

Büffon, Vögel, VI. p. 298. *die aschgraue Turteltaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 646. Luzonian Turtle.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 606. n. 47. δ. Col. griseo-cinerea, subtus vinaceo-grisea, macula colli nigra, pennis apice albis, rectricibus intermediis duabus nigris, lateralibus albis.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 22. *die aschfarbene Turteltaube.*

ε. *Die braune chinesische Turteltaube.* (1)

Latham, Syn. IV. p. 647. Chinese Turtle.

Latham, Syst. ornith. II. p. 606. n. 48. Columba (Orientalis) fusco-grisea, lateribus colli pennis nigris, apice griseo-cinereis, fascia alarum flava.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 138. *die braune Chinesische Turteltaube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 607. n. 49. Columba (Aegyptiaca) testaceo-incarnata, gula maculata, plumis nigris, apice bilobo-truncatis, ferrugineis.

Forskål, fn. orient. p. 5. n. 15. Columba *testaceo-incarnata:* gula maculata, plumis nigris, apice bilobo-truncatis, ferrugineis.

ζ. *Die*

(1) *Latham* nimmt *Sonnerats* Tourterelle brune de la Chine, und Forskåls Columba testaceo-incarnata, als *zwey besondere Gattungen* an.

ζ. *Die weiße Turteltaube.* *

Lichtenberg u. Voigt, Magazin für das Neueste, etc. VII. 2. p. 97.

η. *Die Ohrenturteltaube.* *

Müller, Natursyst. II. p. 511. *die Ohrtaube.*
Halle, Vögel, p. 472. n 502. *die Turteltaube mit Ohren.*
Klein, av. p. 119. n. 12. Turtur auritus; *Eardowe.*
Klein, Vorbereit. p. 221. *Turteltaube mit Ohren.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 124. n. 12. *Ohrtaube.*
Büffon, Vögel, VI. p. 281. *Ohrentauben.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 303.
Raji Synops. p. 184 n. 26. Turtur auritus.
Sloane, Jam. p. 304. tab. 262. fig. 2. Eardove.

67. SURINAMENSIS. *Die Surinamische Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 607. n. 50. Columba (Surinamensis) cinerea subtus alba, gula viridi nigroque varia, rostro caeruleo.
Fermin, Surin. II. p. 144. *die Turteltaube.*

33. RISORIA. *Die Lachtaube.* (2)

Müller, Natursyst. II. p. 512. n. 33 *die Lachtaube.*
Leske, Naturgesch. p. 254. n. 4. *die Lachtaube.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 214. n. 12. *die Lachtaube.*
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 201. n. 5. Columba (Risoria) supra lutescens, lunula cervicali nigra.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 492. n. 4. *die Lachtaube.*
Ebert, Naturl. II. p. 124. *die Lachtaube.*
Halle, Vögel, p. 473. n. 503. *die Lachtaube mit schwarzem Bogen im Nacken.*

Gatterer,

(2) Wird von *Büffon*, *Kramer*, u. a. als eine Spielart oder Abänderung von der gemeinen Turteltaube angesehen.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 352. n. 276. *die Lachtaube.*

Neuer Schaupl. d. Nat. V. p. 6. *Lachtaube.*

Onomat. hist. nat. III. p. 188. *die gemeine Turteltaube.*

Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 118. *die Lachtaube.*

Klein, av. p. 119. n. 13. Columba turtur indica.

Klein, Vorbereit. p. 221. n. 13. *Lachtaube aus Indien.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 124. n. 13. *Lachtaube.*

Klein, Vögeleyer, p. 32. tab. 16. fig. 4.

Brisson, ornith. I. p. 22. n. 8. Tourterelle à collier.

Büffon, Vögel, VI. p. 271. 279. 282. *die Lachtaube;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 428. *die Lachtaube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 607. n. 51. Columba (Risoria) supra lutescens, subtus alba, lunula cervicali nigra.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 405. *die Lachtaube.*

Fischer, Liv. p. 92. n. 127. *Lachtaube.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 150. n. 182. *die Lachtaube.*

Naturforsch. XVII. p. 76. n. 159. *die Lachtaube.*

Börner, Stadt- und Landwirthsch. II. p. 137. n. 5.

Leipz. ökonom. Abhandl. II. p. 158.

Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 97.

Bresl. Natur- u. Kunstgesch. Vers. 19. p. 182.

Borkhausen, Magazin, I. p. 209. n. 88.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 165. n. 21. Columba (Risoria) supra lutescens lunula cervicali nigra.

Kramer, Austr. p. 359. n. 3. β. Turtur; *einheimische Turteltaube, Lachtaube.*

Brünniche, ornith. bor. p. 63. n. 220. Columba risoria. Turteldae.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 364. Turtur turcicus. *Lachendes Teublin; Türkisch Teublin; Indianisch Turtur Teublin.*

Jonston, av. p. 92. Turtur indicus.

Bomare, Diction. XI. p. 442. — Diction. des anim. IV. p. 412.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 341. n. 8. *die Lachtaube.*

β. *Die graue chinesische Lachtaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 649. Chinese grey Turtle.

Latham, Syst. ornith. II. p. 608. n. 51. β. Col. fusca subtus vinaceo-grisea, vertice griseo, cervice lunula nigra maculis albis, rectricibus lateralibus nigris, albo maculatis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. China, II. p. 137. *die graue chinesische Turteltaube.*

γ. *Die Bastardlachtaube.*

Müller, Natursystem, II. p. 512. *die Bastardturteltaube.*

Brisson, ornithol. I. p. 22. n. 8. A. Tourterelle Mulet.

Büffon, Vögel, VI. p. 279. *Zwittertaube.*

Latham, Syn. II. 2. p. 649. Hebridal Turtle.

Latham, Syst. ornith. II. p. 608. n. 51. γ. Turtur hybridus.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 365. Turtur mixtus; *Zwitter Turtel Taube.*

δ. *Die weiße Lachtaube.* *

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 117. n. 7.
Naturforsch. XVI. p. 47. n. 5.

34. Pas-

34. PASSERINA. *Die Sperlingstaube.* (3)

Müller, Naturſyſt. II. p. 512. n. 34. *die Sperlingstaube.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 493 n. 6. *die Sperlingstaube.*

Halle, Vögel, p. 473. n. 504. *die Jalouſietaube.*

Halle, Vögel, p. 477. n. 514. *die graue Turteltaube, mit ſchwarzen Schuppen und rothen Schwungfedern.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 188. *die kleinſte gefleckte Turteltaube.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 306. n. 107. *die Erdtaube; Sperlingstaube.*

Klein, av. p. 120. n. 24. Columbus minimus. Turtur minimus guttatus.

Klein, Vorbereit. p. 222. *kleinſte Taube; kleinſte punktirte Turteltaube.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſtor. p. 124. n. 24. *kleinſte Turteltaube.*

Briſſon, ornith. I. p. 27. n. 19. petite Tourterelle d'Amerique.

Büffon, Vögel, VI. p. 313. *die Sperlingstaube; Kokozin;* m. 2. Figg.

Batſch, Thiere, I. p. 429. *die Sperlingstaube.*

Latham, Syn. Suppl. p. 100. Ground Pigeon.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 611. n. 67. Columba (Paſſerina) rectricibus remigibusque obſcurioribus, corpore purpuraſcente, roſtro pedibusque flavis.

Seligmann, Vögel, I. tab. 52. *die kleinſte gefleckte Turteltaube.*

(3) Liebt beſonders die Beeren des Zahnwehbaums (Xanthoxylum, Clava Herculis Linn.) wovon ihr Fleiſch einen angenehmen Geſchmack bekömmt. Die franzöſiſchen Inſulaner nennen ſie wegen ihrer groſsen Fettigkeit und des feinen Geſchmacks wegen, *Ortolane.* Jung gefangen werden ſie zahm.

Bankroft, Guian. p. 107. *die kleine Turteltaube des Ray mit gesprenkelten Flügeln.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. p. 151. n. 183. *die ganz kleine amerikanische Taube.*

Neueste Mannigfaltigk. I. p. 570. *Steintauben.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 165. n. 22. Columba (Passerina) rectricibus remigibusque obscurioribus, corpore purpurascente, rostro pedibusque flavis.

Jonston, av. p. 199. Picuipinima.

Pison. hist. nat. p. 86. Picuipinima.

Nouv. voy. aux Isles de l' Amerique, II. p. 237.

35. MINUTA. *Die Zwergtaube.*

Müller, Natursyst. II. p. 512. n. 35. *die Zwergtaube.*

Brisson, ornith. I. p. 28. n. 20. petite Tourterelle brune d' Amerique.

Latham, Syst. ornith. II. p. 612. n. 68. Columba (Minuta) fusca alis punctatis 5. s. 7. chalybeis, rectricibus extimis apice albis.

68. MALACCENSIS. *Die malakkische Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 612. n. 69. Columba (Malaccensis) nigro undulatim lineata, supra cinereo-grisea, subtus cinerea, collo lateribus albo, rectricibus fuscis, lateribus versus apicem albis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 180. *die kleine Turteltaube von Queda.*

69. VERNANS. *Die grüne philippinische Taube.*

Müller, Natursyst. Supplem. p. 132. a. *die grüne Taube.*

Brisson, ornithol. I. p. 37. n. 38. Pigeon vert des Philippines.

Büffon,

Büffon, Vögel, VI. p. 228. *die grüne philippinische Taube*, m. e. Fig. p. 232. *die grüne Taube von der Insel Luçon und Antigua.*

Latham, Syn. II. 2. p. 630. n. 20. Parrot-Pigeon.

Latham, Syst. ornith. II. p. 599. n. 22. Columba (Vernans) viridis subtus flavens, alarum margine exteriore luteo.

Raj. Syn. p. 196. n. 15. tab. 2. fig. 15. Columba maderaspatana, variis coloribus eleganter depicta.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 40. *die grüne Taube der Insel Luçon und Antigua;* m. 2. Figg. M. u. Weibch.

** *Mit langen keilförmigen Schwänzen.*

36. MIGRATORIA. *Die Wandertaube.* (4)

Müller, Natursyst. II. p. 513. n. 36. *die Wandertaube.*

 Leske,

(4) Gewicht, nach *Penn* 9. Unzen. Die Anzahl dieser Vögel, besonders wenn sie wandern, ist ganz ungeheuer, und übersteigt fast allen Glauben. Wenn sie die Noth zwingt, ihren Aufenthalt zu verändern, so fliegen sie millionenweise in einer Herde, und halten im eigentlichen Verstande das Sonnenlicht eine beträchtliche Strecke weit auf. Wo sich ihr Schwarm niederläßt, da richten sie, wie die Heuschrecken, unter den Blumen und Früchten schreckliche Verwüstungen an; und dabey machen sie einen solchen Lärm, dass die Menschen einander weder hören noch verstehen können. Eine nicht sonderlich zahlreiche Gesellschaft von Indianern schlug einst in einer Nacht über 18000. mit Stöcken todt. Auf einen Schuss mit der Muskete werden zuweilen über 120. getödtet. Sie nisten auf Bäumen, bauen in den Wäldern Nest an Nest, und binden durch ihre Nester Baum an Baum viele Meilen weit zusammen. Wenn die Irokesen merken, dass die jungen Tauben flick sind, so hauen sie die Bäume um, und treffen oft auf einem Baume wohl 100. Paar junge Tauben an. Oft brechen die Zweige starker Eichen von

Leske, Naturgesch. p. 254. n. 5. *die Wander-taube.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 214. n. 13. *die Wandertaube, Strichtaube.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 202. n. 6. Columba (Migratoria) orbitis denudatis sanguineis, pectore rufo.

Halle, Vögel, p. 476. n. 510. *die röthliche Waldtaube aus Karolina, mit langem Schwanze, und vergoldeter Schulter.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 332. n. 278. *Wandertaube; Zugtaube; Strichtaube; amerikanische Taube.*

Onomat. hist. nat. III. p. 184. *die langgeschwänzte Taube.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 300. *die Wandertaube.* Tab. 14. ober. Fig.

Klein, av. p. 119. n. 16. Palumbus Carolinensis.

Klein, Vorbereit. p. 221. n. 16. *langgeschwänzte Holztaube aus Karolina.*

Klein, verb. Vögelhistor. p. 124. n. 16. *langgeschwänzte Holztaube.*

Brisson, ornith. I. p. 24. n. 12. Pigeon sauvage d'Amerique.

Büffon, Vögel, VI. p. 225. *die Wandertaube*; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 429. *die Wandertaube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 612. n. 70. Columba (Migratoria) cauda cuneata, orbitis denudatis sanguineis, corpore cinereo, pectore rufo.

Seligmann, Vögel, I. tab. 46. *die Strichtaube.*

Shaw, Reise, p. 352. not. t. *Strichtauben.*

Loskiel,

von dem Gewicht der aufsitzenden Menge, und der Boden unter den Bäumen, worauf sie eine Nacht gesessen haben, ist einige Zoll hoch mit Mist bedeckt. Das Fleisch wird frisch, geräuchert und getrocknet gegessen.

Loskiel, Geschichte der Mission der evangelischen Brüder unter den Indianern in Nordamerika. Barby, 1789. p. 514.

Lichtenberg u. Voigt, Magaz. für das Neueste, etc. VI. 2. p. 168. *wilde Tauben.*

Linné, Abhandlung. II. p. 280. n. 13. *die Schwanz-Tauben.*

Schwed. Abhandl. XXI. p. 268.

Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorseh. I. p. 356.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 164. n. 16. Columba (Macroura) cauda cuneiformi, longa, pectore purpurascente.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 341. n. 9. *die Wandertaube.*

37. Carolinensis. *Die carolinische Taube.*

Müller, Natursyst. II. p. 514. n. 37. *die carolinische Taube.*

Halle, Vögel, p. 478. n. 518. *die Turteltaube, mit einem großen Flecken aus Gold, Karmin, und Grün an der Seite des Halses.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 504. *die Carolinische Taube*, tab. 14. unt. fig.

Klein, av. p. 119. n. 17. Columba Turtur Carolinensis.

Klein, Vorbereit. p. 221. n. 17. *Langgeschwänzte Turtel aus Karolina.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 124. n. 17. *Langgeschwänzte Turteltaube.*

Brisson, ornithol. I. p. 27. n. 18. Tourterelle de la Caroline.

Büffon, Vögel, VI. p. 317. *die Karolinische Turteltaube;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 603. n. 71. Columba (Carolinensis) cauda cuneata, corpore rufo-cinereo subtus rufescente, orbitis caeruleis.

Seligmann, Vögel, I. tab. 48. *die carolinische Turteltaube.*

Jonston, av. p. 199. Picacureba.

70. MELANOPTERA. *Die schwarzgeflügelte Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 615. n. 78. Columba (Melanoptera) cauda cuneata, corpore caerulescente, remigibus nigris.

Molina, Naturgesch. von Chili, p. 208. Columba melanoptera.

38. AMBOINENSIS. *Die braunrothe amboinische Taube.*

Müller, Natursyst. II. p. 514. n. 38. *die amboinische Taube.*

Brisson, ornith. I. p. 31. n. 26. Tourterelle d'Amboine.

Büffon, Vögel, VI. p. 303. *die amboinische Turteltaube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 614. n. 74. Columba (Amboinensis) cauda cuneata, corpore rufo, collo undulato nigricante.

39. CAPENSIS. *Die capsche Taube.*

Müller, Natursyst. II. p. 514. n. 39. *die capsche Taube.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 135. n. 45. *der Schwarzhals.*

Brisson, ornith. I. p. 29. Tourterelle du Cap de bonne esperance.

Büffon, Vögel, VI. p. 293 *das Afrikanische Turteltäubchen; die Turteltaube mit schwarzem Halskragen; das kapische Turteltäubchen;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 614. Columba (Capensis) cauda cuneata, corpore griseo-fusco,

subtus

subtus albo, remigibus primoribus latere interiore rufis.

71. MACROURA. *Der Turocko.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 134. n. 43. *der Langschwanz.*

Büffon, Vögel, VI. p. 292. *der Turokko; die breitschwänzige Senegalische Turteltaube;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 615. n. 76. Columba (Macroura) macroura, cauda cuneata, corpore cinnamomeo subtus albido, rectricibus apice albis.

40. MARGINATA. *Die gerändelte Taube.* (s)

Müller, Natursyst. II. p. 515. n. 40. *die gerändelte Taube.*

Brisson, ornith. I. p. 24. n. 13. Tourterelle d'Amerique.

Halle, Vögel, p. 475. n. 508. *die langschwänzige Turteltaube, Schwanztaube.*

Büffon, Vögel, VI. p. 286. *langgeschwänzte Turteltaube; amerikanische Turteltaube.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 614. n. 73. Columba (Marginata) cauda cuneata, corpore supra fusco, subtus fusco-cinereo, pectore rubro, rectricibus apice nigris, albo marginatis.

Seligmann, Vögel, I. tab. 29. *die langgeschwänzte Taube.*

A. *Ver-*

(s) Nach *Büffon* zu *Columba Canadensis* n. 30 gehörig.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 279. β. Col. domest. Var.	p. 769. n. 2. Col. Domestica —
p. 279. n. 2. Col. Hispanica.	p. 770. n. 2. β. Var.
p. 279. n. 3. Col. Dasypus.	p. 770. n. 2. ε. Var.
p. 280. n. 4. Col. Gutturosa.	p. 771. n. 2. ϱ. Var.
p. 280. n. 5. Col. Cucullata.	p. 770. n. 2. ι. Var.
p. 280. n. 6. Col. Hispida.	p. 770. n. 2. κ. Var.
p. 280. n. 7. Col. Turbita.	p. 770. n. 2. λ. Var.
p. 280. n. 8. Col. Laticauda.	p. 770. n. 2. μ. Var.
p. 280. n. 9. Col. Gyratrix.	p. 771. n. 2. ν. Var.
p. 280. n. 10. Col. Galeata.	p. 771. n. 2. ξ. Var.
p. 281. n. 11. Col. Turcica.	p. 771. n. 2. ο. Var.
p. 281. n. 12. Col. Tabellaria.	p. 771. n. 2. π. Var.

Das Geschlecht ist, der Anzahl nach, mit 31. Gattungen vermehrt. Wenn man aber hiezu nimmt, dass 11. Gattungen der XII. Edition jetzt nur als Varietäten angenommen, und deren Stellen mit andern besetzt worden, so beträgt die Summe der neuhinzugekommenen Gattungen 42. Auch die Spielarten β. γ. ζ. η. ϑ. σ. τ. υ. φ. von Nro. 2. sind neu. — Bey der 21ten Gattung ist die Varietät β; bey der 22ten die Var. β; bey der 24ten die Var. β; bey der 29ten die Var. β; bey der 32ten die Varietäten β. γ. δ. ε; bey der 33ten die Var. β. γ; bey der 34ten die Var. β. γ. δ. hinzugekommen.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Die Waalia* in Abyssinien.

Brüce, Reis. nach den Quellen des Nils, V. p. 188. n. 8. tab. 38. *Waalia.*

Gmelin, Anhang zu Brüce Reisen, p. 31. Columba viridis, subtus flava, alarum tectricibus purpureis,

pureis, remigibus nigris apice albidis, cauda fordide caerulescente, subtus fulvo alboque varia.

Meyer, Ueberficht des neueft. zool. Entdeck. Lpz. 1793. p. 128. n. 6.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Die olivenfarbige Taube mit purpurfarbenen Schultern, in Indien.*

Latham, Syn. Suppl. p. 201. n. 60. β. Pourple fhouldered Pigeon.

Latham, Syft. ornith. II. p. 597. n. 13. Columba (Phoenicoptera) olivacea, fubtus cinerafcens, capite colloque flavefcentibus, tectricibus alarum minoribus purpurafcentibus, maioribus remigibusque fecundariis albo nigroque ftriatis.

2. *Die afiatifche Taube.*

Latham, Syn. Suppl. p. 202. n. 60. γ. Indian Pigeon.

Latham, Syft. ornith. II. p. 597. n. 14. Columba (Afiatica) cinereo viridis, capite cinereo, macula alarum corporeque fubtus albo, remigibus nigris, albo extus marginatis.

3. *Die Taube von der Infel Tanna.*

Latham, Syft. ornith. II. p. 600. n. 26. Columba (Tannenfis) viridis, tectricibus alarum albomaculatis, remigibus fecundariis ad apicem margine flavis.

Vielleicht eine Spielart von *Columba Curviroftra* Gmel. Syft. p. 777. n. 45.

4. *Die braune neufeeländifche Taube.*

Latham, Syft. ornith. II. p. 603. n. 38. Columba (Brunnea) pileo, collo fupra, dorfo tectricibusque

que alarum brunneis, pectore collo, subtus uropygioque viridi splendidis.

5. *Die goldflüglige Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 604. n. 39. Columba (Chalcoptera) fusco-cinerea, rufo-marginata, fronte gulaque albis, fascia alarum cupereo-aurea bifida, rectricum ad apicem nigra.

White, Reis. nach Neu-Süd-Wallis, — in dem Magaz. merkw. Reisebeschr. V. p. 129. *die goldflügelichte Taube.*

6. *Die bantamische Taube.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 615. n. 77. Columba (Bantamensis) cauda cuneata, orbitis denudatis carneis, collo, pectore hypochondriisque albo nigroque undulatis.

Mus. Carlson. fasc. III. tab. 67. Columba Bantamensis.

7. *Die Taube von St. Domingo.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 615. n. 79. Columba (Dominicensis) cauda cuneata, corpore griseo, capite subtus albo, macula verticis, fascia sub oculis et torque colli nigris.

Büffon, pl. enl. 487. Tourterelle de St. Domingue.

105. GESCHLECHT. ALAUDA. *Die Lerche.*

Müller, Natursyst. II. p. 517. Gen. CV.
Leske, Naturgesch. p. 254. Gen. XXXVII.
Borowsky, Thierreich, III. p. 195. Gen. LXXIII.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 179. Gen. XXVII.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 493. Gen. LXIV.
Ebert, Naturl. II. p. 125.

Halle,

Halle, Vögel, p. 305. Gen. VI.
Pennant, arct. Zool. II. p. 365.
Neuer Schaupl. d. Nat. V. p. 92.
Onomat. hist. nat. I. p. 234.
Klein, av. p. 71. Gen. VI.
Brisson, ornith. I. p. 404. Gen. XXXIX.
Büffon, Vögel, XIV. p. 152. ff.
Batsch, Thiere, I. p. 317. Gen. LXXIV.
Latham, Syst. ornith. II. p. 491. Gen. XLI.
Hermann, tab. affin. anim. p. 210.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 342. Gen. LXXII.

1. Arvensis. *Die Feldlerche.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 517. n. 1. *die Ackerlerche.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 196. n. 2. *die Acker-Feld-, Saat-, Himmel-; Sanglerche.*
Blumenbach, Handb. d. N.G. p. 179. n. 1. Alauda (Arvensis) rectricibus extimis duabus extrorsum longitudinaliter albis; intermediis inferiori latere ferrugineis. *Feldlerche; Pardale.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 494. n. 1. *Feldlerche; gemeine Acker- oder Sandlerche.*
Funke, Naturgesch. I. p. 231. *die Ackerlerche.*
Ebert, Naturl. II. p. 125. *die Ackerlerche.*
Halle, Vögel, p. 306. n. 271. *die Feldlerche.*
Meyer, Thiere, II. tab. 98. *Feldlerche.*
Neuer Schaupl. der Natur, V. p. 94. n. 1. *Ackerlerche.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 377. n. 307. *die Lerche.*
Onomat. hist. nat. I. p. 240. *Kornlerche, Weglerche, Brachlerche.*

Pennant,

(6) Flügelweite 12 1/2 Zoll, Gewicht 1 1/2 Unzen, *Penn.* Kann über 24 Jahre alt werden. —

Pennant, arct. Zool. II. p. 367. A. *die Feldlerche.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 122. *Saatlerche.*

Beckmann, Naturhist. p. 51. *Die Lerche.*

Klein, av. p. 71. n. 1. Alauda simpliciter.

Klein, Vorbereit. p. 134. n. 1. *Himmellerche.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 72. n. 1. *Himmelslerche.*

Klein, Stemmat. av. p. 13. tab. 15. Fig. 1. a. b. c. d.

Klein, Vögeleyer, p. 23. tab. 9. Fig. 1.

Gesner, Vögelb. p. 316. *Heidlerch*, *Gesanglerch*, *Himmellerch*, *Holzlerch*, fig. p. 317.

Brisson, ornith. I. p. 404. n. 1. Alouette.

Büffon, Vögel, XIV. p. 152. *die Lerche;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 343. *Saatlerche.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 491. n. 1. Alauda (Arvensis) nigricante-griseo-rufescente et albido vario, subtus rufo-alba, rectricibus extimis duabus extrorsum longitudinaliter albis, intermediis interiori latere ferrugineis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 72. n. 153. *die Feldlerche.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 104. n. 1. *die Feldlerche*, *Leewaark.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 406. *die Ackerlerche.*

Cetti, Sardin. II. p. 143. *die Ackerlerche.*

Fischer, Livl. p. 92. n. 128. *Feldlerche.*

White, N. G. von Engl. p. 63. n. 7. p. 66. n. 1. *Feldlerche.*

Georgi, Reis. I. p. 173. *Feldlerche; Shawaronok.*

Pallas, nord. Beytr. III. p. 14. IV. p. 14. *die gemeine Feldlerche.*

Pontoppidan, Dännem. p. 172. n. 1. *Sanglerche.*

Pontoppidan, Norweg. II. p. 158. *Sang-Lerke.*

Kolbe,

Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffn. Ed. in 4. p. 398. *die Lerche.*

Forskål, fn. orient. p. VII. n. 16. Alauda arvensis. *Kunbar* vel *Kombara.*

Linné, Abhandlung. II. p. 300. n. 113. *die Acker-Lerche.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 289. *die Feldlerche.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 58. *Feldlerche.*

Naumann, Vogelsteller, p. 178. *die Lerche.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 152. n. 184. *die Feldlerche.*

Forstlex. II. p. 688. *Feld- oder Kornlerche.*

Martini, Naturlex. I. p. 226. *Ackerlerche.*

Oekon. Zool. p. 92. n. 33. *Ackerlerche.*

Naturforsch. XVII. p. 77. n. 160. *die Ackerlerche.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 681. *die Lerche.*

Meidinger, Vorles. I. p. 146. n. 1. *die gemeine Lerche.*

Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 294. *Lerche.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 120. *die Lerche oder Feldlerche.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 598. *Lerche.*

Börner, schlesische ökonom. Nachr. 1781. p. 97. n. 179

Eberhard, Thiergesch. p. 83. *die Lerche.*

Hannöv. Magaz. 1779. p. 130.

Zückert, Speis. aus d. Thierreich, p. 95.

Merklein, Thierreich, p. 307. *Lerche.*

Hamburg. Magaz. VII. p. 161.

Geoffroy, mater. med. VII. p. 280. *die gemeine Lerche.*

Valentini, Alaudarum commessio minus laudabilis. — Eph. nat. cur. Vol. II. Obs. 120. p. 278.

Goeze, nützl. Allerl. I. p. 18.

Anweis. Vögel zu fang. p. 358. *die Lerche.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 166. n. 37.
André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 228. 233.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. Alauda.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 165. n. 1. Alauda (Arvensis) rectricibus extimis duabus extrorsum longitudinaliter albis, intermediis interiore latere ferrugineis.
Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 229. Alauda (Arvensis) rectricibus extimis duabus extrorsum longitudinaliter albis, intermediis interiore latere ferrugineis.
Charleton, exercitat. p. 88. Alauda.
Charleton, onom. zoic. p. 80. n. 8. Alauda.
Moehring, av. gen. p. 43. n. 32. Alauda.
Schwenkfeld, av Siles. p 191. Alauda vertice plano; coelipeta; *Feldlerche; große Lerche; Himmellerche.*
Sibbald, Scot. p. 364. Alauda vulgaris.
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 354. Alauda non cristata; alauda terrena.
Belon, hist. nat. des ois. p. 269. Alauda non cristata seu gregalis. *Alouette.*
Jonston, av. p. 99. Alauda, p. 100. Alauda non cristata.
Schaefer, element. ornithol. tab. 18.
Zinnan. Uov. p. 55. tab. 8. fig. 43. Lodola.
Herkens, av. Fris. p. 1. Alauda.
Bomare, diction. I. p. 157. Alouette ordinaire.
Salerne, hist. nat. des Ois. p. 90. Alavette.
Du Tertre, hist. des Antill. II. p. 55.
Sloane, Jamaic. I. p. 51.
Vie du Comte Marsigli P. X. p. 148.
Aristot. hist. anim. L. 4. c. 1. L. 9. c. 25. Κορυδος.
Aelian. de nat. anim. L. 1. c. 35. L. 3. c. 30. L. 4. c. 5. L. 6. c. 46. L. 16. cap. 5. Κορυδος, Κορυδαλος.

Donndorff,

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 342. n. 1. *die gemeine Lerche.*

β. *Die weiße Lerche.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 599. *b. die weiße Lerche.*

Klein, av. p. 72. n. 4. Alauda alba.

Klein, Vorbereit. p. 135. n. 4. *weiße Lerche.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 72. n. 4. *weiße Lerche.*

Brisson, ornith. I. p. 405. A. Alouette blanche.

Büffon, Vögel, XIV. p. 181. *die weiße Lerche;* m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 369. A. White Lark.

Latham, Syst. ornith. II. p. 491. n. 1. β. Alauda candida.

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 7. *weißgraue Lerche.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 105. n. 1. β. *die weiße Feldlerche.*

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 116. n. 5.

Naturforsch. I. p. 63. n. 9. — XIII. p. 17. — XVI. p. 48. n. 1. *weiße Lerche.*

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. ad n. 229.

Brünniche, ornith. bor. p. 63. ad n. 222.

Barrere, Sp. nov. cl. III. Gen. 16. p. 40. Alauda alba sine crista.

γ. *Die schwarze Lerche.*

Halle, Vögel, p. 316. n. 280. *die schwarze Lerche.*

Brisson, ornith. I. p. 405. B. Alouette noire.

Büffon, Vögel, XIV. p. 186. *die schwarze Lerche;* m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 370. Dusky Lark.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 492. n. 1. β. Alauda nigra.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 14. *die schwarze astrachanische Lerche.*

Naturforscher, II. p. 2. n. 4. *die schwarze Lerche.*

δ. *Die langfüßige Lerche.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 492. n. 1. δ.

7. RUFA. *Die schwarzbraune Lerche.* (7)

Büffon, Vögel, XIV. p. 188. *die schwarze Lerche mit falben Rücken.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 492. n. 2. Alauda (*Fulva*) fusco-nigricans, cervice, dorso scapularibusque rufo-aurantiis, alis caudaque obscuris.

2. PRATENSIS. *Die Wiesenlerche.* (8)

Müller, Natursystem, II. p. 518. n. 2. *die Wiesenlerche.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 198. n. 3. *die Wiesenlerche; Brachlerche.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 496. *die Wiesenlerche; Hüster.*

Ebert, Naturl. II. p. 125. *die Wiesen- oder Brachlerche.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 378. n. 308. *Wiesenlerche; Löwerke.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 368. C. *die Wiesenlerche.*

Neuer Schaupl. der Nat. V. p. 94. n. 2. *Wiesenlerche.*

Onomat. hist. nat. I. p. 245. *die Wiesenlerche.*

Klein, stemmat. av. p. 13. tab. 15. fig. 2. a—c. Alauda stratorum?

Brisson, ornith. I. p. 406. n. 3. Alouette du Prez, ou la Farlouse.

Büffon,

(7) Die Trivialbenennung: *Rufa*, kommt im Syst. p. 798. n. 28. nochmals vor.

(8) *Bock*, *Fischer*, u. a. wollen sie als eine Abart von der Feldlerche ansehen.

Büffon, Vögel, XIV. p. 203. *die Wiesenlerche*, p. 204. *kleine Lerche, Holz- oder Heidelerche, Bastardlerche; Buschlerche; Gartenlerche.*

Batsch, Thiere, I. p. 344. *Wiesenlerche.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 493. n. 5. Alauda (Pratensis) viridi-fusca, rectricibus duabus extrorsum albis, linea superciliari alba.

Fischer, Livl. p. 92. n. 129. *Wiesenlerche; Himmelsleiche.*

Cetti, Sardin. II. p. 148. *die Wiesenlerche.*

White, N. G. von England, p. 63. n. 10. p. 66. n. 2. *Wiesenlerche.*

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 2. *Englerke.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 105. n. 2. *die Wiesenlerche.*

Meidinger, Vorles. I. p. 146. n. 2. *die Wiesenlerche.*

Eberhard, Thiergesch. p. 84 *die Wiesenlerche.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 168. n. 38.

Linné, Abhandl. II. p. 300. n. 112. *die Wiesenlerche.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 123. *die Wiesenlerche.*

André u. Bechstein, Spazierg. IV. p. 99.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 2. Alauda pratensis.

Linné, Syst. nat. Ed. X. I. p. 166. n. 2. Alauda (Pratensis) rectricibus extimis duabus extrorsum albis, linea superciliorum alba.

Charleton, onom. zoic. p. 81. n. 3. Alauda pratensis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 230. Alauda (Pratensis) rectricibus extimis duabus extrorsum albis, linea superciliorum alba.

Belon, hist. nat. des ois. p. 271. Farlouse, fallope, alouette de près.

Jonston, av. p. 101. Alauda pratorum.
Zinnan. Uov. p. 55. tab. 8. fig. 44. Mattolina?
Zinnan. Uov. p. 50. tab. 7. fig. 37. Spippola minore.
Hermann, tab. affin. anim. p. 215. Alauda pratensis.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 43. n. 2. *die Wiesenlerche.*

β. *Die weiße Wiesenlerche.* (9)
Brisson, ornith. I. p. 407. A. Farlouse blanche.
Büffon, Vögel, XIV. p. 213. *die weiße Wiesenlerche.*
Büffon, oiſ. IX. p. 51. Varieté de la Farlouse.

δ. *Die schwarzfüßige Wiesenlerche.*

ε. *Die ganz schwarze Wiesenlerche.* *
Beseke, Vögel Kurl. p. 72. n. 154.

12. MINOR. *Die kleine Feldlerche.* (10)
Pennant, arct. Zool. II. p. 368. D. *die Brachlerche.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 494. n. 8. Alauda (Minor) rubro-fusca, subtus maculata, gula abdomineque albis, iugulo pectoreque obscure flavescentibus.
Britt. zool. Nro. 139. Field-Lark.

13. ITALICA. *Die italienische Lerche.* (1)
Halle, Vögel, p. 315. n. 278. *die Wachtellerche.*
Brisson,

(9) *Brisson* rechnet hieher auch die *Spipola alba sive Bonrina Aldr.* ingl. die *Spipola tertia Jonst. Willugb. Raj* u. *Rzac.*

(10) Unter den Synonymen dieser und der *vierten* Gattung herrscht grosse Verwechselung; in der arct. Zool. werden beyde für einerley angenommen, und *Büffons Farlouzanne* (Alauda Ludoviciana n. 4) als Abart davon angesehen.

(1) *Latham* ist geneigt, sie als eine Spielart von *Alauda arborea* anzusehen.

Brisson, ornith. I. p. 409. n. 7. Alouette d'Italie.
Büffon, Vögel, XIV. p. 235. *die Giarola.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 492. n. 4. Alauda (Italica) fusco castanea, subtus alba, capite vitta annulari albicante, rectrice extima alba, proxima apice alba.
Naturgesch. aus den besten Schriftst. VII. p. 696. *die italienische Lerche.*

3. ARBOREA. *Die Baumlerche.* (2)

Müller, Natursyst. II. p. 519. n. 3. *die Baumlerche.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 198. n. 4. *Waldlerche, Heidelerche, Baumlerche.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 495. n. 2. *die Waldlerche, Dullerche.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 597. *die Waldlerche.*
Ebert, Naturl. II. p. 125. *Heidelerche.*
Halle, Vögel, p. 310. n. 272. *die Waldlerche.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 379. n. 309. *die Baumlerche; Gereutlerche; Schmervogel.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 367. B. *die Waldlerche.*
Neuer Schaupl. d. Nat. V. p. 93. *Heide-Waldlerche*, p. 94. n. 3. *Baumlerche.*
Onomat. hist. nat. I. p. 238. *Heidelerche, Buschlerche, Holzlerche.*
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 122. *Heidelerche.*
Klein, av. p. 71. n. 2. Alauda sylvestris, pratorum.
Klein, Vorbereit. p. 135. n. 2. *Heide- Wiese. Brach- Mittel- Wald- Steinlerche.*

(2) Die *Baumlerche*, *Wiesenlerche*, *Piplerche* und *Gerenthlerche* werden von den mehresten Schriftstellern verwechselt.

Klein, verb. Vögelhist. p. 72. n. 2. *Wiesenlerche, Brachlerche.*

Klein, stemmat. av. p. 13. tab. 15. fig. 4. a—c.

Klein, Vögeleyer, p. 24. tab. 9. fig. 5.

Brisson, ornith. I. p. 405. n. 2. Alouette de bois ou Cujelier.

Büffon, Vögel, XIV. p. 190. *die Baum- oder Waldlerche.*

Batsch, Thiere, I. p. 314. *die Waldlerche.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 492. n. 3. Alauda (Arborea) varia, capite vitta annulari alba cincto.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 106. n. 3. *die Baumlerche.*

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 3. *Heedelerke, Pibelerke.*

Linné, Abhandlung. II. p. 300. n. 112. *die Baumlerche.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 407. *die Baumlerche; Haidelerche.*

Cetti, Sardin. II. p. 145. *die Baumlerche.*

White, N. G. von Engl. p. 62. n. 2. p. 63. n. 1. p. 66. n. 3. et 5. *Holzlerche.*

Fischer, Liv. p. 92. n. 130. *Baumlerche.*

André u. Bechstein, Spazierg. III. p. 145. 150.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 122. *Baumlerche, Waldlerche.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 153. n. 186. *Baumlerche, Heydelerche.*

Naturforsch. XVII. p. 78. n. 161. *Baumlerche.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 292. *die Heide-Lerche.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 59. *Heidelerche.*

Onomat. forestal. II. p. 695. *die Heidelerche.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 169. n. 40.

Börner, schlesische ökonom. Gesellschaft 1781. p. 98.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 687. *Heidelerche.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 2. Alauda arborea.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 166. n. 3. Alauda (Arborea) capite vitta annulari alba cincto.

Müller, zool. dan. prodr. p. 28. n. 231. Alauda (Arborea) capite vitta annulari alba cincta.

Kramer, Austr. p. 362. n. 3. Alauda lineola superciliorum alba, torque in collo pallido, cauda brevissima; *Ludllerche, Waldlerche.*

Charleton, onomast. zoic. p. 81. n. 2. Alauda arborea.

Charleton, exercitat. p. 88. Alauda arborea.

Sibbald, Scot. p. 249 Alauda arborea.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 137. Alauda arborea.

Barrere, Sp. nov. class. III. Gen. 16. p. 40. Alauda non cristata fusca.

Zinnan. Uov. p. 55. tab. 8. fig. 44. Mattolina?

Hermann, tab. affin. anim. p. 215. Alauda arborea.

Bomare, diction. I. p. 159. Alouette des bois.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 343. n. 3. *die Baumlerche.*

14. LUDOVICIANA. *Die louisianische Lerche.* (3)

Büffon, Vögel, XIV. p. 216. *die Louisianische Lerche oder Farlousanne.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 368. ad D. *Farluzzanne.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 494. n. 9. Alauda (Ludoviciana) fusco nigricans, subtus fulva, iugulo pectoreque flavescente-griseis, pectore fusco-maculato.

(3) Nach *Pennant* eine Spielart von *Alauda minor* n. 12. dem auch *Latham* beyzupflichten nicht abgeneigt ist. *Büffon* sagt, sie habe viel Aehnliches mit der *Wiesenlerche.*

15. Rubra. *Die pensylvanische Lerche.*

Brisson, ornithol. I. p. 413. n. 13. Alouette de Pensylvanie.

Büffon, Vögel, XIV. p. 253. *die pensylvanische Lerche;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 494. n. 10. Alauda (Rubra) obscure fusca, subtus fulvo-rufescens, maculis fuscis varia, genis nigricantibus, superciliis pallide rufis.

Pennant, arct. Zool. II. p. 366. n. 196. *die rothe Lerche.*

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 87. *pensylvanische Lerche.*

Brittische Thiergesch. p. 102. n. 5. *die englische Rothlerche.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 126. *die rotbäkkigte pensylvanische Lerche.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 700. *die Lerche mit braunen Backen aus Pensylvanien.*

16. Mosellana. *Die Morastlerche.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 255. *die Morastlerche;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 495. n. 1. Alauda (Mosellana) rufa fusco-varia, subtus rufescens, pectore fusco-maculato, fasciis tribus subocularibus fuscis.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 701. *die Sumpflerche.*

4. Campestris. *Die Gereuthlerche.*

Müller, Natursyst. II. p. 519. n. 4. *die Feldlerche.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 199. n. 5. *die Feldlerche; braunfalbe Lerche, Guckerlein.*

Halle,

Halle, Vögel, p. 312. ad n. 272. *die Gereutlerche.* (mit der Heidelerche und Wiesenlerche verwechselt.)

Klein, Stemmat. av. p. 13. tab. 15. Fig. 3. a—c. Alauda dumetorum.

Brisson, ornith. I. p. 408. n. 5. Alouette de champ.

Büffon, Vögel, XIV. p. 224. *die Gereuthlerche, Brachlerche oder Spipolette;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 344. *die Feldlerche.*

Gesner, Vögelb. p. 143. *Gickerlein*, *Guckerlein*, *Grienvögelein;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 495. n. 12. Alauda (Campestris) rectricibus fuscis, inferiore medietate, exceptis intermediis duabus, albis, gula pectoreque flavescente.

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 4. *Marklerke.*

Linné, Abhandlung, II. p. 300. n. 112. *die Feldlerche.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 107. n. 4. *die Brachlerche.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 59. *Spießlerche; Krautvögelgen.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 168. n. 39. *Brachlerche.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 297. *die Brach- oder Kothlerche.*

Storr, Alpenreise, I. p. 78. *Feldlerche.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 125. *Spipolette.*

Schrift. der berlin. Gesellsch. N. Fr. VII. p. 465. n. 52. *die Feldlerche.*

Naturgesch. aus den best. Schriftst. VIII. p. 694. *die Gereuthlerche.*

Börner, schles. ökon. patr. Gesellsch. 1781. p. 98. Alauda campestris.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 4. Alauda campestris.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 166. n. 4. Alauda (Campestris) rectricibus fuscis, inferiori medietate, exceptis intermediis duabus, albis, gula pectoreque flavescente.

Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 232. Alauda (Campestris) rectricibus fuscis, inferiori medietate, exceptis intermediis duabus, albis, gula pectoreque flavescente.

Brünniche, ornith. bor. p. 64. n. 226. Alauda campestris.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 349. Stoparola, Acredula, Glariana; *Stoppelvogel; Stöpling; Spies-Lörche; Grienvögelin; Greinerlin; Gückerlin.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 42. *Zdzoto.*

β. SPINOLETTA. *Die florentinische Lerche.* (4)

Müller, Natursyst. II. p. 520. n. 7. *die florentinische Lerche.*

Halle, Vögel, p. 316. n. 279. *die braunfalbe Lerche.*

Latham, Syn. II. 2. p. 378. n. 10. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 495. n. 12. β. A. rectricibus fuscis, extimis duabus oblique dimidiato albis.

Büffon, Vögel, XIV. p. 233. *die Spinoletta.*

Cetti, Sardin. II. p. 149. *die florentinische Lerche.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 153. n. 187. Alauda Spinoletta.

Borkhausen, Magazin, I. p. 169. n. 39. β.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 125. Spinoletta.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 166. n. 7. Alauda (Spinoletta) rectricibus fuscis, extimis duabus oblique dimidiato-albis.

17. MA-

(4) Länge, nach *Cetti*, nicht über 5 Zoll.

17. MALABARICA. *Die malabarische Lerche.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 495. n. 13. Alauda (Malabarica) fusca, pennis rufo-marginatis, apice albo-maculatis, collo rufescente, maculis sagittatis nigris.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 158. *die Haubenlerche von der Küste Malabar*, tab. 113. Fig. 1.

18. GINGICA. *Die Lerche aus Gingi.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 496. n. 14. Alauda (Gingica) cinereo-rufa, capite cinereo, subtus vittaque per oculos nigra.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 158. *die kleine graue Lerche aus Gingi*, tab. 113. Fig. 2.

19. TATARICA. *Die tatarische Lerche.* (s)

Müller, Natursyst. Suppl. p. 136. *die Tartarlerche.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 287. *die schwarze Steppenlerche, oder die tatarische Lerche*; m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 177. Black Lark.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 496. n. 15. Alauda (Tatarica) fusco-nigricans, pennis albido-marginatis, remigibus rectricibusque nigris.

Pallas, Reis. III. p. 647. *die schwarze Steppenlerche.*

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 8. n. 15. Alauda tatarica, tab. C.

Pallas, Reis. Ausz. II. p. 240. III. p. 365. 474. *die schwarze Steppenlerche.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 216. Alauda tatarica.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 343. n. 4. *die schwarze Steppenlerche.*

20. Mu-

(s) *Latham* rechnet hieher auch die *Tanagra Sibirica*, Syst Gmel. p. 899. n. 42.

20. MUTABILIS. *Die veränderliche Lerche.* (6)

Büffon, Vögel, XIV. p. 289. *die veränderliche Lerche.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 496. n. 15. β. A. nigra, pennis margine canis, subtus toto nigra, remigibus rectricibusque fuscis.

5. TRIVIALIS. *Die Piplerche.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 519. n. 5. *die Pieplerche.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 200. n. 6. *die Pieplerche, Leimvogel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 496. n. 4. *die Pieplerche, Gereuthlerche, Heidelerche.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 598. *die Pieplerche.*

Ebert, Naturl. II. p. 126. *die Pieplerche.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 260. *Piplerche.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 123. *die Pipplerche.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 392. L. *Der Grashüpfer; die Pieplerche.*

Klein, av. p. 71. ad n. 2. Alauda fistulans.

Klein, Vorbereit. p. 135. n. 2. *Pfeif- oder Pieplerche.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 72. n. 2. *Pfeiflerche.*

Brisson, ornith. I. p. 407. n. 4. Alouette de buisson.

Büffon, Vögel, XIV. p. 218. *die Piplerche;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 344. *die Piplerche.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 493. n. 6. Alauda (Trivialis) nigricante et olivaceo-varia, subtus

(6) Nach *Latham* eine Varietät von *Alauda Tatarica*, n. 19.

(7) Aus den verschiedenen Synonymen, welche sich von dieser und andern Gattungen bey den Naturhistorikern finden, läßt sich beurtheilen, wie schwankend und unzuverläßig, besonders die deutschen Benennungen, bey den Lerchenarten sind.

tus albo flavicans, maculis nigricantibus, rectrice extima dimidiato, secunda apice alba.

Brittisch. Thiergesch. p. 103. tab. 50. fig. *Buschlerche.*

White, N. G. von Engl. p. 33. p. 34. n. 14. p. 59. n. 14. *die Pieplerche.*

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 5. *Havelerke.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 298 *die Pip-Lerche.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 124. *die Pieplerche.*

Naturgesch. aus den best. Schriftst. VIII. p. 692. *Pieplerche.*

Börner, Schles. patriotisch. Schrift. 1781. p. 98. n. 183.

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 104.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 108. n. 5. *die Pieplerche.*

Meidinger, Vorles. I. p. 146. n. 4. *die Pieplerche.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 166. n. 5. Alauda (Trivialis) rectricibus fuscis, extima dimidiato alba, secunda apice cuneiformi alba, linea alarum duplici alba.

Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 233. Alauda (Trivialis) rectricibus fuscis, extima dimidiato alba, secunda apice cuneiformi alba, linea alarum duplici albida.

Brünniche, ornith. bor. p. 64. n. 227. Alauda Trivialis. *Hauge-Hylde-Pibe-Lerke.*

Jonston, av. p. 122. Anthos?

Hermann, tab. affin. anim. p. 215. Alauda trivialis.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 344. n. 5. *die Piplerche.*

6. Cristata. *Die Haubenlerche.*

Müller, Natursyst. II. p. 520. n. 6. *die Haubenlerche.*

Müller,

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 136. n. 13. *der Roſtflügel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 200. n. 7. *die Haubenlerche, Kobellerche, Kothmönch.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 180. n. 2. Alauda (Criſtata) rectricibus nigris, extimis duabus margine exteriori albis, capite criſtato. *Haubenlerche, Heidelerche.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 496. n. 5. *die Haubenlerche.*

Ebert, Naturl. II. p. 125. *Heidelerche; Haubenlerche.*

Halle, Vögel, p. 312. n. 273. *die Haubenlerche;* Fig. 17.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 379. n. 311. *Haubenlerche, Schopflerche.*

Neuer Schaupl. d. N. V. p. 94. n. 6. *gehaubte Lerche.*

Klein, av. p. 71. n. 3. Alauda capitata criſtata, viarum.

Klein, Vorbereit. p. 135. n. 3. *Kobel-Koth-Wege-Heubellerche.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 72. n. 3. *Kobellerche, Wegelerche, Kothlerche.*

Klein, Stemmat. av. p. 13. tab. 15. Fig. 6. a—c.

Klein, Vögeleyer, tab. 9. Fig. 4.?

Briſſon, ornith. I. p. 410. n. 8. Alouette hupée, ou Cochevis.

Büffon, Vögel, XIV. p. 265. *die Zopflerche;* m. e. Fig. p. 267. *Weinlerche; Kammlerche; gehörnte Lerche; Lerche von Brie; *große Lerche.*

Batſch, Thiere, I. p. 344. *die Haubenlerche.*

Gesner, Vögelb. p. 360. *Heubellerch, Kobellerch, Weglerch*, fig. p. 361.

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 499. n. 25. Alauda (Cristata) rectricibus nigris, extimis duabus margine exteriore albis, capite cristato.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 408. *die Haubenlerche, Schubslerche.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 109. n. 6. *die Haubenlerche, Töppellerch; Heidlerch.*

Cetti, Sardin. II. p. 146. *die Haubenlerche.* *

Fischer, Livl. p. 92. n. 131. *Haubenlerche, Wegelerche.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 152. n. 185. *die Schopflerche.*

Naturforsch. XVII. p. 79. n. 162. *die Haubenlerche.*

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 6. *Toplerke.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 224. *die Heidelerche.*

Naumann, Vogelsteller, p. 74. *Heidelerche.*

Naturgesch. aus den best. Schriftst. VIII. p. 703. *die Haubenlerche.*

Jagd- und Forstlex. II. p. 700. *die Haubellerche.*

Meidinger, Vorl. I. p. 146. n. 3. *die Heidelerche.*

Börner, Schles. ökon. patr. Gesellsch. 1781. p. 98. *Haubenlerche.*

Anweis. Vögel zu faug. p. 321. *die Heydelerche.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 170. n. 41.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 166. n. 6. Alauda (Cristata) rectricibus nigris, extimis duabus margine exteriori albis, capite cristato.

Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 234. Alauda (Cristata) rectricibus nigris, extimis duabus margine exteriori albis, capite cristato.

Kramer, Austr. p. 362. n. 1. Alauda crista dependente, *Kothlerche, Schopflerche.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 193. Alauda cristata; *Heubel-Lerch, Kott-Lerche, Lürle.*

Sibbald, Scot. ill. p. 17. Alauda cristata. *

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 315. Alauda capellata, viarum. *Dzierlatka.*

Charleton, onom. zoic. p. 81. Alauda galerita, cassita, cristata.

Belon, hist. nat. des oif. p. 267. Cochevis.

Salerne, ornithol. p. 194. Cochevis.

Jonston, av. p. 100. Alauda cristata maior.

Zinnan. Uov. p. 64. tab. 9. Fig. 56. Lodola capelluta.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 344. n. 6. *die Haubenlerche.*

21. NEMOROSA. *Die Waldlerche.*

Brisson, ornithol. I. p. 411. n. 9. petite Alouette hupée.

Büffon, Vögel, XIV. p. 277. *die kleine Zopflerche, oder Lulu;* p. 279. *Waldlerche.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 499. n. 26. Alauda (Cristatella) cristata, corpore supra fusco subtus albicante, remigibus rectricibusque fuscis, pedibus subrubris.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 225. *die Steinlerche.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 706. *die kleine Haubenlerche.*

Britt. Thiergesch. p. 102. *die kleine Schopf- oder Haubenlerche.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 193. Alauda arborea; *Heide Lerche; Mittel Lerche; Baumlerche; Wald Lerche; Stein Lerche.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 354. Alauda arborea seu sylvatica.

Jonston, av. p. 100. Alauda cristata minor.

22. UNDATA. *Die Coquillade.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 281. *die Coquillade;* m. e. Fig.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 500. n. 27. Alauda (Undata) cristata nigricans rufo varia, subtus alba, pectore nigro maculato, tectricibus alarum maioribus apice albis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 225. *die Coquillade.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 707. *die provenzalische Lerche.*

23. Senegalensis. *Die senegalische Lerche.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 137. n. 15. *die senegallische Lerche.*

Brisson, ornith. I. p. 411. n. 10. Alouette hupée du Senegal.

Büffon, Vögel, XIV. p. 285. *die senegalische Zopflerche.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 500. n. 28. Alauda (Senegalensis) fusco griseoque varia, subtus albida, collo inferiore fusco maculato, rectricibus duabus extimis extus rufo-albis.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 708. *die Grisette, oder senegalische Haubenlerche.*

Adanson, Senegal. p. 217. 251. *Lerchen?*

24. Testacea. *Die gibraltarische Lerche.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 500. n. 29. Alauda (Testacea) testacea subtus albida, vertice tectricibusque alarum nigro-maculatis, rectricibus quatuor exterioribus testaceo-albis.

25. Lusitana. *Die portugiesische Lerche.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 500. n. 30. Alauda (Lusitana) fusco-flavescens, pennis medio fuscis, subtus rectricibusque exterioribus flavescente albis.

26. Africana. *Die afrikanische Lerche.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 263. *der Sirli vom Cap;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 499. n. 24. Alauda (Africana) fusca, rufo alboque varia, subtus alba maculis fuscis, alis caudaque fuscis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 224. *der kapsche Sirli.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 703. *der Sirli vom Vorgeb. der gut. Hoffn.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 216. Alauda curvirostris.

27. Cinerea. *Die graue Lerche.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 261. *die aschgraue Lerche.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 499. n. 23. Alauda (Cinerea) cinerea, abdomine albo, remigibus rectricibusque fuscis, rectrice extima extus apice alba.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 224. *die graue Lerche.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 703. *die Aschlerche.*

28. Rufa. *Die Lerche vom de la Plata.* (8)

Büffon, Vögel, XIV. p. 259. *die Lerche vom de la Plata;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 498. n. 22. Alauda (Rufa) nigricans, rufo-nebulosa, corpore subtus gulaque albis, rectricibus duabus extimis albo-marginatis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 223. *die Variole.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 782. *der Schäcke.*

8. Ca-

(8) Die Trivialbenennung *Rufa* ist im Syst. p. 792. n. 7. schon einmal vorgekommen.

28. CAPENSIS. *Die capsche Lerche.*

Müller, Natursystem, II. p. 520. n. 8. *die capsche Lerche.*

Brisson, ornith. I. p. 411. n. 11. Alouette du Cap de bonne éspérance.

Büffon, Vögel, XIV. p. 247. *die capsche Lerche.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 498. n. 20. Alauda (Capensis) rectricibus tribus lateralibus apice albis, gula lutea, nigro marginata, superciliis flavis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 126. *die capsche Calandra.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 698. *gelbe Halsbinde.*

29. NOVAE SEELANDIAE. *Die neuseeländische Lerche.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 497. n. 19. Alauda (Novae Zealandiae) obscura, pennis cinerascente marginatis, abdomine albo, superciliis albis, fascia oculari nigra.

β. A. cinerea, subtus cinereo-alba, remigibus rectricibusque nigris, margine exteriore albis. *

Latham, Syst. ornith. II. p. 497. n. 19. β.

30. MONGOLICA. *Die mongolische Lerche.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 292. *die mongolische Lerche;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 497. n. 18. Alauda (Mongolica) capite colloque ferrugineis, vitta annulari verticis marginali maculaque medio albis, gula macula bifida.

Pallas, Reis. Anz. III. Anh. p. 8. n. 19. Alauda Mongolica.

Schwed. Abhandl. XL. p. 192. *die mongolische Lerche.*

31. SIBIRICA. *Die sibirische Lerche.* (9)

Büffon, Vögel, XIV. p. 291. *die Lerche vom Irtisfluß.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 497. n. 17. β. Al. flavo-ferruginea subtus albida, iugulo ferrugineo vario, remigibus secundariis maxima parte albis.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 9. n. 15. * III. p. 365. Anh. p. 8. * Alauda Calandra.

9. CALANDRA. *Die Kalanderlerche.*

Müller, Natursyst. II. p. 521. n. 9. *die Kalanderlerche.*

Ebert, Naturl. II. p. 126. *Kalander.*

Halle, Vögel, p. 315. n. 276. *die große Ringlerche.*

Onomat. hist. nat. I!. p. 398. *die große Lerche.*

Klein, av. p. 72. n. 7. Alauda Calandra.

Klein, Vorbereit. p. 137. n. 7. *die Kalandra Lerche.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 73. *Calandra.*

Brisson, ornithol. I. p. 408. n. 6. Grosse Alouette ou Calandre.

Büffon, Vögel, XIV. p. 238. *die Kalanderlerche, oder große Lerche;* m. e. Fig.

Pennant, arct. Zool. II. p. 366. n. 197. *die Calandra.*

Latham, Syn. Supplem. p. 177. Calandre Lark.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 498. n. 17. Alauda (Calandra) rectrice extima exterius tota alba, secunda tertiaque apice albis, fascia pectorali fusca.

Gesner, Vögelb. p. 361. *Kalander oder Galander*, p. 472. *kleiner Tetrax.*

Cetti, Sardin. II. p. 139. *die Ringlerche;* m. e. Fig.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 58. *die große Lerche.*

Pallas,

(9) Nach *Latham* eine Varietät von *Alauda Calandra*, n. 9.

Pallas, Reis. III. p. 697. — Ausz. III. Anh. p. 8. not. * *Calander.*

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 126. *die Calandra.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VII. p. 697. *die Kalanderlerche.*

Charleton, onom. zoic. p. 81. n. 4. Alauda Calandra.

Jonston, av. p. 100. Calandra.

Barrere, ornith. p. 40. Alauda non cristata cinerea, pectore albo maculoso.

Belon, hist. nat. des ois. p. 270. Calandre.

Salerne, ois. p. 196. Kalandra.

Hermann, tab. affin. anim. p. 216. Alauda Calandra.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 344. n. 7. *die Kalanderlerche.*

10. Alpestris. *Die Schneelerche.*

Müller, Natursyst. II. p. 521. n. 10. *die Berglerche.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 201. n. 8. *die Berglerche.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 498. n. 6. *die Berglerche.*

Ebert, Naturl. II. p. 126. *die Schneelerche.*

Halle, Vögel, p. 314. n. 274. *die gelbköpfige Lerche.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 365. n. 195. *die Uferlerche.*

Klein, av. p. 72. n. 5. Alauda gutture flavo, Virginiae et Carolinae.

Klein, Vorbereit. p. 136. n. 5. *gelbbärtige Lerche.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 73. n. 5. *gelbbärtige amerikanische Lerche.*

Klein, stemmat. av. p. 13. tab. 15. fig. 5. c. d.

Brisson, ornith. I. p. 412. n. 12. Alouette de Virginie.

Büffon, Vögel, XIV. p. 249. *die Schneelerche oder Berglerche.*

Batsch, Thiere, I. p. 343. *Berg- oder Winterlerche.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 498. n. 21. Alauda (Alpestris) rectricibus dimidio interiore albis, gula flava, fascia suboculari pectoralique nigra.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 408. *Berglerche, nordische Schneelerche.*

Seligmann, Vögel, II. tab. 64. *gelbbärtige Lerche.*

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 194. *wilde zweyschopfigte Alpenlerche.*

Pennant. Reis. d. Schottl. I. p. 285. *Berglerche.*

Pallas, Reis. III. p. 647. *Schneelerche.*

Pallas, Reis. Ausz. I. p. 99. III. p. 474. *Schneelerchen.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 48. *die Schneelerche.*

Linné, Abhandlung. II. p. 280. n. 14. *die Caroliner-Lerche.*

Naturforsch. XVII. p. 79. n. 163. *Berglerche; türkische Lerche.*

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 126. *Schneelerche.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 171. n. 42.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 699. *die virginische Lerche.*

Naumann, Vogelsteller. p. 179. *die Schneelerche.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 166. n. 8. Alauda (Alpestris) rectricibus dimidio inferiore albis, gula flava, fascia suboculari pectoralique nigra.

32. FLAVA. *Der Priestergürtel.* (10)

Büffon, Vögel, XIV. p. 257. *die sibirische Lerche.*

Latham,

(10) Nach *Latham* eine Varietät von *Alauda Alpestris* n. 10.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 498. n. 21. β. Al. rufa griseo varia subtus alba, vertice nigro-maculato, fascia pectorali suboculari lorisque nigris.

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 207. *der Priestergürtel oder die sibirische Lerche.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 171. n. 43. *gelbe sibirische Lerche.*

33. OBSCURA. *Die unbestimmte Lerche.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 296. *eine Lerchenart, von der es ungewiß ist, ob sie zu den Lerchen gehöre.*

11. MAGNA. *Die Riesenlerche.* (¹)

Müller, Natursyst. II. p. 522. n. 11. *die Riesenlerche.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 196. n. 1. *die Riesenlerche.* tab. 73.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 498. not. c.

Halle, Vögel, p. 314. n. 275. *die große Amerikanische Baumlerche.*

Klein, av. p. 72. n. 6. Alauda magna.

Klein, Vorbereit. p. 136. n. 6. *Dubbellerche.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 73. n. 6. *Dubbellerche.*

Brisson, ornithol. I. p. 225. n. 15. Merle à collier d'Amerique.

Büffon, Vögel, IX. p. 111. *die amerikanische Amsel mit dem Ringkragen;* m. e. Fig.

Pennant, arct. Zool. II. p. 308. n. 108. *der halbe Mond; die amerikanische Ringamsel.*

Latham, Syn. II. 1. p. 6. n. 3. A. Crescent Staare.

(1) Nach *Brisson* eine Amsel; nach *Pennant* ein Staar; nach *Catesby* eine Lerche; nach *Latham* eine Varietät von *Sturnus Ludovicianus*; p. 02. n. 3. — Gewicht, nach *Pennant*, zwischen 3. und 4. Unzen.

Latham, Vögel, II. 1. p. 6. n. 3. Var. A. *der Staar mit dem halben Monde. Amerikanische Staar.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 323. n. 3. A. *Sturnus* supra fusco-rufescente et nigricante varius, subtus flavus, fascia pectorali curva nigra, rectricibus tribus lateralibus albis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 66. *die große Lerche.*

Fermin, Surin. II. p. 181. *die amerikanische Lerche?*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 167. n. 9. Alauda (magna) subtus flava, fascia pectorali curva nigra; rectricibus tribus lateralibus albis.

Gentlem. Magaz. XXIII. tab. p. 324. Large Lark.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. 214. Alauda magna.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 288. n. 7. Alauda Spinoletta.	p. 794. n. 4. β. Spinoletta. *Var.*

Das Geschlecht ist, der Anzahl nach, mit 22. Gattungen vermehrt; da aber die 7te der XIIten Edition jetzt als Spielart von einer andern aufgeführt worden, so sind der neuhinzugekommenen Gattungen überhaupt 23.

Bey der 1sten Gattung sind *vier*, bey der 2ten *drey* Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Die Winterlerche des Scopoli.*

Scopoli, an. I. p. 129. n. 188. Alauda brumalis.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 154. n. 188. *die Winterlerche.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 295. *die Winterlerche.*

2. Alauda

2. Alauda pectore lutescente, punctis atris.
Kramer, Austr. p. 362. n. 4. Austr. *Breinvogl;* Norimb. *Krautvogl;* Styr. *Schmelvogl.*
In der Büffonschen Vögelübersetzung wird dies Synonym, p. 204. zu *Alauda pratensis*, und p. 219. wieder zu *Alauda trivialis* gerechnet.

3. Alauda hispanica *Hasselq.*
Hasselquist, Reis. n. Palaestina, p. 335. n. 46.
Büffon, Vögel, XIV. p. 582. *die spanische Lerche.* Vielleicht *Alauda arvensis?*

4. *Die Grillenlerche; in den sumpfigen Gegenden von England.*
Halle, Vögel, p. 315. n. 277. *die Lerchenheuschrekke.*
Büffon, ois. IX. p. 59. Locustelle.
Büffon, Vögel, XIV. p. 214. *die Grillenlerche.*
Pennant, brittisch Zoolog. p. 95. the Willow Lark.
Pennant, britt. Thiergesch. p. 103. tab. 50. fig. 4. *Weidenlerche.*
Naturgesch. aus den best. Schriftst. VIII. p. 694. *die Lerchenheuschrecke.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 494. n. 7. Alauda (Obscura) olivaceo - fusca, nigricante varia, subtus flavicans, rectricibus colli pectoreque maculis fuscescentibus, rectrice extima dimidiato, secunda apice albo - cinerascente?

5. *Thufu - Tytlinger. Olassen*, Isl. I. p. 310. *b.* — *Müll.* zool. dan. prodr. p. 29.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Die Yeltonische Lerche.*
Büffon, Vögel, XIV. p. 288. *die Yeltonische Lerche.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 496. n. 16. Alauda (Yeltoniensis) nigra supra rufescente-varia, sexta remigum margine exteriore alba, rectricibus duabus intermediis rufis.

Forster, philos. transact. LVII. p. 350. Alauda yeltoniensis.

Vielleicht eine Spielart von *Alauda tatarica*?

106. GESCHLECHT. STURNUS. *Der Staar.*

Müller, Natursyst. II. p. 523. Gen. CVI.
Leske, Naturgesch. p. 255. Gen. XXXVIII.
Borowsky, Thierreich, III. p. 201. Gen. LXXIV.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 180. Gen. XXVIII.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 498. Gen. LXV.
Halle, Vögel, p. 272. Gen. IV.
Pennant, arct. Zool. II. p. 308.
Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 408.
Onomat. hist. nat. VII. p. 358.
Klein, av. p. 64. Gen. IV.
Brisson, ornith. I. p. 280. Gen. XXVI.
Büffon, Vögel, VII. p. 5. sqq.
Batsch, Thiere, I. p. 318. Gen. LXXVIII.
Latham, Vögel, II. 1. p. 1. Gen. XXX.
Latham, Syst. ornith. I. p. 321. Gen. XXXI.
Hermann, tab. affin. anim. p. 210.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 345. Gen. LXXIII.

1. VULGARIS. *Der gemeine Staar.* (2)

Müller, Natursyst. II. p. 523. n. 1. *die Sprehe.*
Leske, Naturgesch. p. 255. n. 1. *der gemeine Staar.*
Borows-

(2) Gewicht etwa 3 1/2 Unze. Brütet zweymal; 18—20. Tage. Kann über 10. Jahr alt werden.

Borowsky, Thierreich, III. p. 202. n. 1. *der gemeine Staar,* tab. 74.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 180. n. 1. Sturnus (Vulgaris) rostro flavescente, corpore nigro punctis sagittatis albis; *der Staar.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 498. n. 1. *der gemeine Staar.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 714. *der gemeine Staar.*
Funke, Naturgesch. I. p. 239. *der Staar.*
Ebert, Naturl. II. p. 140. *Sprehe.*
Halle, Vögel, p. 272. n. 227. *der gemeine Staar.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 380. n. 314. *der Staar.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 309. A. *der gemeine Staar.*
Neuer Schaupl. der Nat. VIII. p. 408. *Sprehe.*
Onomat. hist. nat. VII. p. 363. *der gemeine Staar.*
Handb. der Naturgesch. II. p. 212. *der Staar,* p. 214. *Wiesenstaar.*
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 123. *Staar; Stär; Stärlein; Sprehe; Spren.*
Klein, av. p. 64. n. 1. Sturnus pratorum, vulgaris.
Klein, Vorbereitung. p. 121. n. 1. *Rinderstaar; Spreche.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 63. n. 1. *gemeiner Wiesenstaar; Rinderstaar; Sprehe.*
Klein, stemmat. av. p. 10. tab. 12. fig. 5. a. b. c.
Klein, Vögeleyer, p. 22. tab. 8. fig. 7.
Gesner, Vögelb. p. 484. *Staar oder Rinderstaar;* m. e. zieml. gut. Fig.
Brisson, ornith. I. p. 280. n. 1. Etourneau.
Büffon, Vögel, VIII. p. 5. *der Staar;* m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 357. *der gemeine Staar.*
Latham, Syn. Suppl. p. 137. Common Stare.
Latham, Vögel, II. 1. p. 1. n. 1. *der gemeine Staar.*

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 321. n. 1. Sturnus (Vulgaris) rostro flavescente, corpore nigro nitente, punctis albis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 72. n. 155. *die Sprehe.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 85. n. 1. *die gemeine Sprehe.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 409. *der Staar.*

Cetti, Sardin. II. p. 174. *der Staar.*

Fischer, Liv. p. 93. n. 132. *Sprehe.*

Fabricius, Reis. nach Norweg. p. 59. *der gewöhnliche Sprehe.*

Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 17. *die Staare.*

Pallas, Reis. Ausz. I. p. 99. III. p. 475. *die Staare.*

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. III. p. 13. *Staare.*

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 1. *Stär.*

Pontoppidan, Norweg. II. p. 185. *Stär, oder Star.*

Hasselquist, Paläftin. (ed. germ.) p. 335. n. 48. Sturnus vulgaris.

Leske, Reis. durch Sachsen, p. 31. *die Staare.*

Pennant, britt. Thiergesch. p. 99.

Borkhausen, Magazin, I. p. 164. n. 35.

Linné, Abhandlung. II. p. 283. n. 40. *die Staare*, p. 284. n. 44. p. 301. n. 14. *Staare.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 155. n. 189. *der gemeine Staar.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 58. *Staar.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 323. *der Star.*

Naumann, Vogelsteller, p. 122. *der Staar.*

Hervieux, von Canarienvögeln, p. 170. *der Star.*

Beckmann, Naturhist. p. 55. *der gemeine Staar.*

Meidinger, Vorles. I. p. 146. n. 1. *der gemeine Staar.*

Naturforsch. XVII. p. 79. n. 164. *die Sprehe*, XXI. p. 133. *Staar.*

Naturforsch. XXV. p. 14. *der Staar.*

Anweis. Vögel zu fang. p. 521. *der Staar.*

Jablonsky,

Jablonsky, allgem. Lex. p. 1116. *Staar.*
André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 214. 222.
Oekon. Zool. p. 93. n. 34. *der Staar.*
Loniceri, Kräuterb. p. 680. *Staar.*
Zückert, Speis. aus d. Thierreich, p. 98.
Lemmery, Materiallex. p. 1087.
Beckmann, Bibl. VIII. p. 533. *der Staar.*
Mannigfaltigkeit. II. p. 159.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. Sturnus.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 1. Sturnus.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 167. n. 1. Sturnus (Vulgaris) rostro flavescente, corpore nigro, punctis albis.
Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 235. Sturnus (Vulgaris) rostro flavescente, corpore variegato punctis albis.
Kramer, Austr. p. 361. n. 1. Sturnus rostro flavescente, corpore nigro, punctis albis. *Starl.*
Schwenkfeld, av. Siles. p. 351. Sturnus. *Staar; Spreche.*
Charleton, onomast. zoic. p. 84. n. 3. Sturnus.
Moehring, av. gen. p. 32. n. 9. Sturnus.
Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 291. Sturnus.
Sibbald, Scot. p. 157. Sturnus.
Jonston, av. p. 107. Sturnus vulgaris.
Heerkens, av. Fris. p. 169. Sturnus.
Schaefer, element. ornithol. tab. 65.
Zinnan. Uov. p. 69. tab. 10. fig. 60. Storno.
Russel, Alepp. p. 69. Stare.
Levin, britt. Birds II. tab. 56.
Belon, hist. nat. des oiss. p. 322. Estourneau; Sansonnet.
Voy. en Barbar. p. 271. Etourneau.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 42. Sturnus.
Aristot. hist. anim. L. 9. c. 34. n. 202. ψαρος.
Aelian. de nat. anim. L. VI. c. 46. ψαρ.

Donn-

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 345. n. 1. *der gemeine Staar.*

Donndorff, Natur und Kunst, III. p. 176. *der Staar.*

β. *Der weiße Staar.*

Brisson, ornith. I. p. 281. A. Etourneau blanc.

Büffon, Vögel, VIII. p. 24. *der weiße Staar.*

Latham, Syn. II. 1. p. 3. White Stare.

Latham, Vögel, II. 1. p. 3. Var. A. *der weiße Staar.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 322. n. 1. β. Sturnus albus.

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 111. n. 1. *ein weißer Staar.*

Naturforscher, XVI. p. 46. n. 1. *weißer Staar.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 353. Sturnus candidus.

Jonston, av. p. 107. Sturnus totus candidus.

Rozier, observat. XIV. p. 228.

γ. *Der schwarz und weiße Staar.*

Brisson, ornithol. I. p. 281. B. Etourneau blanc et noir.

Büffon, Vögel, VIII. p. 24. *der schwarz und weiße Staar.*

Latham, Syn. II. 1. p. 4. Pied Stare.

Latham, Vögel, II. 1. p. 3. Var. B. *der bunte Staar.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 322. n. 1. γ. Sturnus leucomelas.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 352. Sturnus ut pica varius. *Elster-Staar.*

δ. *Der weißköpfige Staar.*

Brisson, ornithol. I. p. 281. C. Etourneau à tête blanche.

Büffon, Vögel, VIII. p. 24. *der weißköpfigte Staar.*

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 322. n. 1. δ. Sturnus leucocephalus.

Jonston, av. p. 108. Sturnus alter.

ε. *Der aschgraue Staar.*

Brisson, ornith. I. p. 282. D. Etourneau gris.

Büffon, Vögel, p. 25. *der aschgraue Staar.*

Latham, Syn. II. 1. p. 4. Grey Stare.

Latham, Vögel, II. 1. p. 44. Var. C. *der graue Staar.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 322. n. 1. ε. Sturnus cinereus.

Charleton, onom. zoic. p. 84. ad n. 8. Sturnus cinereus.

Jonston, av. p. 108. Sturnus tertius.

2. Capensis. *Der capsche Staar.* (3)

Müller, Natursystem, II. p. 524. n. 2. *der Capsche Staar.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 204. n. 3. *der Capische Staar.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 359. *der Capische Staar.*

Brisson, ornith. I. p. 282. n. 3. Etourneau du Cap de bonne Esperance.

Büffon, Vögel, VIII. p. 31. *der Elsterstaar, oder Staar vom Vorgeb. der gut. Hoffn.* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 4. n. 2. *der Capsche Staar.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 322. n. 2. Sturnus (Capensis) nigricans, capitis lateribus subtusque albis.

3. Lu-

(3) *Büffon* rechnet hieher auch den *Sturnus Contra*, p. 803. n. 7. und alle daselbst bemerkte Synonymen. Auch *Latham* nimmt letztern als eine Spielart davon an.

3. LUDOVICIANUS. *Der louisianische Staar.* (4)

Müller, Natursyst. II. p. 524. n. 3. *der louisianische Staar.* Tab. 20. Fig. 3.

Pennant, arct. Zool. II. p. 309. n. 109. *der louisianische Staar.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 362. *der Louisianische Staar.*

Brisson, ornith. I. p. 283. n. 4. Etourneau de la Louisiane.

Büffon, Vögel, VIII. p. 37. *der Louisianische Staar.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 5. n. 3. *der Louisianische Staar.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 323. n. 3. Sturnus (Ludovicianus) griseo fuscoque maculatus, subtus flavus, linea capitis superciliisque albis, gulá nigra.

4. CONTRA. *Der Kontra.* (5)

Müller, Natursyst. II. p. 525. *der bunte indianische Staar.*

Halle, Vögel, p. 295. n. 250. *die schwarze Bengalische Amsel. Der Kontra von Bengalen.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 511. *die Elster von Bengalen.*

Klein, verb. Vögelhistor. p. 70. n. 37. *Tag und Nacht Drossel.*

Brisson, ornith. I. p. 181. n. 9. Troupiale de Bengale.

Büffon, Vögel, VIII. p. 35. *Staar Kontra;* mit e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 5. Contra Stare.

Latham, Vögel, II. 1. p. 5. n. 2. Var. A. *der Contra-Staar.*

Latham,

(4) *Latham* rechnet auch die *Alauda magna* Linn. p. 801. n. 11. als Spielart hieher.

(5) S. vorher Anmerk. 3.

Latham, Syst. ornith. I. p. 322. n. 2. β. Sturnus fuscus macula oculari fascia alari abdomineque albis.

Seligmann, Vögel, VI. tab. 82. *der schwarz und weiße indianische Staar.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 167. Sturnus (Contra) fuscus, macula oculari, fascia alari abdomineque albis.

5. Cinclus. *Der Wasserstaar.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 525. n. 5. *der Wasserstaar.*

Leske, Naturgesch. p. 255. n. 2. *der Wasserstaar.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 203. n. 2. *der Wasserstaar; Wasseramsel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 499. n. 2. *der Wasserstaar.*

Ebert, Naturl. II. p. 140. *Wassermerle.*

Halle, Vögel, p. 296. n. 252. *die schwarze Wasseramsel.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 383. n. 315. *Wasseramsel; Seeamsel.*

Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 552. *Wasseramsel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 361. *Wasseramsel.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 313. *die Wasseramsel.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 124. *Wasserstaar.*

Klein, av. p. 68. n. 18. Turtur aquaticus.

Klein, Vorbereit. p. 129. n. 18. *Wasserdrossel.*

(6) Gewicht, nach *Pennant*, 2 1/2 Unze. Dieser Vogel scheint, wie *Pallas* bemerkt, die Ordnung der *Grallen* mit den Passeribus zu verbinden, indem er seinem Schnabel und Füssen nach ohne allen Zweifel zu den letztern gehört, hingegen die Stellung seines Körpers und seine Oekonomie ihn zu den erstern hinbringen. *Pallas* hat auch am angef. O. die ausführlichste Beschreibung von ihm gegeben. Vid. *Zoolog. Beytr.* 1. B. p. 550.

Pennant, arct. Zool. II. p. 310. B. *der Wasserstaar.*
Gesner, Vögelb. p. 39. *Wasseramsel*; m. e. Fig.
Brisson, ornith. II. p. 275. n. 19. Merle d'eau.
Büffon, Vögel, VIII. p. 53. *der Wasserstaar.*
Latham, Syn. Suppl. p. 142. Water Ouzel.
Latham, Vögel, II. 1. p. 45. n. 50. *die Wasseramsel oder der Wasserstaar.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 343. n. 57. Turdus (Cinclus) fusco-nigricans, genis, gutture, collo inferiore et pectore niveis, ventre supremo fusco-rufescente, imo rectricibusque nigricantibus.
Beseke, Vögel Kurl. p. 72. n. 156. *der Wasserstaar.*
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 87. n. 2. *die Bachsprehe.*
Cetti, Sardin. II. p. 177. *die Bachamsel.*
Leem, Finnm. p. 138. *Elve-Kald.*
Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 2. *Strömstär; Bachvogel.*
Pallas, Reis. I. p. 96. *die Wasseramsel.*
Pallas, Reis. Ausz. I. p. 87. *die Wasseramsel.*
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 70. Sturnus Cinclus.
Zorn, Petinotheol. II. p. 440. *die Wasser-Amsel.*
Linné, Abhandl. II. p. 301. n. 118. *die Wasseramsel.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 75. *Wasser-Amsel.*
Beckmann, Bibl. III. p. 171. *die Wasseramsel.*
Schrift. der berlin. Gesellsch. N. Fr. VII. p. 455. n. 24. *der schwarze Blauspecht.* Sitta Melaina.
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 185. n. 223. *die Wasseramsel.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 170. *die Wasseramsel.*
Meidinger, Vorles. I. p. 146. n. 2. *der Wasserstaar.*
Günther, Nest. u. Ey. tab. 67. *Wasseramsel.*

André

André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 161.
Borkhausen, Magaz. I. p. 165. n. 36.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 168. n. 4. Sturnus (Cinclus) niger, pectore albo.
Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 236. Sturnus (Cinclus) niger, pectore albo.
Kramer, Austr. p. 374. n. 3. Motacilla pectore albo; capite et collo piceis, corpore nigricante. *Wasser-Amsel; Bach-Amsel.*
Charleton, onom. zoic. p. 108. n. 9. Tringa.
Charleton, onom. zoic. p. 108. n. 12. Merula aquatica.
Merrot, pinac. rer. natural. Britan. p. 183.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 302. Merula aquatica. *Bachamsel; Seeamsel.*
Jonston, av. p. 107. Merula aquatica.
Zinnan. Uov. p. 109. tab. 19. fig. 97. Merla acquajuola.
Levin, britt. Birds. II. tab. 63.
Dec. Ruff. I. p. 307. 314.
Soc. nat. Lipf. 1747. p. 444. tab. 8. fig. 3. Turdus musicus palustris dumetorum arundinaceus.
Aristot. hist. anim. L. 9. c. 9. n. 158. Κιγκλος?
Hermann, tab. affin. anim. p. 212. Sturnus Cinclus.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 346. n. 2. *der Wasserstaar.*

6. Militaris. *Der weißstreifige Staar.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 46. *der weißstreifige Staar;* m. e. Fig.
Latham, Vögel, II. 1. p. 6. n. 4. *der magellanische Staar.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 313. n. 4. Sturnus (Militaris) griseus, pectore gulaque sanguineis.

7. MONTANUS. *Der Bergstaar.* (7)

Latham, Syst. ornith. I. p. 325. n. 1. Sturnus (Moritanus) (*soll ohnstreitig* montanus *heißen,*) cinereus, capitis parte inferiore et gula ex cinereo et albo variis, ventre cano rufescente maculato, rostri apice nigro.

8. LOYCA. *Der chilesische Staar.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 11. n. 14. *der rothbrüstige Staar.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 325. n. 12. Sturnus (Loyca) fusco alboque maculatus, pectore coccineo.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 346. n. 3. *der chilesische Staar.*

9. MEXICANUS. *Der mexicanische Staar.*

Brisson, ornith. I. p. 254. n. 4. Cotinga du Mexique.

Büffon, Vögel, VIII. p. 43. *der Caxcaxtototl.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 11. n. 13. *der mexikanische Staar.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 326. n. 15. Sturnus (Mexicanus) caeruleus nigro variegatus, iridibus luteis.

10. OBSCURUS. *Der Schilfstaar.*

Brisson, ornithol. I. p. 283. n. 3. Etourneau de la nouvelle Espagne.

Büffon, Vögel, VIII. p. 42. *der Schilfstaar oder Tolocatzanatl.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 11. n. 12. *der braunköpfige Staar.*

Latham,

(7) Soll, nach *Bechstein*, nichts anders als *Motacilla alpina* p. 957. n. 65 seyn, und auch *Sturnus collaris* n. 16, dahin gehören. S. Naturgesch. Deutschl. III. p. 715. *

Latham, Syst. ornith. I. p. 326. n. 14. Sturnus (Junceti) niger capite fusco.

11. ZEYLANICUS. *Der zeylonische Staar.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 10. n. 11. *der zeylanische Staar.*

Ist nach *Latham*, mit *Turdus Ochrocephalus*, p. 821. n. 70. einerley.

12. FUSCUS. *Der olivenfarbige Staar.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 10. n. 10. *der braune Staar.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 325. n. 10. Sturnus (Olivaceus) fusco-olivaceus, subtus flavescens, vitta oculari caerulea.

13. VIRIDIS. *Der grüne Staar.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 10. n. 9. *der grüne Staar.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 325. n. 9. Sturnus (Viridis) viridis supra caerulescens, macula sincipitis poneque oculos unica, scapulari duplici alba.

14. SERICEUS. *Der Seidenstaar.*

Latham, Syn. Suppl. p. 137. Silk Stare.

Latham, Vögel, II. 1. p. 9. n. 8. *der Seidenstaar.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 324. n. 8. Sturnus (Sericeus) pallide griseus, capite flavescente-albo, basi remigum albo, remigibus rectricibusque nigris.

15. CARUNCULATUS. *Der gelappte Staar.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 8. n. 6. *der belappte Staar.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 324. n. 6. Sturnus (Carunculatus) niger, dorso tectricibusque alarum ferru-

ferrugineis, ad basin mandibulae inferioris palea duplici carunculata fulva.

16. Collaris. *Der Staar mit dem Halsbande.* (8)

Latham, Vögel, II. 1. p. 7. n. 5. *der Staar mit dem Halsbande.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 323. n. 5. Sturnus (Collaris) fusco-nigricans, dorso maculato, uropygio albo vario, gula alba, fusco-maculata, remigibus caudaque apice fuscis.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 156. n. 192. *der Staar mit dem Halsbande.*

17. Dauricus. *Der daurische Staar.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 48. *der daurische Staar*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 12. n. 15. *der daurische Staar.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 325. n. 13. Sturnus (Dauricus) corpore supra ex atro violaceo, subtus ex cinerascente albo, capite et cervice caerulescente-canis, verticis litura violaceo-atra (*feminis* fusca.)

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 346. n. 4. *der daurische Staar.*

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit *zwölf* Gattungen vermehrt. Bey der 1sten Gattung sind *fünf* Varietäten aus einander gesetzt.

107 GE-

(8) S. die vorhergehende Anmerk. Auch *Latham* hält ihn mit der *Motacilla alba* für einerley und zieht alle in unserm Syst. p. 957. angeführte Synonymen, selbst seinen eignen *Alpine Warbler* hieher.

107. GESCHLECHT. TURDUS. *Der Krammetsvogel.* (Drossel.)

Müller, Natursyst. II. p. 527. Gen. CVII.
Leske, Naturgesch. p. 256 Gen. XXXIX.
Borowsky, Thierreich, III. p. 162. Gen. LXVII.
Blumenbach, Handb. der N. G. p. 180. Gen. XXIX.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 500. Gen. LXVI.
Funke, Naturgesch. I. p. 233.
Ebert, Naturl. II. p. 127.
Halle, Vögel, p. 277. Gen. V.
Neuer Schaupl. der Natur. II. p. 406.
Onomat. hist. nat. VII. p. 610.
Klein, av. p. 65. Gen. V.
Brisson, ornith. I. p. 213. Gen. XXII.
Buffon, Vögel, VIII. p. 202.
Pennant, arct. Zool. II. p. 310.
Batsch, Thiere, I. p. 3117. Gen. LXXIII.
Latham, Vögel, II. 1. p. 13. Gen. XXXI.
Latham, Syst. ornith. I. p. 326. Gen. XXXII.
Hermann, tab. affin. anim. p. 209.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 347. Gen. LXXIV.

1. VISCIVORUS. *Der Ziemer.* (9)

Müller, Natursystem, II. p. 528. n. 1. *die Mistel-Drossel.*
Leske, Naturgesch. p. 256. n. 1. *die Misteldrossel, Schnarre.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 164. n. 2. *Mistel-, Schnarrdrossel.*
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 180. n. 1. Turdus (Viscivorus) dorso fusco, collo maculis albis, rostro flavescente; *Schnarre*, *Ziemer*, *Mistler*, *Brachvogel; Zaritzer.*

Q 5 *Bechstein*,

(9) Gewicht an 5. Unzen. *Penn.* Wird über 15. Jahr alt.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 500. n. 1. *die Misteldrossel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 610. *die Misteldrossel.*

Funke, Naturgesch. I. p. 233. *die Misteldrossel.*

Ebert, Naturl. II. p. 128. *Misteldrossel; Ziemer.*

Halle, Vögel, p. 277. n. 233. *die große Drossel.*

Meyer, Thiere, II. p. 17. tab. 66. *der Mistler.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 384. n. 316. *die Schnarre; Zarer; Zerrer; Zeher; Zaritzer; Mistelfink; Mistelziemer; Schnerrer, Schneer; Ziering.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 318. B. *die Misteldrossel.*

Beckmann, Naturhist. p. 52. a. *die Schnarrdrossel.*

Neuer Schaupl. d. Nat. VII. p. 722. *Schnarre.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 637. *Misteldrossel.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 125. *Misteldrossel.*

Klein, av. p. 65. n. 1. Turdus viscivorus maximus.

Klein, Vorbereit. p. 122. n. 1. *Schnarrdrossel, Misteldrossel; Schnarre.*

Klein, verb. Vögelh. p. 65. n. 1. *Schnarre, Ziemer.*

Klein, Stemmat. av. p. 12. tab. 13. Fig. 1. a—c.

Gesner, Vögelb. p. 430. *Mistler*, Fig. p. 431. gut.

Brisson, ornith. I. p. 213. n. 1. *Große Grive.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 261. *die Misteldrossel;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 338. *die Misteldrossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 13. n. 1. *die Misteldrossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 326. n. 1. Turdus (Viscivorus) supra griseo-fuscus, subtus albo-flavicans, maculis nigricantibus varius, rectricibus tribus extimis albo-terminatis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 73 n. 157. *die Misteldrossel.*

Siemßen,

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 88. n. 1. *die Mistel-drossel; Schnarr; Brakvogel.*

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 410. *die Misteldrossel.*

Cetti, Sardin. II. p. 152 *die Misteldrossel.*

Fischer, Livl. p. 93. n. 133. *die Misteldrossel.*

White, N. G. von Engl. p. 65. n. 1. p. 129. *Misteldrossel.*

Pennant, britt. Thiergesch. p. 95. tab. 47. Fig. 1. *der Mistler.*

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 1. *Simmersnäre; doppelter Kramsvogel.*

Naturforsch. XVII. p. 80. n. 165. *die Misteldrossel.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 158. n. 193. *der Mistler, oder Schnärre.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 304. *der Mistler.*

Oekonom. Zool. p. 94. n. 35. *der gemeine Krammetsvogel oder Ziemer.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 54. *Schnerre.*

Naumann, Vogelsteller, p. 84. *Schnarre oder Schnarrziemer.*

Anweis. Vögel zu fang. p. 385. *Mistler.*

Meidinger, Vorles. I. p. 147. n. 1. *die Misteldrossel.*

Hamb. Magazin, XIX. p. 531. XXI. p. 269.

Zückert, Speis. aus dem Thierr. p. 96.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 683. *Mistler.*

Beckmann, Bibl. VIII. p. 535. *die Schnarre.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 160. n. 29. *Mistler.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 168. n. 1. Turdus (Viscivorus) dorso fusco, collo maculis albis, rostro flavescente.

Müller, Zool. dan. prodr. p. 29. n. 237. Turdus (Viscivorus) dorso fusco, collo maculis albis, rostro flavescente.

Kramer,

Kramer, Austr. p. 361. n. 6. Turdus pedibus fuscis, alis subtus albentibus, *Zaritzer; Mistler; Zerrer.*

Charleton, onom. zoic. p. 83. n. 1. Turdus viscivorus.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 359. Turdus maximus, *Schnarre*, *Schnerre*, *Mistler.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 423. Turdus maximus.

Sibbald, Scot. ill. p. 155. Turdus viscivorus.

Belon, hist. nat. des ois. p. 324. Grive, Siserre.

Jonston, av. p. 103. Turdus viscivorus.

Zinnan, Uov. p. 39. tab. 5. Fig. 21. Tordo viscado.

Heerkens, av. Fris. p. 193. Turdus. (cum reliq. specieb.)

Levin, britt. Birds, II. tab. 57.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 347. *der Ziemer.*

Donndorff, Natur u. Kunst, III. p. 520. *der Ziemer.*

5. Pilaris. *Der gemeine Krammetsvogel.* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 528. n. 2. *die Wacholder-Drossel.*

Leske, Naturgesch. p. 256. n. 2. *der Ziemer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 165. n. 2. *der Krammetsvogel.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 181. n. 2. Turdus (Pilaris) rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano; *der Krammetsvogel.*

Bech-

(10) Gewicht 4 Unzen. *Penn.* Die deutschen Benennungen, dieser, der vorhergehenden, ingl. der *dritten* und *vierten* Gattung, werden häufig verwechselt.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 501. n. 2. *die Wacholderdrossel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 611. *die Wacholderdrossel.*

Funke, Naturgesch. I. p. 234. *der eigentliche Krammetsvogel.*

Ebert, Naturl. II. p. 127. *Wacholderdrossel.*

Halle, Vögel, p. 279. n. 234. *Kramsvogel.*

Meyer, Thiere, II. p. 18. tab. 65. *Kramtvogel.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 385. n. 317. *der Kammetsvogel; Krambsvogel; Schomerling; Schacker*, etc.

Pennant, arct. Zool. II. p. 317. A. *der Ziemer.*

Beckmann, Naturhist. p. 52. *b. der Kramsvogel.*

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 725. *Krammetsvogel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 630. *der Krammetsvogel.*

Handb. der Naturgesch p. 78. *der Krametvogel.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 124. *der Krammetsvogel.*

Klein, av. p. 65. n. 2. Turdus simpliciter; Turdus medius pilaris.

Klein, Vorbereit. p. 123. n. 2. *Großziemer; Blauziemer; Wacholderdrossel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 65. n. 2. *Krametvogel.*

Klein, Stemmat. av. p. 11. tab. 13. Fig. 4. a. b. c.

Gesner, Vögelb. p. 425. *Reckholdervogel*, fig. p. 427. gut.

Brisson, ornith. I. p. 217. n. 5. Litorne ou Tourdelle.

Büffon, Vögel, VIII. p. 276. *der Ziemer oder Krammetsvogel;* m. e Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 339. *der Ziemer.*

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 21. n. 11. *die Wacholderdrossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 330. n. 1. Turdus (Pilaris) fusco-rufescens, subtus nigricante varius, rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano.

Beseke, Vögel Curl. p. 73. n. 158. *die Wacholderdrossel.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 89. n. 2. *der Schaker.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 410. *der Krammetsvogel.*

Fischer, Livl. p. 94. n. 134. *Krammetvogel.*

Cetti, Sardin. II. p. 153. *der Ziemer.*

Boswell, Beschr. von Corsic. p. 45. *die Drossel.*

White, N. G. von Engl. p. 61. n. 3. *Krammetsvogel.*

Taube, Slavon. I. p. 22. *Krammetsvögel.*

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. III. p. 13. *Drosseln.*

Pennant, Reis. d. Schottl. II. p. 17. *Wacholderdrosseln.*

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 2. *Kramsvogel.*

Pontoppidan, Norweg. II. p. 131. *Krametsfugl.*

Georgi, Reis. d. Russl. p. 173.

Pennant, brittisch. Thiergesch. p. 96. tab. 48. Fig. 2.

Borkhausen, Magazin, I. p. 160. n. 30.

Naturforsch. XVII. p. 81. n. 166. *die Wacholder-Drossel.*

Schwed. Abhandl. XXVIII. p. 299. *Ziemer.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 308. *Wacholder-Drossel.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 53. *Krammets-oder Krannabet-Vogel.*

Naumann, Vogelsteller, p. 85. *Ziemer, oder Krammetsvogel.*

Linné, Abhandl. II. p. 283. n. 39. *Krammetsvogel.*

Scopoli,

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 158. n. 194. *Krammetvogel*, *Zeumer.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 349. *Kranwets*-*Vogel.*
Meidinger, Vorles. I. p. 147. n. 2. *der Ziemer.*
Loniceri, Kräuterb. p. 677. *Krametvogel; Zymmer.*
Oekonom. Zool. p. 94. n. 3. *die Wacholderdrossel.*
Beckmann, Bibl. VIII. p. 535. *der Kramtsvogel.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 550. *Krammets*-*Vogel.*
Krünitz, ökon. Encykl. XLVI. p. 758. *Krammetsvogel.*
André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 56. *Krammetsvogel.*
Schönfeld, Landwirthsch. p. 707.
Physik. oekonom. Zeit. 1785. II. p. 631.
Berlin. Intell. Blatt, 1784. n. 287. p. 2297.
Neues allgem. Harzmagaz. 1768. St. 5. p. 318.
Matthioli, epist. An Turdi salubre praebeant alimentum? Epist. medic. I. p. 55.
Zückert, Speis. aus dem Thierr. p. 95.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. Turdus simpl.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 29. n. 6. Turdus pilaris.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 168. n. 2. Turdus (Pilaris) rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano.
Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 238. Turdus (Pilaris) rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano.
Kramer, Austr. p. 361. n. 7. Turdus rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus, capite cano; *Kranabetsvogel; Kranabeter.*
Charleton, onom. zoic. p. 83. n. 2. Trichas.

Schwenk-

Schwenkfeld, av. Silef. p. 359. Turdus medius; *Groß-Ziemer; Blaw-Ziemer, Krametvogel.*
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 424. Turdus pilaris.
Sibbald, Scot. p. 211. Turdus pilaris.
Jonston, av. p. 103. Trichas.
Hermann, tab. affin. anim. p. 210. Turdus pilaris.
Hist. Prov. I. p. 492. Grive.
Voyage en Barbarie, p. 271. Grive.
Levin, britt. Birds, II. tab. 60.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 25. c. 42. c. 53. L. 17. c. 9. Turdi.
Varro, de re rust. L. 3. c. 2. c. 5. Turdi.
Columella, de re rust. L. 8. c. 10. Turdi.
Palladius, de re rust. L. 1. c. 26. Turdi.
Aelian. de nat. anim. L. 1. c. 35. Κιχλαι.
Aristot. hist. anim. L. 6. c. 1. n. 12. Κιχλαι.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 347. *der gemeine Krammetsvogel.*
Donndorff, Natur und Kunst, III. p. 523. *der gemeine Krammetsvogel.*

β. *Der kleinere Krammetsvogel.*

γ. *Der bunte Krammetsvogel.*
Klein, av. p. 67. n. 10. Turdus pilaris, maculis lunatis variegatus.
Klein, Vorbereit. p. 127. n. 10. *die bunte Drossel mit mondförmigen Flecken.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 68. ad n. 16.
Brisson, ornith. I. p. 218. B. Litorne tachetée.
Büffon, Vögel, VIII. p. 284. *der gefleckte Ziemer.*
Halle, Vögel, p. 291. n. 242. *der weißköpfige Krammsvogel.*
Latham, Syn. II. 1. p. 25. n. 11. A. — *Latham*, Vögel, II. 1. p. 22. n. n. 11. Var. A.
Latham, Syst. ornith. I. p. 330. n. 11. β. T. nigro maculatus, capite collo subtusque albo, gu-

la

la pectoreque rufis, dorso fusco, uropygio cinereo.

δ. *Der weißköpfige Krammetsvogel.*

Brisson, ornith. I. p. 218. A. Litorne à tête blanche.

Büffon, Vögel, VIII. p. 284. *der weißköpfige Ziemer.*

Latham, Syn. II. 1. p. 25. n. 11. B.

Latham, Vögel, II. 1. p. 22. n. 11. Var. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 330. n. 11. γ. T. capite cerviceque albis corpore communi.

Naturforsch. I. p. 62. n. 4. *ein Krammetsvogel mit ganz weißem Kopfe.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 360. Turdus pilaris, λευκοκεφαλος.

ε. *Der Krammetsvogel mit weißem Kopf und Halse, etc.*

Latham, Syn. II. 1. p. 26. n. 11. C.

Latham, Vögel, II. 1. p. 22. n. 11. Var. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 330. n. 11. δ. T. capite colloque albis, corpore albo maculis magnis nigricantibus.

14. AFRICANUS. *Die geränderte Drossel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 143. Margined Thrush.

Latham, Vögel, II. 1. p. 81. n. 123. *die geränderte Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 362. n. 130. Turdus (Africanus) nigricans, pectore pennis nigris, rufo-marginatis, subtus rufo-flavus, pedibus cinereis.

19. TRIPOLITANUS. *Die olivenfarbige barbarische Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 175. *die olivenfarbene Amsel aus der Barbarey.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 21. n. 10. *die Tripolische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 329. n. 10. Turdus (Tripolitanus) olivaceo-flavus, subtus albidus, remigibus nigris, rectricibus nigricantibus, apice albis.

30. Barbaricus. *Die grüne barbarische Drossel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 306. *die kurzbeinichte Drossel aus der Barbarey.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 20. n. 9. *die Drossel aus der Barbarey.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 329. n. 9. Turdus (Barbaricus) virescens, pectore albo nigricante-maculato, uropygio caudaque apice luteis.

Shaw, Reis. p. 164. *die grüne Drossel.*

31. Aonalaschkae. *Der Krammetsvogel von Unalaschka.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 315. n. 118. *der Krammetsvogel von Unalaschka.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 20. n. 8. *die Unalaschka-Drossel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 329. n. 8. Turdus (Aonalaschkae) fuscus, obscure maculatus, pectore flavo, nigro maculato, uropygio caudaque apice luteis.

3. Iliacus. *Die Weindrossel.* (1)

Müller, Natursyst. II. p. 530. n. 3. *die Zipdrossel.*

Leske, Naturgesch. p. 257. n. 3. *die Weindrossel; Zippe.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 166. n. 4. *die Weindrossel, Weißdrossel, Zipdrossel.*

Blumen-

(1) Gewicht 2 1/4 Unze. *Penn.* Wird häufig mit *Turdus Musicus* verwechselt.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 181. n. 3. Turdus (Iliacus) alis subtus ferrugineis, superciliis flavescentibus. *Rothdrossel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 502. n. 4. *die Rothdrossel.*

Funke, Naturgesch. I. p. 233. *die Weindrossel; Drossel.*

Ebert, Naturl. II. p. 128. *die Zipdrossel*

Halle, Vögel, p. 282. n. 235. *die Weißdrossel; Pfeifdrossel.*

Meyer, Thiere, II. p. 18. tab. 67. *Rothdrossel.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 391. n. 318. *die Buntdrossel; Winterdrossel; Heidedrossel; Walddrossel; Heideziemer, Behemle.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 319. D. *der rothfittige Krammetsvogel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 617. *die Rothdrossel.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 126. *Rothdrossel.*

Klein, av. p. 66. n. 3. Turdus iliacus; *Illas* aut *Tylas.*

Klein, Vorbereit. p. 124. n. 3. *Ziep-, Pfeifdrossel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 65. n. 3. *Zipdrossel; Pfeifdrossel; Weißdrossel; Singdrossel.*

Klein, Stemmat. av. p. 11. tab. 14. Fig. 6. a—c.

Klein, Vögeleyer, p. 23. tab. 9. Fig. 1.

Gesner, Vögelb. p. 432. *Winsel; Wintze; Bergtrostel; Boemerlein; Beemerziemar; Weintrostel; Rottrostel; Bitter; Gixerlein; Weingartvogel;* m. e. Fig.

Brisson, ornith. I. p. 216. n. 5. Mauvis.

Büffon, Vögel, VIII. p. 296. *die Rothdrossel;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 339. *die Rothdrossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 19. n. 7. *die Rothdrossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 329. n. 7. Turdus (Iliacus) griseo-fuscus, subtus albidus, maculis fuscis; alis subtus ferrugineis, superciliis albicantibus.

Beseke, Vögel Kurl. p. 74. n. 159. *die Zipdrossel.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 90. n. 3. *die Rothdrossel; Zippdrossel.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 411. *die Weindrossel.*

Fischer, Livl. p. 94. n. 135. *Pfeifdrossel.*

White, N. G. von Engl. p. 61. n. 2. p. 70. *Weißdrossel.*

Pennant, Reis. d. Schottl. II. p. 17. *Zipdrosseln.*

Pennant, britt. Thiergesch. p. 97. tab. 48. fig. 6. *Rothdrossel.*

Linné, Abhandlung. II. p. 283. n. 39. p. 301. n. 117. *die Zipdrossel.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 20. Turdus Iliacus.

Neue Schwed. Abhandl. IV. p. 48. Turdus Iliacus.

Zorn, Petinotheol. II. p. 313. *Rothdroschel; Weindroschel.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 160. n. 196. *Rothdrossel; Winterdrossel.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 161. n. 31. *Weißdrossel.*

Naturforsch. XVII. p. 81. n. 167. *die Zipdrossel.*

Meidinger, Vorles. I. p. 147. n. 3. *die Weindrossel.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 54. *Zipp-Drossel.*

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 266. *Rothdrossel.*

Krünitz, Encykl. IX. p. 642. *die Weiß- oder Ziepdrossel.*

Naumann, Vogelsteller, p. 77. *Zippdrossel.*

Geoffroy,

Geoffroy, mater. med. VII. p. 741. *Weindrossel; Gesangdrossel.*

Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 96.

Anweis. Vögel zu fang. p. 163. *Rothdrossel.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 29. n. 7. Turdus viscivorus.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 169. n. 4. Turdus (Musicus) alis subtus ferrugineis, linea superciliorum albicante.

Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 239. Turdus (Iliacus) alis subtus ferrugineis, superciliis albicantibus.

Kramer, Austr. p. 361. n. 9. Turdus alis subtus ferrugineis, linea supra oculos albicante. *Rothdroschl; Walddröscherl; Winterdroschl.*

Charleton, onom. zoic. p. 83. n. 3. *Illas*, nonnullis *Tyllas.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 361. Turdus minor; *Kleinziemer, Heide-Drossel; Bergdrossel; Winsel; Gixerle.*

Sibbald, Scot. p. 195. Turdus Iliacus.

Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 296. Turdus minor.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 424. Turdus Illas seu Tylas.

Jonston, av. p. 103. Illas.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. Turdus Iliacus.

Levin, britt. Birds, II. tab. 59.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 348. n. 3. *die Weindrossel.*

Donndorff, Natur u. Kunst, III. p. 529. *die Weindrossel.*

β. *Die bunte Weindrossel.* *

Frisch, Vögel, tab. 28. Fig. 2.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 611.

32. Minor. *Die kleine Drossel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 315. n. 117. *der kleine Krammetsvogel.*

Klein, av. p. 69. n. 23. Turdus minimus.

Klein, Vorbereit. p. 131. n. 23. *die kleinste Drossel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 69. n. 24. *kleine carolinische Drossel.*

Brisson, ornith. I. p. 217. n. 4. Mauvis de la Caroline.

Büffon, Vögel, VIII. p. 250. *die kleine karolinische Drossel*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 18. n. 5. *die kleine Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 328. n. 5. Turdus (Minor) fusco-rufescens, corpore subtus maculis nigricantibus vario, gula, abdomine crissoque albis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 62. *die kleinste Drossel.*

33. Jamaicensis. *Die jamaicaische Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 17. n. 4. *die Jamaikaische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 329. n. 4. Turdus (Jamaicensis) fusco-cinereus, subtus albus, gula iuguloque longitudinaliter fusco-striatis, pectore cinereo.

34. Guianensis. *Die guianische Drossel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 248. *die guianische Drossel*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 17. n. 3. *Die Guianische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 328. n. 3. Turdus (Guianensis) viridi-fuscus, subtus flavescente-albus, maculis longitudinalibus nigricantibus.

4. Mu-

4. Musicus. *Die Singdrossel.* (2)

Müller, Natursyst. II. p. 530. n. 4. *die Singdrossel.*
Leske, Naturgesch. p. 257. n. 4. *die Singdrossel.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 67. n. 5. *die Singdrossel; Weindrossel.*
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 181. n. 4. Turdus (Musicus) remigibus basi interiore ferrugineis.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 501. n. 3. *die Singdrossel; Zipdrossel.*
Funke, Naturgesch. I. p. 233 *die Singdrossel.*
Ebert, Naturl. II. p. 128. *Singdrossel; kleine Misteldrossel; Rothdrossel.*
Halle, Vögel, p. 283. n. 236. *die Gesangdrossel.*
Meyer, Thiere, II. p. 18. tab. 66. *Weißdrossel.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 390. n. 319. *die Sangdrossel; Sommerdrossel.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 318. C. *die Singdrossel.*
Onomat. hist. nat. VII. p. 624. *Weißdrossel; Singdrossel; Zippe.*
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 125. *Zippe; Pfeifdrossel.*
Klein, av. p. 66. n. 4. Turdus minimus, nostras.
Klein, Vorbereit. p. 124. n. 4. *Sangdrossel; weinrothe Drossel.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 66. n. 4. *Weindrossel; rothe Drossel; Sangdrossel.*
Klein, Stemmat. av. p. 11. tab. 14. Fig. 7. a—c. d.
Gesner, Vögelb. p. 433. *Trostel; Droschel; Drossel; Durstel; Sangdruschel; Weißtrostel.*
Brisson, ornith. I. p. 214. n. 2. petite Grive.
Büffon, Vögel, VIII. p. 227. *die Weißdrossel;* m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 338. *Weißdrossel.*
Latham, Syn. Suppl. p. 139. *Mavis - Throstle; Songthrush.*

(2) Gewicht 3 Unzen. *Penn.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 15. n. 2. *die Singdrossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 327. n. 2. Turdus (Musicus) supra griseo-fuscus, subtus albo-rufescens, maculis nigricantibus varius, remigibus basi interiore ferrugineis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 74. n. 160. *die Singdrossel.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 91. n. 4. *Sangdrossel; Graagdrossel; Wiendrossel.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 414. *die Singdrossel.*

Fischer, Livl. p. 94. n. 136. *Singdrossel.*

White, N. G. von Engl. p. 63. n. 2. p. 66. n. 2. p. 70. *Singdrossel.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 20. Turdus musicus.

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 3. *Taletrost.*

Olassen, Reis. d. Isl. I. p. 310. *Thröstr; Skogarthröstur.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 162. n. 32. *Singdrossel.*

Günther, Nest. u. Ey. tab. 33. *Weißdrossel.*

Linné, Abhandl. II. p. 283. n. 39. *Weindrosseln.*

Naturforsch. XVII. p. 82. n. 168. *die Singdrossel.*

Neue Schwed. Abhandl. IV. p. 48. Turdus musicus.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 159. n. 195. *Weißdrossel, oder Zippe.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 306. *die eigentlich sogenannte Droschel; Sang-, oder Weiß-Droschel.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 55. *Weindrossel, Pfeiffdrossel.*

Anweis. Vögel zu fang. p. 163. *Weißdrossel.*

Meidinger, Vorl. I. p. 147. n. 4. *Singdrossel.*

Krünitz, Encykl. IX. p. 643. *Rothdrossel; Bergdrossel; Winterdrossel.*

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 196.

Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 240. Turdus (Musicus) remigibus basi inferiore ferrugineis.

Kramer,

Kramer, Austr. p. 361. n. 8. Turdus alis subtus ochreis. *Weindroschl; Weißdroschl; Sommerdroschl.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 361. Turdus musicus. *Sangdrossel; Zierdrossel.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 424. Turdus musicus.

Belon, ois. p. 226. petite grive.

Jonston, av. p. 104. Turdus simpliciter dictus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. Turdus iliacus.

Schaefer, element. ornithol. tab. 68.

Zinnan. Uov. p. 37. tab. 5. fig. 20. Tordello.

Levin, britt. Birds. II. tab. 58.

Russel, Alepp. p. 65.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 348. n. 4. *die Singdrossel.*

Donndorff, Natur und Kunst, III. p. 531. *die Singdrossel.*

β. *Die weißköpfige Singdrossel.*

Brisson, ornithol. I. p. 215. A. petite grive à tête blanche.

Büffon, Vögel, VIII. p. 239. *Weißdrossel mit weißer Kopfplatte.*

Aldrovand. ornithol. II. p. 601.

Jonston, av. p. 103. Turdus leucocephalus.

γ. *Die gehäubte Singdrossel.*

Brisson, ornith. I. p. 215. B. petite grive hupée.

Büffon, Vögel, VIII. p. 240. *die gehäubte Drossel des Schwenkfeld.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 362. Turdus musicus cristatus. *Kobeldrossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 17. n. 6. *die Singdrossel mit dem Federbusch.*

δ. *Die weiße Singdrossel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 239. *die weiße Gesangdrossel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 68. n. 17. *weiße Drossel.*

Frisch, Vögel, tab. 33. *zweyerley weiße Drosseln.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 615.

Naturforscher, I. p. 62. n. 5.

ε. *Die Singdrossel mit weißem Halsringe.* *

Frisch, Vögel, tab. 27. fig. 2.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 611.

ζ. *Die graue Singdrossel.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 17. n. 5.

5. Olivaceus. *Die olivenfarbige afrikanische Drossel.*

Müller, Natursystem, II. p. 531. n. 5. *Olivendrossel.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 626. *die olivenfarbige Drossel.*

Brisson, ornithol. I. p. 240. n. 43. Merle olive du Cap de bonne esperance.

Büffon, Vögel, IX. p. 133. *die olivenfarbige capsche Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 60. n. 80. *die olivenfarbige Drossel.*

Latham, Syn. II. 1. p. 66. n. 80. Olive Trush.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 351. n. 88. Turdus (Olivaceus) fusco-olivaceus, subtus fulvus, remigibus rectricibusque lateralibus intus fuscis.

35. Indicus. *Die olivenfarbige indianische Drossel.*

Brisson, ornith. I. p. 241. n. 45. Merle olive des Indes.

Büffon,

Büffon, Vögel, IX. p. 138. *die olivenfarb'ge indische Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 61. n. 81. *die Indische Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 351. n. 89. Turdus (Indicus) viridi-olivaceus, remigibus intus fuscis, extus flavescentibus.

36. Cinereus. *Die aschgraue indianische Drossel.*

Brisson, ornith. I. p. 237. n. 39. Merle cendrée des Indes.

Büffon, Vögel, IX. p. 139. *die aschfarbige indische Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 61. n. 82. *die aschfarbige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 352. n. 90. Turdus (Cinerascens) cinereo-nigricans, subtus dilutior, tectricibus alarum maioribus, remigibus, rectricibusque lateralibus nigris.

6. Migratorius. *Die Wanderdrossel.*

Müller, Natursyst. II. p. 531. n. 6. *die Wanderdrossel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 312. n. 112. *der Krammetsvogel mit der rothen Brust.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 623. *die Zug- oder Wanderdrossel.*

Klein, av. p. 68. n. 17. Turdus musicus Carolinensis.

Klein, Vorbereit. p. 129. n. 17. *Karolinische Sangdrossel.*

Brisson, ornithol. I. p. 220. n. 9. Grive de Canada.

Büffon, Vögel, IX. p. 292. *der canadische Ziemer*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 23. n. 12. *die Wanderdrossel.*

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 330. n. 12. Turdus (Migratorius) griseus abdomine rufo, palpebris albis, rectrice extima interiore alba.

Seligmann, Vögel, II. tab. 58. *die carolinische Strichdrossel.*

Kalm, Reis. n. d. nördl. Amer. p. 58.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 349. n. 5. *die Wanderdrossel.*

7. TRICHAS. *Die gelbbrüstige Drossel.*

Müller, Natursyst. II. p. 531. n. 7. *die maryländische Drossel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 371. n. 200. *der Sänger mit der gelben Brust.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 371. n. 201. *der Sänger mit orangegelben Schenkeln.*

Onomat. hist. nat. III. p. 901. *die marilandische Bachstelze mit gelber Kehle.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 166. n. 1. *Gelbbrüstchen aus Maryland.*

Brisson, ornithol. I. p. 448. n. 58. Figuier de Maryland.

Büffon, Vögel, XVI. p. 105. *der schwarzbakkige Feigenesser.*

Martini, Naturlex. V. p. 122. *marylandische Bachstelze.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 519. n. 36. Sylvia (Trichas) olivacea, corpore subtus flavo, fascia oculari nigra.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 25. *das Gelbkehlchen aus Maryland.*

8. CANORUS. *Der bengalische Banjahbu.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 532. n. 8. *die bengalische Merle.*

Halle,

(3) Ist, nach *Latham*, mit *Lanius Faustus*, p. 311. n. 26. einerley.

Halle, Vögel, p. 500. n. 264. *die gelbfüßige braune bengalische Drossel.*

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 407. n. 23. *braungelbe Misteldrossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 614. *die Amsel oder Drossel von Bengala.*

Klein, av. p. 70. n. 30. Turdus bengalensis.

Klein, Vorbereitung. p. 132. n. 30. *braungelber Mistler.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 69. n. 30. *braungelber Mistler; Baniahbow.*

Brisson, ornithol. I. p. 230. n. 25. Merle de Bengale.

Büffon, Vögel, IX. p. 124. *der bengalische Banjahbu;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 32. n. 32. *die Schreydrossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 336. n. 34. Turdus (Canorus) griseus, subtus ferrugineus, linea alba pone oculos, cauda rotundata.

Seligmann, Vögel, VI. tab. 79. *die braune indianische Drossel.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 169. n. 5. Turdus (Canorus) griseus, subtus ferrugineus, linea alba ad latera capitis, cauda rotundata.

Hermann, tab. affin. anim. p. 211. Turdus Canorus.

9. Rufus. *Die rostfarbige Drossel.*

Müller, Natursyst. II. p. 532. *der rothe Krammetsvogel.*

Halle, Vögel, p. 296. n. 253. *die fuchsfarbene große Gesangdrossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 634. *die rothe Drossel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 312. n. 111. *der rostfarbige Krammetsvogel.*

Klein,

Klein, av. p. 69. n. 19. Turdus rufus.

Klein, Vorbereit. p. 130. n. 19. *rostige Drossel.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 68. n. 20. *rostige Drossel.*

Brisson, ornithol. I. p. 220. n. 8. Grive de la Caroline.

Büffon, Vögel, VIII. p. 334. *die Spottdrossel der Franzosen.*

Batsch, Thiere, I. p. 340. *die französische Spottdrossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 36. n. 4. *die rostfarbige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 338. n. 4. Turdus (Rufus) ferrugineus, subtus dilutior maculatus, remigibus unicoloribus, cauda rotundata, rectricibus rufis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 56. *die fuchsfärbige Drossel.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 169. n. 6. Turdus (Rufus) ferrugineus, subtus dilutior maculatus, remigibus unicoloribus, cauda rotundata.

10. POLYGLOTTUS. *Die amerikanische Nachtigall.*

Müller, Natursyst. II. p. 532. n. 10. *der Melodist.*

Leske, Naturgesch. p. 257. n. 5. *der vielstimmige Krammetsvogel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 168. n. 6. *die Spottdrossel.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 181. n. 5. Turdus (Polyglottus) fusco-cinereus, subtus albidus, maculis verticis, alarum et caudae candidis; *die americanische Nachtigall; Sinsonte.*

Halle, Vögel, p. 297. n. 255. *die graue langschwänzige Spottdrossel; Vielzungige Drossel; Vierhundertzunge.*

Gatterer,

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 393. n. 320. *Spottdrossel; Spötter.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 310. n. 110. *der Spötter; Centcontlatolli.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 632. *die größere Spottdrossel.*

Klein, av. p. 69. n. 21. Turdus minor cinereo-albus, immaculatus.

Klein, Vorbereit. p. 130. n. 21. *graue langschwänzige Drossel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 68. n. 22. *graue langgeschwänzte Drossel.*

Brisson, ornithol. I. p. 232. n. 29. grand Moqueur.

Büffon, Vögel, VIII. p. 322. *die große Spottdrossel des Brisson*, p. 327. *die Spottdrossel*; m. e. Fig.

Büffon, Vögel, VIII. p. 334. *der Spötter des Catesby.*

Batsch, Thiere, I. p. 340. *die eigentliche Spottdrossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 36. n. 42. *die Spottdrossel, oder der Spottvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 339. n. 45. Turdus (Polyglottus) obscure cinereus, subtus pallido-cinereus, remigibus primoribus exteriore dimidio albis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 54. *graue langschwänzige Drossel.*

Kalm, Reis. n. d. nördl. Amer. p. 361.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 169. n. 7. Turdus (Polyglottus) obscure cinereus, subtus pallide cinereus, macula alarum albida.

Charleton, onom. zoic. p. 68. n. 3. Mimus, sive Picus garrulus Indicus.

Hermann,

Hermann, tab. affin. anim. p. 212. Turdus Polyglottus.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 349. n. 6. *die amerikanische Nachtigall.*

11. Orpheus. *Der Spottvogel.*

Müller, Natursyst. II. p. 533. n. 11. *der Sänger.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 628. *die kleine Spottdrossel.*

Klein, av. p. 80. n. 27. Sylvia inferne ex albo cinerea, superne ex terreo colore cinerascens, genis albis; alis fusco et albo variis, rostro pedibusque nigricantibus.

Klein, Vorbereit. p. 151. n. 27. *bunter Wenzel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 81. n. 30. *Weißschmuzziger Wenzel mit weißen Backen.*

Brisson, ornith. I. p. 231. n. 27. Moqueur.

Büffon, Vögel, VIII. p. 320. *Brissons Spottvogel*, p. 321. *Cencontlatolli.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 336. *der Spötter des Edwards.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 37. n. 43. *der Orpheus.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 339. n. 47. Turdus (Orpheus) dorso fusco, pectore rectricibusque lateribus albidis, superciliis albis.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 51. *der kleinere Spötter.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 169. n. 8. Turdus (Orpheus) dorso fusco, pectore rectricibusque lateralibus albidis, alis fascia alba.

Charleton, onomast. zoic. p. 114. n. 17. Polyglotta.

Jonston, av. p. 177. Polyglotta.

β. *Der bunte Spottvogel.* (4)

Brisson, ornith. I. p. 232. n. 28. Moqueur varié.

Büffon,

(4) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

Büffon, Vögel, VIII. p. 321. *der Tzonpan.* p. 318. *die bunte Spottdrossel.*

Latham, Syn. II. 1. p. 41. — *Latham*, Vögel, II. 1. p. 38. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 340. n. 47. β. T. griseo-fuscus, nigro et candenti varius, subtus albus, cinereo et nigro maculatus.

Nieremberg, hist. nat. L. 10. c. 77. Tzonpan.

γ. *Der Thenca.* (5)

Latham, Syst. ornithol. I. p. 339. n. 46. Turdus (Thenca) fusco-cinereus, subtus pallido-cinereus, remigibus rectricibusque apice albis.

Vidaure, Chil. p. 74. *der Trenca.*

37. SANDWICHENSIS. *Die Drossel von den Sandwichinseln.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 35. n. 40. *die Sandwichische Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 338. n. 42. Turdus (Sandvicensis) pallide fuscus, subtus cum sincipite cinereo-albus, abdomine fuscescente.

38. PACIFICUS. *Die Drossel von den Freundschaftsinseln.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 35. n. 39. *die Drossel vom stillen Meere.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 338. n. 41. Turdus (Pacificus) cinereus, corpore subtus genisque fuscescente-albis, loris obscuris, cauda nigra apice alba.

39. SURATENSIS. *Die Drossel von Surate.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 35. n. 38. *die Suratische Drossel.*

Latham,

(5) Ich weiss nicht, warum *Latham* den Vogel als eine eigne Gattung aufstellt, da *Molina* ihn selbst nur für eine Spielart ausgiebt.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 338. n. 40. Turdus (Suratensis) capite cristato colloque nigris, subtus griseus, dorso uropygioque flavescentibus, alis viridibus nitentibus, remigibus primoribus caudaque nigris.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 151. *die Amsel von Surate.*

40. PHILIPPENSIS. *Die philippinische Drossel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 311. *die kleine philippinische Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 35. n. 37. *die Philippinische Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 338. n. 39. Turdus (Philippensis) olivaceo-fuscus, collo pectoreque rufis, albo-maculatis, abdomine flavescente-albo.

41. SHANHU. *Der Schonhu.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 34. n. 36. *die Shonhu-Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 337. n. 38. Turdus (Shanhu) viridi-fuscus, capite, collo inferiore, pectore abdomineque griseis, orbitis, gula iuguloque nigris, macula aurium alba.

42. NOVAE HOLLANDIAE. *Die neuholländische Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 34. n. 35. *die Neuholländische Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 337. n. 36. Turdus (Novae Hollandiae) caerulescente-plumbeus, facie, gula iuguloque nigris, remigibus nigricantibus, rectricibus lateralibus apice albis.

12. PLUMBEUS. *Der Thili.*

Müller, Natursyst. II. p. 533. n. 12. *die bleyfarbige Drossel.*

Halle,

Halle, Vögel, p. 298. n. 256. *die schwarzblaue geschlanke Drossel; mit hellrothen Schenkeln.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 631. *die bleyfärbige Drossel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 314. n. 116. *der Tilly.*

Klein, av. p. 69. n. 22. Turdus viscivorus plumbeus.

Klein, Vorbereit. p. 130. n. 22. *die bleyfarbige Drossel mit rothen Beinen.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 68. n. 23. *Hochschwanz mit rothen Füßen.*

Brisson, ornithol. I. p. 238. n. 40. Merle cendré d'Amerique.

Büffon, Vögel, VIII. p. 308. *der Tilly, oder die aschgraue amerikanische Drossel;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 31. n. 29. *die rothbeinige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 334. n. 29. Turdus (Plumbeus) ater, axillis luteis, cauda cuneata. *(Mas).*

Seligmann, Vögel, II. tab. 60. *die Drossel mit rothen Füßen.*

Vidaure, Chil. p. 76. *der Thile, oder Chile.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 169. n. 9. Turdus (Plumbeus) caerulescens, gula atra.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 350. n. 7. *der Thili.*

β. *Latham*, Syst. ornithol. I. p. 334. n. 29. β. T. caerulescens, gula atro-punctata, cauda cuneata, rectricibus quatuor exterioribus apice albis. *(Femina).*

43. Crassirostris. *Die dickschnäblige Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 31. n. 30. *die dickschnäblige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 335. n. 30. Turdus (Crassirostris) rufo-fuscus, subtus cinereus, pennis longitudinaliter medio striatis, rectricibus lateralibus obscure rufis.

44. Ulietensis. *Die Drossel von Ulieta.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 32. n. 31. *die rothbraune Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 335. n. 31. Turdus (Ulietensis) rufo-fuscus, alis, cauda rotundata pedibusque nigricantibus, rostro incarnato.

45. Pallidus. *Die graugelbe Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 28. n. 27. *die blasse Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 334. n. 27. Turdus (Pallidus) corpore flavescente-cinereo, subtus albido, collo lutescente, rectricibus fusco-cinereis, extimis apice albis.

46. Sibiricus. *Die sibirische Drossel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 342. *die Sibirische Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 28. n. 26. *die Sibirische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 333. n. 26. Turdus (Sibiricus) niger superciliis, alis subtus crissoque albis.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 5. n. 10. Turdus sibiricus.

47. Ruficollis. *Die rothhälsige Drossel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 341. *die rothhälsigte Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 28. n. 25. *die rothhälsige Drossel.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 333. n. 25. Turdus (Ruficollis) corpore supra fusco, subtus albo, collo rectricibusque lateralibus rufis.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 5. n. 9. Turdus ruficollis.

48. OBSCURUS. *Die dunkelbraune Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 27. n. 24. *die dunkele Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 333. n. 24. Turdus (Obscurus) corpore fusco, pectore nigricante, superciliis, gula crissoque albis.

49. PHOENICURUS. *Die rothschwänzige Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 27. n. 23. *die rothschwänzige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 333. n. 23. Turdus (Phoenicurus) viridi-olivaceus, fascia per oculos nigra, superciliis albis, collo inferiore, pectore rectricibusque lateralibus rufis.

50. RUFICAUDUS. *Die gelbrothschwänzige Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 27. n. 42. *die gelbrothschwänzige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 333. n. 22. Tetrao (Ruficaudus) olivaceo-fuscus, subtus purpureo albus, rectricibus lateralibus a basi ad medium rufis.

51. MALABARICUS. *Die malabarische Drossel.* (6)

Latham, Syn. Suppl. p. 140. Malabar Thrush.

Latham, Vögel, II. 1. p. 26. n. 21. *die Malabarische Drossel.*

 Latham,

(6) *Latham* hält ihn für das Weibchen von der folgenden Gattung. Die Trivialbenennung *Malabaricus* kommt im System p. 837. n. 125. nochmals vor.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 333. n. 21. Turdus (Malabaricus) cinereo - fuscus, subtus rufo-fuscus, capite colloque albo lineatis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 152. *der greise Eisvogel von der Küste Malabar.*

52. PAGODARUM. *Die Bramanendrossel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 140. Pagoda Thrush.

Latham, Vögel, II. 1. p. 26. n. 20. *die Pagoden-Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 332. n. 20. Turdus (Pagodarum) cristatus griseus, capite, corpore subtus, remigibus caudaque nigris, abdomine albo lineato, crisso albo.

Sonnerat, Reis. nach Ostind. und Chin. II. p. 148. *der Bramanen-Eisvogel.*

53. CAYENNENSIS. *Die aschgraue cayennische Drossel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 291. *der cayennische Ziemer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 25. n. 19. *die Cayennische Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 332. n. 19. Turdus (Cayanus) cinereus, subtus albus, pennis medio nigricantibus, gula nigricante, alis nigris tectricibus maioribus ferrugineo-marginatis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. Turdus cayanensis.

54. VARIEGATUS. *Die schwarz und weißbunte Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 25. n. 18. *die bunte Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 332. n. 18. Turdus (Variegatus) albescente nigroque variegatus, corpore supra fusco, subtus albescente.

Fermin,

Fermin, Surin. II. p. 169. *die zwote Art von Drosseln.*

55. STRIATUS. *Die gelbrückige Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 25. n. 17. *die gelbrükkige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 332. n. 17. Turdus (Striatus) flavo griseoque variegatus, stria dorsi longitudinali flava.

Fermin, Surin. II. p. 168. *die erste Art von Drosseln.*

56. FUSCUS. *Die braune Drossel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 314. n. 15. *der braune Krammetsvogel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 25. n. 16. *die braune Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 332. n. 16. Turdus (Fuscus) olivaceo-fuscus, pectore abdomineque albescentibus, maculis nigris fuscis.

57. MUSTELLINUS. *Die lohgelbe Drossel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 314. n. 114. *der hellbraune Krammetsvogel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 24. n. 15. *die lohgelbe Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 331. n. 15. Turdus (Mustelinus) rufo-fuscus, subtus albus maculis nigris, genis albo maculatis, uropygio, remigibus caudaque fuscis.

58. CAMTSCHATKENSIS. *Die kamtschatkische Drossel.* (7)

Pennant, arct. Zool. II. p. 319. E. *der Kamtschatkische Krammetsvogel.*

S 4 *Latham*,

(7) Ist, nach *Latham*, mit *Motacilla Calliope* p. 977. n. 129. einerley.

Latham, Vögel, II. 1. p. 24. n. 14. *die Kamtschatkische Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 331. n. 14. Turdus (Calliope) fusco ferrugineus, subtus flavescente albus, gula cinnabrina, albo nigroque marginata, loris nigris, superciliis albis.

59. NAEVIUS. *Die gefleckte Drossel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 314. n. 113. *der bunte Krammetsvogel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 23. *die gefleckte Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 331. n. 13. Turdus (Naevius) obscure cinereus, pileo nigricante, fascia pone oculos corporeque subtus ferrugineis, tectricibus alarum remigibusque ferrugineo maculatis, pectore fascia nigra.

60. HUDSONIUS. *Die hudsonische Drossel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 316. n. 120. *der Krammetsvogel von der Hudsonsbay.*

Latham, Syn. Suppl. p. 143. Hudsonian Thrush.

Latham, Vögel, II. 1. p. 81. n. 124. *die Hudsonische Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 362. n. 131. Turdus (Hudsonius) caeruleo-cinereus, vertice, nucha, tectricibus alarum uropygioque pallide-castaneo marginatis, cauda cinerea rotundata.

61. NOVEBORACENSIS. *Die neuyorkische Drossel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 316. n. 121. *der Krammetsvogel von Neuyork.*

Latham, Syn. Suppl. p. 144. New-York Thrush.

Latham, Vögel, II. 1. p. 81. n. 125. *die Neuyorkische Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 362. n. 132. Turdus (Noveboracensis) nigro subferrugineoque nebulosus, subtus nigricans, remigibus caudaque nigris

nigris viridi-nitentibus, supra et infra oculos vitta nigra.

62. CURAEUS. *Der Cureu.*

Molina, Chil. p. 223. *der Cureu.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 83. n. 131. *die Chilesische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 342. n. 53. Turdus (Curaeus) ater nitens, rostro substriato, cauda cuneiformi.

Vidaure, Beschr. von Chile, p. 75. *der Kereu.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 350. n. 8. *der Cureu.*

13. NITENS. *Die grüne angolische Drossel.*

Müller, Natursyst. II. p. 534. n. 13. *die grüne Drossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 622. *die grüne Amsel aus Angola.*

Brisson, ornith. I. p. 244. n. 53. Merle vert d'Angola.

Latham, Vögel, II. 1. p. 53. n. 60. *die Glanzdrossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 346. n. 66. Turdus (Nitens) viridis, macula tectricum alarum violacea nitida.

β. *Büffon*, Vögel, IX. p. 114. *die angolische grüne Amsel;* m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 56. A. — Suppl. p. 143. — Vögel, p. 53. n. 60. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 347. n. 66. β. T. olivaceo-nitens, caeruleo violaceoque splendens, alis maculis nigricantibus.

Edw. tab. 300. Blue and green Daw?

63. Aeneus. *Die Schillerdrossel.*

Brisson, ornith. I. p. 245. n. 54. Merle verd à longue queue du Senegal.

Büffon, Vögel, IX. p. 109. *die goldgrüne senegalische Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 53. n. 61. *die Schillerdrossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 347. n. 67. Turdus (Aeneus) viridis nitens, capite nigro aureo, abdomine cupreo, uropygio rectricibusque duabus intermediis purpureo splendentibus, cauda longissima cuneiformi.

64. Auratus. *Die Golddrossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 116. *die violette guianische Amsel;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 54. n. 62. *die Golddrossel.*

Latham, Syst. ornith I. p. 347. n. 68. Turdus (Auratus) viridis auratus, capite, collo corporeque subtus violaceis; cauda fasciaque alarum caeruleis.

65. Leucogaster. *Die weißbäuchige Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 169. *die violette weißbäuchige afrikanische Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 54. n. 64. *die weißbäuchige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 348. n. 71. Turdus (Leucogaster) violaceus, abdomine albo, remigibus nigricantibus.

15. Roseus. *Die rosenfarbige Drossel,* (*)

Müller, Natursyst. II. p. 534. n. 15. *die rosenfärbige Drossel.*

Borows-

(*) Kommt in grosser Zahl in die Gegend von Aleppo im Julius und August, wo sie die Schwärme von Heuschrecken verfolgt, und

Borowsky, Thierreich, III. p. 163. n. 1. *die Ackerdrossel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 504. n. 9. *die rosenfarbige Drossel.*

Halle, Vögel, p. 301. n. 267. *die rosenfarbige Ackerdrossel, mit liegendem Federbusche; Seestaar.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 320. G *der rosenrothe Krammetsvogel (Heuschreckenvogel.)*

Onomat. hist. nat. VII. p. 633. *die rosenfarbige Drossel.*

Klein, av. p. 71. n. 37. Turdus roseus, capite ex nigro caeruleo, et cirro retro compto, alis et cauda nigris; rostro ultra dimidium lutescente.

Klein, Vorbereit. p. 134. n. 37. *rosenfarbige Drossel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 70. n. 35. *haarzopfige Drossel.*

Brisson, ornith. I. p. 228. n. 20. Merle couleur de rose.

Büffon, Vögel, IX. p. 55. *die rosenfarbige Amsel;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 341. *die rosenfarbige Amsel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 142. Rose-coloured Thrush.

Latham, Vögel, II. 1. p. 46. n. 52. *die rosenfarbige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 344. n. 59. Turdus (Roseus) subincarnatus, capite, alis caudaque nigris, occipite cristato.

Seligmann, Vögel, I. tab. 39. *die rosenrothe oder fleischfarbene Amsel des Aldrovandi.*

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 415. *die rosenfarbige Bruch-Weidendrossel.*

Lepe-

und vertilgt, daher dieser Vogel von den Türken für heilig gehalten wird. In England ist er nur selten.

Lepechin, Tageb. d. ruſſ. Reiſ. I. p. 267. *die roſenfarbenen Droſſeln.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 23. *die roſenfarbene Droſſel.*

Linné, Abhandl. II. p. 301. n. 116. *die roſenfarbene Droſſel.*

Gmelin, Reiſ. d. Rußl. I. p. 153.

Wirſing, Vög. tab. 1. turdus aſiaticus.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 156. n. 191. *die roſenfarbne Droſſel.*

Martini, Naturlex. I. p. 219. tab. 14. *Ackerdroſſel.*

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 170. n. 1. Turdus (Roſeus) ſubincarnatus, capite, alis caudaque nigris, occipite criſtato.

Charleton, onom. zoic. p. 84. n. 5. Merula roſea.

Jonſton, av. p. 107. Merula roſea.

Brückmann, epiſt. itin. p. 161. avis incognita.

Forskål, fn. orient. p. VI. n. 16. Turdus Seleucis; Grylli-vora. Arab. *Samarmar.*

Forskål, deſcript. anim. p. 5. n. 16. Turdus (Seleucis) roſtro pedibusque flavicantibus; abdomine dorſoque incarnatis, cauda, alis femoribusque fuſcis.

Ruſſel, Alepp. p. 70. Locuſt bird. (*Heuſchreckenvogel.*)

Levin, britt. bird. II. tab. 64.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. Turdus roſeus.

66. Leucurus. *Die weißſchwänzige Droſſel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 142. White-tailed Thruſh.

Latham, Vögel, II. 1. p. 46. n. 51. *die weißſchwänzige Droſſel.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 344. n. 58. Turdus (Leucurus) niger, uropygio, femoribus caudaque a baſi fere ad apicem albis.

Faun.

Faun. arragon. p. 72. Corvus totus niger, rectricibus basi albis?

16. CAFER. *Die cafferſche Droſſel.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 534. n. 16. *die cafriſche Droſſel.*

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 613. *die gehaubte Amſel vom Vorgeb. d. g. H.*

Briſſon, ornithol. I. p. 229. n. 23. Merle hupé du Cap de bonne eſperance.

Büffon, Vögel, IX. p. 151. *die gehaubte Amſel;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 65. n. 92. *die Capſche Droſſel.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 354. n. 99. Turdus (Cafer) nigricans ſubcriſtatus, capite nigro-violaceo, uropygio ventreque albis, criſſo rubro.

Sonnerat, Reiſ. n. Oſtind. u. Chin. II. p. 154. *die ſchwarzköpfige Grasmücke aus China.*

β. *Latham*, Syn. II. 1. p. 72. n. 92. Var. A. — Vögel, II. 1. p. 66. n. 92. A.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 354. n. 16. β. T. fuſco-cinereus, fuſco lineatus, ſubtus cinereo-albus, capite nigro, criſſo coccineo rectricibus tribus lateralibus apice albis.

67. MACROURUS. *Die langſchwänzige Droſſel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 66. n. 93. *die langſchwänzige Droſſel.* Tab. 40.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 354. n. 100. Turdus (Macrourus) nigro-caeruleſcens, ventre rufo, uropygio rectricibusque tribus extimis albis.

β. *Sonnerat*, Reiſ. n. Oſtind. u. Chin. II. p. 153. *die langgeſchwänzte Grasmücke aus Gingi.* — *Latham*, Vögel, II. 1. p. 66. ad n. 93.

68. AMBOINENSIS. *Die amboinische Drossel.*

Brisson, ornith. I. p. 226. n. 16. Merle d'Amboine.

Büffon, Vögel, IX. p. 153. *die amboinische Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 66. n. 94. *die Amboinische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 354. n. 101. Turdus (Amboinensis) fusco-rubescens, corpore subtus remigibusque minoribus prima medietate flavescentibus, rectricibus subtus aureis.

69. BORBONICUS. *Die bourbonische Drossel.*

Brisson, ornith. I. p. 239. n. 42. Merle de l'Isle de Bourbon.

Büffon, Vögel, IX. p. 154. *die Amsel von Bourbon.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 67. n. 95. *die Bourbonische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 355. n. 102. Turdus (Borbonicus) cinereo-olivaceus, subtus flavicans, vertice nigro, rectricibus fuscis, fasciis duabus saturatioribus.

70. OCHROCEPHALUS. *Die gelbköpfige Drossel.* (8)

Latham, Syn. Suppl. p. 143. Yellow-crowned Thrush.

Latham, Vögel, II. 1. p. 67. n. 96 *die gelbköpfige Drossel.* (*Tsut-ju-Craven*, in Java.)

Latham, Syst. ornith. I. p. 355. n. 103. Turdus (Ochrocephalus) pileo genisque flavis, corpore subtus cinereo, remigibus rectricibusque obscure viridibus, sub genis striga alba.

71. ORIENTALIS. *Die schwarze indianische Drossel.*

Brisson, ornith. I. p. 227. n. 19. Merle des Indes.

Büffon,

(8) Ist, nach *Latham*, mit *Sturnus Ceylanicus*, p. 804. n. 11. einerley.

Büffon, Vögel, IX. p. 160. *der Terat-Bu'on, oder die indische Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 67. n. 97. *die Drossel mit dem aschgrauen Steiße.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 355. n. 104. Turdus (Orientalis) niger, subtus albus, uropygio cinereo, fascia per oculos nigra, rectricibus nigris, tribus extimis apice albis.

72. NIGERRIMUS. *Die Savigala.*

Brisson, ornith. I. p. 217. n. 18. Merle doré de Madagascar.

Büffon, Vögel, IX. p. 162. *die madagascarische Goldamsel, oder Savigala;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 68. n. 98. *die schwarzwangige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 356. n. 105. Turdus (Savi-jala) splendide niger, marginibus pennarum citrinis, gutture, remigibus, rectricibusque nigris.

73. HISPANIOLENSIS. *Die olivenfarbige domingische Drossel.*

Brisson, ornith. I. p. 240. n. 44. Merle olive de St. Domingue.

Büffon, Vögel, IX. p. 172. *die olivenfarbne Domingische Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. 68. n. 99. *die Drossel von Hispaniola.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 356. n. 106. Turdus (Hispaniolensis) olivaceus, subtus grisescens, remigibus rectricibusque fuscis, extus violaceis.

β. *Die olivenfarbige cayennische Drossel.* *

Büffon, ois. III. p. 404. — Pl. enl. 558. 2. Merle olive de Cayenne.

Büffon, Vögel, IX. p. 173. *die olivenfarbige kayennische Amsel;* m. e. Fig.

Latham,

Latham, Syn. II. 1. p. 76. *
Latham, Syst. ornith. I. p. 356. n. 106. β. T. olivaceus subtus griseo-albus, crisso flavescente, remigibus rectricibusque fuscis.

74. ALBIFRONS. *Die weißstirnige Drossel.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 64. n. 91. *die weißstirnige Drossel.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 354. n. 98. Turdus (Albifrons) plumbeo nigricans, subtus obscure flavescens, sincipite macula alba.
β. *Latham*, Syn. II. 1. p. 71. n. 91. Var. A.
Latham, Syn. Suppl. p. 143. — Vögel, II. 1. p. 65. n. 91. Var. A.
Latham, Syst. ornith. I. p. 350. n. 98. β. T. niger, corpore subtus lateribusque sincipitis utrinque macula albis.

17. CAPENSIS. *Die capsche Drossel.*
Müller, Natursyst. II. p. 535. n. 17. *die capsche Drossel.*
Onomat. hist. nat. VII. p. 614. *die braune Amsel vom Vorgeb. d. g. H.*
Brisson, ornith. I. p. 230. n. 24. Merle brun du Cap de b. E.
Büffon, Vögel, IX. p. 147. *die braune capsche Amsel.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 64. n. 90. *die bräunliche Drossel.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 353. n. 97. Turdus (Capensis) nigricans, abdomine subflavescente, crisso luteo.
β. *Büffon*, Vögel, IX. p. 148. *Abänderung der braunen kapschen Amsel.*
Latham, Syn. II. 1. p. 71. n. 90. Var. A. — Vögel, II. 1. p. 64. n. 90. Var. A.
Latham, Syst. ornith. I. p. 353. n. 97. β.

18. Atricapillus. *Die schwarzköpfige Drossel.*

Müller, Natursyst. II. p. 535 n. 18. *die Amsel.*
Onomat. hist. nat. VII. p. 612. *die schwarzköpfige Amsel vom Vorgeb. d. g. H.*
Brisson, ornith. I. p. 252 n. 66. Merle à tête noire du Cap de bonne Esperance.
Büffon, Vögel, IX. p. 145. *die schwarzköpfigte capsche Amsel;* m. e. Fig.
Latham, Vögel, II. 1. p. 63. n. 89. *die schwarzköpfige Drossel.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 353. n. 96. Turdus (Atricapillus) nigricans, capite atro, abdomine uropygioque rufis, macula alarum alba.

75. Mauritianus. *Die Drossel von Isle de France.*

Büffon, Vögel, IX. p. 144. *die grüne Amsel von der Isle de France;* m. e. Fig.
Latham Vögel, II. 1. p. 63. n. 88 *die Mauritius-Drossel.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 349. n. 75. Turdus (Mauritianus) toto corpore virescente caeruleo, pennis capitis collique longioribus angustis.

76. Mindanaensis. *Die Drossel von Mindanao.*

Büffon, Vögel, IX. p. 143. *die Amsel von Mindanao.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 63. n. 87. *die Mindanaische Drossel.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 353. n. 95. Turdus (Mindanensis) caeruleo-chalybeus, corpore subtus strigaque longitudinali alarum albis.

77. Madagascariensis. *Der Tanaombé.*

Brisson, ornith. I. p. 234. n. 33. Merle de Madagascar.

Büffon, Vögel, IX. p. 141. *der Tanaombé, oder madagascarische Amsel;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 62. n. 86. *die Madagaskarische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 352. n. 94. Turdus (Madagascariensis) fuscus, subtus albus, pectore lateribusque rufescentibus, macula alarum rufo-aurea, rectricibus duabus intermediis, lateraliumque marginibus viridi-auratis, extimis margine exteriore albis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. Turdus madagascarius.

78. Senegalensis. *Die Senegalische Drossel.*

Brisson, ornith. I. p. 231. n. 26. Merle du Sénégal.

Büffon, Vögel, IX. p. 140. *die braune Senegalische Amsel;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 62. n. 85. *die Senegalsche Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 352. n. 93. Turdus (Senegalensis) griseo-fuscus, ventre sordide albo, remigibus rectricibusque fuscis.

79. Longirostris. *Die langschnäblige Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 62. n. 84. *die langschnäblige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 352. n. 92. Turdus (Longirostris) fusco-virescens, subtus flavus, superciliis rectricibusque extus flavescentibus.

80. Griseus. *Die graue Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 61. n. 83. *die graue Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 352. n. 91. Turdus (Griseus) griseus, subtus griseo-rubescens, vertice cerviceque albidis.

Sonne-

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 150. *die graue Amsel aus Gingi.*

19. PALMARUM. *Die Palmendrossel.*

Müller, Natursyst. II. p. 535. n. 19. *die Palmdrossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 620. *die Palmdrossel.*

Brisson, ornith. I. p. 242. n. 47. Palmiste.

Büffon, Vögel, IX. p. 166. *die Palmenamsel;* m. e. Fig. (eigentlich p. 167.)

Latham, Vögel, II. 1. p. 69. n. 101. *die Palm-Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 356. n. 108. Turdus (Palmarum) viridi-olivaceus, subtus subcinereus, sincipite genisque nigris, maculis utrinque tribus albis.

β. *Die schwarzköpfige Palmendrossel.* (9)

Brisson, ornith. I. p. 242. n. 48. Palmiste à tête noire.

Büffon, Vögel, IX. p. 166. Palmiste.

Latham, Syn. II. 1. p. 77. n. 101. Var. A. — Vögel, II 1. p. 69. n. 110. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 357. n. 108. β.

81. MONACHA. *Die Nonnendrossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 176. *die abyssinische Nonne, oder Molopita.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 70. n. 102. *die Nonnen-Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 357. n. 109. Turdus (Monacha) fusco-luteus, subtus lutescens, capite colloque inferiore nigris.

82. AETHIOPICUS. *Die aethiopische Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 177. *die schwarz und weisse abyssinische Amsel.*

(9) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

Latham, Vögel, II. 1. p. 70. n. 103. *die Aethiopische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 357. n. 110. Turdus (Aethiopicus) niger, corpore subtus fasciaque alarum albis.

83. Abyssinicus. *Die abyssinische Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 179. *die braune abyssinische Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 70. n. 104. *die Abyssinische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 357. n. 111. Turdus (Abyssinicus) fuscus, remigibus caudaque saturatioribus, gutture fuscescente, corpore subtus fulvo.

84. Cochinchinensis. *Die cochinchinesische Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 181. *der kochinchinesische Grünling.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 71. n. 106. *Die Drossel mit schwarzem Kinne.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 357. n. 113. Turdus (Cochinsinensis) viridis, loris gulaque nigris, sub gula lunula lata flava, ad basin rostri utrinque macula caerulea.

85. Cinnamomeus. *Die zimmetfarbige Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 150. *die kayennische Amsel mit der Halsbinde;* m. e. Fig.

Latham Vögel, II. 1. p. 71. n. 107. *die schwarzbrüstige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 358. n. 114. Turdus (Cinnamomeus) testaceo-ruber, collo inferiore nigro undique albo marginato, tectricibus alarum nigris, minoribus albo-, mediis maioribusque rufo-terminatis.

86. Ru-

86. Rufifrons. *Die rothstirnige Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 170. *die gelbrothe cayennische Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 72. n. 108. *die gelbrothe Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 358. n. 115. Turdus (Rufifrons) fuscus, sincipite, lateribus capitis corporeque subtus rufis, tectricibus alarum nigris flavo-marginatis, cauda cinerea, tectricibus inferioribus albis.

87. Cantans. *Der Arada.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 193. *der Arada;* mit e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 72. n. 109. *die flötende Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 358. n. 116. Turdus (Arada) rufo-fuscus, nigricante transversim striatus, subtus albidus, sub oculis macula nigra, albo-punctata, genis colloque interiore rufo-fulvis.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 103. *der Arada.*

88. Coraya. *Der Coraya.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 199. *die Ameisen-Nachtigall, mit gebändertem Schwanz.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 73. n. 110. *die Coraya-Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 358. n. 117. Turdus (Coraya) rufo-fuscus, pileo lateribusque capitis et colli nigris, gula, iugulo strigisque sub oculis albis, cauda grisea, fasciis nigris.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 104. *der Coraya.*

89. Fuscipes. *Die braunfüßige Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 74. n. 111. *die lohflügelige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 359. n. 118. Turdus (Fuscipes) cinereus, subtus obscure rufus, pileo nigro, tectricibus alarum flavescente fasciatis.

90. Alapi. *Der Alapi.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 201. *die buntflügelichte Ameisen-Nachtigall.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 74. n. 112. *die weißrükkige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 359. n. 119. Turdus (Alapi) fuscus, subtus cinereus, collo inferiore pectoreque nigris, tectricibus alarum albo punctatis, dorso macula alba.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 102. *der Alapi.*

91. Cirrhatus. *Die geschopfte Drossel.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 183. *der Ameisenvogel mit dem Zopf.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 74. n. 113. *die Drossel mit schwarzem Federbusche.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 359. n. 12. Turdus (Cirrhatus) cristatus griseo-cinereus, pileo, collo inferiore pectoreque nigris, gula albo varia, tectricibus alarum apice, rectricibus margine et apice albis.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 102 *der gehäubte Ameisenfresser.*

92. Titinnabulatus. *Der Glockenspieler.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 187. *der Ameisenvogel, Glöckner.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 75. n. 114. *die Läute-Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 359. n. 121. Turdus (Campanella) fuscus, subtus uropygioque rufo-fulvus, gula alba, pileo genisque albis, nigro

nigro maculatis, superciliis strigaque pone oculos nigris.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 102. *der Glokkenspieler.*

93. Bambla. *Der Bambla.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 190. *der Ameisenvogel, Bambla, oder Weißbinde.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 75. n. 115. *die schwarzflügelige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 360. n. 122. Turdus (Bambla) nebulosus, supra rufo-fuscus, subtus cinerascens, alis nigris fascia alba, cauda nigricante brevi.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 103. *der Bambla.*

94. Auritus. *Die weißöhrige Drossel.* (10)

Büffon, Vögel, XIII. p. 185. *der weißöhrigte Ameisenvogel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 76. n. 116. *die weißöhrige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 360. n. 123. Turdus (Auritus) rufo-olivaceus, fusco-varius, abdomine albo, gula iuguloque nigris, vertice fasciaque pectorali rufo-fuscis, vitta aurium argentea.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 102. *der weißöhrige Ameisenfresser.*

95. Colma. *Der Colma.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 181. *der Ameisenvogel, Colma;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 76. n. 117. *die Colma-Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 360. n. 124. Turdus (Colma) rufo-fuscus, subtus cinereus, lunula nuchae

(10) Ist nach *Latham*, mit *Pipra Leucotis* p. 1003. n. 19. einerley.

nuchae rufa, iugulo albo nigroque vario, macula narium gulaque albis.

Samml. zur Phyf. u. N. G. III. p. 102. *der Colma.*

β. *Der Tetema.* (1)

Büffon, Vögel, XIII. p. 182. *der Ameisenvogel Tetema;* m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 86. — Vögel, II. 1. p. 77. n. 117. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 360. n. 124. *β.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 102. *der Tetema.*

96. Tinniens. *Der Läutvogel.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 175. *der größere läutende Ameisenvogel;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 77. n. 118. *die Larum-Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 360. n. 125. Turdus (Tinniens) fuscus, subtus albus, pectore nigricante nebuloso.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 101. *der große Befroi.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 350. n. 9. *der Läutvogel.*

97. Lineatus. *Die gestreifte cayennische Drossel.* (2)

Büffon, Vögel, XIII. p. 177. *der kleinere läutende Ameisenvogel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 78. n. 119. *die gesprenkelte Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 361. Turdus (Lineatus) fusco-olivaceus, subtus albus fusco punctatus, lateribus colli albo lineatis, rectricibus alarum maculis rufis.

98. For-

(1) *Büffon* hält den *Tetema* für das Männchen, und den *Colma* für das Weibchen. *Latham* umgekehrt.

(2) Nach *Büffon* eine Abart vom vorigen.

98. Formicivorus. *Der Palikour.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 178. *der Ameisenvogel, Palikour*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. I. p. 78. n. 120. *die Ameisendrossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 361. n. 127. Turdus (Formicivorus) ruso-fuscus, subtus albidus, macula dorsali, collo inferiore pectoreque nigris, tectricibus alarum flavo-maculatis, cauda rufa.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 101. *der Palikour.*

β. T. jugulo rufo, nigro marginato; cauda apice nigro, inter scapulas macula alba. *Latham* l. c. *

γ. T. jugulo nigro medio albo. *Lath.* l. c. *

δ. T. abdomine et crisso cinereis, femoribus rufofuscis. *Lath.* l. c. *

99. Cyanurus. *Die blauschwänzige Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 183. *der Blauling*; mit e. Fig.

Büffon, Vögel, XIII. p. 174. *der himmelblaue Ameisenvogel.*

Latham, Vögel, II. I. p. 79. n. 121. *die blauschwänzige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 361. n. 128. Turdus (Cyanurus) rufo-fuscus, subtus flavus, abdomine caeruleo fasciato, pileo lateribusque colli striga longitudinali nigris, fascia pectorali caudaque caeruleis.

100. Rex. *Die Königsdrossel.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 171. *der größte Ameisenvogel*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 80. n. 122. *die Königs-Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I p. 361. n. 129. Turdus (Grallarius) fusco-nebulosus, subtus rufescens, maxillae inferioris striga, macula pectoris crissoque albis, nucha plumbea.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 100. *der König der Ameisenfresser.*

20. Sinensis. *Der Hoamy.*

Müller, Natursyst. II. p. 335. n. 20 *der chinesische Krammetsvogel.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 635. *die chinesische Drossel.*

Brisson, ornithol. I. p. 219. n. 7. Grive de la Chine.

Büffon, Vögel, VIII. p. 312. *der chinesische Hoamy.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 33. n. 33. *die chinesische Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 337. n. 35. Turdus (Sinensis) rufescens, capite fusco-striato, superciliis albis, rectricibus fuscis strigis obscurioribus, pedibus flavis.

101. Arcuatus. *Die Bogendrossel.*

Latham, Vögel, I. 1. p. 34. n. 34. *die mondhälsige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 337. n. 36. Turdus (Arcuatus) rufo-fuscus, corpore subtus superciliis, lorisque albis, cervice, iugulo pectoreque rubentibus, genis lunulaque sub gula nigris.

102. Melanopis. *Die Drossel mit schwarzem Gesichte.*

Ist nach *Latham*, mit *Turdus Shanna* p. 814. n. 41. einerley.

103. Vio-

103. VIOLACEUS. *Die violette Drossel.*

Latham, Syn. II. 1. p. 57. n. 63. Violet Thrush.

Latham, Vögel, II. 1. p. 54. n. 63. *die violette Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 347. n. 69. Turdus (Violaceus) violaceo-nitens, pennis capitis, colli, pectoris tectricibusque alarum caeruleo-chalybeis, macula alarum femoribusque intus albis.

Sonnerat, Reis. nach Ostind. und Chin. II. p. 147. *die blaue chinesische Amsel.*

104. LEUCOCEPHALUS. *Die weißköpfige Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 55. n. 66. *die weißköpfige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 348. n. 73. Turdus (Leucocephalus) cinereo-griseus, capite colloque albis, alis caudaque viridi-cupreis, remigibus nigris, macula alarum alba.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 149. *die chinesische Dominicaner Amsel.*

105. NIGRICOLLIS. *Die schwarzhälsige Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 56. n. 68. *die schwarzhälsige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 349. n. 76. Turdus (Nigricollis) fusco-ferrugineus, subtus fusco-albus, capite toto albo, collo, remigibus caudaque nigris, secundariis apice albis.

106. BUBIL. *Der Bubil.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 56. n. 70. *die Pfeif-Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 349. n. 78. Turdus (Bonbil) fuscus, pone aures fascia nigra.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 150. *der chinesische Bubil.*

107. PER-

107. Perspicillatus. *Die Brillendrossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 108. *die chinesische Amsel;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 57. n. 71. *die Brillen-Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 349. n. 79. Turdus (Perspicillatus) griseo-viridis subtus flavescente-albus, capite colloque cinereis, sincipite lunulaque sub oculis nigris.

108. Flavus. *Die gelbe Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 58. n. 74. *die gelbe Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 350. n. 82. Turdus (Flavus) fulvus orbitis albis, fascia oculari nigra.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 152. *die gelbe chinesische Amsel.*

109. Viridis. *Die grüne chinesische Drossel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 339. *die Drossel Chaumi.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 60. n. 79. *die grüne Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 351. n. 87. Turdus (Virescens) griseo-viridis, corpore subtus, superciliis maculaque subocalari albis, gula grisea albo-maculata, pectore lateribusque rufis.

110. Ater. *Die schwarzkehlige Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 134. *die schwarzkehligte domingische Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 59. n. 78. *die schwarzkehlige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 351. n. 86. Turdus (Jugularis) griseo-fuscus, subtus flavo-virescens maculis sparsis nigris, facie, gula iuguloque nigris, rufo-marginatis.

21. DOMINICUS. *Die grau und weiße domingosche Drossel.*

Müller, Natursyst. II. p. 436. n. 21. *die domingische Drossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 607. *die Amsel von St. Domingo.*

Brisson, ornith. I. p. 237. n. 38. Merle de S. Domingue.

Büffon, Vögel, VIII. p. 338. *die domingosche Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 38. n. 44. *die Domingo-Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 340. n. 48. Turdus (Dominicus) subfuscus, subtus albus, remigibus primoribus basi albis, rectricibus 3. extimis albis.

III. BRASILIENSIS. *Die brasilianische Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 39. n. 45. *die gelbbäuchige Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 340. n. 49. Turdus (Brasiliensis) niger, subtus flavescens, dorso infimo ferrugineo, fascia alarum alba, rectricibus tribus exterioribus, apice, extimis toto albis.

22. MERULA. *Die* (gemeine) *Amsel.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 536. n. 22. *die Merle, oder Amsel.*

Leske, Naturgesch. p. 257. n. 6. *die Amsel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 169. n. 8. *die Amsel, Schwarzdrossel.*

Blumen-

(3) Gewicht 4. Unzen. *Penn.* Zuweilen, aber selten, finden sich Amseln mit schwarzen Schnäbeln und schwarzen Füssen. — Brütet 2. mal. Die jungen Männchen ähneln vor der ersten Mauser der Mutter mehr als dem Vater; der gelbe Schnabel kommt erst im Frühjahr zur Zeit der Paarung zum Vorschein.

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 182. n. 6. Turdus (Merula) ater, roſtro palpebrisque flavis; *die Amſel.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 503. n. 6. *die Schwarzdroſſel.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 612. *die ſchwarze Amſel.*

Funke, Naturgeſch. I. p. 234. *die Schwarzdroſſel.*

Ebert, Naturl. II. p. 129. *die Amſel.*

Halle, Vögel, p. 285. n. 237. *die Amſel.*

Meyer, Thiere, II. p. 18. tab. 68. *ſchwarze Amſel.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 395. n. 322. *die Amſel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 321. I. *die Amſel.*

Beckmann, Naturhiſt. p. 52. c. *die Amſel.*

Neuer Schaupl. der Natur. I. p. 282. *Amſel.*

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 618. *gemeine Amſel; Kohlamſel.*

Handb. der Naturgeſch. II. p. 199. *die Amſel.*

Handb. der deutſch. Thiergeſch. p. 126. *die Amſel.*

Klein, av. p. 66. n. 5. Turdus niger; Merula ſimpliciter.

Klein, Vorbereit. p. 125. n. 5. *Schwarze Droſſel; Amſelmeerle.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſtor. p. 66. n. 5. *Amſel; Meerle.*

Klein, ſtemmat. av. p. 11. tab. 13. fig. 2. a — c.

Gesner, Vögelb. p. 34. *Amſel; Merl; Merlaer; Merel; Lyſter.* Fig. p. 35.

Briſſon, ornith. I. p. 221. n. 10. Merle.

Büffon, Vögel, IX. p. 5. *die Amſel;* m. 2. Fig. M. u. N.

Batſch, Thiere, I. p. 340. *die Amſel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 141. Black-bird.

Latham, Vögel, II. 1. p. 39. n. 46. *die Schwarzdroſſel.*

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 340. n. 50. Turdus (Merula) rostro, palpebris pedibusque fulvis.
Beseke, Vögel Kurl. p. 74 n. 161. *die Merle.*
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 92. n. 5. *die Schwarzdrossel.*
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 415. *die Merle.*
Fischer, Liv. p. 94. n. 138. *schwarze Amsel.*
Cetti, Sardin. II. p. 164. *die Amsel.*
White, N. G. von Engl. p. 64. n. 11. p. 66. n. 4. *Schwarze Amsel.*
Adanson, Senegal. p. 278. *Amseln?*
Boswell, Beschr. von Corsic. p. 45. *die Amsel.*
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *die schwarze Amsel.*
Carver, Reis. durch Nordamer. p. 391. *Krähenamsel?*
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 161. n. 197. *die schwarze Amsel.*
Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 4. *Selsort.*
Pontoppidan, Norweg. II. p. 183. *Soolsort.*
Georgi, Reis. I. p. 173.
Borkhausen, Magaz. I. p. 162. n. 33. *die Amsel.*
Naturforsch. XVII. p. 83. n. 171. *die Merle.*
Krünitz, Encykl. I. p. 701. *Amsel.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 55. *Schwarz-Amsel.*
Naumann, Vogelsteller, p. 82. *schwarze Amsel.*
André u. Bechstein, Spazierg. III. p. 12. 16.
Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. III. 1. p. 62. VI. 3. p. 135.
Hervieux, Canarienvög. p. 133. *Amsel.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 318. *die gemeine schwarze Amsel.*
Geoffroy, mat. med. VII. p. 544. *Amsel.*
Meidinger, Vorles. I. p. 147. n. 5. *die Amsel.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 89. *Amsel.*
Forst-, Fisch- u. Jagdlex. I. p. 86. *Schwarzamsel.*

Börner,

Börner, neue schlef. ökonom. Nachr. II. p. 99. *schwarze Amsel.*

Loniceri, Kräuterb. p. 676. *Amsel.*

Lemmery, Materiallex. p. 727.

Oekon. Zool. p. 95. n. 37. *die Amsel.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 47. *Amsel.*

Zückert, Speis. aus d. Thierreich, p. 97.

Haus- u. Landbibl. II. p. 477.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. Merula nigra.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 29. n. 2. Merula nigra.

Linné, Syst Nat. Ed. X. I. p. 170. n. 12. Turdus (Merula) ater, rostro palpebrisque fulvis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 29. n. 241. Turdus (Merula) ater, rostro pedibusque fulvis.

Kramer, Austr. p. 360. n. 3. Turdus ater, rostro palpebrisque fulvis. *Amaxl.*

Brünniche, ornithol. bor. p. 66. n. 234. Turdus Merula.

Charleton, onom. zoic. p. 83 n. 3. Merula.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 300. Merula nigra. *Amsel; Meerle.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 394. Merula vulgaris.

Sibbald, Scot. p. 214. Merula.

Jonston, av. p. 104. Merula.

Zinnan. Uov. p. 39. tab. 5. fig. 22. Merla.

Belon, oif. p. 30. Merle noir.

Salerne, hist. nat. des oif. p. 126. 176.

Heerkens, av. Fris. p. 245. Merula.

Hist. Prov. I. p. 491. Merle.

Levin, britt. Birds. II. tab. 61. Black-bird.

Voyage en Barbar. I. p. 272. Merle.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 29. c. 53. Merulae.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 2. n. 52. 169. Κοττυφος.

Aelian,

Aelian. de nat. anim. L. 12. c. 28. Κοσσυφος.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 351. n. 10. *die Amsel.*

β. *Die weißköpfige Amsel.*

Brisson, ornith. I. p. 222. A. Merle à tête blanche.
Büffon, Vögel, IX. p. 24. *die weißköpfigte Amsel.*
Latham, Syn. II. 1. p. 44. White-headed Black-bird.
Latham, Vögel, II. 1. p. 41. n. 46. Var. A. *die weißköpfige Schwarzdrossel.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 341. n. 50. β. T. capite albo, pone oculos alasque supra albo variegatus; rostro, pedibus iridibusque luteis.
Aldrov. ornithol. II. L. 16. c. 6. p. 277. Merula Leucocephalos.
Charleton, onom. zoic. p. 84. n. 1. Merula Leucocephalus.
Jonston, av. p. 104. Merula Leucocephalus.

γ. *Die bunte Amsel.*

Brisson, ornithol. I. p. 222. B. Merle varié.
Büffon, Vögel, IX. p. 23. *die weißgefleckte Amsel.*
Klein, av. p. 68. n. 16. Turdus niger. Merulus variegatus.
Klein, Vorbereit. p. 129. n. 16. *schwarzgefleckte Amsel.*
Klein, verbess. Vögelhistor. p. 68. n. 19. *schwarz gefleckte Amsel.*
Latham, Syn. II. 1. p. 44. Pied Black-bird.
Latham, Vögel, II. 1 p. 41. n. 46. Var. B. *die bunte Schwarzdrossel.*
Schwenkfeld, av. Siles. p. 301. Merula varia; *weißgescheckte Amsel.*
Jonston, av. p. 104. Merula ex albo et nigro maculata.

δ. *Die weiße Amsel.*

Brisson, ornithol. I. p. 223. C. Merle blanc.
Büffon, Vögel, IX. p. 23. *die weiße Amsel.*
Latham, Syn. II. 1. p. 44. White Black-bird.
Latham, Vögel, II. 1. p. 41. n. 46. Var. C. *die weiße Schwarzdrossel.*
Krünitz, Encykl. I. p. 713 *weiße Amseln.*
Hannov. nützl. Samml. 1756. St. 44. *weiße Amsel.*
Journal encycl. 1772. VII. 141.
Berlin. Samml. V. p. 177. *die weiße Amsel.*
Aldrovand. ornith. II. L. 16. p. 276. Merula candida.
Charleton, onomast. zoic. p. 84. n. 2. Merula candida.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 301. Merula candida.
Jonston, av. p. 104. Merula tota candida.
Varro, de re rust. L. 3. c. 9. Merula alba.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 30. Merula candida.

112. Aurantius. *Die weißkehlige Drossel.*

Klein, av. p. 69. n. 27. Turdus fuscus.
Klein, Vorbereit. p. 131. n. 27. *Pomeranzschnäbler; graue Amsel.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 69. n. 28. *Pomeranzschnäbler.*
Brisson, ornith. I. p. 835. n. 31. Merle de la Jamaique.
Büffon, Vögel, IX. p. 149. *braune jamaikanische Amsel.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 41. n. 47. *die Drossel mit weißem Kinne.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 341. n. 51. Turdus (Leucogenus) fusco-niger, gula abdomineque albis.

β. *Latham*,

β. *Latham*, Syn. II. 1. p. 45. Var. A. — *Latham*, Vögel, II. 1. p. 42. n. 48. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 342. n. 51. β. T. gula corpore concolore.

γ. *Latham*, Syn. II. 1. p. 45. Var. B. — *Latham*, Vögel, II. 1. p. 42. n. 48. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 342. n. 51. γ. T. corpore toto nigro, rostro pedibusque fulvis.

Fermin, Surin. II. p. 162. *die Amsel.*

δ. *Brisson*, ornith. I. p. 244. n. 51. Merle d'Amerique. (4)

Latham, Syn. II. 1. p. 45. Var. C. — *Latham*, Vögel, II. 1. p. 42. n. 48. Var. C.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 342. n. 52. Turdus (Americanus) corpore violaceo-nitente, subtus obscuro, remigibus apice rufis, rostro pedibusque luteis.

113. Labradorius. *Die labradorische Drossel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 316. n. 122. *der Krammetsvogel von Labrador.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 42. n. 48. *die Labradorische Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 342. n. 54. Turdus (Labradorius) atro-nitens, caeruleo viridique varians, rostro pedibusque nigris.

Philos. transact. LXII. p. 400. n. 22.

23. Torquatus. *Die Ringamsel.* (*)

Müller, Natursyst. II. p. 537. n. 23. *die Ringdrossel.*

(4) Nach *Brisson* eine eigne Gattung, wofür ihn auch *Latham* im Syst. ornith. aufgenommen hat.

(*) Findet sich in Europa bis Lappland, aber weder in Rußland noch in Sibirien. Auch an den Ufern des caspischen Meers; und überwintert in Persien.

Leske, Naturgesch. p. 257. n. 7. *die Ringamsel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 170. n. 9. *die Ringdrossel; Ringmerle.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 502. n. 5. *die Ringdrossel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 612. *die Ringamsel.*

Ebert, Naturl. II. p. 129. *die Ringmerle.*

Halle, Vögel, p. 287. n. 238. *die Dianenamsel.*

Meyer, Thiere, II. tab. 68. *Bergamsel.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 396. n. 323. *Ringamsel; Schildamsel; Stockziemer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 321. H. *die Ringamsel.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 636. *die Ringamsel.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 127. *Ringamsel; Meeramsel.*

Klein, av. p. 66. n. 6. Turdus torquatus.

Klein, Vorbereit. p. 125. n. 6. *Ringdrossel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 66. *Ringdrossel; Schneedrossel; Roßdrossel.*

Gesner, Vögelb. p. 37. *Ringamsel;* m. e. Fig.

Brisson, ornith. I. p. 223. n. 12. Merle à collier.

Büffon, Vögel, IX. p. 36. *die Ringelamsel;* mit e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 341. *die Berg- oder Ringamsel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 141. Ring-Ouzel.

Latham, Vögel, II. 1. p. 43. n. 49. *die Ringdrossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 343. n. 56. Turdus (Torquatus) nigricans, torque albo, rostro flavescente.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 39. n. 6. *die Schilddrossel.*

*Bec*k,

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 416. *Ringdrossel.*
Fischer, Liv. p. 94. n. 139. *Ringdrossel.*
White, N. G. von Engl. p. 37. p. 42. p. 61. n. 1. *Ringamsel.*
Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 5. *Ringtrost.*
Pallas, nord. Beytr. IV. p 55. Turdus torquatus.
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 162. n. 198. *die Ringamsel.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 319 *die Berg-Amsel.*
Naturforsch. XVII. p. 84. n. 172. *die Ringdrossel.*
Borkhausen, Magaz. I. p. 163. n. 34. *Ringamsel.*
Naumann, Vogelsteller, p. 82. *die Ringamsel.*
Meidinger, Vorles. I. p. 147. n. 6. *die Ringamsel.*
Krünitz, Encykl. I. p. 714. *Meeramsel; Ringel-Amsel.*
Forst-, Fisch- u. Jagdlex. I. p. 87. *Meeramsel.*
Börner, neue schles. ökonom. Nachr. II. p. 100.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 29. n. 3. Merula torquata.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 170. n. 13. Turdus (Torquatus) nigricans, torque albo, rostro flavescente.
Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 242. Turdus (Torquatus) nigricans, torque albo, rostro flavescente.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 302. Merula torquata; *Ringamsel; Schneeamsel; Roß-Amsel.*
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 394. Merula torquata.
Sibbald, Scot. p. 215. Merula torquata.
Jonston, av. p. 106. Merula torquata.
Tavernier, voyages II. p. 24?
Hermann, tab. affin. anim. p. 200. Turdus torquatus.
Levin, britt. Birds II. tab. 62.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 351. n. 11. *die Ringamsel.*

β. *Die weiße Ringamsel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 48. *die weiße Ringamsel.*

γ. *Die weißgefleckte Ringamsel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 49. *die weißgefleckte Amsel.*

114. SAXATILIS. *Die Steindrossel.* (5)

Latham, Vögel, II. 1. p. 50. n. 57. *die Stein-Drossel.*

Latham,

(5) Die in unserm System angeführten beyden Synonymen aus *Raj.* und *Willugh.* sind auch p. 310. bey n. 25. *(Lanius infaustus)* citirt, und was *Lathams Rock Thrush* betrift, so findet sich im *Syst. ornith.* p. 326 dass er ihn mit seinem *Rock Shrike* (Lanius infaustus *Gmel.*) für einerley ausgegeben, und beyde zu seinem *Turdus infaustus* gerechnet hat. Ich beziehe mich im Ganzen hier auf dasjenige, was ich bereits im ersten Bande dieser Beyträge p. 216. not. 8 angeführt habe. Fast bey keiner Gattung findet sich eine grössere Verwechselung der Synonymen, als bey *Lanius Infaustus* p. 310. n. 25. *Lanius Faustus* p. 311. n. 26. und *Turdus Saxatilis* p. 833. n. 14. Ich will zum Besten derer, die den Lathamschen Index ornithologicus nicht besitzen, hier ausführlich bemerken, wie dieser Ornithologe die Synonymen geordnet hat. *A. Corvus Infaustus Latham* Syst. ornith. I. p. 159. n. 22. = *a*) Corvus Infaustus *Linn.* fn. suec. n. 93. — *b*) Corvus Infaustus *Brünn.* p. 10. — *c*) Corvus Infaustus *Müll.* dan. prodr. p. 12. n. 93. — *d*) Lanius Infaustus *Linn.* XII. 1. p. 138. n. 25. — *e*) Corvus rufficus *Gmelin* it. p. 50. tab. 11. — *B. Turdus Infaustus Latham* l. c. p. 335. n. 32. = a) Turdus Saxatilis *Gmel.* Syst. I. p. 833. n. 114. — b) Lanius Infaustus *Gmel.* Syst. I. p. 310. n. 25. c) *Borowsky* Thierr. II. p. 84. n. 4. — d) Merula Saxatilis, *Raj.* Syn. p. 68. 3. e) *Will.* p. 145. tab. 36. — f) *Brisson*, II. p. 238. 13. — g) Faun. Arragon. p. 85. — h) *Klein*, av. p. 70. 32. — i) Merle de roche *Büffon*, III. p. 351. (maior). — k) Codirosso maggiore, *Olin.* uc. t. p. 47.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 335. n. 32. Turdus (Infaustus) nigricante fusco, rufescenteque varius, capite cinereo rufescente-maculato, rectricibus lateralibus rufis.

115. Eremita. *Die einsame philippinische Drossel.*

Brisson, ornithol. I. p. 234. n. 32. Solitaire des Philippines.

Büffon, Vögel, IX. p. 99. *einsame philippinische Amsel*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 50. n. 56. *die Einsiedler-Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 346. n. 63. Turdus (Eremita) fuscus, apicibus pennarum fasciis nigricante albido terminatis, subtus sordide albo rufescens fusco-striatus, remigibus rectricibusque griseo-marginatis.

116. Manillensis. *Die manillische Drossel.*

Brisson, ornith. I. p. 233. n. 31. Solitaire de Manille.

Büffon, Vögel, IX. p. 96. *die manillische einsame Amsel*; m. e. Fig.

47. — l) *Zinnan.* Uov. p. 40. t. 6. f. 23. — m) Steinröthel, *Wirsing* Vög. tab. 16. — n) Greater Redstart, *Albin.* III. t. 55. — o) *Will.* p. 197. t. 36. — p) Rock Crow, *Arct. Zool.* II. p. 252. F. — q) Rock Shrike, *Lath.* Syn. I. p. 176. — r) Rock Thrush, *Lath.* Syn. III. p. 54. 57. — C. *Turdus Saxatilis. Latham* l. c. p. 336. n. 33. = a) Lanius Infaustus minor, *Gmel.* Syst. I. p. 310. 25. β — b) Turdus Saxatilis *Linn.* Syst. XII. 1. p. 294. 14. — c) *Kramer* Austr. p. 360. 2. — d) *Scopoli* ann. I. p. 199. — e) *Borowsky* Thierr. III. p. 168. 7. — f) Merula Saxatilis minor, *Brisson*, II. p. 240. 14. — g) Turdus ruber cyaneo capite, *Klein* av. p. 67. 8. — h) *Frisch* tab. 32. — i) Merle de roche, *Büffon*, III. p. 351. t. 23. Pl. enl. 562. — k) *Günth.* Nest. u. Ey. tab. 75. — l) Lesser Rock Shrike, *Lath.* Syn. I. p. 177. n. 27. A.

Latham, Vögel, II. 1. p. 49. n. 55. *die Manillische Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 345. n. 62. Turdus (Manillensis) fusco-caerulescens, subtus rufus, fusco albidoque maculatus, uropygio caerulescente, remigibus rectricibusque fusco-nigricantibus.

117. SOLITARIUS. *Die einsame Amsel.*

Halle, Vögel, p. 292. n. 243 *die einsame Drossel.*

Klein, av. p. 67. n. 11. Turdus, passer Solitarius dictus.

Klein, Vorbereit. p. 127. n. 11. *Spreedrossel.*

Klein, verb Vögelhist. p. 67. n. 16. *Spreedrossel; einsame Drossel.*

Gesner, Vögelb. p. 38. *Passer solitarius;* m. e. Fig.

Brisson, ornithol. I. p. 233. n. 30. Solitaire.

Büffon, Vögel, IX. p. 86. *die einsame Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 48. n. 54 *die einsame Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 345. n. 61. Turdus (Solitarius) fuscus albido punctatus, genis, collo pectore alisque caeruleo adumbratis, rectricibus nigricantibus.

Cetti, Sardin. II. p. 170. *der braune Einsiedler.*

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 221. Passer Solitarius.

Jonston, av. p. 105. Passer Solitarius.

Beckmann, Bibl. VIII. p. 539. *die einsame Amsel.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. Merula solitaria.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 352. n. 12. *die einsame Amsel.*

24. CYANUS. *Die Blauamsel* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 538. n. 24. *die blaue Merle.*

Halle,

(6) Wird häufig mit dem vorhergehenden verwechselt.

Halle, Vögel, p. 290. n. 240. *die blaue Gesang-drossel.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 615. *die einsame Drossel.*

Klein, av. p. 77. III. n. 1. Sylvia gula caerulea, pectore rubro.

Klein, Vorbereit. p. 145. n. 1. *Blaukehlein mit rother Brust.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 78. n. 3. *Blauvogel; Steinrotele.*

Gesner, Vögelb. p. 42. *Blawvogel.*

Brisson, ornithol. I. p. 236. n. 37. Merle bleu.

Büffon, Vögel, IX. p. 75. *die Blauamsel.*

Batsch, Thiere, I. p. 342. *die Blauamsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p 48. n. 53. *die blaue Drossel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 345. n. 60. Turdus (Cyanus) pennis margine cinereo - caeruleis, ore palpebrisque luteis.

Latham, Syn. Suppl. p. 142. Blue-Thrush.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 416. *die blaue Merle; Blauvogel.*

Cetti, Sardin. II. p. 169. *der blaue Einsiedler.*

Seligmann, Vögel, I. tab. 35. *die blaue Amsel; der einsame Sperling.*

Naturforsch. XVII. p. 84. n. 173. *die blaue Merle.*

Beckmann, Bibl. VIII. p. 537. *die blaue Stein-Amsel.*

White, N. G. von Engl. p. 87. *die Blaudrossel.*

Charleton, onom. zoic. p. 88. Caeruleo.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 347. Rubicilla maior Saxatilis. *Blaw-Vogel, Stein-Rötele; Blaw-Stein-Amsel; Stein-Drossel; Klein Blaw-Zimmer.*

Jonston, av. p. 106. Passeri Solitario congener.

Faun. Arragon. p. 85. Turdus plumbeus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 210. Turdus Cyanus.

25. ARUNDINACEUS. *Die Rohrdrossel.*

Müller, Natursyst. II. p. 238. n. 25. *die Rohrdrossel.*

Leske, Naturgesch. p. 258. n. 8. *die Rordrossel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 170. n. 10. *die Rohrdrossel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 504. n. 8. *die Rohrdrossel.*

Funke, Naturgesch. I. p. 234. *die Rohrdrossel.*

Ebert, Naturl. II. p. 229. *die Rohrdrossel.*

Halle, Vögel, p. 304. n. 270. *die singende Rohrdrossel.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 397. n. 326. *Rohrdrossel; Weidendrossel; Bruchdrossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 611. *die Rohrdrossel.*

Klein, Vorbereit. p. 133. *Bruch-, Weiden-, Rohrdrossel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 70. n. 38. *Bruchdrossel.*

Brisson, ornith. I. p. 219. n. 6. Rousserolle ou Roucherolle.

Büffon, ois. III. p. 293. tab. 18. — Pl. enl. 513. Rousserolle.

Büffon, Vögel, VIII. p. 254. *die Rohrdrossel;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 339. *die Rohrdrossel.*

Latham, Syn. II. 1. p. 32. n. 28. Suppl. p. 141. Reed Thrush.

Latham, Vögel, II. 1. p. 28. n. 28. *die Rohrdrossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 334. n. 28. Turdus (Arundinaceus) fusco-ferrugineus, subtus albido-testaceus, remigibus fuscis apice rufescentibus.

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 416. *Rohrdrossal*

Fischer, Livl. p. 95. n. 140. *Rohrdrossel.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 94. n. 7. *die Rohrdrossel; groote Ruhrspaarling.*

Pallas, Reis. I. p. 370. *die Schilfdrossel.*

Pallas,

Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *Rohrdrossel.* IV. p. 25. Turd. arundinaceus.

Naturforsch. XVII. p. 83. n. 170. *Bruchdrossel.*

Schrift. der danziger Gesellsch. I. p. 444.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 170. n. 15. Turdus (Arundinaceus) griseus, subtus albidus, lineolis transversim lunatis fuscis, pedibus caerulescentibus.

Charleton, onom. zoic. p. 105. n. 2. Rousserolle seu Roucherolle, Gallorum, *Bellonio Alcyon vocalis.*

Jonston, av. p. 163. Junco.

Jonston, av. p. 182. Acototloquichitl, seu passer aquaticus.

Belon, hist. nat. des ois. p. 224. Alcyon vocalis.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 352. n. 13. *die Rohrdrossel.*

β. *Latham*, Syst. ornith. I. p. 334. n. 28. β. T. fusco-testaceus, subtus superciliisque albidis, uropygio rectricibusque rufis, lateralibus fascia nigra, quatuor extimis apice albis.

Latham, Vögel, II. 1. p. 30. n. 28. Var. A.

26. MORIO. *Die gelb und schwarze afrikanische Drossel.*

Müller, Natursyst. II. p. 538. n. 26. *die afrikanische Drossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 624. *die afrikanische Amsel.*

Brisson, ornith. I. p. 244. n. 52. Merle du cap de bonne esperance.

Büffon, Vögel, IX. p. 101. *die gelbe und schwarze afrikanische Drossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 52. n. 58. *die Afrikanische Drossel.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 346. n. 64. Turdus (Morio) ater nitens, remigibus primoribus rufis, apice nigro.

118. Bicolor. *Die grünlich braune capsche Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 123. *die grünlich braune capsche Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 58. n. 75. *die Drossel mit weißem Steiße.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 350. n. 84. Turdus (Bicolor) viridi fuscus, abdomine uropygioque albis.

119. Erythropterus. *Die rothflügelige Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 107. *Senegalische Podobe.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 52. n. 59. *die rothflügelige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 346. n. 65. Turdus (Erythropterus) ater alis rufis, crisso rectricibusque lateribus apice albis, cauda cuneiformi.

120. Chrysogaster. *Die orangegrüne Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 121. *Orangengrüne senegalische Amsel;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 58. n. 73. *die orangenbäuchige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 350. n. 81. Turdus (Chrysogaster) viridis fulvo splendens, subtus fulvus nitidus, remigibus quibusdam extus albis.

β. *Die orange-blaue Drossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 122. *Orangenblaue senegalische Amsel;* m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 63. n. 73. Var. A. — Vögel, II. 1. p. 58. n. 73. A.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 350. n. 81. β. T. caerulescens, pennis margine saturatioribus, corpore subtus fulvo.

121. UROVANG. *Die aschfarbige madagascarische Drossel.*

Brisson, ornith. I. p. 239. n. 41. Merle cendrée de Madagascar.

Büffon, Vögel, IX. p. 128. *die aschfarbige madagaskarische Amsel;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 59. n. 76. *die aschgraue Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 351. n. 85. Turdus (Ourovang) cinereo-nigricans, capite, collo, pectore, dorso tectricibusque alarum olivaceis, abdomine flavescente.

27. SURINAMUS. *Die surinamische Drossel.*

Müller, Natursyst. II. p. 539. n. 27. *die surinamische Drossel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 636. *die Surinamische Amsel.*

Brisson, ornithol. I. p. 251. n. 65. Merle de Surinam.

Büffon, Vögel, IX. p. 164. *die Surinamische Amsel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 356. n. 107. Turdus (Surinamus) ater nitens, vertice, uropygio maculaque laterali pectoris luteis.

Latham, Vögel, II. 1. p. 69. n. 100. *die Surinamische Drossel.*

122. COLUMBINUS. *Die Taubendrossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 130. *die philippinische Amsel der Taubenhäuser.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 59. n. 77. *die Taubendrossel.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 348. n. 70. Turdus (Columbinus) viridi-nitens, corpore toto versicolore.

123. DOMINICANUS. *Die Dominikanerdrossel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 156. *die philippinische Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 54. n. 65. *die Dominikaner-Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 348. n. 72. Turdus (Dominicanus) fuscus violaceo-chalybeo variegatus, capite corporeque subtus fuscescente-albis.

124. CANTOR. *Die philippinische Sangdrossel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 55. n. 67. *die Musikdrossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 348. n. 74. Turdus (Cantor) virescenti-ater, caeruleo violaceoque nitens, remigibus caudaque nigris.

Büffon, Vögel, IX. p. 132. (mit Turdus Columbinus verwechselt.)

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 42. *der Sänger oder die kleine Merle, von der Insel Panai.*

125. MALABARICUS. *Die gelbstirnige Drossel.* (7)

Latham, Vögel, II. 1. p. 56. n. 69. *die gelbstirnige Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 349. n. 77. Turdus (Malabaricus) viridis nitens, fronte flava, gutture nigro, maxilla inferiore striga caerulea, tectricibus alarum caerulescentibus.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 150. *die kleine Amsel aus Malabar.*

126. SE-

(7) Da die Trivialbenennung *T. Malabaricus*, p. 816. n. 51. schon einmal vorgekommen, so könnte man diese *T. Flavifrons* nennen.

126. Seleucis. *Die Seleucische Drossel.*

Forskål, faun. orient. p. 6. n. 16. Turdus Seleucis: *Grylli vora;* arab. *Samarmar.*

Büffon, Vögel, IX. p. 44. not. 9. *die Seleucische Drossel.*

28. Zeylonus. *Die Zeylanische Drossel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 539. n. 28. *die zeylonnesische Merle.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 639. *die Ceylonische Amsel.*

Brisson, ornith. I. p. 241. n. 46. Merle à collier du cap de bonne espérance.

Büffon, Vögel, IX. p. 117 *Ceylonische Amsel mit schwarzem Brustschilde.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 57. n. 72. *die Zeylanische Drossel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 349. n. 80. Turdus (Zeylonus) viridis, subtus luteus, linea oculari utrinque in pectus nigrum ducto.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 11. *die grüne Aelster von der Insel Ceylon.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 294. n. 14. Turdus Saxatilis.	p. 310. n. 25. β. Lanius Infaustus *minor.*

Das Geschlecht ist mit *acht und neunzig* Gattungen vermehrt. Bey der 2ten Gattung sind *vier*, bey der 4ten *drey*, bey der 11ten *zwey*, bey der 12ten *eine*, bey der 16ten *eine*, bey der 19ten *eine*, bey der 22ten *drey*, bey der 25ten *drey* Varietäten hinzugekommen.

B. *Unbe-*

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Brissons Bergamsel.*

Brisson, ornith. II. p. 232. n. 11. tab. 21. Fig. 2. — Ed. in 8. I. p. 223. n. 11. Merula montana; *Merle de Montagne.* — Turdus fusco-nigricans, marginibus pennarum griseis, taenia supra pectus transversa, ad rufum vergente, rectricibus nigricantibus.

Büffon, Vögel, IX. p. 39. *Bergamsel.*

Raj. Syn. p. 67. n. 12. Merulae congener?

Raj. Syn. p. 65. n. 3. Merula Saxatilis.

Willough. orn. p. 144. tab. 30. Merula montana.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 29. — Fn. Suec. I. p. 186. Merula montana.

Linné, fn. suec. I. p. 186. II. p. 221. β. Turdus nigricans, torque fusca, rostro flavescente.

Charleton, onom. zoic. p. 84. n. 3. Merula *Montana* Germanorum.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 301. Merula alpina. *Birg-Amsel; Stein-Amsel; Hag-Amsel.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 394. Merula alpina *Schwenkf.*

Jonston, av. p. 106. Merula montana.

Latham, Syst. ornith. I. p. 343. n. 56. β.

Soll, nach *Büffon*, das Weibchen — nach *Latham* ein junger Vogel von *Turdus Torquatus* seyn.

2. *Die Port-Jackson-Drossel.*

White, voy. t. p. 157. Port Jackson Thrush.

White, Reis. n. Neu-Süd-Wallis; — in dem Magaz. merkw. Reisebeschr. V. p. 125. *die Port-Jackson-Drossel.*

Meyer, zoolog. Entdeck. p. 52. *Port-Jacksons-Drossel.*

Vielleicht eine Spielart von *Turd. Novae Hollandiae*, p. 814. n. 42.

3. *Die*

3. *Die ockergelbe Drossel.*
Mus. Carls. IV. n. 85. Turdus Ochrogaster.
Latham, Vögel, II. I. p. 84. n. 134. *ockergelbe Drossel.*

4. *Die lauchgrüne Drossel.*
Mus. Carls. IV. n. 86. 87. Turdus prasinus.
Latham, Vögel, II. I. p. 85. n. 135. *lauchgrüne Drossel.*

C. *Neuere Gattungen.*

1. Turdus australis; Mus. Carls. fasc. III. tab. 69.
Latham, Syst. ornith. I. p. 338. n. 43. Turdus (Australis) corpore fusco-nigricante, pectore abdomineque albis.
Latham, Vögel, II. I. p. 84. n. 133. *die Südindische Drossel.*

2. Persian Thrush. *Latham*, Syn. Suppl. p. 145.
Latham, Syst. ornith. I. p. 343. n. 55. Turdus (Persicus) niger, corpore subtus cinereo, alis fuscis, sub oculis macula alba, rostro pedibusque flavis.
Latham, Vögel, II. I. p. 82. n. 127. *die persische Drossel.*

3. Orange-headed Thrush. *Latham*, Syn. Suppl. p. 145.
Latham, Syst. ornith. I. p. 350. n. 83. Turdus (Citrinus) cinereus, capite, collo, pectore abdomineque fulvis, crisso maculaque alarum albis.
Latham, Vögel, II. I. p. 83. n. 139. *die orangenköpfige Drossel.*

4. Yellow-breasted Thrush. *Latham*, Syn. II. I. p. 78. n. 105.
Latham, Vögel, II. I. p. 71. n. 105. *die gelbbrüstige Drossel.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 357. n. 112. Turdus (Pectoralis) fuſcus, collo inferiore pectoreque ruſeſcente-flavis.

Buffon, oiſ. III. p. 403. — Pl. enl. p. 641. f. 2. Petit merle brun à gorge rouſſe de Cayenne.

5. Gingi Thruſh. *Latham*, Syn. Suppl. p. 144.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 662. n. 133. Turdus (Ginginianus) griſeus, capite nigro-criſtato, alis vireſcenti-nigris, remigibus primoribus baſi caudaque apice rufis, ſupra oculos faſcia nuda flava.

Sonnerat, voy. Ind. II. p. 194. Petit Martin de Gingi.

Latham, Vögel, II. 1. p. 82. n. 126. *die Gingiſche Droſſel.*

6. Dauma Thruſh. *Latham*, Syn. Suppl. p. 145.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 362. n. 134. Turdus (Dauma) lunulis nigris, ſupra fuſcus, ſubtus albus, tectricibus alarum minoribus nigris albo variegatis, remigibus primoribus fuſcis apice caſtaneis.

Latham, Vögel, II. 1. p. 82. n. 128. *die Cowal-Droſſel.*

7. Black and ſcarled Thruſh. *Latham*, Syn. Suppl. p. 146.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 363. n. 135. Turdus (Specioſus) ater, abdomine, dorſo poſtico, tectricibus alarum, intermediis maculis tribus remigum rectricibusque lateralibus coccineis.

Latham, Vögel, II. 1. p. 83. n. 130. *die ſchwarz und rothe Droſſel.*

8. Turdus minutus. *Muſ. Carlſon*, faſc. III. tab. 68.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 363. n. 136. Turdus (Minutus) ſupra fuſco-ferrugineus, ſubtus ferrugi-

rugineo-cinereus, gula albida, alis et cauda nigro ferrugineoque notatis.

Latham, Vögel, II. 1. p. 84. n. 132. *die kleinste Drossel.*

108. GESCHLECHT. AMPELIS. *Der Seidenschwanz.*

Müller, Natursyst. I. p. 240. Gen. CVIII.
Leske, Naturgesch. p. 258. Gen. XL.
Borowsky, Thierreich, III. p. 171. Gen. LXVIII.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 182. Gen. XXX.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 504. Gen. LXVII.
Onomat. hist. nat. I. p. 381.
Batsch, Thiere, I. p. 317. Gen. LXXII.
Latham, Vögel, II. 1. p. 86 Gen. XXXII.
Latham, Syst. ornith. I. p. 363. Gen. XXXIII.
Hermann, tab affin. anim. p. 211.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 352. Gen. LXXV.

1. GARRULUS. *Der gemeine Seidenschwanz.* (8)

Müller, Natursyst. II. p. 540. n. 1. *der Seidenschwanz.*

Leske, Naturgesch. p. 258. *der Seidenschwanz.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 171. *der Seidenschwanz*, tab. 68.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 182. n. 1. Ampelis (Garrulus) occipite cristato; racheos s. costae remigum secundariorum apice coccineo com- plana-

(8) Gewicht 3 3/4 bis 4 Loth. Die Anzahl der hornartigen Spitzen an den Flügelfedern ist sehr verschieden. Gewöhnlich hat das Männchen 9, das Weibchen nur 5. Vielleicht kommt es dabey wohl mit auf das Alter des Vogels an. Schade, dass noch Niemand bisher die Jungen gesehen hat.

planato. *Seidenschwanz, Pfeffervogel; Sterbevogel; Böhmer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 505. *der gemeine Seidenschwanz ; die Haubendrossel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 614. *der Seidenschwanz.*

Funke, Naturgesch. I. p. 234. *die Haubendrossel.*

Ebert, Naturl. II. p. 130. *der Seidenschwanz.*

Halle, Vögel, p. 302. n. 268. *das Seidenschwänzchen*, Fig. 16.

Meyer, Thiere, I. tab. 70. *Seidenschwanz.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 398. n. 329. *der Seidenschwanz, Seidenschweif.*

Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 169. *Seidenschwanz.*

Onomat. hist. nat. I. p. 384. *der Seidenschwanz; böhmische Schwätzer.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 127. *der Seidenschwanz.*

Klein, av. p. 70. n. 34. Turdus cristatus, rostro brevi ad ortum lato.

Klein, Vorbereit. p. 133. n. 34. *Seidenschwanz.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 69. n. 33. *Seidenschwanz; böhmische Haubendrossel.*

Klein, Stemmat. av. p. 11. tab. 13. Fig. 5. a—c.

Gesner, Vögelb. p. 29. *Behemle, Zinzerelle; Seidenschwanz;* m. e. schl. Fig.

Brisson, ornith. I. p. 250. n. 63. Jaseur de Boheme.

Büffon, Vögel, IX. p. 221. *der Seidenschwanz;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 336. *der Seidenschwanz.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 86. n. 1. *der gemeine Seidenschwanz.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 369. n. 1. Ampelis (Garrulus) occipite cristato, remigibus secundariis apice membranaceo colorato.

Beseke,

Beseke, Vögel Curl. p. 74. n. 162. *der Seidenschwanz.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 95. n. 1. *gemeine Seidenschwanz.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 417. *der Seidenschwanz.*

Fischer, Livl. p. 95. n. 141. *gemeiner Seidenschwanz.*

Fischer, Zusätze zur N. G. von Livl. p. 48.

Lepechin, Tageb. der russ. Reis. II. p. 5. *Seidenschwänze.*

White, N. G. von Engl. p. 20. p. 62. n. 17. *Seidenschwanz.*

Linné, Abhandl. II. p. 301. n. 19. *der Seidenschwanz.*

Lange, Briefe zur Naturgeschich. p. 38. *Seidenschwanz.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 18. n. 2. *Böhmlein.*

Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 299. *Seidenschwänze.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 159. n. 28. *europäischer Seidenschwanz.*

Götz, Naturgesch. einig. Vögel, p. 44. *der Seidenschwanz.*

Naturforsch. I. p. 71. XVII. p. 85. XXII. p. 127. XXV. p. 14. *Seidenschwanz.*

Lichtenberg, Magaz. für das Neuste, etc. I. 3. p. 66. *Seidenschwänze.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 315. 559. *der Seidenschwanz.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 56. *Seidenschwanz.*

Naumann, Vogelsteller, p. 88. *Seidenschwanz.*

Beckmann, Bibl. I. p. 187. VIII. p. 538. *der Seidenschwanz.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 750. *der Seidenschwanz.*

Meidinger, Vorlef. I. p. 148. *der gemeine Seidenfchwanz.*

Anweif. Vogel zu fang. p. 121. *Seidenfchwanz.*

André u. Bechftein, Spazierg. II. p. 308.

Oekonom. Zool. p. 96. n. 38. *der europ. Seidenfchwanz.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 1057. *Seidenfchwanz.*

Neue Mannigfaltigk. II. p. 204. *Seidenfchwanz.*

Eberhard, Thiergefch. p. 73. *der Seidenfchwanz.*

Goeze, Natur, Menfchenl. u. Vorfeh. I. p. 614. II. p. 242. III. p. 257. *der Seidenfchwanz.*

Wirfing, Vögel, tab. 4. *Seidenfchwanz.*

Onomatol. foreftal. I. p. 402.

Piller, element. hift nat. I. p. 40. Ampelis Garrula.

Fränkifche Samml. II. p. 439.

Wittenb. Wochenbl. 1777. p. 278.

Gothaifch. Hofkalender, 1780. p. 64.

Linné, Syft. Nat. Ed. II. p. 56. Garrulus bohemicus.

Linné, Syft. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 1. Garrulus Bohemicus.

Linné, Syft. Nat. Ed. X. I. p. 95. n. 10. Lanius (Garrulus) remigibus fecundariis apice membranaceo colorato, cauda integra.

Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 243. Ampelis (Garrulus) occipite criftato, remigibus fecundariis apice membranaceo colorato.

Kramer, Auftr. p. 363. n. 1. Ampelis remigibus quibusdam apice membranaceo terminatis. *Zuferl; Seidenfchweiffl.*

Brünniche, ornith. bor. p. 8. n. 25. 26. Lanius Garrulus.

Moehring, av. gen. p. 42. n. 29. Ampelis.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 229. Bombycilla. — Fullo; Galerita varia; Microphoenix; Incendiaria;

diaria; Gallulus Sylvestris. *Seidenschwanz, Schnee-Leschke; Behemle; Schneevogel; Wipsterz.*

Charleton, onom. zoic. p. 68. n. 5. Garrulus Bohemicus *Gesneri.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 381. Garrulus Bohemicus.

Jonston, av. p. 44. Garrulus Bohemicus *Gesn.* s. Ampelis *Aldrov.*

Salerne, hist. nat. des oiseaux, p 253.

Forskål, descript. anim. p. 7. n. 6. Lanius Ampelis.

Gerin. ornithol. II. p. 42. tab. 106.

Levin, britt. Birds, II. tab. 65.

Hermann, tab. affin. anim. p. 211. Ampelis Garrulus.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 16. Γναφαλος?

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 351. n. 1. *der gemeine Seidenschwanz.*

β. *Der carolinische Seidenschwanz.* (9)

Pennant, arct. Zool. II. p. 322. n. 123. *der Prip.*

Klein, av. p. 70. n. 35. Turdus garrulus carolinensis.

Klein, Vorbereit. p. 133. n. 35. *grauer Seidenschwanz.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 70. n 34. *grauer Seidenschwanz*, p. 166. n. 2. *carolinischer Seidenschwanz.*

Klein, av. p. 98. n. 11. Fringilla cristata Xomotl dicta.

Klein, Vorbereit. p. 181. n. 11. *Strausfinke.*

Klein, verb. Vögelh. p. 87. n. 11. *Straussfink.*

(9) Länge, nach *Pennant* nur 7. Zoll. Auch sollen dem Weibchen die rothen Anhänge an den Flügeln fehlen. *Brisson* führt ihn als eine eigne Gattung auf.

Halle, Vögel, p. 304. n. 269. *der schwarzbraune karolinische Seidenschwanz.*

Brisson, ornith. I. p. 251. n. 64. Jaseur de la Caroline.

Büffon, Vögel, IX. p. 249. *der karolinische Seidenschwanz des Catesby und Edwards;* mit 2. Figg.

Latham, Syst. ornith. I. p. 364. n. 1. β.

Latham, Syn. II. 1. p. 93. n. 1. Var. A. — Vögel, II. 1. p. 88. n. 1. Var. A.

Seligmann, Vögel, II. tab. 92. *der carolinische Seidenschwanz* (fig. *Catesb.*)

Seligmann, Vögel, VII. tab 32. *der carolinische Seidenschwanz.* (fig. *Edw.*)

Götz, Naturgesch einiger Vögel, p. 49.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 5. n. 10. β. Garrulus carolinensis.

2. POMPADORA. *Der Pompadour.*

Müller, Natursyst. II. p. 541. n. 2. *der Pompadur.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 172. n. 2. *der Pompadur.*

Brisson, ornith. I. p. 254. n. 5. Cotinga pourpré.

Büffon, Vögel, XIII. p. 141. *der Pacopac oder Pompadour;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 91. n. 6. *der Pompadur-Seidenschwanz.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 365. n. 6. Ampelis (Pompadora) purpurea, tectricibus alarum proximis ensiformibus elongatis carinatis rigidis.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 31. *der Pompadour.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 750. *der Pacapac.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 213. Ampelis Pompadora.

β. *Der*

β. *Der purpurgraue Pompadour.* (10)

Brisson, ornithol. I. p. 255. n. 6. Cotinga gris-pourpré.

Büffon, Vögel, XIII. p. 144. *der purpurgraue Pacapac.*

Latham, Syn. II. 1. p. 97. A. Grey Chatterer.

Latham, Syst. ornith. I. p. 366. n. 6. β.

γ. *Der graubraune Pompadour.*

δ. *Der graue Pompadour.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 145. *der graue Cotinga.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 91. n. 6. Var. A. *der graue Seidenschwanz; Pacapac.*

3. CARNIFEX. *Der rothe Seidenschwanz.*

Müller, Natursystem, II. p. 542. n. 3. *der Mörder.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 173. n. 3. *der rothe Seidenschwanz.*

Halle, Vögel, p. 293. n. 244. *die rothe Surinamische Drossel.*

Klein, av. p. 68. n. 12. Turdus totus ruber.

Klein, Vorbereit. p. 128. n. 12. *Rothe Wittewal.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 67. n. 12. *rother Wittewal.*

Brisson, ornith. I. p. 255. n. 7. Cotinga rouge.

Büffon, Vögel, XIII. p. 146. *Louette, oder der rothe Cotinga aus Cayenne;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 91. n. 7. *der rothe Seidenschwanz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 366. n. 7. Ampelis (Carnifex) ruber, fascia oculari, remigum rectricumque apicibus nigris.

Seligmann, Vögel, II. tab. 77. *der surinamische Rothvogel.*

(10) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

Bankroft, N. G. von Guiana, p. 92. *der rothe Neuntödter oder Fleischervogel von Surinam.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 751. *der rothe cayennische Cotinga.*

Moehring, av. gen. p. 79. n. 101. Fringillae affinis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 213. Ampelis Carnifex.

8. Coccinea. *Der schillernde Seidenschwanz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 366. n. 8. Ampelis (Cuprea) olivacea, pennis apice cupreo-aurantiis, pileo rubro, genis aurantiis, pectore et abdomine sanguineis margine viridi-nitentibus.

Latham, Vögel, II. 1. p. 94. n. 11. *der schillernde Seidenschwanz.*

4. Cotinga. *Der blaubrüstige Seidenschwanz.*

Müller, Natursyst. II. p. 542. n. 4. *der brasilianische Seidenschwanz.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 147. n. 4. *der Fünfsleck.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 166. n. 1. *purpurbrüstiger blauer Wittewal.*

Brisson, ornith. I. p. 252. n. 1. Cotinga.

Büffon, Vögel, XIII. p. 129. *der Blaugürtel. Cotinga mit dem Orden*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 89. n. 2. *der rothbrüstige Seidenschwanz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 364. n. 2. Ampelis (Cotinga) nitidissima caerulea, subtus purpurea, alis caudaque nigris.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 31. *der blaue Manakin mit purpurfarbner Brust.*

Seligmann, Vögel, IX. tab. 30. *der Manakin mit purpurfarbner Brust.*

Salerne,

Salerne, ornith. p. 174. Grive de Rio-caneiro; Cotinga ou Grive au cordon bleu.

5. MAYNANA. *Der Seidenvogel.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 542. n. 5. *der majenniſche Seidenſchwanz.*

Briſſon, ornith. I. p. 253. n. 2. Cotinga de Maynas.

Büffon, Vögel, XIII. p. 139. *der Cotinga mit ſeidenartigen Federn;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 90. n. 5. *der ſeidenartige Seidenſchwanz.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 365. n. 5. Ampelis (Maynana) nitida caerulea, gula violacea, remigibus intus albis.

Salerne, ornith. p. 174. Grive ou Cotinga de Maynas.

Hermann, tab. affin. anim. p. 213. Ampelis Maynana.

6. CAYANA. *Der cayenniſche Seidenſchwanz.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 542. n. 6. *der cajenniſche Seidenſchwanz.*

Halle, Vögel, p. 223. n. 161. *der mexicaniſche ſchwarzblaue Würger.*

Klein, av. p. 54. n. 6. Lanius *Ocotolin* dictus.

Klein, Vorbereit. p. 102. n. 6. *der Okokolin.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſtor. p. 53. n. 31. *Mexikaner Neuntödter.*

Briſſon, ornithol. I. p. 253. n. 3. Cotinga de Cayenne.

Büffon, Vögel, XIII. p. 134. *der Guereiva; Cayenniſche Cotinga;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 89. n. 3. *der rothkehlige Seidenſchwanz.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 365. n. 3. Ampelis (Cayana) nitida caerulea, collo ſubtus violaceo, remigi-

remigibus rectricibusque nigris, caeruleo-marginatis.

Seba, thes. II. p. 102. tab. 96. n. 3. Ococolin, species pici.

De Laet, nov. orb. p. 542. Quereiva.

Jonston, av. p. 180. Quereiva.

7. Tersa. *Der Tersinne.*

Müller, Natursyst. II. p. 543. n. 7. *der bunte Seidenschwanz.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 137. *der Tersinne.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 365. n. 4. Ampelis (Tersa) nitida-caerulea, dorso nigro, abdomine albo-flavescente.

Latham, Vögel, II. 1. p. 90. n. 4. *der blaubrüstige Seidenschwanz.*

9. Carunculata. *Der weiße Seidenschwanz.*

Brisson, ornithol. I. p. 257. Cotinga blanc.

Büffon, Vögel, XIII. p. 152. *der Guira-Panga, oder der weiße Cotinga;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 92. n. 8. *der Seidenschwanz mit Fleischzapfen*, tab. 41.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 366. n. 9. Ampelis (Carunculata) alba, uropygio, remigibus rectricibusque flavescente-adumbratis, fronte denudata, elongata, carunculata.

De Laet, nov. orb. p. 557. Guira-panga.

Hermann, tab. affin. anim. p. 213. Ampelis alba.

10. Variegata. *Der Averano.* (Sommervogel).

Brisson, ornithol. I. p. 256. n. 9. Cotinga tacheté.

Büffon, Vögel, XIII. p. 155. *der Averano; gefleckte Cotinga;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 93. n. 9. *der bunte Seidenschwanz.*

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 367. n. 10. Ampelis (Variegata) cinerea, nigricante virescenteque variegata, capite obscure fusco, remigibus nigricantibus, sub gula caranculis duabus carnosis elongatis nigris.

Pison, hist. nat. p. 93. Guira-punga.

Jonston, av. p. 196. Guirapunga, p. 197. Ave de Verano.

Marcgrav. Brasil. p. 201. Guira-punga Brasiliensibus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 211. 214. Ampelis Averano.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 353. n. 2. *der Averano*.

11. CRISTATA. *Der gehäubte Seidenschwanz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 368. n. 14. Ampelis (Cristata) capite cristato, alis caudaque nigris, abdomine genisque albis, dorso rubro.

Latham, Vögel, II. 1. p. 94. n. 12. *der Kronen-Seidenschwanz.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 4. Gattungen vermehrt. Bey der 2ten Gattung sind *vier* Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der rothflüglige Seidenschwanz; in Afrika.*

Latham, Syn. Suppl. p. 146. Red-winged Chatterer.

Latham, Vögel, II. 1. p. 93. n. 10. *der rothflügelige Seidenschwanz.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 367. n. 12. Ampelis (Phoenicia) caeruleo-nigra, alarum tectricibus minoribus fulvo-coccineis.

2. *Der goldgelbe Seidenschwanz.*

Muf. Carlf. fafc. III. tab. 70. Ampelis luteus.

Latham, Vögel, II. 1. p. 94. n. 13. *der gelbe Seidenschwanz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 368. n. 13. Ampelis (Lutea) corpore fupra fufco-olivaceo, fubtus uropygio rectricibusque lateralibus luteo, macula faucium alba.

* EINGESCHOBENES GESCHLECHT.

Colius. *Der Colius. (Kegelschnabel; Kegelschnäbler; Keilschwanz.*

Bechstein, Naturgefch. Deutfchl. II. p. 189. Gen. LXXIV.

Brisson, ornith. I. p. 393. Gen. XXXVI.

Büffon, Vögel, XIII. p. 53. fqq.

Latham, Vögel, II. 1. p. 95. Gen. XXXIII.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 368. Gen. XXXIV.

Samml. zur Phyf. u. N. G. II. p. 744. fqq.

Donndorff, Handb. der Thiergefch. p. 353. Gen. LXXVI.

1. Capensis. *Der capische Colius.*

Müller, Naturfyst. II. p. 549. n. 12. *der Kegelschnabel.*

Bechstein, Naturgefch. Deutfchl. II. p. 189. *der kapische Kegelschnäbler.*

Brisson, ornith. I. p. 394. n. 1. Coliou du cap de bonne efperance.

Büffon, Vögel, XIII. p. 59. *der kapsche Kegelschnabel;* m. e. Fig.

Onomat.

Onomat. hist. nat. IV. p. 844. *der Emmerling mit dem langen keilförmigen Schwanze vom Vorgebürge der guten Hoffnung.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 255. *der Coliou auf dem Vorgeb. d. g. Hoffn.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 368. n. 1. Colius (Capensis) rectricibus extimis externe albis, corpore cinereo subtus albido.

Latham, Vögel, II. 1. p. 95. n. 1. *der capsche Kegelschnäbler.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 744. *der Coliou.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 354. *der capische Kegelschnäbler.*

2. SENEGALENSIS. *Der senegalische Colius.*

Müller, Natursyst. II. p. 111. n. 5. *der senegallische Langschwanz.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 660. *der Würger mit dem Busche aus Senegall.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 256. *der Coliu von Senegal.*

Brisson, ornithol. I. p. 394. n. 2. Coliou hupé du Sénégal.

Büffon, Vögel, II. p. 241. *der langgeschwänzte senegalische Würger.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 61. *der gehäubte senegalische Colius;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 96. n. 2. *der Senegalische Kegelschnäbler.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 368. n. 2. Colius (Senegalensis) vinaceo-grisescens, cauda caerulescente, capite cristato.

Linné, Syst. Nat. Ed. XII. I. p. 134. n. 5. Lanius (Macrourus) cauda cuneiformi longissima caerulescente, capite cristato.

3. ERY-

3. ERYTHROPUS. *Der rothfüßige Colius.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 96. n. 3. *der weißrückige Kegelschnäbler*, tab. 42.

Latham, Syst. ornith. I. p. 369. n. 3. Colius (Leuconotus) cristatus cinereus subtus albus, dorso infimo uropygioque castaneo-purpureis, medio vitta longitudinali alba.

4. STRIATUS. *Der gestreifte Colius.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 63. *der gestreifte Colius.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 97. n. 4. *der gestreifte Kegelschnäbler.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 369. n. 4. Colius (Striatus) griseo-rubescens, subtus fusco transversim striatus, pectore griseo-ruso, abdomine ruso, cauda viridi.

5. PANAYENSIS. *Der Colius von Panay.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 64. *der Colius von Panay;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 97. n. 5. *der Panayische Kegelschnäbler.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 369. n. 5. Colius (Panayensis) griseo-cinereus, capite cristato, pectore striis transversis nigris, abdomine ruso.

Sonnerat, Reis. nach Neuguinea, p. 42. *der Koliu von Panai;* m. e. Fig.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 746. *der Coliou von der Insel Panay.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das ganze Geschlecht ist *hier* neu; findet sich aber schon beym *Brisson.* Die 1ste und 2te Gattung sind aus andern Geschlechtern hieher versetzt; die übrigen drey sind neu hinzugekommen.

B. *Neuere*

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der grüne Colius in Neuholland.*

Latham, Syn. Suppl. p. 147. Green Coly.

Latham, Vögel, II. 1. p. 97. n. 6. *der grüne Kegelschnäbler.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 369. n. 6. Colius (Viridis) viridis nitens, sincipite palpebrisque nigrosericeis, remigibus rectricibusque nigricantibus.

2. *Der aschgraue indianische Colius.*

Latham, Syn. Suppl. p. 147. Indian Coly.

Latham, Vögel, II. 1. p. 97. n. 7. *der Indische Kegelschnäbler.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 370. n. 7. Colius (Indicus) cinereus, subtus rufus, sincipite gulaque flavis, loris orbitisque nudis flavis.

109. GESCHLECHT. Loxia. *Der Kernbeißer.* *(Dickschnabel).*

Müller, Natursyst. II. p. 544. Gen. CIX.

Leske, Naturgesch. p. 259. Gen. XLI.

Borowsky, Thierreich, III. p. 131. Gen. LXI.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 183. Gen. XXXI.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 506. Gen. LXVIII.

Ebert, Naturl. II. p. 131.

Halle, Vögel, p. 396. Gen. IV.

Onomat. hist. nat. IV. p. 833.

Pennant, arct. Zool. II. p. 323.

Klein, av. p. 94. Trib. IV.

Brisson, ornith. I. p. 370. Gen. XXXIV. Coccothraustes, p. 305. Gen. XXXVII. Pyrrhula, p. 401. Gen. XXXVIII. Loxia.

Batsch, Thiere, I. p. 317. Gen. XXXVI.

Latham, Vögel, II. 1. p. 99. Gen. XXXIV.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 370. Gen. XXXV.

Hermann, tab. affin. anim. p. 216.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 354. Gen. LXXVII.

1. CURVIROSTRA. *Der Kreutzschnabel.* (1)

Müller, Natursystem, II. p. 544. n. 1. *der Kreutzschnabel.*
Leske, Naturgesch. I p. 259. n. 1. *der Kreutzschnabel.*
Borowsky, Thierreich, I. p. 131. n. 1. *der Kreutzschnabel.* Tab. 61.
Blumenbach, Handb. der N. G. p. 183. n. 1. Loxia (Curvirostris) rostro forficato. *Kreutzschnabel; Krummschnabel; Krünitz.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 507. n. 1. *der Kreutzschnabel.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 595. *der Kreutzschnabel; Grünitz.*
Funke, Naturgesch. I. p. 332. *der Kreutzschnabel.*
Ebert, Naturl. II. p. 132. *der Kreutzvogel.*

Halle,

(1) Die Gröſse einer Lerche ſagt wohl zu wenig. Er iſt noch gröſser als ein Dompfaffe. — Falſch iſt es, wenn man im Allgemeinen behauptet, daſs ſein Geſang ſchlecht ſey; er iſt vielmehr, beſonders bey abgerichteten Vögeln, der Nachtigall ihrem ähnlich. — Diejenigen, die man in den Stuben hält, geben zwar im October und November oft ein unangenehmes lautes Geſchrey von ſich, wovon aber wahrſcheinlich ihr Naturtrieb, ſich kurz vor dem Winter zu paaren, die Urſach iſt — Die vornehmſte Nahrung dieſes Vogels iſt der *Cimex abietis*, der unter den ſich feſt anſchlieſsenden Schuppen der Tannenzapfen Schutz wider den Winter ſucht. Die Kreutzvögel brechen gegen den Winter eine Menge Zapfen ab, um aus ihnen die Wanzen hervorzuhohlen, und ſie ſind ihm vielleicht ein Aphrodiſiacum, daſs eben desfalls ſo früh ihre Begattungen und Geburten erfolgen — Zuweilen finden ſich auch Kreutzſchnäbel, deren Oberkiefer von der rechten zur linken gebogen iſt, und alsdenn iſt auch der Unterkiefer anders gekehrt. — Kann über 10. Jahr alt werden.

Halle, Vögel, p. 404. n. 416. *der Tannenvogel; Tannenpapagai; Zapfenbeißer; Zapfennager.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 398. n. 330. *der Kreutzschnabel; Krummschnabel; Grinitz.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 323. n. 124. *der Kreutzschnabel.*
Beckmann, Naturhist. p. 53. d. *der Kreutzschnabel.*
Neuer Schaupl. der Nat. IV. p. 769. *Kreutzschnabel.*
Onomat. hist. nat. III. p. 536. *der Kreuzvogel.*
Handb. der Naturgesch. II. p. 258. *der Creuzschnabel*, tab. 4.
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 127. *Kreutzschnabel.*
Klein, av. p. 96. n. 13. Coccothraustes curvirostra.
Klein, Vorbereit. p. 178. n. 13. *Kreuzschnabel.*
Klein, verbess. Vögelhistor. p. 96. n. 16. *Kreutzschnabel.*
Klein, stemmat. av. p. 19. tab. 19. fig. 19. a. b.
Gesner, Vögelb. p. 355. *Kreutzvogel oder Krumbschnabel;* Fig. p. 356.
Brisson, ornith. I. p. 401. n. 1. Bec-croisé.
Büffon, Vögel, IX. p. 21. *der Kreutzschnabel;* m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 350. *der Kreutzschnabel.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 99. n. 1. *der gemeine Kreuzschnabel.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 370. n. 1. Loxia (Curvirostra) rostro forficato, corpore versicolore, remigibus rectricibusque fuscis, oris exterioribus viridi-olivaceis, cauda furcata.
Beseke, Vögel Kurl. p. 75. n. 163. *der Kreuzschnabel.*
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 97. n. 1. *der Kreuzschnabel; Krüüzschnabel.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 418. *der Kreutzschnabel.*

Fischer, Liv. p. 96. n. 142. *Kreuzschnabel.*

White, N. G. von Engl. p. 15. p. 62. n. 16. *Kreuzschnabel.*

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 1. *Korsnäb.*

Seligmann, Vögel. VIII. tab. 93. *der Krummschnabel; ein Er und eine Sie.*

Pennant, britt. Thiergesch. p. 120. *Krummschnabel.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 165. n. 200. *der Krummschnabel.*

Naturforsch. II. p. 66. — XII. p. 92. — XVII. p. 86. n. 176. — XXI. p. 197. n. 5. — XXII. p. 142. — XXV. p. 17. *Kreuzschnabel; Kreuzvogel.*

Lichtenberg, Magazin für das Neueste, etc. I. 3. p. 67. *Kreutzschnäbel.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 344. *der Krumm-Schnabel.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 57. *Grinitz; Creutz-Vogel.*

Naumann, Vogelsteller, p. 130. *Kreutzvogel.*

André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 21. *der Kreutzschnabel.*

Bechstein, Must. schädl. Thiere, p. 134. n. 2. *der Kreutzschnabel.*

Schwed. Abhandl. XIX. p. 134. *Kreutzschnabel.*

Neue schwed. Abhandl. IV. p. 49. *Kreutzschnäbel.*

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 283. n. 7. *der Kreutzschnabel.*

Goeze, Natur, Menschenl. und Vors. I. p. 614. V. p. 297. *der Kreutzschnabel.*

Smellie, Philosoph. der Naturgesch. II. p. 255.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 620. *der Kreuzschnabel.*

Bork-

Borkhausen, Magaz. I. p. 137. n. 1. *Kreuzschnabel.*
Beckmann, Bibl. V. p. 383. VI. p. 162. VIII. p. 538. *der Finnische Papagey; Kreuzvogel.*
Erxleben, phys. Bibl. III. p. 278. *Kreutzschnabel.*
Oekon. Zool. p. 97. n. 93. *der Kreutzschnabel.*
Meidinger, Vorlesf. I. p. 148. n. 1. *der Kreuzschnabel.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 558. *Krinitz.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 352. *der Krummschnabel.*
Forst Fisch- und Jagdlex. II. p. 598. *Krinitz; Grünitz; Grönitz.*
Mannigfaltigk. 1776. p. 463. *Kreutzschnabel.*
Börner, schles. ökonom. Nachr. 1781. p. 100. Loxia curvirostra.
Krünitz, Encykl. XLIX. p. 267. *Kreuz-Vogel.*
Hannov. Seltenheit. der Nat. I. p. 278.
Allgem. Gesch. d. neuesten Entdeck. in Russl. und Pers. VI. p. 241.
Schrift der berlin. Gesellsch. N. Fr. VII. p. 465. n. 53. *der Kreutzschnabel.*
Eberhard, Thiergesch. p. 82. *der Kreutzschnabel.*
Koelreuter, act. hist. acad. Palat. III. p. 62.
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. Loxia.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 2. Curvirostra.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 171. n. 1. Loxia (Curvirostra) rostro forficato.
Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 244. Loxia (Curvirostra) rostro forficato.
Moehring, av. gen. p. 40. n. 24. Loxias.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 252. Curvirostra. *Krinitz; Krinis.*
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 391. Loxia; Crucifera, Cruciata.

Sibbald, Scot. p. 254. Loxia.
Hermann, tab. affin. anim. p. 216. 218. Loxia curvirostra.
Schaefer, element. ornithol. tab. 45.
Levin, britt. Birds II. tab. 66.
Faun. Arragon. p. 85. — Hist. prov. II. p. 317.
Bomare, dictionn. I. p. 463. Bec-croisé.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 354. n. 1. *der Kreutzschnabel.*
Donndorff, Natur und Kunst, I. p. 553.

β. *Der braunrothe Kreutzschnabel mit rothem Kopfe.*
Brisson, ornith. I. p. 403. A. Bec-croisé roussatre.
Büffon, Vögel, IX. p. 32. *der pyrenäische Kreutzschnabel.*
Barrere, ornithol. cl. 3. gen. 18. sp. 2. Loxia pyrenaica ex subrufo nigricans, cervice et capite coccineis.

γ. *Der größere Kreutzschnabel mit dickerm und kürzerm Schnabel.*
Büffon, Vögel, IX. p. 48. *der große Krummschnabel;* m. e. Fig.
Krünitz, Encykl. XLIX. p. 284. *der große Kreuz-Vogel.*
Borkhausen, Magaz. I. p. 139. Loxia (Pytyopsittacus) rostro subforficato, digito medio breviore.

12. Leucoptera. *Der weißflüglige nordamerikanische Kernbeißer.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 323. ad n. 124. *die amerikanische Art.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 371. n. 2. Loxia (Falcirostra) rostro forficato, corpore croceo-coccineo, alis nigris, fasciis duabus albis, remigibus secundariis apice albis, cauda nigra.

Latham,

Latham, Syn. Suppl. p. 148. White-winged Crossbill.

Latham, Vögel, II. 1. p. 103. *der weißflügelige Kreutzschnabel.*

50. Psittacea. *Der Papageykernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 371. n. 3. Loxia (Psittacea) olivaceo-fusca, capite colloque flavis, mandibula superiore adunca, inferiore subtruncata.

Latham, Vögel, II. 1. p. 104. n. 3. *der papageyschnäbelige Kernbeißer*, tab. 43.

2. Coccothraustes. *Der gemeine Kernbeißer.* (2)

Müller, Natursyst. II. p. 546. n. 2. *der Dickschnabel*, tab. 25. fig. 1.

Leske, Naturgesch. p. 259. n. 2. *der Kirschfink.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 132. n. 2. *Kirschfink; Steinbeißer.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 183. n. 2. Loxia (Coccothraustes) linea alarum alba, remigibus mediis apice rhombeis, rectricibus latere tenuiore baseos nigris; *Kernbeißer, Kirschknäpper.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 510. n. 4. *der Kirschfink; Dickschnabel.*

Funke, Naturgesch. I. p. 303. *der Kernbeißer.*

Ebert, Naturl. II. p. 131. *der Kirschfink.*

Halle, Vögel, p. 396. n. 405. *der Kirschenfink; Fichtenhacker*; Fig. 25.

Meyer, Thiere, II. tab. 75. *Kernbeißer.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 399. n. 332. *der Kernbeißer; Kirschenschneller; Klepper; Kirschleske.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 329. C. *der Kernbeißer.*

(2) Flügelweite 13. Zoll. Gewicht 2. Unzen. *Penn.*

Neuer Schaupl. der Natur. V. p. 457. *Kernbeißer.*
Onomat. histor. natur. III. p. 35. *der Kernbeißer; Nußbicker; Nuß- oder Tannhäger.*
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 128. *Kernbeißer.*
Beckmann, Naturhist. p. 52. a. *der Kirschenfink.*
Klein, av. p. 94. n. 1. Coccothraustes, simpliciter.
Klein, Vorbereit. p. 175. n. 1. *brauner Steinbeißer; Kirschleske.*
Klein, verbess. Vögelhistor. p. 94. n. 1. *brauner Steinbeißer; Kirschfink; Klepper.*
Klein, stemmat. av. p. 19. tab. 19. fig. 11. a. b.
Gesner, Vögelb. p. 486. *Steinbeißer; Klepper; Kernbeiß; Bollenpick;* m. e. gut. Fig.
Brisson, ornith. I. p. 370. n. 1 Gros-bec.
Buffon, Vögel, X. p. 5. *der Kernbeißer;* m. 2. Figg. M. u. W.
Batsch, Thiere, I. p. 348. *der gemeine Kernbeißer.*
Latham, Syn. Suppl. p. 148. Grosbeak.
Latham, Vögel, II. 1. p. 104. n. 4. *der gemeine Kernbeißer.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 371. n. 4. Loxia (Coccothraustes) cinereo-castanea, linea alarum alba, remigibus mediis apice rhombeis, rectricibus latere tenuiore baseos nigris.
Seligmann, Vögel, VI. tab. 83. *brauner Kernbeißer.*
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 98. n. 2. *der Kernbeißer; Kaarnbiker.*
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 420. *der Dickschnabel.*
Fischer, Liv. p. 96. n. 144. *Dickschnabel.*
Cetti, Sardin. II. p. 179. *der Kernbeißer.*
White, N. G. von Engl. p. 15. p. 62. n. 15. *Kirschfink.*

Pallas,

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 15. *Dickschnabel.*
Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 2. *Kirsebärfugl.*
Linné, Abhandl. II. p. 302. n. 122. *der Kirschfink.*
Pennant, britt. Thiergesch. p. 118. tab. 56. fig. 1. *Kernbeisser.*
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 166. n. 201. *der Kernbeisser.*
Borkhausen, Magazin, I. p. 139. n. 2. *Dickschnabel; Kirschfink.*
Naturforsch. XVII. p. 87. — XXII. p. 143. — XXV. p. 19. *Kernbeisser.*
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 620. *der Kirschfink.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 325. *der Kirsch-Fink.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 56. *Kern-Beisser; Kirsch-Schneller; Kirsch Knepper.*
Naumann, Vogelsteller, p. 142. *der Kernbeisser.*
Bechstein, Must. schädl. Th. p. 133. n. 1. *der Kirschfink.*
André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 70. III. p. 312.
Krünitz, Encykl. XXXIX. p. 191. *Kirschfink.*
Goeze, nützl. Allerl. II. p. 379. *Kernbeisser.*
Meidinger, Vorles. I. p. 148. n. 2. *der Kirschfink.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 338. *der Kernbeiss.*
Beckmann, Bibl. VIII. p. 538. *der Kirschfink.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 526. *Kernbeisser.*
Wirsing, Vögel, tab. 16. *Kernbeisser.*
Onomatol. forestal. II. p. 482.
Mannigfaltigk. 1776. p. 463. 2.
Oekonom. Zool. p. 97. n. 4. *der Kernbeisser.*
Heister, de glandulis in ingluvie Coccothraustae observatis. — Eph. nat. curios. I. p. 408. c. fig.
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. Coccothraustes.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 1. Coccothraustes.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 171. n. 2. Loxia (Coccothraustes) linea alarum simplici alba, rectricibus latere tenuiore baseos albis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 245. Loxia (Coccothraustes) linea alarum alba, remigibus mediis apice rhombeis, rectricibus latere tenuiore baseos nigris.

Kramer, Austr. p. 364. n. 1. Loxia linea alarum duplici alba. *Kernbeiß; Nußbeisser.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 236. Coccothraustes; *Leske; Kirsch-Leske, Steinbeisser; Lysklicker; Kirschfinke; Klepper; Bollenbeisser.*

Jonston, av. p. 108. Coccothraustes.

Belon, hist. nat. des ois. p. 337. Gros-bec; Pinçon royal.

Schaefer, element. ornithol. tab. 57.

Levin, britt. Birds, II. p. 67.

Roman. orn. I. p. 151. tab. 23.

Faun. Arragon. p. 85. — Hist. Prov. I. p. 493.

Hermann, tab. affin. anim. p. 217. Loxia Coccothraustes.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 355. n. 2. *der gemeine Kernbeisser.*

3. ENUCLEATOR. *Der große Kernbeißer.*

Müller, Natursyst. II. p. 546. n. 3. *der Krappenfresser.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 133. n. 3. *der Kernfresser.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 509. n. 2. *der Kernfresser; Fichtenhacker.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 399. n. 331. *der große Kernbeisser.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 324. n. 125. *der Fichtendickschnabel.*

Onomat.

Onomat. hist. nat. III. p. 846. *der Canadensische Kernbeisser.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 95. n. 13. *Parisvogel.*

Brisson, ornith. I. p. 378. n. 15. Gros-bec de Canada.

Büffon, Vögel, X. p. 59. *der Talbit, oder canadische Kernbeisser, oder Hartschnabel;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 349. *der canadische Kernbeisser.*

Latham, Syn. Suppl. p. 148. Pine Grosbeak.

Latham, Vögel, II. 1. p. 106. n. 5. *der Fichtenkernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 372. n. 5. Loxia (Enucleator) sordide roseo fusco griseoque varia, linea alarum duplici alba, rectricibus totis nigricantibus.

Seligmann, Vögel, V. tab. 18. *der größte Dickschnabel, der Er;* tab. 19. *die Sie.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 76. n. 164. *der Krappenfresser;* tab. 7. fig. 1. u. 2.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 99. n. 3. *der Parisvogel.*

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 421. *Parisvogel; pomeranzenfarbiger oder rother Kernbeisser.*

Fischer, Livl. p. 96. n. 145. *großer Kernbeisser; finnischer Dompfaffe; finnischer Papagey.*

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 197. *der Kernbeisser.*

Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 91. *der große Rothschwanz.*

Linné, Abhandl. II. p. 302. n. 123. *der Kernbeisser.*

Schwed. Abhandl. XIX. p. 132.

Neue Schwed. Abhandl. IV. p. 49. *Talbitur.*

Natur-

Naturforsch. XVII. p. 87. n. 178. *der Krappenfresser.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 622. *der Dur-bec.*

Pennant, britt. Thiergesch. p. 119. *der Kernfresser.*

Mannigfaltigk. 1776. p. 463. n. 3.

Meidinger, Vorles. I. p. 148. n. 3. *der kanadische Kernbeiß.*

Linné, amoenit. acad. VII. p. 127. Loxia Enucleator.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 171. n. 3. Loxia (Enucleator) linea alarum duplici alba, rectricibus totis nigricantibus.

Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 246. Loxia (Enucleator) linea alarum duplici alba, rectricibus totis nigricantibus.

Levin, britt. Birds. II. tab. 68.

Hermann, tab. affin. anim. p. 178. Loxia Enucleator.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 355. n. 3. *der große Kernbeisser.*

51. NAEVIA. *Der gefleckte capsche Kernbeisser.* (3)

Büffon, Vögel, X. p. 121. *der gefleckte Kernbeisser;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 373. n. 7. β. Loxia fusca, pennis medio nigris, subtus albida, nigro striata, tectricibus alarum uropygioque luteis.

Latham, Syn. II. 1. p. 114. n. 7. Var. A. — Vögel, II. 1. p. 109. n. 7. A.

52. MA-

(3) Die *Büffonschen* Synonymen sind p. 862. n. 39. β. nochmals aufgeführt, und dieser Vogel daselbst als Spielart von *Loxia Capensis* aufgenommen, wofür ihn auch *Latham* ansieht.

52. MACROURA. *Der langgeschwänzte Kernbeisser.*

Büffon, Vögel, X. p. 157. 160. *der schwarze langgeschwänzte Sperling; der schwarze Sperling von Juda;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 109. n. 8. *der langschwänzige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 773. n. 9. Loxia (Longicauda) nigra, tectricibus alarum dorsoque inter alas fascia transversa rufo-lutea, cauda longiore cuneiformi.

53. AUREA. *Der goldrückige Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 110. n. 9. *der goldrükkige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 373. n. 8. Loxia (Aurea) nigra, dorso uropygioque luteis, tectricibus alarum fuscescentibus nigro maculatis.

54. RUBICILLA. *Der caucasische Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 108. n. 6. *der Caucasische Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 372. n. 6. Loxia (Rubicilla) coccinea albo maculata, abdomine crissoque roseis, tectricibus alarum maioribus fuscis, cauda nigra.

Hermann, tab. affin. anim. p. 218. Loxia Rubicilla.

4. PYRRHULA. *Der Dompfaffe.* (4)

Müller, Natursyst. II. p. 547. n. 4. *der Thumpfaffe;* tab. 25. Fig. 3.

Leske,

(4) Nährt sich hauptsächlich von allerley Saamen, Beeren, Knospen, und Insekten. Im Bauer kann man ihn mit blossem Rübsaamen viele Jahre unterhalten. Wird sehr leicht zahm, und

Leske, Naturgesch. p. 260. n. 3. *der Gimpel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 135. n. 5. *der Dompfaff; Gümpel.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 183. n. 3. Loxia (Pyrrhula) artubus nigris, rectricibus caudae remigumque posticarum albis. *Dompfaff, Blutfink; Liebig, Rothfink; Gieker.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 509. n. 3. *der Gimpel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 587. *der Dompfaff; Gümpel; Hahle.*

Funke, Naturgesch. I. p. 270. *der Dohmpfaff.*

Ebert, Naturl. II. p. 131. *Gympel; Thumherr.*

Halle, Vögel, p. 401. n. 409. *der Blutfink, Domherr, Dummherr.*

Meyer, Thiere, II. tab. 8. *der Blutfink.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 400. n. 333. *der Dommpfaff; Rothschlegel; Schniegel; Goldfink; Pfäfchen.*

Beckmann, Naturhist. p. 52. *b. der Dompfaffe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 319. A. *der Dompfaffe.*

Neuer Schaupl. der Natur, I. p. 274. III. p. 417. *Blutfink; Gimpel.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 856. *Blutfink.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 256. *der Thumpfaff.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 128. *der Dompfaff; Hoylen.*

Klein, av. p. 95. n. 5. Coccothraustes sanguinea.

Klein, Vorbereit. p. 176. n. 5. *Thumpfaffe; Lohfinke; Rottvogel.*

Klein,

und es gehört dazu gar nicht viel Zeit und Geduld, wie *Büffon* meint. Dafs er aber im Zimmer so leicht hecke, wie einige vorgeben, widerspricht wenigstens meiner eignen vieljährigen Erfahrung. Noch weniger ist mir ein Beyspiel bekannt, dafs sich ein Dompfaffe mit einer Kanarien-Sie gepaart habe. — Wird an 20 Jahr alt.

Klein, verb. Vögelhist. p. 94. n. 5. *Thumpfaffe.*
Klein, Stemmat. av. p. 19. tab. 19. Fig. 13. a. b.
Gesner, Vögelb. p. 43. *Blutfink;* p. 44. *Pfäfflein; Güger (Quetsch* das Weibch.) m. e. mittelm. Fig.
Brisson, ornith. I. p. 395. Bouvreuil.
Buffon, Vögel, XIII. p. 6. *der Gimpel;* m. 2. Figg. M. u. W.
Batsch, Thiere, I. p. 349. *der Dompfaff.*
Latham, Syn. Suppl. p. 152. *Bulfinch.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 135. n. 51. *der Gimpel.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 387. n. 56. Loxia (Pyrrhula) cinerea, artubus nigris, tectricibus caudae remigumque posticarum albis.
Beseke, Vögel Kurl. p. 77. n. 165. *der Dompfaff.*
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 101. n. 4. *der gemeine Dompfaff; Dohnpaap.*
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 421. *der Thumpfaffe.*
Fischer, Livl. p. 96. n. 143. *Dompfaffe.*
White, N. G. von Engl. p. 30. p. 66. n. 7. *Blutfink.*
Linné, Abhandl. II. p. 302. n. 120. *der Blutfink.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 167. n. 202. *der Gympel.*
Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 3. *Dompfaffe.*
Pontoppidan, Norweg. II. p. 130. *Domherre.*
Naturforsch. XVII. p. 88. n. 179. *der Thumpfaffe.* XXI. p. 197. *Liebiche.*
Borkhausen, Magaz. I. p. 140. n. 3. *Blutfink.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 27. 328. *der Blut-Fink.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 56. *Gümpel; Rothschlegel; Schnigel.*
Naumann, Vogelsteller, p. 89. *Schniel oder Dompfaffe.*
André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 308.

Samml.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 743. *der Gümpel.*
Beckmann, Bibl. VI p. 477. *Dompfaffe.*
Krünitz, Encykl. XVIII. p. 535. *Gimpel.*
Oekonom. Zool. p. 98. n. 41. *der Gimpel.*
Meidinger, Vorl. I. p. 148. n. 4. *der Gimpel.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 272. *Duhmpfaffe.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 237. *Gimpel.*
Loniceri, Kräuterb. p. 682. *Blutfink.*
Eberhard, Thiergesch. p. 82. *Blutfink.*
Forst- Fisch- u. Jagdlex. I. p. 1047. *Gimpel.*
Börner, Schles. ökon. Nachr. 1781. p. 101. Loxia Pyrrhula.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. Pyrrhula.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 3 Pyrrhula.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 171. n. 4. Loxia (Pyrrhula) artubus nigris, tectricibus caudae remigumque posticarum albis.
Müller, Zool. dan. prodr. p. 30. n. 247. Loxia (Pyrrhula) artubus nigris, tectricibus caudae remigumque posticarum albis.
Charleton, onom. zoic. p. 91. n. 9. Rubicilla.
Moehring, av. gen. p. 40. n. 25 Pyrrhulas.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 262. Fringilla sanguinea. *Blut-Finke; Luh-, Loh-Finke; Rottvogel; Bollenbeisser; Gümpel.*
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 419. Rubicilla seu Pyrrhula.
Belon, hist. nat. des ois. L. 7. c. 17. fol. 13. Pivoine.
Salerne, hist. nat. des ois. p. 258. Ebourgeonneux, etc.
Schaefer, element. ornithol. tab. 59.
Zinnan, Uov. p. 59. tab. 8. Fig. 48. Monachino.
Levin, britt. Birds. II. tab. 70.
Faun. Arragon. p. 86. — Rom. orn. I. p. 158. tab. 24. Fig. 2.

Jonston,

Jonston, av. p. 122. Pyrrhula seu Rubicilla.
Hermann, tab. affin. anim. p. 178. Loxia Pyrrhula.
Bomare, Dictionn. II. p. 48. Bouvreuil.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 256. n. 4. *der Dompfaffe.*

β. *Der schwarze Dompfaffe.* (s)
Brisson, ornith. I. p. 396. A. Bouvreuil noir.
Klein, av. p. 96. n. 11. Coccothraustes atricilla.
Klein, Vorbereit. p. 178. n. 11. *Thumdechant.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 95. n. 11. *Thumdechant.*
Büffon, Vögel, XIII. p. 28. *der schwarze Gimpel.*
Latham, Syn. II. 1. p. 144. n. 51. A. Black Bulfinch. — Vögel, II. 1. p. 137. n. 51. Var. A.
Latham, Syst. ornith. I. p. 387. n. 56. β.
Zorn, Petinotheol. II. p. 330. ad §. 2.
Naturforsch. II. p. 2. *schwarzer Gimpel.*
Beseke, Vögel Kurl. p. 77. ad n. 165.

γ. *Der weiße Dompfaffe.*
Brisson, ornith. I. p. 396. B. Bouvreuil blanc.
Büffon, Vögel, XIII. p. 27. *der weiße Gimpel.*
Latham, Syn. II. 1. p. 144. n. 51. B. — Vögel, II. 1. p. 137. n. 51. Var. B.
Latham, Syst. ornith. I. p. 388. n. 56. β.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 263. Pyrrhula candida.

5. Car-

(s) *Zorn* versichert mit Gewisheit, dass ein Weibchen, mit Hanf gefüttert, davon öfters kohlschwarz werde. *Beseke* gedenkt eines schwarzen Dompfaffen, der lange im Käfig gehalten war, nachdem er aber in Freyheit gesetzt war, und in der Stube umher flog, in der Mauserzeit die schwarze Farbe verlohr und seine gewöhnliche Farbe wieder annahm, die er auch mehrere Jahre, welche er wieder im Käfig zugebracht, beybehalten hat.

5. CARDINALIS. *Der Cardinalvogel.* (6)

Müller, Naturſyſt. II. p. 547. n. 5. *der Haubenblutfink;* tab. 25. Fig. 2.

Borowsky, Thierreich, III. p. 134. n. 4. *der Haubenblutfink;* tab. 61. B.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 184. n. 4. Loxia (Cardinalis) criſtata rubra, capiſtro nigro, roſtro pedibusque ſanguineis: *der Indianiſche Haubenfink; die virginiſche Nachtigall.*

Halle, Vögel, p. 399. n. 407. *der Karminrothe Kirſchenfink; Kardinalfink; (gehaubter kleiner Papagey* Seb.)

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 401. n. 334. *indianiſche Haubenfink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 325. n. 126. *der Cardinal; der virginiſche Kernbeiſſer.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 838. *der karminrothe Kirſchenfink.*

Klein, av. p. 94. n. 3. Coccothrauſtes indica criſtata.

Klein, Vorbereit. p. 176. n. 3 *rother Steinbeiſſer.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 94. n. 3. *rother Steinbeiſſer.*

Briſſon, ornith. I. p. 379. n. 17. Gros-bec de Virginie, dit vulgairement Cardinal hupé.

Büffon, Vögel, X. p. 74. *der Cardinal mit dem Zopf;* m. e. Fig.

Batſch, Thiere, I. p. 350. *der Cardinal mit dem Zopf.*

Latham, Syn. Suppl. p. 150. Cardinal Grosbeak.

Latham, Vögel II. 1. p. 112. n. 13. *der Cardinal-Kernbeiſſer.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 375. n. 14. Loxia (Cardinalis) criſtata rubra, capiſtro nigro, roſtro pedibusque ſanguineis.

Selig-

(6) Soll, nach *Beſeke*, auch in Kurland niſten.

Seligmann, Vögel, II. tab. 76 *der Rothvogel.*

Frisch, Vögel, tab. 4 Fig. 1. *der indianische Haubenfink, oder die virginische Nachtigall.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 77. n. 166. *der Haubenblutfink.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 168. n. 203. Loxia rubra; *der rothe Dickschnabel.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 422. *rother Steinbeisser.*

Schöpf, Reis. d. Nordamer. II. p. 199. *der rothe Vogel.*

Kalm, Reis. n. Nordamer. p. 40.

Naturforsch. XVII. p. 89. n. 180. *der Haubenblutfink.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 172. n. 5. Loxia (Cardinalis) rubra, facie nigra.

Charleton, onom. zoic. p. 85. n. 5. Coccothraustes indica, Cardinalis.

Gentl. Magaz. XXIII. tab. p. 512. Red bird.

Hermann, tab. affin. anim. p. 179. Loxia Cardinalis.

Donndorff, Handb. d. Thiergeschich. p. 356. n. 5.

94. Carlsoni. *Der ungehäubte Cardinalvogel* (7)

Latham, Syst. ornith. I. p. 375. n. 14. β. L. rubra, mento nigro, uropygio, cauda, alis pedibusque fuscis.

Latham, Vögel, II. 1. p. 114. not. i.

55. Indica. *Der indianische Kernbeisser.*

Brisson, ornith. I. p. 379. n. 16. Gros-bec des Indes.

Latham, Vögel, II. 1. p. 114. n. 14. *der Indische Kernbeisser.*

Z 2 *Latham,*

(7) Nach *Latham*, eine Varietät vom vorigen.

Latham, Syst. ornith. I. p. 376. n. 15. Loxia (Boetonensis) cristata rubra, rostri basi tectricibusque alarum obscurioribus, rostro pedibusque flavis.

6. MADAGASCARIENSIS. *Der madagascarische Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 548. n. 6. *der Madagascarische.*

Brisson, ornith. I. p. 337. n. 20. Cardinal de Madagascar.

Büffon, Vögel. X. p. 175. *der Foudis.*

Latham, Syn. Suppl. p. 150. Madagascar Grosbeak.

Latham, Vögel, II. 1. p. 114. n. 15. *der Madagascarische Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 376. n. 16. Loxia (Madagascariensis) rubra, fascia oculari nigra, dorso nigricante-maculato.

7. MEXICANA. *Der mexicanische Kernbeisser.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 548. n. 7. *der Mexicanische.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 852. *der Schwarzflügel; rothe Mexicanischer Vogel von Sperlingsart.*

Klein, av. p. 95. n. 8. Coccothraustes alis nigris.

Klein, Vorbereit. p. 177. n. 8. *Schwarzflügler.*

Klein, verb. Vögelh. p. 95. n. 18. *Schwarzflügler.*

Brisson, ornith. I. p. 380. n. 18. Gros-bec du Mexique.

Latham, Vögel, II. 1. p. 116. n. 17. *der Mexicanische Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 377. n. 18. Loxia (Mexicana) rubra, alis caudaque nigris.

Linné,

(7) Die Trivialbenennung *L. Mexicana* kommt p. 854. n. 26. nochmals vor.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 172. n. 8. Loxia (Mexicana) rubra, alis nigris.

56. Brasiliana. *Der gesprenkelte Kernbeisser.*

Büffon, Vögel, X. p. 82. *der sprenklichte Kernbeisser;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 116. n. 18. *der Brasilische Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 378. n. 19. Loxia (Brasiliana) fusca, subtus rufescens, maculis albis nigro annulatis, capite abdomineque medio rubris, lunula nuchae caudaque apice albis.

8. Dominicana. *Der Dominicanercardinal.* (9)

Müller, Natursyst. II. p. 548. n. 8. *der Dominicaner.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 846. *der brasilianische Finke.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 98. n. 18. *Brasilianer Fink.*

Brisson, ornith. I. p. 377. n. 13. Gros-bec du Brésil.

Büffon, Vögel, X. p. 82. 83. Guira-tirica.

Latham, Vögel, II. 1. p. 117. n. 20. *der Dominikaner-Kernbeisser.*

Latham, Syn. Suppl. p. 151. Dominican Grosbeak.

Latham, Syst. ornith. I. p. 377. n. 21. Loxia (Dominicana) nigra, capite gulaque coccineis, pectore, abdomine remigumque margine albis.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 22. *der Dominicaner cardinal.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 172. n. 6. Loxia (Dominicana) nigra, capite gulaque coccineis, pectore, abdomine remigumque margine albis.

(9) Ist nicht mit *L. Dominicensis* p. 855. n. 70. zu verwechseln.

Jonston, av. p. 203. Guira tirica.
Hermann, tab. affin. anim. p. 218. Loxia dominicana.

β. *Der gehäubte Dominicanercardinal.* (10)
Büffon Vögel, X. p. 190. *der gezopfte domingische Kardinal;* m. e. Fig.
Latham, Syn. II. 1. p. 123. n. 20. A. Crested dominican Grosbeak.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 378. n. 22. Loxia (Cucullata) cinerea, capite cristato gulaque coccineis, pectore abdomineque albis, cauda longiore, rectricibus lateralibus nigricantibus.
Latham, Vögel, II. 1. p. 117. n. 20. Var. A. *der Dominikaner-Kernbeisser mit dem Federbusche.*

γ. *Der Pabst.* (1)
Pennant, arct. Zool. II. p. 325. n. 127. *der Pabst.*
Brisson, ornith. I. p. 339. n. 22. Cardinal Dominiquain.
Büffon, Vögel, X. p. 189. *der domingische Sperling.*
Latham, Syn. II. 1. p. 124. n. 20. β. — Vögel, II. 1. p. 118. n. 20. Var. B.
Latham, Syst. ornith. I. p. 378. n. 21. β. L. cinerea subtus nivea, capite anteriore guttureque rubris, rectricibus nigris cinereo-marginatis, extima margine exteriore alba.
Jonston, av. p. 208. Tije guacu Paroara.

57. Sibirica. *Der sibirische Kernbeisser.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 119. n. 21. *der Sibirische Kernbeisser.*

Latham,

(10) Nach *Latham* eine eigne Gattung. Ueberhaupt werden die Synonymen bey dieser Gattung und den dahin gerechneten Varietäten sehr verwechselt.

(1) Ist nicht mit *Emberiza Ciris*, der auch diese deutsche Benennung gegeben wird, zu verwechseln.

Latham, Syst. ornith. I. p. 378. n. 23. Loxia (Sibirica) coccinea, fusco-maculata, subtus pallide coccinea, capistro purpureo, alis albo nigroque fasciatis, rectricibus nigris, extima alba.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 13. n. 24. Loxia sibirica.

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 182. Loxia, vertice, gula et pectore coccineis, dorso fusco rubro irrorato, imo abdomine sordide albo? *Duratschok; Tschetschewiza.*

58. VIRGINICA. *Der virginische Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 119. n. 22. *der gelbbäuchige Kernbeisser.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 327. n. 131. *der Dickschnabel mit dem gelben Bauche.* Ist nach *Latham*, mit *Tanagra Missisippensis*, p. 889. n. 23. β. einerley; vid. *Syst. ornith.* I. p. 421. n. 6.

9. CRISTATA. *Der Haubenkernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 559. n. 9. *der Haubenkernbeisser;* tab. 21. Fig. 1.

Onomat. hist. nat. IV. p. 845. *der Finke aus Ethiopien.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 120. n. 23. *der Kernbeisser mit dem Federbusche.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 378. n. 24. Loxia (Cristata) albicans, fronte cristata, uropygio pedibusque rubris, rectricibus intermediis longissimis.

10. ERYTHROCEPHALA. *Der rothköpfige Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 549. n. 10. *der Rothkopf.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 848. *der Sperling aus Angola mit dem rothen Kopfe.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 95. n. 14. *rothköpfiger Grünling.*

Brisson, ornith. I. p. 368. n. 69. Cardinal d'Angola.

Latham, Syn. Suppl. p. 150. Paradise Grosbeak.

Latham, Vögel, II. 1. p. 116. n. 19. *der Paradies-Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 377. n. 20. Loxia (Erythrocephala) cinerascens, capite purpurascente, pectore albo-maculato.

Seligmann, Vögel, VI. tab. 75. *der Paradies-Sperling.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 172. n. 9. Loxia (Erythrocephala) cinerascens, capite purpurascente, pectore albo maculato.

11. MAJA. *Der Majan.* (*)

Müller, Natursyst. II. p. 549. n. 11. *der Weißkopf.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 850. *der chinesische Finke.*

Brisson, ornith. I. p. 365. n. 65 Maia de la Chine.

Büffon, Vögel, XI. p. 81. *der Majan.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 144. n. 68. *der weißköpfige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 391. n. 72. Loxia (Maja) fusca, capite albo.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 96. *der Kernbeisser oder Dickschnäbler aus Malacca.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 629. *der Majan.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 219. Loxia Maja.

13. FLAVICANS. *Der gelbliche Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 550 *der gelbe Kernbeisser.*

Onomat.

(*) Ist nicht mit *Fringilla Maja*, p. 924. zu verwechseln.

Onomat. hist. nat. IV. p. 848. *der gelblichte Finke.*
Bankroft, N. G. von Guiana, p. 108. *der gelbe Finke.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 132. n. 44. *der gelbe Kernbeisser.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 385. n. 48. Loxia (Flavicans) flava, dorso flavicante, capite fulvo.

60. BONARIENSIS. *Der schwarz und saffrangelbe Kernbeißer.*

Büffon, Vögel, XI. p. 165. *der schwarz und saffrangelbe Fink.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 132. n. 43. *der saffrangelbe Kernbeisser.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 385. n. 47. Loxia (Bonariensis) nigricans, subtus flavescens, capite colloque superiore caeruleis, iugulo pectoreque fulvis.
Hermann, tab. affin. anim. p. 219. *Noir-Souci.*

14. ORYZIVORA. *Der Reißvogel.*

Müller, Natursyst. II. p. 550. n. 14. *der Reißfresser.*
Blumenbach, Handb. der N. G. p. 184. n. 5. Loxia (Oryzivora) fusca, temporibus albis, rostro rubro.
Halle, Vögel, p. 407. n. 417. *der Reißfink.*
Neuer Schaupl. der Natur. VII. p. 88. *Reismäher.*
Onomat. hist. nat. V. p. 373. *der Reißfresser.*
Klein, av. p. 96. n. 12. Coccothraustes caerulescens.
Klein, Vorbereit. p. 178. n. 12. *Reismeher.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 95. n. 12. *Reismäher.*
Brisson, ornith. I. p. 377. n. 12. Gros-bec cendré de la Chine.
Büffon, Vögel, X. p. 88. *der Padda oder Reisvogel;* m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 349. *der Padda.*

Latham, Syn. Suppl. p. 151. Java Grosbeak.

Latham, Vögel, II. 1. p. 122. n. 29. *der Reiskern-beisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 380. n. 31. Loxia (Oryzivora) fusca temporibus albis, rostro rubro, capite caudaque nigris.

Seligmann, Vögel, III. tab. 81. 82. *der chinesische Reisvogel Padda genannt*, M. u. W.

Bankroft, Guian. p. 107. *der guianische Reisvogel.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 622. *der Padda.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 173. n. 1. Loxia (Oryzivora) fusca, temporibus albis, rostro rubro.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 357. n. 6. *der Reisvogel.*

62. FLABELLIFERA. *Der Fächerschwanz.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 326. n. 130. *der Fächerschwanz.*

Büffon, Vögel, X. p. 87. *der Fächerschwanz;* m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Vögel, II. 1. p. 122. n. 28. *der fächerschwänzige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 380. n. 30. Loxia (Flabellifera) rubro-fusca, subtus rubescens, remigibus caudaque fuscis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 217. Loxia Flabellicauda.

15. PANICIVORA. *Der weissflüglige Kernbeisser.*

Brisson, ornithol. I. p. 397. n. 4. Bouvreuil noir d'Afrique.

Büffon, Vögel, XIII. p. 30. *der grosse schwarze afrikanische Gimpel.*

Onomat.

Onomat. histor. natur. IV. p. 854. *der schwarze Africanische Domherr.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 138. n. 52. *der weissflügelige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 388. n. 57. Loxia (Panicivora) nigra, alula alba, rostro incarnato.

16. MALACCA. *Der malackische Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 551. n. 16. *der malackische Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 851. *der Blauschnabel aus China.*

Klein, av. p. 88. n. 5. Passer Sinensis rostro caeruleo.

Klein, Vorbereit. p. 165. n. 5. *Blauschnabel aus China.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 91. n. 5. *Blauschnabel.*

Brisson, ornith. I. p. 375. n. 8. Gros-bec de Java.

Büffon, Vögel, X. p. 108. *der Jacobiner*, p. 109. *der javanische Kernbeisser*, p. 111. *der Jacobin*, p. 112. *der Jacobin;* m. e. Fig. n. 3. p. 107. *der indianische Sperling mit weisser Brust.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 133. n. 47. *der Malakkische Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 385. n. 51. Loxia (Malacca) ferruginea, capite abdomineque nigris, rostro caeruleo.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 45. fig. 2. *der indianische Sperling mit weisser Brust.*

β. *Der* (sogenannte) *chinesische Sperling.*

Klein, av. p. 90. n. 19. Passer fuscus, capite nigro.

Klein, Vorbereit. p. 168. n. 19. *brauner Sperling mit schwarzem Kopfe.*

Klein,

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 92. n. 17. *schwarzköpfiger brauner Sperling.*

Halle, Vögel, p. 377. n. 367. *der zimmetfarbne Sperling aus China.*

Brisson, ornithol. I. p. 374. n. 7. Gros-bec de la Chine.

Buffon, Vögel, X. p. 105. *die chinesischen Sperlinge.*

Latham, Syn. II. 1. p. 141. Var. A. — Suppl. p. 152. — Vögel, II. 1. p. 134. n. 47. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 386. n. 51. β. L. ferruginea, capite colloque inferiore nigris.

Seligmann, Vögel, II. tab. 85. *die chinesischen Sperlinge.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 183. n. 29. Fringilla (Chinensis) ferruginea, capite atro, rostro caeruleo.

17. Molucca. *Der moluckische Kernbeißer.*

Müller, Natursyst. II. p. 551. n. 17. *der moluckische Kernbeißer.*

Brisson, ornith. I. p. 376. n. 10. Gros-bec des Moluques.

Büffon, Vögel, X. p. 108. 111. *der moluckische Domino.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 134. n. 48. *der Molukkische Kernbeißer,*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 386. n. 52. Loxia (Molucca) fuscescens, capite, iugulo rectricibusque nigris, subtus uropygioque albo nigroque undulata.

18. Punctularia. *Der Gobryvogel.* (2)

Müller, Natursyst. II. p. 551. n. 18. *der gesprenkelte Kernbeißer.*

Halle,

(2) Die Synonymen dieser und der beyden vorhergehenden Gattungen werden gar häufig verwechselt. Im *Buffon*, (loc. citt.) ist

Halle, Vögel, p. 380. n. 378. *der Tigersperling*; Fig. 23.

Onomat. hist. nat. IV. p. 856. *rostiger Sperling mit getiegertem Unterleibe.*

Klein, av. p. 89. n. 6. Passer Sinensis ferrugineus.

Klein, Vorbereit. p. 166. n. 6. *brauner Sperling aus China.*

Klein, av. p. 90. n. 18. Passere vario maculato.

Klein, Vorbereit. p. 168. n. 18. *rostiger Sperling mit getiegertem Unterleibe.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 92. *rostiger Sperling mit getiegertem Unterleibe.*

Brisson, ornithol. I. p. 375. n. 9. Gros-bec tacheté de Java.

Büffon, Vögel, X. p. 108. *b.* p. 111. n. 2. *der Jacobiner*, p. 109. *Gowry.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 135. n. 50. *der getüpfelte Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 386. n. 54. Loxia (Punctularia) ferruginea, abdomine nigro albo-maculato.

Seligmann, Vögel, II. tab. 79. *der Gobryvogel.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 173. n. 13. Loxia (Punctularia) ferruginea, abdomine nigro albo maculata.

19. HORDEACEA. *Der gelbsteißige Kernbeißer.*

Müller, Natursyst. II. p. 551. n. 19. *der Gerstenfresser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 849. *der Gerstenfink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 133. n. 45. *der Kernbeißer mit gelbem Steiß.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 385. n. 49. Loxia (Hordeacea) fulva, temporibus albis, cauda pectoreque atris.

20. SAN-

ist alles so unter einander geworfen, daſs man sich gar nicht heraus finden kann.

20. SANGUINIROSTRIS. *Der rothschnäblige Kernbeißer.*

Müller, Natursystem, II. p. 552. n. 20. *der Blutschnabel.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 858. *der Finke mit dem blutrothen Schnabel.*

Latham, Syn. II. 1. p. 151. n. 69. Red-billed Grosbeak.

Latham, Vögel, II. 1. p. 144. n. 69. *der rothschnäblige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 392. n. 73. Loxia (Sanguinirostris) grisea, subtus albida, rostro pedibusque sanguineis, gula nigra.

21. ASTRILD. *Der senegalische Kernbeißer.*

Müller, Natursyst. II. p. 552. n. 21. *der senegallische Kernbeißer.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 835. *der gestreifte Sperling.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 92. n. 23. *glattköpfiger Rothschnabel.*

Brisson, ornithol. I. p. 365. n. 64 Senégali rayé.

Büffon, Vögel, XI. p. 73. *der gestreifte Senegali*, p. 180. *Lackschnabel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 145. n. 71. *der gestreifte Senegalist.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 392. n. 75. Loxia (Astrild) grisea fusco-undulata, rostro, orbitis pectoreque coccineis.

Seligmann, Vögel, VI. tab. 74. fig. 2. *glattköpfigter Rothschnabel.*

Seligmann, Vögel, IX. tab. 44. *der Rothschnabel.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 173. n. 16. Loxia (Astrild) grisea, fusco-undulata, rostro, temporibus pectoreque coccineis.

β. Büffon,

β. *Büffon*, Vögel, XI. p. 77. *der Serevan.*

Latham, Syn. II. 1. p. 153. Red-rumped Grosbeak.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 392. n. 75. β. L. cinereo-fusca, subtus albida, uropygio crissoque coccineis.

Latham, Vögel, II. 1. p. 145. n. 71. A. *der Kernbeißer mit rothem Steiße.*

γ. *Büffon*, Vögel, XI. p. 78. *der kleine senegallische Sperling.*

Latham, Syn. II. 1. p. 153. n. 71. B. White-rumped Grosbeak.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 392. n. 75. γ. L. fusca, subtus uropygioque incarnata, vertice, collo dorsoque caeruleis, per oculos fascia coccinea.

Latham, Vögel, II. 1. p. 146. n. 71. B. *der Kernbeißer mit weißem Schwanze.*

63. LEUCURA. *Der weißschwänzige Kernbeißer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 146. n. 72. *der weißschwänzige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 393. n. 76. Loxia (Leucura) cinerea, dorso luteo, pectore abdomineque flavescentibus, cauda alba, rectricibus duabus extimis nigris.

22. CYANEA. *Der hellblaue Kernbeißer.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 552. n. 22. *der hellblaue Kernbeißer.*

Brisson, ornithol. I. p. 381. n. 19. Gros-bec bleu d'Angola.

Onomat. hist. nat. IV. p. 845. *der kornblumfarbige Finke.*

Latham,

(3) *Latham* ist geneigt, ihn als Spielart von *Loxia Caerulea* anzusehen.

Latham, Syn. II. 1. p. 117. n. 11. B. — Vögel, II. 1. p. 112. n. 11. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 374. n. 12. Loxia (Cyanea) caerulea, remigibus rectricibusque nigris.

Seligmann, Vögel, V. tab. 20. *der blaue Dickschnabel*, (*Azulam* portugies.)

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 170. n. 207. *der blaue Dickschnabel.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 174. n. 17. Loxia (Cyanea) caerulea, remigibus rectricibusque nigris.

23. Virens. *Der grünliche Kernbeißer.*

Müller, Natursyst. II. p. 553. n. 23. *der Grünling.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 860. *der grüne Surinamische Finke.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 392. n. 74. Loxia (Virens) virens humeris caeruleis.

Latham, Vögel, II. 1. p. 144. n. 70. *der blauschulterige Kernbeißer.*

24. Angolensis. *Der angolische Kernbeißer.*

Müller, Natursyst. II. p. 553. n. 24. *der angolische Kernbeißer.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 834. *der angolische Finke.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 138. n. 53. *der Angolische Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 389. n. 60. Loxia (Angolensis) nigro-caerulea, ventre ferrugineo, macula alarum alba.

64. Ferruginea. *Der braunköpfige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 389. n. 62. Loxia (Ferruginea) nigra, marginibus pennarum flavis, subtus flavescens, pectore ferrugineo, capite gulaque fuscis.

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 138. n. 54. *der braunköpfige Kernbeißer.*

65. MELANURA. *Der schwarzschwänzige Kernbeißer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 138. n. 55. *der grauhälsige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 389. n. 63. Loxia (Melanura) cervice fusca, iugulo uropygioque griseis, abdomine rufescente, alis caudaque nigris, macula alarum, remigibus apice crissoque albis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 155. *der chinesische Kernbeißer.*

66. AURANTIA. *Der Bouveret.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 33. *der Bouveret;* m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Vögel, II. 1. p. 139. n. 56. *der pomeranzengelbe Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 390. n. 66. Loxia (Aurantia) fulva, pileo, alis caudaque nigris.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 744. *der Bouveret.*

67. TORRIDA. *Der weisschnäblige Kernbeisser.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 34. *der weisschnäblichte Gimpel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 139. n. 57. *der weisschnäbelige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 389. n. 61. Loxia (Torrida) nigra, pectore abdomineque castaneis.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 169. n. 204. *der Amerikaner.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 744. *der weisschnäblichte Gimpel.*

25. LINEOLA. *Der weissgestreifte Kernbeisser.* (4)

Müller, Natursyst. II. p. 553. n. 25. *der gestreifte Kernbeißer.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 849. *der schwarze Finke aus Asien, mit einer weißen Linie von der Stirne gegen den Wirbel zu.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 141. n. 63. *der Linien-Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 390. n. 68. Loxia (Lineola) caeruleo-nigra, linea frontali, temporibus, macula alarum corporeque subtus albis.

68. HAMBURGICA. *Der hamburgische Gimpel.* (*)

Müller, Natursyst. II. p. 547. ad n. 4. *der hamburgische Baumläufer.*

Halle, Vögel, p. 368. n. 363. *der Baumsperling.*

Klein, av. p. 88 ad n. 2. Hamburg-the-Creeper.

Klein, Vorbereit. p. 164. ad n. 2.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 90. ad n. 2.

Brisson, ornith. I. p. 396. n. 2. Bouvreuil de Hambourg.

Büffon, Vögel, XIII. p. 50. *der hamburgische Gimpel;* m. e. Fig.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 102. n. 5. *der hamburgische Dompfaffe.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 216. Loxia scandens.

Latham, Vögel, II. 1. p. 142. n. 64. *der Hamburger Kernbeißer.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 357. n. 7. *der hamburgische Gimpel.*

26. MEXI-

(4) *Latham* rechnet hieher auch *Büffons* Bouveron IV. p. 388. und *Brissons* Pyrrhula africana nigra minor. (Gmel. Syst. p. 865 n. 46.

(*) Ist nach *Latham* mit *Fringilla montana*, p. 925. n. 37. einerley.

26. Mexicana. *Der gelbköpfige neuspanische Kernbeißer.* (5)

Müller, Natursyst. II. p. 553. n. 26. *der Gelbkopf.*
Onomat. hist. nat. IV. p. 853. *Mexikanischer Goldammer.*

Klein, av. p. 92. n. 9. Emberiza flava Mexicana.

Klein, Vorbereit. p. 172. n. 9. *mexikanischer Goldammer.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 93. n. 6. *mexikanischer Goldammer.*

Brisson, ornithol. I. p. 334. n. 12. Moineau du Mexique.

Büffon, Vögel, XI. p. 48. *der gelbköpfige Hänfling;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 133. n. 46. *der gelbköpfige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 385. n. 50. Loxia (Mexicana) grisea, fronte gula uropygio superciliisque luteis.

Seligmann, Vögel. II. tab. 87. *der Häufling mit dem gelben Kopf.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 174. n. 19. Loxia (Mexicana) grisea, fronte, gula, uropygio superciliisque luteis.

27. Chloris. *Der Grünling.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 554. n. 27. *der Grünfink.*

Aa 2 *Leske,*

(5) Man muss diesen Vogel nicht mit *Loxia Mexicana* p. 848. n. 7. verwechseln. Zum Unterschiede könnte man *diesen L. Ochrocephala* nennen.

(6) Gewicht etwas über zwey Loth. Ein stiller Vogel, der sehr leicht zahm wird, dass er so gar aus der Hand frisst. Nährt sich im Sommer von allerley Gesäme, besonders Hanf, frisst auch Raupen und andere Insekten; im Winter Wacholderbeeren und Baumknospen. Auch an Gersten kann man ihn gewöhnen. Das Fleisch ist im Herbst schmackhaft.

Leske, Naturgesch. p. 260. n. 4. *der Grünfink.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 135. n. 6. *der Grünfink; Grünling; Grünschwanz.*
Blumenbach, Handb. der N. G. p. 184. n. 6. Loxia (Chloris) flavicanti-virens, remigibus primoribus antice luteis, rectricibus lateralibus quatuor basi luteis. *Grünfink; Grünschwanz; Zwuntsche.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 511. n. 5. *der Grünling; Schwuinz.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 588. *der Grünling.*
Ebert, Naturl. II. p. 132. *der Grünfink; Grünvogel.*
Halle, Vögel, p. 400. n. 408. *der grüngelbe Fink.*
Meyer, Thiere, II. tab. 28. *der Grünling.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 402. n. 337. *der Grünfink.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 329. B. *der grüne Dickschnabel.*
Beckmann, Naturhist. p. 53. c. *der Grünfink.*
Neuer Schaupl. der Nat. III. p. 530. *Grünfink.*
Onomat. histor. natur. IV. p. 840. *der grüngelbe Finke.*
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 128. *Grünling; Wohnütz; Swunsch.*
Klein, av. p. 95. n. 4. Coccothraustes viridis.
Klein, Vorbereit. p. 176. n. 4. *grüngelber Dickschnäbler; Grünling; Grünvogel; Hirsvogel; Kutvogel.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 94. n. 4. *Grünling.*
Klein, stemmat. av. p. 19. tab. 19. fig. 14. a. b.
Gesner, Vögelb. p. 141. Chloris. *Grünling; Grünfink; Kattvogel; Tutter; Rappfink; Hirsenvogel;* Fig. p. 142.

Brisson,

Brisson, ornith. I. p. 359. n. 54. Verdier.
Büffon, Vögel, XI. p. 225. *der Grünfink oder Grünling;* m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 351. *der Grünfink.*
Latham, Syn. Suppl. p. 152. Greenfinch.
Latham, Vögel, II. 1. p. 127. n. 36. *der Grünling.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 382. n. 39. Loxia (Chloris) flavicanti-virens, remigibus primoribus antice luteis, rectricibus lateralibus quatuor basi luteis.
Frisch, Vögel, tab. 2. *der Grünling.*
Wirsing, Vögel, tab. 53. 54. *der Grünling.*
Günther, Nest. u. Ey. tab. 62. *Grünling.*
Beseke, Vögel Kurl. p. 77. n. 167. *der Grünfink.*
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 103. *der Grünling; Gröönling; Gröönschwanz.*
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 422. *der Grünfink.*
Fischer, Liv. p. 97. n. 146. *Grünfink.*
Cetti, Sardin. II. p. 183. *der Grünfink.*
White, N. G. von Engl. p. 64. n. 14. *Grünling.*
Pennant, britt. Thiergesch. p. 121. tab. 56. fig. 5. *Grünfink.*
Storr, Alpenreise, I. p. 78. *Grünfink.*
Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 4. *Svenske.*
Borkhausen, Magaz. I. p. 141. *Grünling.*
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 170. n. 206. *der Grünling.*
Linné, Abhandl. II. p. 302. n. 121. *der Grünfink.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 336. *der Grünling.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 62. *Schwuntz; Schwanschel; welscher Hänfling.*
Naumann, Vogelsteller, p. 66. *der Schwunsch.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 633. *der Grünfink.*

Naturforsch. XVII. p. 89. n. 181. *der Grünfink.*

Onomatol. forestal. I. p. 1072. *Grünzling; Grinzling.*

Krünitz, Encykl. XX. p. 215. *Grünfink.*

Börner, schles. ökonom. Gesellsch. 1782. p. 101. n. 200.

Anweis. Vögel zu fang. p. 253. *Grünling.*

Loniceri, Kräuterb. p. 682. *der Grünfinke.*

Meidinger, Vorles. I. p. 148. n. 5. *der Grünfink.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 414. *Grünling.*

Angenehme Landlust, p. 162.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 2. Chloris.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 174. n. 2. Loxia (Chloris) flavicanti-virens, remigibus primoribus antice luteis, rectricibus lateralibus quatuor basi luteis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 248. Loxia (Chloris) flavicanti-virens, remigibus primoribus antice luteis, rectricibus lateralibus quatuor basi luteis.

Kramer, Austr. p. 367. n. 5. Fringilla remigibus primoribus antice luteis, rectricibus tribus lateralibus basi luteis. *Grünling.*

Brünniche, ornith. bor. p. 67. n. 242. 243. Loxia Chloris.

Charleton, onom. zoic. p. 80. n. 5. Chloris; Fringilla viridis.

Moehring, av. gen. p. 41. n. 26. Chloris.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 295. Linaria viridis; *welscher Hänffling; Hirsch-Fink; Hirschvogel; grüner Finke.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 379. Fringilla viridis.

Rzaczyns-

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 391. Linaria viridis.

Sibbald, Scot. p. 18. Chloris.

Belon, hist. nat. des oiſ. p. 366. Bruyan; Verdan; Verdier; Verdereule; Verdere.

Barrere, ornithol. gen. 30. ſp. 6. Paſſer ſubviridis, alarum extremis nigricantibus.

Salerne, hiſt. nat. des oiſ. p. 255. Bruant; Chloris, etc.

Jonſton, av. p. 101. Chloris.

Zinnan. Uov. p. 6. tab. 19. fig. 54. Verdone.

Levin, britt. Birds II. tab. 69. Greenfinch.

Roman. ornith. I. p. 112. tab. 17. fig. 1. — Faun. Arragon. p. 86.

Bomare, dictionn. IX. p. 283. Verdier commun.

Hermann, tab. affin. anim. p. 219. Loxia Chloris.

Ariſtot. hiſt. anim. L. 9. c. 20. n. 168. Χλωϱις.

Aelian. de nat. anim. L. 4. c. 47. Χλωϱις.

Plin. hiſt. nat. L. 10. c. 29. Chlorion.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 357. n. 8. *der Grünfink.*

69. SINENSIS. *Der chineſiſche Kernbeiſser.*

Latham, Vögel, II. 1. p 129. n. 37. *der chineſiſche Kernbeiſser.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 383. n. 40. Loxia (Sinenſis) fuſca ſubtus ruſeſcens, capite colloque griſeo-vireſcentibus, remigibus rectricibusque nigris, apice albidis.

Sonnerat, Reiſ. n. Oſtind. u. Chin. II. p. 157. *der chineſiſche Grünfink.*

28. BUTYRACEA. *Der gelbſtirnige Kernbeiſser.* (7)

Müller, Naturſyſt. II. p. 554. n. 28. *der Buttervogel.*

(7) Iſt nicht mit *Fringilla Butyracea* p. 913. n. 22. zu verwechſeln. *Latham* rechnet *Büffons Vert-brinet* und *Verdier du Cap de b. E.* hieher.

Onomat. histor. natur. IV. p. 837. *der grünlichte Finke.*

Büffon, Vögel, XI. p. 254. *der butterfarbige Dickschnabel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 129. n. 38. *der gelbstirnige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 383. n. 41. Loxia (Butyracea) virescens, fronte, superciliis, pectore abdomineque flavis, cauda apice alba.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 174. n. 21. Loxia (Butyracea) virescens, fronte, superciliis, pectore abdomineque flavis, caudae apice alba.

Hermann, tab. affin. anim. p. 219. Loxia butyracea.

70. Dominicensis. *Der grünbraune domingische Kernbeißer.* (8)

Büffon, Vögel, XI. p. 257. *der domingische Grünfink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 130. n. 39. *der Kernbeißer von St Domingo.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 383. n. 42. Loxia (Dominicensis) viridi-fusca, subtus rufa fusco-maculata, regione oculorum crissoque albis.

71. Africana. *Der afrikanische Kernbeißer.* (9)

Büffon, Vögel, XI. p. 258. *der capsche Grünfink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 130. n. 40. *der Afrikanische Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 384. n. 43. Loxia (Africana) viridi-fusco-griseoque variegata, subtus alba, tectricibus alarum rufis, rectrice extima macula alba.

29. Ca-

(8) Ist nicht mit *Loxia Dominicana* p. 848. n. 8. zu verwechseln.

(9) Ist nicht mit *Loxia Afra* p. 857. n. 74. zu verwechseln.

29. CANADENSIS. *Der canadische Kernbeisser.*
Müller, Natursyst. II. p. 555. n. 29. *der canadische Kernbeisser.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 328. n. 136. *der Canadische Dickschnabel.*
Onomat. hist. nat. IV. p. 837. *der Kernbeisser aus Canada.*
Brisson, ornith. I. p. 372. n. 4. Gros-bec de Cayenne.
Büffon, Vögel, X. p. 85. *der gelbgrüne Kernbeisser.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 121. n. 27. *der Canadische Kernbeisser.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 379. n. 29. Loxia (Canadensis) viridi-olivacea, subtus flavo-olivacea, capistro nigro.
β. *Latham*, Syn. II. 1. p. 128. n. 27. Var. A. — Vögel, II. 1. p. 122. n. 27. Var. A.
Latham, Syst. ornith. I. p. 380. n. 29. β. L.

30. SULPHURATA. *Der gelbkehlige Kernbeisser.*
Müller, Natursyst. II. p. 555. n. 30. *die Gelbkehle.*
Onomat. hist. nat. IV. p. 859. *der Dickschnäbler vom Vorgebürge der guten Hoffn.*
Brisson, ornith. I. p. 371. n. 2. Gros-bec du cap de bonne esperance.
Latham, Vögel, II. 1. p. 131. n. 41. *der schwefelgelbe Kernbeisser.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 384. n. 45. Loxia (Sulphurata) fusco-olivacea gutture ventreque luteis, superciliis flavis.

72. FLAVIVENTRIS. *Der gelbbäuchige Kernbeisser.*
Brisson, ornith. I. p. 372. n. 3. Gros-bec jaune du cap de bonne esperance.

 Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 131. n. 42. *der gelbbandirte Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 384. n. 46. Loxia (Flaviventris) viridi - olivacea, dorso fusco-maculato, subtus superciliisque luteis, cauda subforcipata.

β. *Latham*, Syn. II. 1. p. 138. n. 42. Var. A. — Vögel. II 1. p. 132. n. 42. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 384. n. 46. β. L. viridi-olivacea, subtus flava, collo superiore, genis gulaque cinereis.

31. Collaria. *Der Nonnen Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 555. n. 31. *der Kragenvogel.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 845. *der Finke mit gelber Brust und gelbem Halskragen.*

Büffon, Vögel, X. p. 100. *der Nonnen-Kernbeisser*, m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 126. n. 34. *der Nonnen-Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 382. n. 37. Loxia (Collaris) flavescens, pectore collarique flavis, temporibus nigris.

β. *Büffon*, Vögel, X. p. 122. *der gesprenkelte Kernbeisser mit der Halsbinde*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 134. n. 34. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 382. n. 37. β.

Latham, Vögel, II. 1. p. 127. n. 34. Var. A.

73. Grisea. *Der grauweiße Kernbeisser.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 328. n. 135. *der graue Dickschnabel.*

Büffon, Vögel, X. p. 102. *der grauweiße Kernbeisser.*

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 127. n. 35. *der graue Kernbeiſſer.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 382. n. 38. Loxia (Griſea) caeruleo-griſea, facie colloque inferiore albis.

32. Bengalensis. *Der bengaliſche Kernbeiſſer.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 555. n. 32. *der bengaliſche Kernbeiſſer.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 836. *der Bengaliſche Sperling.*

Klein, av. p. 88. n. 4. Paſſer Bengalenſis.

Klein, Vorbereit. p. 165. n. 4. *Gelbkopf; bengaliſcher Sperling.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 90. n. 4. *Gelbkopf.*

Briſſon, ornith. I. p. 333. n. 1. Moineau de Bengale.

Büffon, Vögel, X. p. 98. *der Goldkopf.* Loxia (Chryſocephala) fuſca, pileo flavo, abdomine, criſſo maculaque aurium albis, roſtro pedibusque carneis.

Latham, Vögel, II. 1. p. 126. n. 33. *der Bengaliſche Kernbeiſſer.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 382. n. 36. Loxia (Bengalenſis) griſea, pileo flavo, temporibus albidis, abdomine albido fuſco-maculato.

Seligmann, Vögel, VI. tab. 84. *der gelbköpſige indianiſche Sperling.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 175. n. 23. Loxia (Benghalenſis) griſea, pileo flavo, temporibus albidis, abdomine albido fuſco-maculato.

33. Malabarica. *Der malabariſche Kernbeiſſer.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 555. n. 33. *der malabariſche Kernbeiſſer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 147. n. 74. *der Malabariſche Kernbeiſſer.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 394. n. 81. Loxia (Malabarica) cinerea, remigibus rectricibusque nigris, gula crissoque albis.

74. Afra. *Der schwarzbäuchige Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 147. n. 75. *der schwarzbäuchige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 394. n. 82. Loxia (Melanogastra) lutea, fusco-contaminata, gula, pectore abdomineque nigris, alis caudaque fuscis.

75. Caffra. *Der Mohrenkernbeisser.*

Buffon, Vögel, XI. p. 192. *der langschwänzige Kernbeisser.*

Batsch, Thiere, I. p. 348. *der Mohrenkernbeisser.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 153. n. 90. *der Mohren-Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 393. n. 78. Loxia (Caffra) atra, remigibus fuscis, humeris sanguineis.

Lichtenberg u. Voigt, Magaz. für das Neueste etc. IV. I. p. 102. Loxia caffra. *Langschwanz.*

76. Totta. *Der Hottentottenkernbeisser.*

Latham, Syn. Suppl. p. 156. Totty Grosbeak.

Latham, Vögel, II. 1. p. 153. n. 89. *der Hottentotten-Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 393. n. 79. Loxia (Totta) testaceo fusca, subtus albida, remigibus rectricibusque omnibus nigris, summo apice albis.

77. Asiatica. *Der asiatische Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 147. n. 76. *der Asiatische Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 394. n. 83. Loxia (Asiatica) cinereo-rubescens, subtus cinerea, abdomine

mine pallide rubro, capite, tectricibus alarum maioribus, remigibus caudaque apice nigris.

β. L. cinereo-caerulescens, capite, alis caudaque nigris, remigibus rectricibusque duabus intermediis apice albis. *

Latham, Syn. Suppl. p. 153. n. 76. A. — Vögel, II. 1. p. 148. n. 76. Var. A.

Latham, Syst. ornith. p. 394. n. 83. β.

78. CANORA. *Der braunwangige Kernbeisser.*

Latham, Syn. Suppl. p. 154. Brown-cheeked Grosbeak.

Latham, Vögel, II. 1. p. 148. n. 77. *der braunwangige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 394. n. 84. Loxia (Canora) virescens, subtus cinerea, genis fuscis flavo circumdatis.

79. LINEATA. *Der gestreifte Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 148. n. 78. *der gestreifte Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 395. n. 85. Loxia (Lineata) nigra subtus alba, lateribus corporis basique remigum primorum albo nigroque transversim striatis.

80. PERLATA. *Der geperlte Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 149. n. 79. *der geperlte Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 395. n. 86. Loxia (Perlata) nigra subtus fusca, postice albo nigroque varia.

81. FASCIATA. *Der bandirte Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 149. n. 80. *der gebänderte Kernbeisser.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 395. Loxia (Fasciata) testaceo-fusca, nigro undulata, sub gula fascia sanguinea.

Latham, Syn. Suppl. p. 154. Fasciated Grosbeak.

82. CANTANS. *Der Sangkernbeisser.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 149. n. 81. *der Singkernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 395. n. 88. Loxia (Cantans) fusca nigricante transversim lineata, subtus alba, cauda cuneiformi.

34. MELANOCEPHALA. *Der schwarzköpfige Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 556. *der schwarzköpfigte Kernbeisser.*

Halle, Vögel, p. 398. n. 406. *der gelbe Kirschfink mit dem Mohrenkopfe.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 852. *gelber Schwarzkopf.*

Klein, av. p. 94. n. 2. Coccothraustes citrea tota, capite nigro.

Klein, Vorbereit. p. 176. n. 2. *gelber Schwarzkopf.*

Klein, verb. Vögelh. p. 94. n. 2. *gelber Schwarzkopf.*

Brisson, ornith. I. p. 373. n. 5. Gros-bec de Gambie.

Latham, Vögel, II. 1. p. 143. n. 65. *der Gambia-Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 391. n. 69. Loxia (Melanocephala) lutea, capite atro.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 175. n. 26. Loxia (Melanocephala) lutea, capite atro.

83. ERYTHROMELAS. *Der roth- und schwarze Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 143. n. 66. *der schwarzköpfige Kernbeisser.* Tab. 44.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 391. n. 70. Loxia (Erythromelas) rubra, remigibus rectricibusque obscurioribus, capite atro.

84. Coronata. *Der schwarz gehäubte Kernbeisser.*

Klein, av. p. 95. n. 10. Coccothraustes, Phoenicuri species.

Klein, Vorbereit. p. 178. n. 10. *amerikanischer Thumherr.*

Klein, verb. Vögelh. p. 95. n. 10. *amerikanischer Thumherr.*

Brisson, ornith. I. p. 400. n. 10. Bouvreuil hupé d' Amerique.

Latham, Vögel, II. 1. p. 143. n. 67. *der Kernbeisser mit schwarzem Federbusche.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 391. n. 71. Loxia (Coronata) cristata, supra coccinea, subtus cyanea, macula colli inferioris cristaque nigris.

35. Cana. *Der eisengraue Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 556. n. 35. *der graue Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 837. *der graue Finke.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 92. n. 22. *lichtgrauer Sperling.*

Brisson, ornith. I. p. 369. n. 72. Pinçon cendré des Indes.

Büffon, Vögel, XI. p. 46. *der eisengraue Sperling;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 146. n. 73. *der aschgraue Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 393. n. 77. Loxia (Cana) cana remigibus rectricibusque fuscis, pedibus rubris.

Seligmann, Vögel, VI. tab. 74. *der graue Fink.*

Linné,

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 175. n. 27. Loxia (Cana) remigibus rectricibusque fuscis, pedibus rubris.

36. PHILIPPINA. *Der philippinische Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 556. n. 36. *der philippinische Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 855. *der Kernbeisser von den Philippinischen Inseln.*

Brisson, ornith. I. p. 373. n. 6. Gros-bec des Philippines.

Büffon, Vögel, X. p. 95. *der Tucnam-Courvi;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 350. *der Toucnam-Courvi.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 380. n. 32. Loxia (Philippina) fusca, subtus albido-flavicans, vertice pectoreque luteis, gula fusca.

Latham, Vögel, II. 1. p. 123. n. 30. *der Philippinische Kernbeisser.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 622. *der Toucnam-Courvi.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 358. n. 9. *der philippinische Kernbeisser.*

β. *Der Baglafecht.*

Büffon, Vögel, X. p. 115. *der Baglafecht.*

Batsch, Thiere, I. p. 351. *der Baglafecht.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 124. n. 30. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 381. n. 32. β. Loxia cauda remigibus virescente fuscis, margine flavis.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 622. *der Baglafecht.*

85. ABYSSINICA. *Der abyssinische Kernbeisser.*

Büffon, Vögel, X. p. 117. *der abyssinische Kernbeisser.*

Batsch, Thiere, I. p. 351. *der abyssinische Kernbeisser.*

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 125. n. 31. *der abyssinische Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 381. n. 33. Loxia (Abyssinica) corpore flavo, vertice, genis, gula pectoreque nigris, alis caudaque fuscis.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 622. *der abyssinische Dickschnabel.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 358. n. 10. *der abyssinische Kernbeisser.*

86. Pensilis. *Der Nelicourvi.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 125. n. 32. *der Hangnest-Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 381. n. 34. Loxia (Pensilis) viridis subtus grisea, crisso rubro, capite colloque inferiore flavis, remigibus rectricibusque nigris.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 156. *der Nelicourvi aus Madagascar*; tab. 112.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 359. n. 11. *der Nelicourvi aus Madagascar.*

37. Striata. *Der gestrichelte Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 556. n. 37. *der buntgestreifte Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 858. *der Kernbeisser von der Insel Bourbon.*

Brisson, ornith. I. p. 376. n. 11. Gros-bec de l'Isle de Bourbon, ou Jacobin.

Latham, Vögel. II. 1. p. 134. n. 49. *der gestrichelte Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 386. n. 53. Loxia (Striata) fusca, ferrugineo-striata, subtus alba iugulo nigro.

38. Ludoviciana. *Der louisianische Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 557. n. 38. *der louisianische Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 850. *der Finke aus Ludovicien.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 326. n. 128. *der Dickschnabel mit rother Brust.*

Brisson, ornith. I. p. 378. n. 14. Gros-bec de la Louisiane.

Büffon, Vögel, X. p. 80. *das Rosenkehlchen.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 120. n. 24. *der rothbrüstige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 379. n. 25. Loxia (Ludoviciana) nigra, pectore, ventre, alarum fascia basique remigum albis.

87. MACULATA. *Der gefleckte Kernbeisser.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 336. n. 129. *der gefleckte Dickschnabel;* tab. 16. obere Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 120. n. 25. *der gefleckte Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 379. n. 26. Loxia (Maculata) obscure fusca, albo-maculata, subtus albida maculis subfuscis, superciliis pallidis, rectricibus duabus extimis apice albo-maculatis.

88. OBSCURA. *Der dunkelbraune Kernbeisser.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 327. n. 132. *der dunkelbraune Dickschnabel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 121. n. 26. *der dunkelbraune Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 379. n. 27. Loxia (Obscura) fusco-nigricans, gula media corporeque subtus albis, lateribus fusco-maculatis, tectricibus alarum albo bifasciatis.

89. CAPENSIS. *Der capsche Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 557. n. 39. *der capsche Kernbeisser.*

Onomat.

Onomat. hist. nat. IV. p. 838. *der schwarze Sperling vom Vorgebürge der guten Hofn.*

Brisson, ornith. I. p. 354. n. 45. Pinçon du cap de bonne esperance.

Büffon, Vögel, XI. p. 161. *der schwarz und gelbe Fink.*

Latham, Syn. II. 1. p. 113. n. 7. Cape Grosbeak.

Latham, Syn. Suppl. p. 149. Cape Grosbeak.

Latham, Vögel, II. 1. p. 108. n. 7. *der Capsche Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 373. n. 7. Loxia (Capensis) atra, uropygio tectricibusque alarum luteis.

β. *Büffon*, Vögel, X. p. 121. *der gefleckte capsche Kernbeisser.* (10)

Latham, Vögel, II. 1. p. 109. n 7. Var. A.

40. Nigra. *Der schwarze Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 557. n. 40. *der schwarze Kernbeisser.*

Halle, Vögel, p. 402. n. 410. *der schwarze Domherr.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 854. *der schwarze Domherr.*

Klein, av. p. 95. n. 6. Coccothraustes nigra. Rubicilla minor nigra. Mariposa nigra.

Klein, Vorbereit. p. 177. n. 6. *Schorsteinfeger.*

Klein verb. Vögelhist. p. 95. n. 6. *Schorsteinfeger.*

Brisson, ornith. I. p. 397. n. 3. Bouvreuil noir du Mexique.

Büffon, Vögel, XIII. p. 43. *der schwarz und weiße Rundschnabel*; m. e. Fig.

Latham, Vögel II. 1. p. 140. n. 60. *der schwarze Kernbeisser.*

 Latham,

(10) Ist p. 845. n. 51. schon als eine eigne Gattung aufgeführt.

Latham, Syst. ornith. I. p. 388. n. 59. Loxia (Nigra) nigra, macula alba humeri basique remigum duarum exteriorum.

Seligmann, Vögel, III. tab. 36. *das kleine schwarze Rothschwänzlein.*

Bankroft, N. G. von Guian. p. 108. *der kleinere schwarze Rothschwanz.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 175. n. 28. Loxia (Nigra) nigra, macula alba humeri remigumque duarum exteriorum.

89. Crassirostris. *Der dickschnäblige Kernbeisser.*

Latham, Syn. Suppl. p. 152. Thick-billed Grosbeak.

Latham, Vögel, II. 1. p. 141. n. 61. *der dickschnäbliche Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 390. n. 65. Loxia (Crassirostris) nigra, remigibus primoribus rectricibusque duabus intermediis basi albis, rostro gibboso.

β. Loxia pileo coccineo nitido, postice quadrato. *

Latham, Syn. Suppl. p. 152. — Syst. ornith. I. p. 390. n. 65. β. — Vögel, II. 1. p. 141. ad n. 61.

90. Americana. *Der schwarzbrüstige Kernbeisser.* (1)

Latham, Vögel, II. 1. p. 141. n. 62. *der schwarzbrüstige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 390. n. 67. Loxia (Pectoralis) corpore supra fasciaque pectoris nigris, subtus fasciaque alarum gemina alba.

41. Cae-

(1) Das Vaterland ist noch nicht ganz ausgemacht.

41. Caerulea. *Der himmelblaue Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 558. n. 41. *der himmelblaue Kernbeisser.*

Halle, Vögel, p. 403. n. 411. *der blaue Kernbeisser.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 327. n. 133. *der blaue Dickschnabel.*

Klein, av. p. 95. n. 7. Coccothraustes caerulea.

Klein, Vorbereitung. p. 177. n. 7. *blaue Dickschnäbler.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 95. n. 7. *blauer Dickschnabler.*

Brisson, ornith. I. p. 399. n. 7. Bouvreuil bleu de la Caroline.

Büffon, Vögel, XIII. p. 40. *der blaue amerikanische Gimpel;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 111. n. 11. *der blaue Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 374. n. 11. Loxia (Caerulea) caerulea, alis fuscis, fascia baseos purpurea.

Seligmann, Vögel, II. tab. 78. *der blaue Kernbeisser.*

Schöpf, Reis. d. Nordamer. II. p. 109. *der blaue Vogel.*

Bankroft, N. G. von Guian. p. 108. *der guianische Blaufinke?*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 175. n. 29. Loxia (Caerulea) caerulea, alis fuscis, fascia baseos purpurea.

β. *Brisson*, ornith. I. p. 398. n. 6. Bouvreuil bleu du Brésil. (2)

Latham, Syn. II. 1. p. 117. n. 11. Var. A. — Vögel, II. 1. p. 111. n. 11. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 374. n. 11. β. Loxia tota caerulea, loris macula nigra.

(2) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

42. ORIX. *Der Grenadier.*

Müller, Natursyst. II. p. 564. n. 7. *der afrikanische Ammer.*

Onomat. hist. nat. V. p. 719. *der afrikanische Ammer.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 98. n. 20. *neu entdeckter Fink.*

Brisson, ornith. I. p. 338. n. 21. Cardinal du cap de bonne esperance.

Latham, Vögel, II. 1. p. 115. n. 16. *der Grenadier-Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 376. n. 17. Loxia (Orix) fulvo-sanguinea, facie pectoreque atris, alis rectricibusque nigricantibus.

Seligmann, Vögel, VI. tab. 72. *der Grenadier.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. p. 177. n. 5. Emberiza (Orix) grisea, fronte abdomineque nigris, collo uropygioque fulvis, rostro nigro.

β. *Büffon*, Vögel, X. p. 84. *der roth und schwarze Kernbeisser*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 121. n. 16. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 376. n. 17. β.

Latham, Vögel, II 1. p. 115. n. 16. Var. A.

91. ERYTHRINA. *Der carmoisinrothköpfige Kernbeisser.* (3)

Latham, Vögel, II. 1. p. 265. n. 29. *der karmoisinköpfige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 444. n. 33. γ. Fringilla cinereo-rubescens, subtus alba, capitis, uropygii gutturisque pennis apice ruberrimis, remigibus rectricibusque fuscis, margine lutescentibus.

92. FLA-

(3) Nach *Latham* eine Varietät von *Fringilla rosea*, p. 923. n. 91.

92. FLAMENGO. *Der upsalische Kernbeisser.* (4)

Latham, Syn. Suppl. p. 155 Flamingo Grosbeak.

Latham, Vögel, II. 1. p. 152. n. 88 *der Flamingo Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 388. n. 56. δ. Loxia alba, capite, collo, pectore abdomineque roseis.

43. VIOLACEA. *Der violettfarbige Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 558. n. 43. *der violetfärbige Kernbeisser.*

Halle, Vögel, p. 403. n. 413. *der purpurblaue Kernbeisser.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 328. n. 134. *der purpurrothe Dickschnabel.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 859. *der purpurblaue Kernbeisser.*

Klein, av. p. 95. n. 9. Coccothraustes purpurea.

Klein, Vorbereit. p. 177. n. 9. *Purpurklepper.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 95. n. 9. *Purpurklepper.*

Brisson, ornith. I. p. 400. n. 9. Bouvreuil violet de Bahama.

Büffon, Vögel, XIII. p. 46. *der violette Dickschnabel, oder violette Gimpel mit rother Kehle und Augenbraunen*, m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 112. n. 12. *der purpurfarbene Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 375. n. 13. Loxia (Violacea) violacea, superciliis, gula crissoque rubris.

Seligmann, Vögel, II. tab. 80. *der purpurfarbne Kernbeisser.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 176. n. 30. Loxia (Violacea) violacea, superciliis, gula anoque rubris.

Gentl. Magaz. XXIII. tab. p. 128.

(4) Nach *Latham* eine Varietät von *Loxia Pyrrhula.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 359. n. 12. *der violettfarbige Kernbeisser.*

44. GROSSA. *Der weisskehlige Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 558. n. 44. *der grosse Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 848. *der Amerikanische blaue Fink.*

Brisson, ornith. I. p. 381. n. 20. Gros-bec bleu d'Amerique.

Büffon, Vögel, X. p. 56. *der blaue amerikanische Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 110. n. 10. *der weisskehlige Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 374. n. 10. Loxia (Grossa) cano-caerulescens, iugulo rectricibusque atris, gula alba, rostro rubro.

45. MINIMA. *Der kleine Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 558. n. 45. *der kleine Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 853. *der kleinste Fink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 154. Dwarf Grosbeak.

Latham, Vögel, II. 1. p. 151. n. 83. *der Zwerg-Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 396. n. 92. Loxia (Minima) fusca, subtus testacea, remigibus primoribus basi, secundariis posterius albis.

β. Loxia corpore subtus cinereo-albo: inter rostrum et oculos, marginibusque alarum flavescens. *

γ. Loxia corpore toto subtus uropygioque albis. *

Latham, Syst. ornith. I. p. 396. ad n. 92. — Vögel, II. 1. p. 151. ad n. 81. — Syn. Suppl. p. 154.

46. Fusca. *Der braune Kernbeisser.* (5)

Müller, Natursyst. II. p. 559. n. 46. *der braune Kernbeisser.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 848. *der braune Krummschnabel.*

Brisson, ornithol. I. p. 398. n. 5. petit Bouvreuil noir d'Afrique.

Büffon, oiſ. IV. p. 368. Bouveron. — pl. enl. n. 319. fig. I. Bouvreuil à plumes frisées du Brésil.

Büffon, Vögel, XIII. p. 35. *der kleine schwarze afrikanische Gimpel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 140. n. 58. *der braune Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 389. n. 64. Loxia (Fusca) fusca, subtus albida, remigibus a tertia ad nonam basi omnino albis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 218. Loxia fusca.

93. Septentrionalis. *Der nördliche Kernbeisser.* (6)

Pennant, arct. Zool. II. p. 329. ad A. Loxia atra.

Latham, Vögel, II. 1. p. 140. n. 59. *der nördliche Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 388. n. 58. Loxia (Septentrionalis) atra, macula alarum alba.

47. Minuta. *Der kleinste Kernbeisser.*

Müller, Natursyst. II. p. 559. n. 47. *der Zwerg.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 854. *der kleine Finke.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 39. *der rothbauchigte Rundschnabel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 150. n. 83. *der kleine Kernbeisser.*

(5) Die Synonymen aus *Brisson* und *Büffon*, rechnet Latham zu *Loxia Lineola*, p. 854. n. 25.

(6) Nach *Pennant* eine Varietät von *Loxia Pyrrhula*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 396. n. 90. Loxia (Minuta) grisea, uropygio subtusque ferruginea, remigibus 4, 5, 6, basi utrinque albis, cauda integra.

Bankroft, N. G. von Guiana, p. 108. *der graue Gimpel.* (7)

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 176. n. 31. Loxia (Minuta) grisea, uropygio subtusque ferruginea, remigibus 4, 5, 6, basi utrinque albis, cauda integra.

48. Bicolor. *Der zweyfarbige Kernbeißer.* (8)

Müller, Natursyst. II. p. 559. n. 48. *der zweyfarbige Kernbeißer.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 836. *brauner Americanischer Distelfinke.*

Klein, av. p. 98. n. 16. Fringilla fusca americana.

Klein, Vorbereit. p. 183. n. 16. *brauner amerikanischer Diestelfinke.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 98. n. 16. *brauner Fink.*

Brisson, ornithol. I. p. 352. n. 40. petit Pinçon rouge.

Büffon, Vögel, XI. p. 145. *der kleine braune Fink;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 150. n. 82. *der orangebäuchige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 395. n. 89. Loxia (Bicolor) fusca, subtus rubra.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 61. *das kleine braune Rothkehlein.*

Linné,

(7) Hier heißt es: er sey *etwas größer als ein Rabe;* das verstehe ich gar nicht. Das Original habe ich nicht zur Hand. In der Note steht *Loxia cana Linn;* der es aber nach der Beschreibung nicht seyn kann.

(8) Ist nicht mit *Fringilla bicolor* zu verwechseln.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 176. n. 32. Loxia (Bicolor) fusca, subtus rubra.

Hermann, tab. affin. anim. p. 219. Loxia bicolor.

β. *Latham*, Syst. ornith. I. p. 395. n. 89 β. Loxia fusca, subtus alba, gula pallide ferruginea.

49. TRIDACTYLA. *Der dreyzehige Kernbeißer.* (9)

Büffon, Vögel, X. p. 119. *der Guisso-Balito.* (Guisso balito-dimmo-won jerck.)

Batsch, Thiere, I. p. 351. *der Guisso-Balito.*

Beckmann, Bibl. VIII. p. 540. *der Guisso-Balito.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 151. n. 85. *der dreyzehige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 397. n. 93. Loxia (Tridactyla) nigra, capite, collo inferiore vittaque longitudinali abdominis rubris, tectricibus alarum fuscis, albo marginatis.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 623. *der Guisso-balito.*

Hermann, tab. affin, anim. p. 217. Guissobalito.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 301. n. 12. Loxia Colius.	p. 842. n. 1. Colius capensis.
p. 306. n. 42. Loxia Madagascarina.	p. 305. n. 27. Lanius bicolor.

Das Geschlecht ist, der Anzahl nach, um 44. Gattungen vermehrt. Da aber zwey derselben in andere Geschlechter versetzt, und an deren Stelle zwey andere einge-

(9) Der gezähnte Schnabel und die nur mit 2. Vorder- und 1. Hinterzehe versehenen Füsse, machen einen ganz besondern Character aus, der wohl für ein eigenes Geschlecht zureichend wäre.

eingeschoben worden; so sind der neu hinzugekommenen Gattungen überhaupt 46. — Bey der 1ten Gattung sind *drey*, bey der 4ten *drey*, bey der 8ten *drey*, bey der 21ten *drey*, bey der 29ten *zwey*, bey der 31ten *zwey*, bey der 36ten *zwey*, bey der 39ten *zwey*, bey der 41ten *zwey*, bey der 42ten *zwey*, und bey der 48ten gleichfalls zwey Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Der graue Kernbeißer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 155. n. 93. *der graue Kernbeißer.*

Mus. Carlf. IV. n. 88. Loxia cinerea.

2. *Der Javanische Kernbeißer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 155. n. 94. *der Javanische Kernbeißer.*

Mus. Carlf. IV. n. 89. Loxia javensis.

3. *Der rostrothe Kernbeißer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 155. n. 95. *der rostrothe Kernbeißer.*

Mus. Carlf. IV. n. 90. Loxia ferruginea.

4. *Der Kernbeißer mit halbem Halsringe.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 157. n. 99. *der Kernbeißer mit dem halben Halsringe.*

Actes de la Soc. d'hist. nat. Vol. I. p. 1. n. 81. Loxia semitorquata.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der Franziskaner in Guinea.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 157. n. 98. *der Franziskaner Kernbeißer.*

Isert: Schrift der berlin. Gesellsch. N. Fr. IX. p. 332. Loxia (Franciscana) coccinea, capite abdomineque nigra, alis griseis, tab. 9.

2. *Der*

2. *Der hudsonische Kernbeißer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 156. n. 96. *der Kernbeißer aus der Hudsonsbay.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 379. n. 28. Loxia (Hudsonia) fusca, abdomine albo, lateribus fusco-maculatis, tectricibus alarum rufo bifasciatis.

3. *Der gesellschaftliche Kernbeißer vom Cap.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 156. n. 97. *der gesellige Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 381. n. 35. Loxia (Socia) rufo-fusca, subtus flavescens, capistro nigro, cauda brevi.

4. *Der gelbe Kernbeißer von Sumatra.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 154. n. 91. *der grüngelbe Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 384. n. 44. Loxia (Hypoxantha) flavicans, fronte superciliisque luteis, remigibus rectricibusque nigris, margine flavescentibus.

Mus. Carlson. fasc. III. tab. 71. Loxia hypoxantha.

5. *Der braunrothe asiatische Kernbeißer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 155. Eastern Grosbeak.

Latham, Vögel, II. 1. p. 152. n. 87. *der östliche Kernbeißer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 387. n. 55. Loxia (Undulata) fusco-rubra, corpore subtus fusco-undulato, cauda pallide rubro-cinerea.

6. *Der grauköpfige indianische Kernbeißer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 155. Ash-headed Grosbeak.

Latham, Vögel, II. 1. p. 152. n. 86. *der grauköpfige Kernbeisser.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 394. n. 80. Loxia (Indica) nigricans, subtus albida, capite colloque cinereis, cauda apice alba.

7. *Der grasgrüne Kernbeißer von Java.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 154. n. 92. *der lauchgrüne Kernbeisser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 396. n. 91. Loxia (Prasina) viridi - olivacea, subtus cano - flavicans, uropygio rubro, pedibus flavis. *(mas.)*

Mus. Carls. fasc. III. tab. 72. Loxia prasina.

β. Loxia fusco - olivacea, subtus cano flavicans, uropygio obsolete rubro, pedibus flavis. (femina) *Latham*, loc. cit. β.

Mus. Carlson. fasc. III. tab. 73.

110. GESCHLECHT. EMBERIZA. *Der Ammer.*

Müller, Natursyst. II. p. 560. Gen. CX.
Leske, Naturgesch. p. 260. Gen. XLII.
Borowsky, Thierreich, III. p. 145. Gen. LXIII.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 184. Gen. XXXII.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 523. Gen. LXXII.
Funke, Naturgesch. I. p. 236.
Ebert, Naturl. II. p. 133.
Halle, Vögel, p. 383. Gen. II.
Pennant, arct. Zool. II. p. 330.
Neuer Schaupl. der Natur. I. p. 267.
Onomat. hist. nat. III. p. 771.
Klein, av. p. 91. trib. IV.
Brisson, ornith. I. p. 382. Gen. XXXV.
Büffon, Vögel, XII. p. 128. sqq.
Batsch, Thiere, I. p. 317. Gen. LXXV.
Latham, Vögel, II. 1. p. 158. Gen. XXXV.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 397. Gen. XXXVI.
Hermann, tab. affin. anim. p. 219.

Donn-

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 359. Gen. LXXVIII.

1. Nivalis. *Der Schneeammer.* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 110. n. 1. *der Schneeammer.*

Leske, Naturgesch. p. 260. n. 1. *der Schneeammer*; tab. 5. fig. 1.

Borowsky, Thierreich, III. p. 147. n. 2. *der Schneeammer.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 184. n. 1. Emberiza (Nivalis) remigibus albis, primoribus extrorsum nigris; rectricibus nigris, lateralibus tribus albis; *der Schneeammer; Schneevogel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 526. n. 6. *der Schneeammer; Schneesperling.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 590. *der Schneeammer.*

Funke, Naturgesch. I. p. 236. *der Schneeammer.*

Ebert, Naturl. II. p. 134. *der Schneeammer; Winterling.*

Halle, Vögel, p. 387. n. 390. *der Schneevogel; nordischer Lerchenammer.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 402. n. 338. *der Schneeammer.*

Pennant,

(10) Länge 6 1/2 Zoll. Flügelweite 10. Zoll. — Gewicht eine Unze fünf Quentchen. *Penn.* Brütet in Grönland im May. Die Knaben fangen sie im Herbst, wenn sie sich, um auszuwandern, an den Küsten in grossen Heerden versammeln, und sie werden getrocknet gegessen. Es scheint, dass sie die Länder innerhalb des ganzen arctischen Kreises zu ihrem Sommeraufenthalt wählen; von dort aus überschwemmen sie, wenn in der kalten Zone der Winter eintritt, die südlichen Länder in ungeheurer Anzahl. — Man hat diese Vögel zuweilen zu den Lerchen gezählet. Die Ursach giebt *Linné* selbst an: fn. suec. p. 83. *Rostro cum Emberiza convenit; pollicis ungue longiore, et quod per terram cursitat, ad alaudas propius accedit.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 331. n. 138. *der Schnee-ammer.*

Neuer Schaupl. d. Nat. I. p. 268. *Schneeammer.*

Onomat. histor. natur. I. p. 243. Alauda hiemalis; *Schneelerche; Winterlerche.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 129. *Schnee-ammer.*

Klein, av. p. 91. n. 4. Emberiza varia. Passer hybernus. Avis peregrina.

Klein, Vorbereit. p. 170. n. 4. *Schneeammer; Winterling; Neuvogel; gescheckter Emmerling; Wintersperling.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 93. n. 4. *Schneeammer.*

Brisson, ornith. I. p. 383. n. 9. Ortolan de neige.

Büffon, Vögel, XII. p. 173. *der Schnee-Ortolan, oder Schnee-Ammer;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 347. *der Schneeammer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 157. Snow-Bunting.

Latham, Vögel, II. 1. p. 158. n. 1. *der Schnee-Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 397. n. 1. Emberiza (Nivalis) remigibus albis, primoribus extrorsum nigris, rectricibus nigris, lateralibus tribus albis.

Seligmann, Vögel, V. tab. 21. *der Schneevogel aus Hudsonsbay.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 78. n. 168. *der Schnee-ammer.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 110. n. 1. *der Schnee-ammer; Schneevagel; Strietvagel.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 423. *Schneeammer.*

Fischer, Liv. p. 97. n. 147. *Schneeammer.*

Fischer, Zus. zur N. G. von Livl. p. 48. *Schnee-vogel.*

Lepechin,

Lepechin, Tageb. d. ruſſ. Reiſ. II. p. 5. *Schneevogel*, III. p. 13. *Schneeammer.*

Pennant, Reiſ. d. Schottl. I. p. 41. *Schneeammer.*

Phipps, Reiſ. nach d. Nordpol. p. 99. *der Schneeammer.*

Schöpf, Reiſ. d. Nordamer. II. p. 13. *Schneevogel.*

Pallas, Reiſ. Ausz. III. p. 475. *Schneeammer.*

White, N. G. von Engl. p. 30. p. 44. *Schneeammer.*

Leem, Finnm. p. 135. *der Schneevogel.*

Pontoppidan, Dännem. p. 173. n. 1. *Sneefugl; Sneekok.*

Pontoppidan, Norweg. II. p. 182. *Sneefugl; Vinterfugl.*

Olaſſen, Isl. I. p. 310. c. *Snio Tytlingar; Tytlings-Bilke; Snio-Tytling.*

Pennant, britt. Thiergeſch. p. 130. tab. 57. fig. 6. *Schneeammer.*

Pallas, nord. Beytr. III p. 17. *Schneeammer.*

Linné, Abhandl. II. p. 283. n. 36. p. 302. n. 124. *der Schneeammer.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 176. n. 214. *der Schnee-Emmerling.*

Martini, Naturlex. II. p. 389. *Schneeammer.*

Naturforſch. XVII. p. 89. n. 182. *die Schneeammer.*

Schwed. Abhandl. II. p. 134. *Schneeſperling*; tab. 1. fig. 9 — 11.

Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 298. *Schneeammer.*

Samml. zur Phyſ. u. N. G. II. p. 738. *der Schneeammer.*

Berlin. Samml. IX. p. 572. *Schneeammer.*

Börner, Schleſ. ökon. Geſellſch. 1781. p. 101. Emberiza nivalis.

Borkhausen, Magazin, I. p. 142. n. 5. *Schneeammer.*

Meidinger, Vorlesſ. I. p. 149. n. 1. *der Schneeammer.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 1013. *Schneevogel.*

Schrift. der Drontheim. Geſellſch. III. p. 514.

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 1. Avis nivalis.

Linné, Syſt. Nat. Ed. X. I. p. 176. n. 1. Emberiza (Nivalis) remigibus albis: primoribus extrorſum nigris, rectricibus nigris, lateralibus tribus albis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 30. n. 250. Emberiza (Nivalis) remigibus albis: primoribus extrorſum nigris, rectricibus nigris; lateralibus tribus albis.

Kramer, Auſtr. p. 372. n. 7. *Meerſtiglitz.*

Olaus M. de gent. ſeptentr. L. 19. c. 156. Avicula nivalis.

Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 256. Emberiza varia. *Winterling, Neuvogel.*

Rzaczynsky, auct. hiſt. nat. Pol. p. 397. Nivalis avis. Paſſer hibernus. Hortulanus ex albo variegatus. Snegula.

Bomar. diction. VI. p. 273. Ortolan de neige.

Levin, britt. Birds, II. tab. 71.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Emberiza nivalis.

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 360. n. 1. *der Schneeammer.*

β. *Der weißfleckige Schneeammer.* (1)

Briſſon, ornithol. I. p. 389. n. 9. A. Ortolan de neige tacheté.

Latham,

(1) *Bechſtein* u. *Otto* halten *Friſchens weißfleckigen Ammer* für ein *Gold-Ammer* Männchen. S. *Bechſteins* N. G. Deutſchl. III. p. 591. — *Büffons* Vögel, XII. p. 179. not. 2.

Latham, Syn. II. 1. p. 163. Var. A. Spotted Bunting.

Latham, Vögel, II. 1. p. 160. n. 1. Var. A. *der gelbgefleckte Schnee-Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 398. n. 1. *β.*

γ. *Der schwarzbrüstige Schneeammer.*

Brisson, ornithol. I. p. 389. n. 9. B. Ortolan de neige à poitrine noire.

Latham, Syn. II. 1. p. 163. Var. B. Black-breasted Bunting.

Latham, Vögel, II. 1. p. 160. n. 1. Var. B. *der schwarzbrüstige Schnee-Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 398. n. 1. γ. Emberiza flavescente-alba, capistro corporeque subtus nigricantibus, alis caudaque albo nigroque variis.

δ. *Der Schneeammer mit dem Halsbande.* (2)

Klein, av. p. 98. n. 10. Fringilla capite albo.

Klein, Vorbereit. p. 181. n. 10. *Weißkopf.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 97. n. 10. *Weißkopf.*

Brisson, ornithol. I. p. 390. n. 9. D. Ortolan de neige à collier.

Büffon, Vögel, XII. p. 195. *der Schneeortolan mit dem Halsbande, oder der weißköpfigte;* mit e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 163. Var. C.

Latham, Vögel, II. 1. p. 161. n. 1. Var. C. *der bunte Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 398. n. 1. δ. E. corpore fusco-rubro, capite colloque albis, pectore macula difformi caerulescente, alis caudaque albo nigroque variis.

(2) *Albin* hat diesen Vogel zuerst abgebildet. *Otto* hält es noch für ungewiss, ob er zu dem Schneeammer gehört, weil er in Gestalt und Farbe von ihm abweicht, und auf einer Eiche sitzend abgebildet ist.

7. Mustelina. *Der Eisammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 161. n. 2. *der lohgelbe Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 398. n. 2. Emberiza (Glacialis) nigra pennis flavo-fusco marginatis, gula uropygioque flavescentibus, subtus alba flavo obscure maculata.

Linné, faun. suec. II. p. 85. n. 227. *β.* (Variet. *Emb. nivalis.*)

Fabric. faun. groenl. p. 119. Pulli?

Nach *Bechstein* ein sehr altes Männchen von der folgenden Gattung.

25. Montana. *Der Bergammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 162. n. 3. *der Bergammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 398. n. 3. Emberiza (Montana) cinerea, subtus flavescente-undulata, capite castaneo, fronte saturatiore, gula alba, rectricibus tribus extimis albis.

2. Hyemalis. *Der schwarze Ammer.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 561. n. 2. *der Wintervogel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 334. n. 139. *der schwarze Ammer.*

Klein, av. p. 89. n. 8. Passer nivalis, cervice alba.

Klein, Vorbereit. p. 166. n. 8. *Weißnacken.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 91. n. 7. *Weißnacken.*

Brisson, ornith. I. p. 389. n. 9. C. Ortolan de neige noir.

Büffon,

(3) Länge 6 1/2 Zoll. Flügelweite 9. Zoll. Gewicht 1/2 Unze *Penn* — *Brisson* und *Büffon* halten ihn für eine Abart von *Emberiza nivalis.*

Büffon, Vögel, XII. p. 194. *der Jacobinortolan, und schwarze Schneeammer;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 164. n. 4. *der schwarze Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 399. n. 4. Emberiza (Hyemalis) nigra, ventre albo.

Seligmann, Vögel, I. tab. 72. *der Schneevogel.*

Kalm, Reis. d. Nordamer. p. 49.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 360. n. 2. *der schwarze Ammer.*

3. MILIARIA. *Der Grauammer.* (4)

Müller, Natursyst. II. p. 562. n. 3. *der graue Ammer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 149. n. 4. *der graue Ammer; Gerstammer.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 185. n. 2. Emberiza (Miliaria) grisea, subtus nigro-maculata, orbitis rufis; *die graue Ammer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 524. n. 2. *der graue Ammer; Strumpfwirker.*

Funke, Naturgesch. I. p. 237. *die graue Ammer.*

Ebert, Naturl. II. p. 133. *die graue Ammer.*

Halle, Vögel, p. 384. n. 382. *der große lerchenfarbne Ammer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 341. B. *der gemeine Ammer.*

Klein, av. p. 91. n. 1. Emberiza alba.

Klein, Vorbereit. p. 169. n. 1. *grauer großer Ammer; Knustknipper.*

(4) Länge 7 1/2 Zoll. Flügelweite 11 1/3 Zoll. *Büff.* Nistet selten auf der blossen Erde, sondern 3—4. Zoll über dem Boden in dem dichtesten Grase, das stark genug ist, sein Nest zu tragen. Die Jungen verlassen das Nest, schon ehe sie fliegen können, und laufen im Grase. Wird leicht zahm.

Klein, verb. Vögelhist. p. 93. n. 1. *grauer Ammer; großer Ammer; Knipper.*

Klein, stemmat. av. p. 18 tab. 18. fig. 5. a. b.

Gesner, Vögelb. p. 475. *weiße Emmeritze.*

Brisson, ornith. I. p. 390. n. 10. Proyer.

Büffon, Vögel, XII. p. 237. *der graue Ammer;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 346. *der graue Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 169. n. 8 *der Gerstenammer; gemeiner Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 402. n. 12. Emberiza (Miliaria) grisea, subtus nigro-maculata, orbitis rufis.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 111. n. 2. *die graue Ammer; Ortolaan.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 424. *die graue große Ammer.*

Fischer, Liv. p. 98. n. 148. *grauer Ammer.*

Cetti, Sardin. II. p. 184. *die graue Ammer.*

Pallas, Reis. III. p. 647. Ausz. III. p. 474. *Grauammer.*

White, N. G. von Engl. p. 24. p. 66. n. 8. *graue Ammer.*

Pennant, britt. Thiergesch. p. 128. tab. 58 Fig. 7.

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 2. *Kornlärke.*

Naturforsch. XVII. p. 91. n. 183. *die graue Ammer.*

Neue Schwed. Abhandl. III. p. 109. Emberiza Miliaria.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 740. *die Grauammer.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 143. n. 6. *Hirsenammer; Grauammer.*

Martini, Naturlex. II. p. 374 *große graue Ammer.*

Börner, schles. ökon. Nachricht. 1781. p. 101. *Gerstling.*

Günther, Nest. u. Ey. tab. 70. *Gerstammer.*

Linné,

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 4. Emberiza.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 176. n. 2. Emberiza (Calandra) grisea nigro-maculata. — Fn. suec. II. n. 228. Emberiza (Calandra) grisea, nigro maculata.

Müller, zool. dan. prodr. p. 38. n. 251. Emberiza (Miliaria) grisea, subtus nigro-maculata, orbitis rufis.

Kramer, Austr. p. 372. n. 6. *Braßler.*

Brünniche, ornith. bor. p. 68. n. 247. Emb. Calandra.

Charleton, exercitat. p. 84. n. 16. Cynchramus, p. 87 n. 14. Emberiza alba.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 14. Emberiza alba. p. 75. n. 16. Cynchramus.

Moehring, av. gen. p. 41. n. 28. Spinus.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 290. Hordeola. *Gerstling; Gerst-Vogel; Gersthammer, welsche Goldammer: weiße Emmeritz.*

Sibbald, Scot. P. II. L. 3. p. 18. Emberiza alba Gesneri.

Belon, hist. nat. des ois. p. 266. Pruyer.

Jonston, av. p. 97. Emberiza alba. p. 72. Cynchramus. p. 101. Alaudae congener.

Zinnan. Uov. p. 63. tab. 9. fig. 55. Strilozzo.

Faun. Arragon. p. 680. — Roman. ornithol. I. p. 155. tab. 24. Fig. 1.

Hist. Prov. I. p. 195. — *Levin*, britt. Birds II. tab. 75.

Bomare, diction. IX. p. 336. — Diction. des anim. III. p. 389.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 360. n. 3. *der graue Ammer.*

4. Hortulana. *Der Ortolan.* (5)

Müller, Naturſyſt. II. p. 562. n. 4. *der Ortolan;* tab. 25. Fig. 4.

Leske, Naturgeſch. p. 261. n. 2. *der Gartenammer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 148. n. 3. *der Ortolan; Fettammer.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 185. n. 3. Emberiza (Hortulana) remigibus nigris, primis tribus margine albidis: rectricibus nigris, lateralibus duabus extrorſum nigris. *Ortulan; Kornfink; windſche Goldammer.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 525. n. 4. *der Gartenammer.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 590. *Ammerling, Grünzling; Hortulan.*

Funke, Naturgeſch. I. p. 237. *der Ortolan.*

Ebert, Naturl. II. p. 135. *der Ortolan.*

Halle, Vögel, p. 385. n. 383. *der Ortolan.* Fig. 24.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 403. *der Ortolan.*

Beckmann, Naturhiſt. p. 53. *b. der Ortolan.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 341. D. *der Ortolan.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 776. *Fettammer; Gärtner.*

Handb. der deutſch. Thiergeſch. p. 129. *Ortolan, Brachamſel.*

Klein, av. p. 91. n. 2. Emberiza miliaria pingueſcens.

Klein, Vorbereit. p. 170. n. 2. *Fettammer.*

Klein, verbeſſ. Vögelhiſtor. p. 93. n. 2. *Fettammer.*

Briſſon, ornith. I. p. 384. n. 4. *Ortolan.*

Büffon, Vögel, XI. p. 128. *der Ortolan;* mit e. Fig.

Batſch, Thiere, I. 345. *der Ortolan.*

Latham,

(5) In Cypern wird ein beträchtlicher Handel damit getrieben, und jährlich oft an 160000 aus dieſer Inſel verſchickt.

Latham, Syn. Suppl. p. 157. Ortolan Bunting.
Latham, Vögel, II. 1. p. 164. n. 5. *der Gartenammer.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 399. n. 5. Emberiza (Hortulana) remigibus nigris, primis tribus margine albidis, rectricibus nigris, lateralibus duabus extrorsum albis.
Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 424. *der Fettammer.*
Cetti, Sardin. II. p. 192. *Ortolan.* *
Fischer, Livl. p. 98 n. 149 *Fettammer.*
Pallas, Reis. Ausz. III. p. 74. *Ortolan.*
Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *der Ortolan.*
Taube, Slavon. I. p. 22. *Ortolane.*
Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 3. *Ortulan.*
Linné, Abhandl. II. p. 286. n. 5. p. 303. n. 126. *der Ortolan.*
Naturforsch. XVII. p. 91. n. 184. *Fettammer.*
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 735. *der Hortulan.*
Borkhausen, Magaz. I. p. 143. n. 7. *Ortolan.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 177 not. n.
Martini, Naturlex. II. p. 365. *Fettammer.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 57. *Ortolahn.*
Naumann, Vogelsteller, p. 73. *Ortolan.*
Eberhard, Thiergesch. p. 81. *der Ortolan.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 173. 333. *Hortulan.*
Forstlex. II. p. 387. *Ortolan.*
Oekonom. Zool. p. 98. n. 42. *der Ortolan.*
Meidinger, Vorl. p. 149. n. 2. *der Gartenammer.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 762. *Ortolan.*
Ludovici, Kaufmannslex. IV. p. 369.
Zückert, Speis. aus dem Thierr. p. 96.
Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 101. Emberiza Hortulana.
Gothaisch. Hofkalender, 1780. p. 149.

Beckmann, Churmark. f. I. p. 873.
Koburgisch. Magazin, 1760. n. 11. p. 161.
Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorf. VI. p. 261.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 5. Hortulana.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 177. n. 3. Emberiza (Hortulana) remigibus nigris, primis tribus margine albidis, rectricibus nigris: lateralibus duabus extrorsum nigris.
Linné, fn. suec. I. p. 208. Fringilla remigibus nigris: primis tribus margine albidis: rectricibus nigris: lateralibus duabus extrorsum albis.
Brünniche, ornith. bor. p. 68. Hortulanus.
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 386. Hortulanus. Miliaria Varronis. *Jüt-vogel.*
Kramer, Austr. p. 371. n. 4. Emberiza capite virescente, annulo circa oculos gulaque flavescentibus. *Ortulan.*
Zinnan, Uov. p. 41 tab. 6. Fig. 25. Ortolano.
Hist. prov. I. p. 494. Ortolan.
Salerne, oif. p. 296. Hortolan; Ortolan; Jardinier.
Bomare, Diction. VI. p. 272. — Diction. des anim. III. p. 289.
Varro, de re rust. L. 3. c. 5. n. 2. Miliariae.
Aristot. hist. anim. L. 8. c. 12. Κεγχραμος.
Donndorff, Handb. d. Thiergeschich. p. 361. n. 4. *der Ortolan.*

β. *Der gelbe Ortolan.*

Halle, Vögel, p. 386. n. 384. *der gelbliche Ortolan.*
Onomat. hist. nat. III. p. 777. n. 1. *eine gelbe Spielart.*
Brisson, ornith. I. p. 385. n. A. Ortolan jaune.
Büffon, Vögel, XII. p. 141. *der gelbe Ortolan.*
Latham, Syn. II. 1. p. 168. n. 5. A. — Vögel, II. 1. p. 166. n. 5. A.

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 399. n. 5. β. Emberiza flavescens tota, remigibus margine albis.
Martini, Naturlex. II. p. 367.
Jonston, av. p. 72. Hortulanus flavus.

γ. *Der weiße Ortolan.*
Halle, Vögel, p. 386. n. 385. *ganz weiße Ortolane.*
Onomat. hist. nat. III. p. 172. *eine schneeweiße Spielart.*
Brisson, ornith. I. p. 385. B. Ortolan blanc.
Büffon, Vögel, XII. p. 141. *der weiße Ortolan.*
Latham, Syn. II. 1. p. 168. n. 5. B. — Vögel, II. 1. p. 166. n. 5. B.
Latham, Syst. ornith. I. p. 400. n. 5. β. E. tota nivea.
Martini, Naturlex. II. p. 369.
Jonston, av. p. 72. Hortulanus albus.

δ. *Der weißschwänzige Ortolan.*
Halle, Vögel, p. 386. n. 388. *Ortolan mit weißem Schwanze.*
Onomat. hist. nat. III. p. 777. *Eine Spielart mit einem weißen Schwanze.*
Brisson, ornith. I. p. 385. C. Ortolan à queue blanche.
Büffon, Vögel, XII. p. 142. *der weißgeschwänzte Ortolan.*
Latham, Syn. II. 1. p. 168. n. 5. C. — Vögel, II. 1. p. 166. n. 5. C.
Latham, Syst. ornith. I. p. 400. n. 5. δ. E. corpore ut in primo, cauda alba.
Martini, Naturlex. II. p. 369.
Jonston, av. p. 72. Hortulanus albicilla.
Zinnan, Uov. p. 42. tab. 6. Fig. 27. Ortolano con la coda bianca.

ε. *Der*

ε. *Der schwarze Ortolan.*

Halle, Vögel, p. 386. n. 387. *Ortolan mit schwarzem Leibe*, etc.

Onomat. hist. nat. III. p. 777. n. 4 *Eine Spielart mit grünem Kopf und Hals*, etc.

Brisson, ornith. I. p. 385. D. Ortolan noir.

Buffon, Vögel, XII. p. 142. *der schwärzliche Ortolan.*

Latham, Syn. II. 1. p. 168. n. 5. D. — Vögel, II. 1. p. 166. n. 5. D.

Latham, Syst. ornith. I. p. 400. n. 5. ε. E. corpore nigricante, capite colloque virescentibus, rostro rubro, pedibus cinereis.

Martini, Naturlex. II. p. 365.

Zinnan, Uov. p. 42. tab. 6. Fig. 26. Ortolano con il collo verde.

26. SINENSIS. *Der chinesische Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 166. n. 6. *der chinesische Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 400. n. 6. Emberiza (Sinensis) rubro-fusca, subtus lutea, tectricibus alarum minoribus flavescentibus, remigibus, rectricibus strigaque abdominis longitudinali fuscis.

5. CITRINELLA. *Der Goldammer.*

Müller, Natursyst. II. p. 563. n. 5. *der Goldammer.*

Leske, Naturgesch. p. 261. n. 3. *der Goldammer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 149. n. 5. *der Goldammer*, *Emmerling.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 185. n. 4. Emberiza (Citrinella) rectricibus nigricantibus: extimis duabus latere interiore macula alba acuta, *der Goldammer*, *Gelbgans.*

Bech-

Bechstein, Naturgesch. I. p. 523. n. 1. *der Goldammer; Embritz.*

Funke, Naturgesch. I. p. 236. *Goldammer.*

Ebert, Naturl. II. p. 134. *Goldammer; Gelbling.*

Halle, Vögel, p. 383. n. 381. *der Goldammer.*

Meyer, Thiere, I. tab. 94. *der Goldammer.* M. u. W.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 405. n. 340. *die Goldammer, Gaalammer,* etc.

Pennant, arct. Zool. II. p. 341. C. *der gelbe Ammer.*

Onomat. hist. nat. II. p 831. *der Gröning.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 130. *Emmerling; Hämmerling.*

Klein, av. p. 92. n. 5. Emberiza flava.

Klein, Vorbereit. p. 171. n. 5. *Goldammer; Gaalammer; Gelbling; Geelgerst; Embritz; Aemmerling; Grünfing.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 93. n. 5. *Goldammer.*

Klein, Stemmat. av. p. 18. tab. 18. Fig. 6. a. b.

Gesner, Vögelb. p. 474. *Emmeritz; Embritz; Emmering; Emmerling; Gilbling; Gilberschen; Kornvogel; Geelgörst.* p. 475. *Gorse; Gurse;* m. e. Fig.

Brisson, ornith. I. p. 382. n. 1. Bruant.

Büffon, Vögel, XII. p. 206. *der Goldammer;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 346. *der Goldammer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 157. Yellow-Bunting.

Latham, Vögel, II. 1. p. 167. n. 7. *der Goldammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 400. n. 7. Emberiza (Citrinella) rectricibus nigricantibus, extimis duabus latere interiore macula alba acuta.

Beseke, Vögel Kurl. p. 78. n. 169. *die Goldammer.*

Siemßen,

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 112. n. 3. *Goldammer; Geelgöschen.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 424. *Goldammer.*

Cetti, Sardin II. p. 193. *der Goldammer.*

White, N. G. von Engl. p. 63. n. 6. *Goldammer.*

Fischer, Livl. p. 98. n. 150. *Goldammer.*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 4. *Goldverling; Gulspurv.*

Pallas, nord. Beytr. III. p. 17. *der gemeine Emmerling.*

Linné, Abhandl. II. p. 302. n. 125. *der Goldammer.*

Pennant, britt. Thiergesch. p. 129. n. 2. *Goldammer.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 144. n. 8. *Goldammer.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 346. *der gelbe Emmerling.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 172. n. 209. *der Goldammer.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 62. *Goldammer; Grünschling.*

Naumann, Vogelsteller, p. 71. *Grünschling; Gehling.*

Beckmann, Naturhist. p. 53. a. *der Goldammer.*

Eberhard, Thiergesch. p. 81. *der Goldammer.*

Naturforsch. XVII. p. 91. n. 185. *Goldammer.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 739. *die Goldammer.*

Neue Schwed. Abhandl. III. p. 109. Emberiza citrinella.

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 387. n. 8. *der Goldammer.*

Krünitz, oekon. Encykl. X. p. 784. *Emmerling.*

Oekonom. Zool. p. 99. n. 43. *Goldammer.*

Martini, Naturlex. II. p. 371. *Goldammer.*

Forstlexikon. I. p. 592. *Emmerling.*

Schrift. der Drontheim. Gesellsch. III. p. 414.

Anweis.

Anweis. Vogel zu fang. p. 172. *Emmerling.*

Meidinger, Vorlesung. I. p. 149. n. 3. *der Goldammer.*

André u Bechstein, Spazierg. III. p. 21. 47. *Goldammer.*

Börner, schles. ökonom. Gesellsch. 1781. p. 101. Emberiza Citrinella.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 297. *Emmerling.*

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. Emberiza.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. 3. Citrinella.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 177. n. 4. Emberiza (Citrinella) rectricibus nigricantibus: extimis duabus latere interiore macula alba acuta.

Linné, fn. suec. I. p. 205. Fringilla rectricibus nigricantibus, extimis duabus latere interiore alba acuminata macula.

Kramer, Austr. p. 370. n. 1. Emberiza rectricibus nigricantibus, extimis duabus, latere interiore, alba acuminata macula, gula pectoreque flavis. *Ammering; Goldammering.*

Brünniche, ornith. bor. p. 68. n. 249. Emberiza Citrinella.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 218. Aureola. *Gaul-Ammer; Geelgerst.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 368. Aureola. p. 392. Lutea altera.

Jonston, av. p. 101. Lutearum genus alterum.

Belon, ois p. 364. 365. Verdier; Serrant.

Barrere, ornithol. p. 56. Passer ex cinereo flavus.

Salerne, ornithol. p. 293. Verdier, etc.

Schaefer, element. ornithol. tab. 32.

Levin, britt. Birds, II. tab. 73.

Faun. Aragon. p. 86. — Hist. Prov. I. p. 495.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 362. n. 5. *der Goldammer.*

β. *Der*

β. *Der fahle oder weißliche Goldammer.* *
Büffon, Vögel, XII. p. 219. — *Latham*, Vögel, II. 1. p. 168. not. y.
Zorn, Petinotheol. II. p. 53.
γ. *Der gefleckte Goldammer.* * *Latham*, l. c.

6. Olivacea. *Der olivenfarbige Ammer.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 563. n. 6. *der Olivenammer.*

Onomat. hiſt. nat. IV. p. 775. *der Ammer aus der Inſel Dominique.*

Briſſon, ornith. I. p. 392. n. 14. Bruant de St. Domingue.

Büffon, Vögel, XII. p. 259. *der olivenfarbige Ammer.*

Martini, Naturlex. II. p. 364. *Ammer von Domingo.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 410. n. 38. Emberiza (Olivacea) olivacea, ſubtus albidior, gula aurantia, faſcia pectorali nigricante.

27. Passerina. *Der Sperlingsammer.*

Müller, Naturſyſt. Suppl. p. 155. n. 25. *der Sperlingsammer.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 528. n. 9. *die Sperlingsammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 278. *der Sperlingsammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 190. n. 35 *der Sperlingsammer.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 403. n. 14. Emberiza (Paſſerina) griſeo-fuſca, ſubtus cinerascens, vertice medio, iugulo rectricibusque nigris, duabus extimis albo nigroque dimidiatis.

Pallas, Reiſ. Ausz. I. Anh. p. 4. n. 10. Emberiza *paſſerina.*

28. Pu-

28. Pusilla. *Der kleine Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 284. *der kleine Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 210. n. 67. *der kleine Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 414. n. 54. Loxia (Pusilla) supra passerina, subtus albida, capite supra et lateribus fasciis quinis testaceis, interiectisque nigris quatuor.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 8. n. 20. Emberiza *pusilla.*

29. Rustica. *Der Bauernammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 285. *der Bauernammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 210. n. 68. *der Bauernammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 413. n. 51. Emberiza (Rustica) supra passerina, subtus alba, capite nigro, fasciis tribus longitudinaliter albis.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 8. n. 21. Emberiza *rustica.*

30. Fucata. *Der geschminkte Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 287. *der geschminkte Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 210. n. 69. *der geschminkte Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 419. n. 73. Emberiza (Fucata) passerina, cervice cano-cinerea, corpore subtus lineaque supra et infra oculos alba.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 8. n. 22. Emberiza *fucata.*

31. Spodocephala. *Der grauköpfige Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 288. *der grauköpfigte Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 211. n. 70. *der graukö-pfige Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 419. n. 74. Emberiza (Spodocephala) passerina, subtus flavescens, capite et collo cano-cinereis, capistro nigro.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 9. n. 24. Emberiza *Spodocephala.*

32. Chrysophrys. *Der Ammer mit gelben Augenbraunen.*

Büffon, Vögel, XII. p. 289 *der Ammer mit gelben Augenbraunen.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 211. n. 71. *der gelbstreifige Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 419. n. 75. Emberiza (Chrysophrys) passerina, vertice nigro, superciliis citrinis, fascia a medio verticis ad nucham alba.

Pallas, Reis. Ausz. III. p. 9. n. 25. Emberiza *chrysophrys.*

33. Maelbyensis. *Der Ammer aus Südermannland.* (*)

Latham, Syn. Suppl. p. 160. Maelby Bunting.

Latham, Vögel, II. 1. p. 208. n. 64. *der Maelbyische Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 401. n. 8. Emberiza (Maelbyensis) capite colloque plumbeo-cinereis, gula albida, abdomine ferrugineo.

34. Rutila. *Der röthliche Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 286. *der röthliche Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 211. n. 72. *der röthliche Ammer.*

Latham,

(*) Nach *Bechstein* eine Varietät von *Emberiza Hortulana.* N. G. Deutschl. III. p. 592.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 411. n. 40. Emberiza (Rutila) ex sanguineo rufa, subtus sulphurea, alis ex griseo ferrugineis.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 9. n. 23. Emberiza *rutila*.

35. FERRUGINEA. *Der rostfarbige Ammer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 338. n. 147. *der rostfarbige Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 192. n. 36. *der rostfarbene Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 411. n. 41. Emberiza (Ferruginea) ferruginea, abdomine remigumque primorum maculis duabus albis.

36. AMERICANA. *Der schwarzkehlige Ammer.* (6)

Pennant, arct. Zool. II. p. 338. n. 144. *der Ammer mit schwarzer Kehle.* Tab. 17. unt. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 193. n. 37. *der schwarzkehlige Ammer;* tab. 46. Fig. 1.

Latham, Syst. ornith. I. p. 411. n. 42. Emberiza (Americana) cinerea, fusco striata, superciliis, striga sub oculis abdomineque flavis, gula alba, iugulo macula alba.

37. BRASILIENSIS. *Der brasilianische Ammer.*

Onomat. hist. nat. III. p. 772. *der brasilianische Emmerlingvogel.*

Halle, Vögel, p. 382. f. *der gelbe Gesangsperling.*

 Brisson,

(6) *Latham* hat im Syst. ornith. l. c. noch die besondere Abtheilung gemacht, dass er *Pennants Ammer mit schwarzer Kehle* als Spielart von seinem eignen *Black-throated Bunting* (Syn. II. 1. p. 197. n. 37. t. 44.) annimmt, und ihn folgender Gestalt characterisirt: *Emberiza cinereo-fusca, subtus albida, fronte superciliisque flavis, fascia sub oculis lunulaque frontis nigris, gula flava, medio macula triquetra nigra;* und sagt von ihm: er bewohne die Hudsonsbay, sey 7 1/2 Zoll lang, niste auf der Erde, und lege weisse, schwarz gefleckte Eyer, cf. *Syn. Suppl.* p. 158.

Brisson, ornith. I. p. 392. n. 13. Bruant du Brésil.

Büffon, Vögel, XII. p. 252. *der Guirnegat*, *oder brasilianische Ammer*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 194. n. 38. *der Brasilische Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 412. n. 43. Emberiza (Brasiliensis) virescens, flavo fuscoque varia, subtus verticeque lutea.

Martini, Naturlex. II. p. 362. *brasilianische Ammer.*

Jonston, av. p. 203. Guiranheemgatu.

38. MEXICANA. *Der mexicanische Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 255. *der mexikanische Ammer oder die gelbe Therete.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 195. n. 39. *der Mexikanische Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 412. n. 44. Emberiza (Mexicana) fuscescens, facie gulaque luteis, corpore subtus sordide albo fusco maculato.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 741. *der gelbe mexikanische Ammer.*

39. MILITARIS. *Der Maltheserammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 195. n. 40. *der Kriegs-Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 412. n. 45. Emberiza (Militaris) flavescente-fusca, subtus alba, pectore dorsoque infimo flavis.

Hasselquist, Palaest. (ed. germ.) p. 336. n. 48. Emberiza Melitensis.

40. ME-

40. MELANOCEPHALA. *Der schwarzköpfige Ammer.* (7)

Büffon, Vögel, XII. p. 198. *der schwarzköpfige Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 195. n. 41. *der schwarzköpfige Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 412. n. 46. Emberiza (Melanocephala) flava, dorso rufo, capite colloque superiore nigris, remigibus rectricibusque fuscis.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 171. n. 208. *der schwarzköpfige Emmerling.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 145. n. 10. *schwarzköpfiger Ammer.*

41. BRUMALIS. *Der Winterammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 195. n. 42 *der Winterammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 412. n. 47. Emberiza (Brumalis) flavo-fusca, sincipite corporeque subtus flavis, collo superiore cum lateribus cinereo, remigibus fuscis.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 175 n. 213. *der Winteremmerling.*

42. COCCINEA. *Der carmoisinrothe Ammer.* (8)

Büffon, Vögel, XII. p. 292. *der Ammer von Karlsruh.*

 Latham,

(7) Was ich aus diesem Vogel machen soll, weiss ich nicht. *Scopoli* führt *Kleins Emberiza capite nigro* (prodr. p. 92. n. 10) als Synonym an; *Klein* aber *Albins greater Brambling* III. n. 63. und dies ist *Fringilla lapponica*, p. 900. n. 1. Ein Schreibfehler ist es wohl, wenn *Latham* das *Kleinsche* Synonym *zweymal*, hier, und bey *Fringilla lapponica* anführt. *Bechstein* meint, es könnte wohl *Emberiza aureola*, p. 875. n. 47. seyn.

(8) Nach *Bechstein* mit *Loxia Pyrrhula* einerley. N. G. Deutschl. III. p. 591.

Latham, Vögel, II. 1. p. 213. not. u. *der Ammer von Karlsruh.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 410. n. 34. Emberiza (Coccinea) corpore supra argenteo, subtus coccineo, crisso albo, rostro, capite remigibusque nigris, postremis, occipite et cauda ex atro caeruleis.

43. Badensis. *Der baadensche Ammer.* (9)

Büffon, Vögel, XII. p. 291. *der baadensche olivenfarbige Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 213. n. 77. *der Baadensche Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 411. n. 39. Eemberiza (Badensis) olivacea, nigricante striata, subtus pallidior, gula aurantia, pectore nigricantestriato.

Borkhausen, Magaz. I. p. 145. n. 9. *badischer Ammer.*

44. Erythrophthalma. *Der rothäugige Ammer.*

Müller, Natursyst. II. p. 582. n. 6. *das Rothauge.*

Onomat. hist. nat. III. p. 971. *der schwarze Sperling.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 334. n. 140. *das Rothauge.*

Klein, av. p. 89. n. 7. passer niger, oculis rubris, iride nigra.

Klein, Vorbereitung. p. 166. n. 7. *schwarzer Sperling.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 91. n. 6. *schwarzer Sperling.*

Brisson, ornith. I. p. 353. n. 44. Pinçon de la Caroline.

Büffon,

(9) Nach *Bechstein* l. c. mit *Fringilla Citrinella* einerley.

Büffon, Vögel, XI. p. 158. *der schwarze rothaugigte Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 196. n. 43. *der rothäugige Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 413. n. 48. Emberiza (Erythrophthalma) nigra, rubro relucens, abdomine rufescente, macula alarum alba.

Seligmann, Vögel, II. tab. 68. *der schwarze Sperling mit rothen Augen.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 180. n. 8. Fringilla (Erythrophthalma) nigra, rubro relucens, abdomine rufescente, macula alarum alba.

45. Leucophrys. *Der weißgescheitelte Ammer* (10)

Pennant, arct. Zool. II. p. 330. n. 137. *der Weißkopf;* tab. 16. untere Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 159. White-crowned Bunting.

Latham, Vögel, II. 1. p. 196. n. 44. *der weißköpfige Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 413. n. 49. Emberiza (Leucophrys) ferrugineo-fusca, subtus alba, crisso flavo, vertice nigro, medio vitta superciliisque albis.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 354. n. 6. *der Weißkopf.*

46. Luctuosa. *Der Trauerammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 290. *der Trauerammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 197. n. 45. *der Trauerammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 414. n. 52. Emberiza (Luctuosa) nigra, barba thracia, fronte pectore abdomine uropygio et ani regione albis.

(10) Flügelweite 9. Zoll. Gewicht 3/4 Unzen. *Penn.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 177. n. 215. *der Trauervogel.*

(Ist nach *Bechstein* mit *Muscicapa Atricapilla* einerley. N. G. Deutschl. III. p. 591.)

47. Aureola. *Der gelbbrüstige Ammer.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 156. n. 27. *der Gelbhals.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 340. A. *der Sibirische Ammer; Goldammer des Pallas.*

Büffon, Vögel, XII. p. 282. *der sibirische Goldammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 198. n. 46. *der gelbbrüstige Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 414. n. 53. Emberiza (Aureola) rufa, subtus flava, fascia pectorali transversa ferruginea, vertice, genis gulaque nigris.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 12. n. 23. Emberiza Aureola.

48. Sandwichensis. *Der Ammer von Unalascha.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 338. n. 145. *der Ammer von Unalascha.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 198. n. 47. *der Sandwichische Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 414. n. 55. Emberiza (Arctica) fusca, subtus albida fusco-striata, sub oculis striga nigra, superciliis flavis.

49. Unalaschcensis. *Der nordwestamerikanische Ammer.* (1)

Pennant, arct. Zool. II p. 339. n. 148. *der nordwestamerikanische Ammer.*

Latham,

(1) Nach *Latham* vielleicht eine Spielart vom vorigen. Cf. *Latham* Vögel, II. 1. p. 199. n. 48.

Latham, Syst. ornith. I. p. 415. n. 156. Emberiza (Aonalaschkensis) rufo-fusca, subtus albida fusco-striata, abdomine medio albo.

50. Atricapilla. *Der schwarzgescheitelte Ammer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 338. n. 146. *der Ammer mit schwarzem Scheitel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 194. n. 49. *der bekränzte Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 415. n. 57. Emberiza (Atricapilla) rufo-fusca, subtus cinerea, gula alba, vertice luteo, sincipite strigaque per oculos ad nucham nigris.

β. Emberiza pectore nigro nebuloso. *Lath.* Syn. Suppl. p. 159. — Syst. ornith. I. p. 415. n. 57. β. * — Vögel II. 1. p. 200.

51. Pithyornus. *Der sibirische Fichtenammer.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 256. n. 26. *der Rostbürzel.*

Büffon, Vögel, XII. p. 280. *der Ammer Pithyornus.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 200. n. 50. *der Fichten-Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 413. n. 50. Emberiza (Pithyornus) rufa, abdomine cano, striga verticis cana, lateribus nigro-marginata, macula genarum, temporum pectorisque alba.

Pallas, Reis. Ausz. II. p. 290. Anh. p. 12. n. 22. Emberiza *Pithyornus.*

52. Cinerea. *Der aschgraue Ammer.*

Onomat. hist. nat. III. p. 772. *der Emmerlingsvogel von Canada.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 339. n. 149. *der aschgraue Ammer;* tab. 17. ob. Fig.

Brisson, ornith. I. p. 391. n. 11. Bruant de Canada.

Büffon, Vögel, XII. p. 271. *der röthliche und blaue Ammer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 159. Cinereous Bunting.

Latham, Vögel, II. 1. p. 201. n. 51. *der aschgraue Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 415. n. 58. Emberiza (Cinerea) griſeſcens, fuſco caſtaneoque varia, ſubtus albida, caſtaneo-maculata, tectricibus caudae rufo-albidis, remigibus rectricibusque fuſcis.

Martini, Naturlex. II. p. 376. *die canadische Ammer.*

53. Caerulea. *Der himmelblaue Ammer.*

Onomat. hist. nat. III. p. 773. *der himmelblaue Emmerlings-Vogel von Canada.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 339. n. 151. *der blaue Ammer.*

Brisson, ornith. I. p. 391. n. 12. Bruant bleu de Canada.

Büffon, Vögel, XII. p. 269. *der kanadische Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 201. n. 52. *der blaue Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 415. n. 59. Emberiza (Caerulea) caerulea rufo-varia, ſubtus dilutior, vertice rufo, tectricibus alarum maioribus, remigibus caudaque fuſcis.

Martini, Naturlex. II. p. 377. *der kanadische himmelblane Ammer.*

54. Cyanea. *Der Indigoammer.*

Müller, Naturſyst. II. p. 574. n. 6. *die blaue Merle.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 427. *der blaue Hänfling aus Carolina.*

Pennant,

Pennant, arct. Zool. II. p. 340. n. 152. *der Indigo-Ammer; Indigo-Vogel.*

Klein, av. p. 97. n. 8. Fringilla caerulea.

Klein, Vorbereit. p. 181. n. 8. *blauer Dieſtelfinke.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 97. n. 8. *blauer Dieſtelfinke.*

Briſſon, ornith. I. p. 307. n. 6. Tanagra bleu de la Caroline.

Büffon, Vögel, p. 54. *der Miniſter, oder Blauhänfling;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 202. n. 53. *der Indigo-Ammer.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 515. n. 60. Emberiza (Cyanea) cyanea, vertice ſaturatiore, remigibus rectricibusque fuſcis caeruleo-marginatis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 90. *der blaue Hänfling.*

8. QUELEA. *Der rothſchnäblige ſenegaliſche Ammer.* (2)

Müller, Naturſyſt. II. p. 564. n. 8. *der indianiſche Ammer.*

Onomat. hiſt. nat. VI. p. 206. *der Indianiſche Ammer.*

Briſſon, ornith. I. p. 337. n. 19. Moineau à bec rouge du Sénegal.

Büffon, Vögel, X. p. 153. *der rothſchnäblige ſenegaliſche Sperling.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 187. n. 28. *der Ammer mit ſchwarzem Geſichte.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 409. n. 31. Emberiza (Quelea) griſea, fronte nigra, roſtro coccineo.

β. *Büffon*,

(2) *Latham* rechnet hieher auch *Briſſ. Paſſer erythrorhynchos Capitis bonae ſpei*, ornith. I. p. 337. n. 18. und hält ihn für das Weibchen.

β. *Büffon*, Vögel, X. p. 151. *der senegalische Sperling?*

Latham, Syn. II. 1. p. 193. n. 28. A. — Vögel, II. 1 p. 188. n. 28. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 409. n. 31. β. Emberiza rufo-rubra, supra fusco nigricante variegata, facie gulaque nigra.

55. Tetrix. *Der Weberammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 188. n. 29. *der Weber-Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 409. n. 32. Emberiza (Tetrix) rufo-fusca, saturatiore varia, subtus flava, superciliis strigaque verticali flavis, pectore medio striga lata nigra.

56. Rubra. *Der Ammer von der Insel Frankreich.*

Büffon, Vögel, X. p. 152. *die Sperlinge von Isle de France;* m. 2. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 189. n. 30. *der karmoisinrothe Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 409. n. 33. Emberiza (Rubra) coccinea, cervice dorsoque olivaceo nigroque variegatis, strigis coccineis sparsis, abdomine cinereo, remigibus rectricibusque nigris.

9. Capensis. *Der capsche Ammer.*

Müller, Natursyst. II. p. 565. n. 9. *der capsche Ammer.*

Brisson, ornith. I. p. 287. n. 7. Ortolan du cap de bonne espérance.

Büffon, Vögel, XII. p. 171. *der capsche Ortolan;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 180. n. 23. *der Capsche Ammer.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 407. n. 28. Emberiza (Capensis) nigro rufescenteque varia, subtus grisea, gula albida, fascia oculari maxillarumque nigricante.

Martini, Naturlex. II. p. 377. *capsche Ammer.*

β. *Büffon*, Vögel, XII. p. 169. *der gelbbäuchigte Ortolan vom Vorgebürge der guten Hoffnung.*

Latham, Syn. II. 1. p. 186. n. 23. A. — Vögel, II. 1. p. 180. n. 23. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 407. n. 28. β. Emberiza supra varia, subtus flava, lateribus capitis strigis tribus nigris in maculam ad nucham coeuntibus.

γ. *Büffon*, Vögel, XII. p. 169. das Weibchen; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 186. n. 23. C. — Vögel, II. 1. p. 181. n. 23. B.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 407. n. 28. γ. Emberiza supra varia, subtus alba, striga maxillari duplici, medio alarum longitudinaliter rufo.

δ. *Büffon*, Vögel, XII. p. 273. *der kayennische Ammer;* (Bonjour-Commendeur) m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 187. n. 23. D. — Vögel, II. 1. p. 181. n. 23. C.

Latham, Syst. ornith. I. p. 408. n. 28. δ. Emberiza supra varia, subtus alba, vertice griseo nigroque vario, striga pone oculos maxillarique nigra, pectore cinerascente.

57. FUSCA. *Der bandirte Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 181. n. 24. *der streifschwänzige Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 408. n. 29. Emberiza (Fasciata) fusco-nebulosa, subtus alba, naribus

gula,

gula genisque fasciculis plumosis, remigibus caudaque fuscis, saturatiore fasciatis.

10. LUDOVICIA. *Der louisianische Ammer.*

Müller, Natursyst. II. p. 565. n. 10. *der louisianische Ammer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 397. n. 143. *der Ammer von Louisiana.*

Onomat. histor. natur. III. p. 780. *der Emmerling aus Ludovicien.*

Brisson, ornithol. I. p. 386. n. 6. Ortolan de la Louisiane.

Büffon, Vögel, XII. p. 167. *der Louisianische Ortolan;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 174. n. 13. *der Louisianische Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 404. n. 18. Emberiza (Ludovicia) grisea, subtus pallida, pectore rufo, capite supra arcu nigro.

Martini, Naturlex. II. p. 380. *Ammer aus Louisiana.*

11. CIA. *Der Zipammer.*

Müller, Natursyst. II. p. 565. n. 11. *der Zipammer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 150. n. 6. *der Zipammer; Wiesenammer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 526. n. 5. *der Zipammer.*

Ebert, Naturl. II. p. 135. *der Zipammer.*

Onomat. histor. natur. III. p. 781. *die Wiesenemmeritze.*

Gesner, Vögelb. p. 476. *Wiesenmertz; Ceppa;* m. e. Fig.

Brisson, ornith. I. p. 383. n. 3. Bruant de Pré.

Büffon,

Büffon, Vögel, XII. p. 230. *der Zipammer*; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 347. *der Zipammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 186. n. 27. *der Zipammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 402. n. 11. Emberiza (Cia) rufescens, capite lineis nigricantibus sparsis, superciliis albis.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 113. n. 4. *die Zippammer.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 146. *Barthemmerling.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 740. *die Zipammer.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 173. n. 210. *der Emmerling mit schwarzem Bart.*

Martini, Naturlex. II. p. 397. *Wiesenammer; Wiesenemmeritz.*

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 14. Emberiza pratensis.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 386. Hortulanus cinereus, species tertia Aldrovandi; germ. *Knipper.*

Kramer, Austr. p. 371. n. 3. *Steinemmerling; grauköpfige Wiesen-Ammering.*

Jonston, av. p. 97. Emberiza pratensis, p. 96. Passeribus congener.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 365. n. 12. *der Zipammer.*

12. CIRLUS. *Der Zirlammer.*

Müller, Natursyst. II. p. 566. *der gefleckte Ammer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 527. n. 7. Emberiza Elaeathorax. *Zaunammer.*

Halle, Vögel, p. 387. n. 389. *der braunfalbe Ammer, mit gelbem Unterleibe; Zirlammer; Pfeifammer.*

Onomat.

Onomat. hist. nat. III. p. 782. *die Zaunemmeritze.*

Klein, av. p. 91. n. 3. Emberiza s. Cirlus.

Klein, Vorbereit. p. 170. n. 3. *Zirlammer.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 93. n. 3. *Zirlammer.*

Brisson, ornithol. I. p. 383. Bruant de haye.

Büffon, Vögel, XII. p. 223. *der Zirlus oder Zizi;* m. 2 Figg. M. u. W.

Batsch, Thiere, I. p. 347. *der Cirlus.*

Latham, Vögel, II. 1. p 184. n. 26. *der Zaunammer.* (In der Note hat *Bechstein* über diese Gattung viel merkwürdiges gesagt.)

Latham, Syst. ornithol. I. p. 401. n. 10. Emberiza (Cirlus) supra varia, subtus lutea, pectore maculato, superciliis luteis, rectricibus duabus extimis macula alba cuneata.

Martini, Naturlex. II. p. 369. *gefleckte Ammer, Heckenammer, weißfleckige Ammer.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 740. *die Zirlammer.*

Belon, hist. nat. des ois. p. 365. Verdier de haie.

Jonston, av. p. 101. Luteae primum genus.

Diction. des anim. II. p. 290. Bruant tacheté. Zivalo.

Roman. ornith. I. p. 114. tab. 17. Fig. 2.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 363. n. 7. *der Zirlus.*

13. Familiaris. *Der gesellige Ammer.*

Müller, Natursyst. II. p. 566. n. 13. *der asiatische Ammer.*

Onomat. hist. nat. III. p. 775. *der Haus-Emmerling.*

Büffon, Vögel, XII. p. 267. *der gesellige Ammer.*

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 189. n. 31. *der gesellige Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 410. n. 35. Emberiza (Familiaris) cinerea griseo-maculata, apicibus rectricum albis, dorso postico flavo.

Martini, Naturlex. II. p. 360. *Hausammer; Hausämmerling.*

Osbeck, Reis. n. Chin. p. 134.

14. Flaveola. *Der Ammer mit gelbem Gesichte.*

Müller, Natursyst. II. p. 566. n. 14. *der Gelbling.*

Onomat. hist. nat. III. p. 776. *der gelblichte Emmerling.*

Büffon, Vögel, XII. p. 257. *der gelbliche Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 190. n. 32. *der Ammer mit gelbem Gesichte.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 410. n. 36. Emberiza (Flaveola) grisea, facie (*fastia* ist wohl ein Druckfehler) flava.

Martini, Naturlex. II. p. 370. *gelbliche Ammer.*

15. Amazona. *Der Amazonenammer.*

Müller, Natursyst. II. p. 566. n. 15. *die Amazone.*

Büffon, Vögel, XII. p. 261. *der Amazonen-Ammer.*

Martini, Naturlex. II. p. 360. *Amazonen-Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 190. n. 33. *der Amazonen Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 410. n. 37. Emberiza (Amazona) fusca, vertice fulvo, crisso albido.

16. Oryzivora. *Der Reisammer.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 567. n. 16. *der Reisdieb.*

Halle,

(3) Merkwürdig ist es, dass, wie *Pennant* sagt, unter den Myriaden dieser Vögel, die im September nach Carolina ziehen, kein einziges Männchen angetroffen wird.

Halle, Vögel, p. 389. n. 394. *der Reisortulan.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 405. n. 341. *der Reißdieb.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 335. n. 141. *der Reisammer.*

Onomat. hist. nat. III. p. 778. *der carolinische Ortolan, Reisvogel.*

Klein, av. p. 92. n. 6. Emberiza Carolinensis. cf. p. 163. n. 5.

Klein, Vorbereit. p. 171. n. 6. *Reisammer; karolinischer Fettammer.* cf. p. 301. n. 5.

Klein, verb. Vögelhist. p. 93. n. 8. *Reisammer.*

Brisson, ornith. I. p. 387. n. 8. Ortolan de la Caroline.

Büffon, Vögel, XII. p. 200. *der Reisammer;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 347. *der Reisammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 182. n. 25. *der Reis-Ammer.* (p. 183. *Bob Lincoln; Conquendle.*)

Latham, Syst. ornith. I. p. 408. n. 30. Emberiza (Orizivora) fusca, cervice rufescente, abdomine nigro, rectricibus mucronatis.

Seligmann, Vögel, I. tab. 28. *der carolinische Ortolan oder Reisvogel.*

Seligmann, Vögel, IX. tab. 81. *der carolinische Emmerling.*

Martini, Naturlex. II. p. 385. *Reißammer.*

Bartram, Reis. durch Carolina, p. 295. *der Reißvogel.*

Linné, Abhandl. II. p. 281. n. 16. *Reisfink.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 739. *die Reißammer.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 179. n. 1. Fringilla (Oryzivora) fusca, cervice fulva, macula alarum dorsoque postico albis.

Amoenit. academ. IV. p. 576. Fringilla oryzivora.

Hermann,

Hermann, tab. affin. anim. p. 222. Emberiza oryzivora.

Donndorff, Handb. d. Thiergeschich. p. 363. n. 8. *der Reisammer.*

β. *Der louisianische Reisammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 204. *der louisianische Reißammer;* m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 189. n. 25. Var. A. — Vögel, II. 1. p. 183. n. 25. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 408. n. 30. β. Emberiza fusco-olivacea, subtus flavescens, uropygio flavo fusco transversim lineato, tectricibus alarum maioribus remigibusque nigris albo-marginatis.

17. Schoeniclus. *Der Rohrammer.*

Müller, Natursyst. II. p. 567. n. 17. *der Rohrsperling.*

Leske, Naturgesch. I. p. 261. n. 4. *der Rohrsperling.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 151. *der Moosämmerling.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 524. n. 3. *der Rohrammer.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 591. *Rohrammer.*

Funke, Naturgesch. I. p. 236. *Rohrammer.*

Ebert, Naturl. II. p. 135. *Rohrsperling.*

Halle, Vögel, p. 305. *die Rohrdrossel.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 406. *Rohrammer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 342. E. *der rothe Ammer.*

Onomat. hist. nat. III. p. 777. *der capische Gärtner.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 130. *der Rohrsperling.*

Brisson, ornithol. I. p. 386. n. 5. Ortolan de roseau.

Büffon, Vögel, XII. p. 149. *der Rohrammer;* m. 2. Figg. M. u. W.

Gesner, Vögelb. p. 474. *Rohrspatz.*

Batsch, Thiere, I. p. 345. *der Rohrammer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 157. Reed-Bunting.

Latham, Vögel, II. 1. p. 170. n. 9. *der Rohrammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 402. n. 13. Emberiza (Schoeniclus) capite nigro, corpore griseo nigroque rectricibus extimis macula alba cuneiformi.

Beseke, Vögel Kurl. p. 78. n. 170. *der Rohrsperling.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 113. *die Rohrammer; Ruhrspaarling.*

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 425. *der Rohrsperling.*

Fischer, Livl. p. 98. n. 151. *Wassersperling.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 15. *der Rohrammer.*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 5. *Rörspurv.*

Naturforsch. XVII. p. 92. n. 186. *der Rohrsperling.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 348. n. 428. *Moß-*, oder *Rohrammerling.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 75. *Rohrsperling.*

Naumann, Vogelsteller, p. 72. *Schiebgen* oder *Rohrammer.*

Anweisung. Vögel zu fang. p. 174. *Moos-Emmerling.*

Martini, Naturlex. II. p. 387. *Rohrammer; Reitmaise.*

Pennant, britt. Thiergesch. p. 129. t. 58. f. 1. 2. *Rohrammer; Schilfschmätzer.*

Börner,

Börner, schlef. ökonom. Nachr. 1781. p. 102. Emberiza Schoeniclus.

Borkhausen, Magaz. I. p. 146. n. 12. *Rohrammer.*

Meidinger, Vorlesung. I. p. 149. n. 4. *der Rohrsperling.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 6. Schoeniclos.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 182. n. 26. Fringilla (Schoeniclus) rectricibus fuscis, extimis duabus macula alba cuneiformi, corpore griseo nigroque, capite nigro.

Kramer, Austr. p. 371. n. 5. *Rohrammering; Meerspatz.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 323. Passer arundinarius. *Rohrspatzlin; Rohrspar.*

Charleton, exercitat. p. 86. n. 7. Passer arundinaceus.

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 7. Passer Junco.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 406. Passer arundinarius.

Hist. prov. I. p. 494. Ortolan de roseaux.

Levin, britt. Birds, II. tab. 75.

Bomare, Diction. VI. p. 272. Ortolan de roseaux.

Hermann, tab. affin. anim. p. 222. Emberiza Schoeniclus.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 363. n. 9. *der Rohrsperling.*

β. *Latham*, Syn. III. p. 175. n. 9. Var. A. — Vögel, II. 1. p. 172. n. 9. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 403. n. 13. β. Emberiza fusca, subtus cinerascens, capite colloque nigricantibus, rectricibus duabus extimis toto, tertia a medio ad apicem albis.

58. ARUNDINACEA. *Der astrachanische Rohrammer.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 213. n. 78. *der Schilfammer.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 403. n. 13. γ. Emberiza alba, remigibus obscuris, rectricum prima utrinque alba, secunda albo nigroque dimidiata, cauda aequali.

59. PROVINCIALIS. *Der Gavotte.* (*)
Büffon, Vögel, XII. p. 160. *der Gavotte aus der Provence; Gavoué, der bärtige Chic;* m. e. Fig.
Latham, Vögel, II. 1. p. 172. n. 10. *der Bart-Ammer.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 403. n. 15. Emberiza (Provincialis) griseo nigroque varia, subtus maculaque alarum alba, macula suboculari fasciaque maxillari nigris.
Hist. Prov. I. p. 494.

60. LESBIA. *Der lesbische Ammer.*
Büffon, Vögel, XII. p. 162. *der Chic oder Mitilene;* m. e. Fig.
Latham, Vögel, II. 1. p. 172. n. 11. *der Lesbische Ammer.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 404. n. 16. Emberiza (Lesbia) griseo nigroque varia, subtus orbitisque alba, sub oculis albo nigroque ter striata, rectricibus lateralibus partim albis.
Hist. Prov. I. p. 494.
Hermann, tab. affin. anim. p. 222. Emberiza Mytilene.

61. LOTHARINGICA. *Der lothringische Ammer.*
Büffon, Vögel, XII. p. 164. *der Lothringische Ortolan;* m. 2. Figg. M. u. W.

Latham,

(*) Nach *Bechstein* eine junge *Cia.* s. N. G. Deutschl. III. p. 592. — Cf. *Latham*, Vögel, l. c. not. p.

Latham, Vögel, II. 1. p. 173. n. 12. *der Lothringische Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 404. n. 17. Emberiza (Lotharingica) nigro-maculata, supra rufa, subtus cinerascens, striga per oculos maxillaeque inferioris nigra, rectricibus lateralibus albo nigroque variis.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 528. n. 8. Emberiza fusciceps? *der Bergammer; braunköpfige Ammer?*

18. PSITTACEA. *Der Papageyammer.*

Müller, Natursyst. II. p. 568. n. 18. *der Papageyammer.*

Klein, av. p. 94. n. 8. Linaria cauda longa.

Klein, Vorbereit. p. 175. n. 8. *langgeschwänzter Hänfling aus Brasilien.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 100. *langgeschwänzter Hänfling.*

Brisson, ornith. I. p. 347. n. 35. Linotte à longue queue du Brésil.

Büffon, Vögel, XI. p. 219. *die braune Wittwe.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 174. n. 14. *der Papageyammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 404. n. 19. Emberiza (Psittacea) cinereo-fusca, alis fulvis, rectricibus duabus longissimis.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 178. n. 11 Emberiza (Psittacea) cinereo-fusca, alis fulvis, rectricibus duabus longissimis.

19. PARADISAEA. *Die Wittwe.* (4)

Müller, Natursyst. II. p. 568. n. 19. *der Paradiesammer;* tab. 21. Fig. 4.

(4) Der Name *Wittwe*, der dieser und noch einigen andern hieher gehörigen Gattungen gegeben wird, und der theils der schwarzen

Borowsky, Thierreich, III. p. 146. n. 1. *der Paradiesammer;* tab. 63. Fig. 1. u. 2.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 185. n. 5. Emberiza (Paradisaea) fusca, pectore rubro, rectricibus intermediis quatuor elongatis acuminatis, duabus longissimis, rostro rubro.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 529. n. 10. *der Paradiesammer.*

Halle, Vögel, p. 381. c. *der Schwanzsperling mit karminrother Brust.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 198. *der Indianische Schwanzsperling.*

Klein, av. p. 90. n. 22. Passer cauda longissima et mutabili.

Klein, Vorbereit. p. 169. n. 22. *Sperling mit sehr langem und veränderlichem Schwanze.*

Klein, verb. Vögelh. p. 92. *längstgeschwänzter Sperling.*

Brisson, ornith. I. p. 340. n. 25. Veuve.

Büffon, XI. p. 198. *die Wittwe mit dem goldenen Halsbande;* m. 2. Figg. im Sommer- u. Winterkleide.

Batsch, Thiere, I. p. 348. *Wittwen; Widhavogel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 175. n. 15. *der Paradies-Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 405. n. 20. Emberiza (Paradisaea) fusca, pectore rubro, rectricibus inter-

zen Farbe, theils des schleppenden Schwanzes wegen, für diese Vögel schicklich zu seyn scheint, ist ihnen aus einem Irrthum beygelegt worden; denn die Portugiesen haben sie *Vögel aus Whidha* (welches eigentlich das Königreich Juida ist, aber doch mit dem portugiesischen Worte, welches eine Wittwe bedeutet, viel Aehnlichkeit hat) genennet, weil sie auf dieser afrikanischen Küste sehr gemein sind. S. Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 632.

intermediis quatuor elongatis acuminatis, duabus longissimis, rostro nigro.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 67. *der rothbrüstige langgeschwänzte Fink.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 177. n. 216. *der langgeschwänzte Emmerling.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 632. *die Wittwe mit dem goldnen Halsbande.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 178. n. 12. Emberiza (Paradisaea) fusca, pectore rubro, rectricibus duabus longioribus acuminatis, intermediis duabus longissimis.

Jonston, av. p. 96. Passer indicus macrourus alius.

20. Serena. *Die Dominicanerwittwe.*

Müller, Natursyst. II. p. 569. n. 20. *der Langschwanz.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 748. *der Ammer mit keilförmigem langen Schwanz.*

Brisson, ornith. I. p. 341. n. 26 petite veuve.

Büffon, Vögel, XI. p. 205. *die Dominikanerwittwe;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 176. n. 16. *der Dominikaner-Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 405. n. 21. Emberiza (Serena) pileo nigro, vertice rubro, cauda cuneiformi, rectricibus duabus intermediis longissimis, pedibus griseis.

21. Vidua. *Die große Wittwe.*

Müller, Natursyst. II. p. 569. n. 20. *die Wittwe.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 203. *langgeschwänzter Sperling.*

Brisson, ornithol. I. p. 342. n. 27. grande veuve.

Büffon, Vögel, XI. p. 208. *die große Wittwe.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 176. n. 17. *der lang-schwänzige Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 405. n. 22. Emberiza (Vidua) nigricans, subtus albida, rectricibus intermediis quatuor elongatis acuminatis, duabus longissimis, rostro rubro.

Charleton, exercitat. p. 87. Passer indicus *macrourus.*

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 13. Passer indicus *macrourus.*

Petiv. gazophyl. tab. 55. Fig. 1. Passer indicus cauda longissima?

Jonston, av. p. 96. Passer indicus Macrourus rostro miniaceo.

22. Principalis. *Die gesprenkelte Wittwe.*

Müller, Natursyst. II. p. 570. n. 23. *der bunte Ammer.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 747. *der bunte Ammer.*

Brisson, ornithol. I. p. 368. n. 70. Veuve d'Angola.

Büffon, Vögel, XI. p. 213. *die gesprenkelte Wittwe;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 177. n. 18. *der gesprenkelte Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 406. n. 23. Emberiza (Principalis) variegata, pectore rufo, rectricibus mediis quatuor longissimis, rostro pedibusque rubris.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 60. *der Sperling mit dem langen Schwanz.*

23. Regia. *Der Königsammer.*

Müller, Natursyst. II. p. 570. n. 23. *der Königsammer;* m. e. Fig.

Onomat.

Onomat. hist. nat. VII. p. 749. *der Königsammer.*

Brisson, ornith. I. p. 342. n. 28. Veuve de la côte d'Afrique.

Büffon, Vögel, XI. p. 203. *die Wittwe mit vier Fäden;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 178. n. 19. *der Königsammer, oder die schaftschwänzige Wittwe.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 406. n. 24. Emberiza (Regia) rectricibus intermediis quatuor longissimis aequalibus, apice tantum pennatis, rostro rubro.

62. Longicauda. *Der gelbschulterige Ammer.*

Büffon, Vögel, XI. p. 211. *die Wittwe mit Achselbändern;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 179. n. 20. *der gelbschulterige Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 406. n. 25. Emberiza (Longicauda) nigra, humeris fulvis albo marginatis, rectricibus elongatis, sex intermediis longissimis.

63. Panayensis. *Der Ammer von Panay.*

Büffon, Vögel, XI. p. 217. *die Wittwe mit der feuerrothen Brust.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 179. n. 21. *der Panayische Ammer, oder die Wittwe mit dem Feuerzeichen.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 407. n. 26. Emberiza (Panayensis) nigra, macula pectoris coccinea, rectricibus quatuor intermediis longissimis aequalibus acuminatis.

Sonnerat, Reis. nach Neuguinea, p. 42. *die Wittwe der Insel Panai.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 633. *die rothbrüstige Wittwe.*

64. Angolensis. *Der angolische Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 179. n. 22. *der Angolische Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 407. n. 27. Emberiza (Angolensis) nigra, capite superiore colloque flavis, cauda elongata.

24. Ciris. *Der gemahlte Ammer.*

Müller, Natursyst. II. p. 570. n. 24. *der Pabstvogel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 337. n. 142. *der gemahlte Ammer.* Mariposa pintada (Span.)

Onomat. histor. natur. III. p. 773. *der dreyköpfige* (mag wohl *dreyfarbige* heissen sollen) *Diestelfink.*

Klein, av. p. 97. n. 7. Fringilla tricolor.

Klein, Vorbereit. p. 180. n. 7. *blauköpfiger Diestelfinke.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 97. n. 7. *blauköpfiger Diestelfink.*

Klein, av. p. 98. n. 13. Fringilla purpurea.

Klein, Vorbereit. p. 182. n. 13. *Kardinälchen.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 98. n. 13. *Cardinalchen.*

Brisson, ornithol. I. p. 362. n. 58. Verdier de la Louisiane, dit vulgairement Pape.

Büffon, Vögel, XI. p. 238. *der Pabst, oder blauköpfige Diestelfink;* m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Syn. Suppl. p. 159. Painted Bunting.

Latham, Vögel, II. 1. p. 203. n. 54. *der gemahlte Ammer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 416. n. 61. Emberiza (Ciris) capite caeruleo, abdomine fulvo, dorso viridi, pennis viridi-fuscis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 88. *der dreyfarbige Fink.*

Selig-

Seligmann, Vögel, V. tab. 25. *der gemahlte Vogel.*

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 63. *der gemahlte Fink; ein Er und eine Sie.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 184. n. 222. *amerikanischer Fink; Mariposa.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 633. *der blauköpfige Diestelfink.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 179. n. 13. Emberiza (Ciris) capite caeruleo, abdomine fulvo, dorso viridi, pennis viridi-fuscis.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 364. n. 11. *der gemahlte Ammer.*

65. QUADRICOLOR. *Der vierfarbige Ammer.*

Büffon, Vögel, X. p. 105. *der vierfarbige Kernbeisser.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 205. n. 55. *der Ammer mit rothem Steisse.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 417. n. 63. Emberiza (Quadricolor) viridis, capite colloque caeruleis, cauda cum tectricibus abdomineque superiore rubris, pectore abdomineque infimo fuscentibus.

66. CYANOPIS. *Der Ammer mit blauem Gesichte.*

Brisson, ornith. I. p. 361. n. 57. Verdier de Java.

Büffon, Vögel, XI. p. 247. *der javanische Grünfink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 205. n. 56. *der Ammer mit blauem Gesichte.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 417. n. 64. Emberiza (Cyanopis) viridis, subtus, dorso infimo uropygioque rufa, fronte, genis gulaque caeruleis, tectricibus caudae abdomineque medio rubris.

67. Viridis. *Der grüne Ammer.*

Brisson, ornith. I. p. 361. n. 56. petit Verdier des Indes.

Büffon, Vögel, XI. p. 249. *der kleine indianische Grünfink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 206. n. 57. *der grüne Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 417. n. 65. Emberiza (Viridis) viridis subtus alba, remigibus caudaque caeruleis.

Jonston, av. p. 101. Chloris indica.

68. Platensis. *Der fünffarbige Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 262. *der fünffarbige Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 206. n. 58. *der Ammer vom Platastrom.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 417. n. 66. Emberiza (Platensis) fusco-virescens, subtus cinereo-alba, dorso nigro-maculato, oris alarum extus, remigibus rectricibusque flavo-marginatis.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 742. *der fünffarbige Ammer.*

69. Borbonica. *Der Mordoré-Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 264. *der Mordoré-Ammer.*

Latham, Syn. II. 1. p. 210. n. 59. Bourbon Bunting.

Latham, Vögel, II. 1. p. 207. n. 59. *der Bourbonische Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 418. n. 67. Emberiza (Borbonica) rufo-rubra, alis caudaque fusco-rubris.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 742. *der mordorefarbene Ammer.*

70. CALFAT. *Der Calfat-Ammer.*

Büffon, Vögel, XII. p. 276. *der Calfat-Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 207. n. 60. *der Calfat-Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 418. n. 68. Emberiza (Calfat) cinerascens, capite gulaque nigris, pectore abdomineque vinaceis, regione oculorum nuda rosea, lateribus capitis fascia alba.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 742. *der Calfat.*

71. CHLOROCEPHALA. *Der gelbköpfige Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 207. n. 61. *der grauköpfige Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 418. n. 69. Emberiza (Tunstalli) fusca, dorso tectricibusque alarum nigro variegatis, capite colloque viridi-olivaceis, cauda bifurca.

72. GRISEA. *Der Gonambuch-Ammer.*

Brisson, ornith. I. p. 393. n. 15. Bruant de Surinam.

Büffon, Vögel, XII. p. 265. *der Gonambuch-Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 208. n. 62. *der graue Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 418. n. 70. Emberiza (Grisea) grisea, tectricibus alarum pectoreque rubro variegatis.

Martini, Naturlex. II. p. 396. *die surinamische Ammer.*

73. SURINAMENSIS. *Der surinamische Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 208. n. 63. *der Surinamische Ammer.*

Latham.

Latham, Syst. ornith. I. p. 418. n. 71. Emberiza (Surinamensis) supra fusco-nebulosa, subtus flavescens, pectore nigro maculato.

Fermin, Surin. II. p. 183. *der Hirsenvogel.*

74. Cyanella. *Der Blauammer.* (5)

Latham, Vögel, II. 1. p. 202. n. 5. *der bläuliche Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 416. n. 60. β. Emberiza caerulea-nitens, interscapuliis humerisque ex caeruleo ferrugineoque variis, remigibus rectricibusque fuscis, margine caerulescentibus.

75. Ruficapilla. *Der rothgescheitelte Ammer.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 212. n. 74. *der rothkappige Ammer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 438. n. 14. Fringilla (Ruficapilla) corpore supra fusco, subtus cinereo, gula ferruginea, capistro albo, capillitio insuper rufescente, cauda nigra.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 309. n. 7. Emberiza Orix.	p. 863. n. 42. Loxia Orix.

Das Geschlecht ist überhaupt mit 51. Gattungen vermehrt. Da aber zwey derselben, die 44te und 54te aus andern Geschlechtern hieher versetzt sind, und die 7te der XIIten Edition durch eine neue ersetzt worden, so beläuft sich die Anzahl der neu hinzugekommenen Gattungen auf *funfzig.* — Bey der 1sten Gattung sind *vier*, bey der 4ten *fünf*, bey der 8ten *zwey*, bey der 9ten

(5) Nach *Latham* eine Varietät von *Emberiza Cyanea.*

9ten *vier*, bey der 16ten *zwey*, bey der 17ten *zwey* Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der gelbflüglige Ammer, von den Falklands-Inseln.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 401. n. 9. Emberiza (Chrysoptera) rufo-fusca, subtus alba, pectore tectricibusque alarum minoribus flavis, iugulo fascia fusca.

2. *Der graue chinesische Ammer.*

Amoenit. acad. IV. p. 2.5 n. 20. Emberiza mixta.
Latham, Vögel, II. 1. p. 209 n. 66. *der gemischte Ammer.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 416. n. 62. Emberiza (Mixta) grisea, pectore gulaque caeruleis, abdomine albo.

An distincta species?

3. *Der asiatische Ammer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 160. Gaur Bunting.
Latham, Vögel, II. 1. p. 209. n. 64. *der Gaur-Ammer.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 419. n. 72. Emberiza (Asiatica) cinerea, alis caudaque fuscis.

III. GESCHLECHT. TANAGRA. *Der Tanager.* (Merle.)

Müller, Natursyst. II. p. 572. Gen. CXI.
Leske, Naturgesch. p. 262. Gen. XLIII.
Borowsky, Thierreich, III. p. 173. Gen. LXIX.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 163. Gen. XXXIII.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 506. Gen. LXVIII.
Pennant, arct. Zool. II. p. 343.

Onomat. hist. nat. VII. p. 424.
Brisson, ornith. I. p. 304. Gen. XXXI.
Büffon, Vögel, XII. p. 5. sqq.
Latham, Vögel, II. 1. p. 214. Gen. XXXVI.
Latham, Syst. ornith. I. p. 419. Gen. XXXVII.
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 633. u. 734.
Hermann, tab. affin. anim. p. 214.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 365. Gen. LXXIX.

1. Jacapa. *Der Silberschnabel.*

Müller, Natursyst. II. p. 572. n. 1. *die schwarze Merle.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 186. n. 1. Tanagra (Jacapa) atra, fronte, iugulo pectoreque coccineis.

Onomat. hist. nat. II. p. 827. *Chichiltototl.*

Brisson, ornithol. I. p. 317. n. 29. Cardinal pourpré.

Büffon, Vögel, XII. p. 38. *der Silberschnabel;* m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Vögel, II. 1. p. 214. n. 1. *die rothbrüstige Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 419. n. 1. Tanagra (Jacapa) atra, fronte, iugulo pectoreque coccineis.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 57. *die Amsel mit rother Brust.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 637. *der Silberschnabel.*

Fernand. hist. nov. Hisp. p. 51. Chichiltototl Tepuzcullulae.

Salerne, ornithol. p. 271. Cardinal pourpre-foncé.

Gerin. ornithol. n. 279. Passer indicus capite et pectore vinaceo.

Ornithol. ital. Floren. 1771. p. 69. n. 334. Avis americana cardinalis niger dicta, brachyura, capite et inferna corporis parte vinacea.

Hermann, tab. affin. anim. p. 214. Tanagra Jacapa.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 365. n. 1. *der Silberschnabel.*

2. Brasilia. *Der scharlachfarbige Tanager.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 573. n. 2. *die scharlachfarbige Merle.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 174. n. 2. *die scharlachfarbne Merle.*

Onomat. hist. nat. II. p. 829. *Chiltototl*, VII. p. 426. *rothe brasilianische Amsel.*

Brisson, ornith. I. p. 315. n. 24. Cardinal.

Büffon, Vögel, p. 16. *der scharlachfarbigte Tanagra*; m. 2. Figg. p. 18. *der rothe Sperling ohne Schwanz.* — ibid. *der rothe Sperling mit dem Schwanz.* p. 19. *der Tijepiranga des Marcgrav; der Chiltototl des Fernandez; die brasilianische Amsel des Belon.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 215. n. 2. *die Brasilische Merle*

Latham, Syst. ornith. I. p. 420. n. 2. Tanagra (Brasilia) coccinea, alis caudaque nigris.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 637. *der Scharlachfarbne Tanagra.*

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 3. Passer indicus sine uropygio. n. 4. Passer indicus porphyromelanus.

Charleton, onom. zoic. p. 84. n. 6. Merula brasiliensis Bellonii.

Jonston, av. p. 96. Passer sine uropygio erythromelanus.

(6) Ist nicht mit *Tanagra brasiliensis* p. 895. n. 15. zu verwechseln.

Jonston, av. p. 97. Paſſer porphyromelanus.
Jonston, av. p. 107. Merula braſilica.
Piſon, hiſt. nat. Braſ. p. 94. Tijepiranga?

β. *Briſſon*, ornith. I. p. 315. n. 25. Cardinal tacheté. (7)
Büffon, Vögel, XII. p. 21. *der gefleckte Cardinal.*
Latham, Syn. II. 1. p. 216 n. 2. Var. A. — Vögel, II. 1. p. 216. n. 2. Var. A.
Latham, Syſt. ornith. I. p. 420. n. 2. β. Tanagra coccinea, pectore et dorſo ſupremo maculis lunatis vireſcentibus variegatis, alis caudaque nigris.
Aldrov. ornith. II. p. 629. Merula apus.
Charleton, onom. zoic. p. 84. n. 7. Merula indica, Apos dicta.
Jonston, av. p. 107. Merula indica Apos.

γ. *Briſſon*, ornith. I. p. 316. n. 26. Cardinal à collier. (8)
Büffon, Vögel, XII. p. 22. *der Cardinal mit dem Halsbande.*
Latham, Syn. II. 1. p. 216. n. 2. Var. B. — Vögel, II. 1. p. 216. n. 2. Var. B.
Latham, Syſt. ornith. I. p. 420. n. 2. γ. Tanagra coccinea, maculis binis in utroque colli latere ſemilunaribus caeruleis, alis et cauda nigris, marginibus alarum caeruleis.
Aldrov. ornith. II. p. 569. Paſſer indicus ſine uropygio alius cyanerythromelas.
Raj. Syn. av. p. 87. n. 14. Paſſer indicus cyanerythromelas ſine uropygio Aldr.
Jonston, av. p. 96. Paſſer indicus ſine uropygio cyanerythromelanus.

3. Ru-

(7) Nach *Briſſon* eine eigne Gattung.
(8) Nach *Briſſon* eine eigne Gattung.

3. Rubra. *Der rothe Tanager.* (9)

Müller, Naturſyſt. II. p. 573. n. 3. *die rothe Merle.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 343. n. 154. *der Canadiſche Tanager.*

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 432. *die rothe Ammer aus Canada.*

Briſſon, ornith. I. p. 316. n. 28. Cardinal de Canada.

Büffon, Vögel, XII. p. 25. *der canadiſche Tanagra;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 216. n. 3. *die rothe Merle.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 420. n. 3. Tanagra (Rubra) rubra, alis caudaque nigris, rectricibus apice albis.

Charlevoix, nouv. France, III. p. 156.

Du Pratz, hiſt. de la Louiſ. II. p. 139.

Gemelli Carreri, voy. autour du monde, VI. p. 322.

β. *Seligmann*, Vögel, IX. tab. 33. *der Scharlachſperling.* (10)

Halle, Vögel, p. 403. n. 412. *der karminfarbne Kernbeiſſer, mit ſchwarzem Schwanz und Flügel.*

Büffon, Vögel, XII. p. 17. *der Scharlachrothe Sperling des Edwards.*

Latham, Syn. II. 1. p. 217. — *Latham*, Vögel, II. 1. p. 216. n. 3. Var. A.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 421. n. 3. β.

6. Olivacea. *Der olivenfarbige Tanager.*

Büffon, Vögel, XII. p. 54. *der olivenfarbigte Tanager.*

(9) Ein ſcheuer Vogel, der in Neuyork im May erſcheint, und im Auguſt zurück geht. Die Schwanzſpitzen ſind nicht allemal weiſs.

(10) Nach *Büffon* mit *Tanagra braſilica* n. 2. einerley.

Pennant, arct. Zool. II. p. 344. n. 155. *der olivenfarbige Tanager.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 217. n. 4. *die olivenfarbige Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 421. n. 4. Tanagra (Olivacea) viridi-olivacea, subtus alba, gula pectoreque luteis, remigibus rectricibusque fuscis.

23. Missisippensis. *Der missisippische Tanager.*

Büffon, Vögel, XII. p. 28. *der missisippische Tangara;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 217. n. 5. *die Missisippi-Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 421. n. 5. Tanagra (Missisippensis) tota rubra.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 637. *der Tangara aus Missisippi.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 214. Tanagra missisippica.

Donndorff, Handb. d. Thiergeschich. p. 366. n. 2. *der missisippische Tanager.*

β. *Latham*, Syst. ornith. I. p. 421. n. 6. Tanagra (Variegata) rubro virescenteque flavo variegata. (1)

Latham, Vögel, II. 1. p. 218. n. 5. Var. A. *die bunte Merle.* Tab. 47.

γ. *Brisson*, ornith. I. p. 316. n. 27. Cardinal du Mexique. (2)

Büffon, Vögel, XII. p. 23. *mexikanischer Vogel von Papagaifarbe.*

Latham,

(1) Nach *Latham* eine eigne Gattung. Auch rechnet derselbe die *Loxia Virginica* p. 840. nebst dem Synonym aus *Pennant* mit hieher.

(2) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

Latham, Syn. II. 1. p. 219. n. 5. Var. B. Mexican Tanager.

Latham, Vögel, II. 1. p. 218. n. 5. Var. B. *die Mexikanische Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 421. n. 5. β. Tanagra rubra, capite, alis caudaque amethystinis, cervice tectricibusque alarum viridibus, scapularibus flavis virescente marginatis.

Hernandez, hist. mex. p. 709. Avis Mexicana Psittaci colore.

25. Aestiva. *Der Sommertanager.*

Müller, Natursyst. II. p. 590. n. 8. *der rothe Fliegenfänger.*

Onomat. hist. nat. V. p. 372. *der rothe Fliegenfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 343. n. 153. *der Sommertanager.*

Klein, av. p. 97. n. 9. Fringilla rubra.

Klein, Vorbereit. p. 181. n. 9. *rother Finke.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 97. n. 9. *rother Fink*, p. 168. *Sommer Rothvogel.*

Brisson, ornithol. I. p. 277. n. 37. Gobe-mouche rouge de la Caroline.

Latham, Vögel, II. 1. p. 219. n. 6. *die Sommer-Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 422. n. 7. Tanagra (Aestiva) rubra, rostro flavescente, remigibus intus fuscis.

Seligmann, Vögel, III. tab. 12. *der rothe Fliegenstecher.*

Seligmann, Vögel, VII. tab. 29. *der rothe Sommervogel.*

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 19. *der rothe Sommervogel oder Fliegenstecher des Catesby.*

Schlözer, Erdbeschreib. von Amer. p. 283. *Roth-vögel.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 181. n. 13. Fringilla (Rubra) tota rubra.

26. MAGNA. *Der große Tanager.*

Büffon, Vögel, XII. p. 10. *der große Tangara*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 219. n. 7. *die große Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 422. n. 8. Tanagra (Magna) fusco-olivacea, fronte genisque caeruleis, striga maxillari nigra, gula crissoque rubris, superciliis maculaque gulae albis.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 637. *der große Tangara.*

4. JACARINA. *Der Jacarini.*

Müller, Natursystem, II. p. 570. n. 4. *der Gabelschwanz.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 455. *Jacarine.*

Brisson, ornith I p 311. Tangara noir du Brésil.

Büffon, Vögel, XII. p. 93. *der Jacarini.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 233. n. 34. *die Jacarini-Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 429. n. 32. Tanagra (Jacarina) atro-violacea, alis subtus albicantibus, cauda divaricata bifurca.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 96. *der Jacarini.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 734. *der Jacarini.*

Jonston, av. p. 205. Jacarini.

Hermann, tab. affin. anim. p. 167. 214. Tanagra Jacarina.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 366. *der Jacarini.*

5. VIO-

5. VIOLACEA. *Der Teitei.*

Müller, Naturfyst. II. p. 574. n. 5. *die violetfärbige Merle.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 173. n. 1. *die violetfärbigte Merle*, tab. 69.

Onomat. hist. nat. III. p. 981. *der violette Fink*, VII. p. 434. Tanagra violacea.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 506. *die violetfarbige Merle.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 191.

Brisson, ornith. I. p. 312. n. 18. Tangara noir et jaune du Brésil.

Büffon, Vögel, XII. p. 97. *der Teitei;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 234. n. 35. *die Gold-Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 429. n. 33. Tanagra (Violacea) violacea subtus et sincipite flavissima, remigibus intermediis rectricibusque lateralibus intus albis.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 53. *die Goldmeise.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 735. *der Teitei.*

De Laet, nov. orb. p. 557. Guranhae-engera.

Jonston, av. p. 106. *Teitei* Brasiliensibus; quam etiam vocant *Guiranhemgeta*, et *Guraundi.*

Salerne, ornithol. p. 290. Teitei.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 266. n. 4. *der Teitei.*

β. CHLOROTICA. *Der schwarz und gelbe Tanager.* (3)

Müller, Naturfyst. II. p. 578. n. 23. *die schwarzgelbe Merle.*

Brisson, ornithol. I. p. 213. n. 19. Tangara noir et jaune de Cayenne.

(3) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

Büffon, Vögel, XII. p. 99. 126. *cayennische Tangara; kleiner Ludwig.*

Latham, Syn. II. 1. p. 240. n. 35 Var. A.

Latham, Vögel, II. 1. p. 235. n. 35. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 430. n. 33. β. Tanagra nigra nitens, abdomine, pectore fronteque luteis, rectrice extima interius macula alba.

27. Caerulea. *Der blaue Tanager.* (4)

Büffon, Vögel, X. p. 174. *der blaue Sperling.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 427. n. 27. Tanagra (Caerulea) tota caerulea.

Latham, Vögel, II. 1. p. 230. n. 28. *die blaue Merle.*

7. Gyrola. *Der rothköpfige Tanager.*

Müller, Natursystem, II. p. 574. n. 7. *die grüne Merle.*

Halle, Vögel, p. 415. n. 430. *der grüngelbe Fink, mit rothem Kopfe und blauer Brust.*

Onomat. histor. natur. III. p. 976. *der rothköpfige Grünfink.*

Klein, av. p. 98. n. 12. Fringilla pectore caeruleo.

Klein, Vorbereitung, p. 182. n. 12. *blaubrüstiger Finke.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 97. n. 12. *blaubrüstiger Fink.*

Brisson, ornithol. I. p. 310. n. 13. Tangara vert du Perou.

Büffon, Vögel, XII. p. 80. *der grüne Tangara mit dem rothbraunen Kopfe;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 229. n. 27. *die rothköpfige Merle.*

Latham,

(4) *Büffon* scheint ihn für eine Spielart von *Tanagra Cayana* n. 8. zu halten.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 427. n. 26. Tanagra (Gyrola) viridis, capite rubro, collari flavo, pectore caeruleo.

Seligmann, Vögel, I. tab. 45. *der rothköpfige Fink*.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 639. *der Rouverdin*.

28. Variabilis. *Der veränderliche Tanager.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 230. n. 29. *die Schiller-Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 428. n. 28. Tanagra (Variabilis) viridis caeruleo fuscoque splendens, uropygio virescente, fascia per oculos nigra, remigibus rectricibusque nigricantibus.

29. Tricolor. *Der dreyfarbige Tanager.*

Brisson, ornithol. I. p. 318. n. 31. Tangara varié à tête verte de Cayenne.

Büffon, Vögel, XII. p. 65. *der dreyfarbige Tangara; gefleckte grünköpfigte kayennische Tangara;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 231. n. 30. *die grünköpfige Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 428. n. 29. Tanagra (Tricolor) viridis splendens, subtus viridi-flavescens, tectricibus alarum violaceis, capistro dorsoque superiore nigris, uropygio fulvo.

β. *Brisson*, ornithol. I. p. 319. n. 32. Tangara varié à tête bleue de Cayenne.

Büffon, Vögel, XII. p. 66. *gefleckte blauköpfigte Tangara;* m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 235. n. 30. Var. A. — *Latham*, Vögel, II. 1. p. 231. n. 30 Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 428. n. 29. β.

18. Gri-

18. GRISEA. *Der graue Tanager.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 344. n. 156. *der graue Tanager.*

Büffon, Vögel, XII. p. 67. *der graue und olivenfarbene Tangara:* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 232. n. 31. *die graue Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 428. n. 30. Tanagra (Grisea) olivaceo-grisea, subtus grisea, alis caudaque nigricantibus, griseo-marginatis.

8. CAYANA. *Der grüne cayennische Tanager.* (s)

Müller, Natursystem, II. p. 574. n. 8. *die gelbe Merle.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 427. *die grüne Ammer aus Cayenne.*

Brisson, ornithol. I. p. 309. n. 12. Tanagra vert de Cayenne.

Büffon, Vögel, X. p. 173. *der grüne Sperling;* m. e. Fig.

Büffon, Vögel, XII. p. 60. *der grüne kayennische Tangara;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 228. n. 26. *die Merle mit gelbrothem Kopfe.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 427. n. 25. Tanagra (Cayana) fulva, dorso viridi, pileo rufo, genis nigris.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 638. *der Passevert.*

β. *Büffon*, Vögel, XII. p. 64. *der grüne Tanagra mit blauem Kopfe.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 427. n. 25. β. Tanagra flava, dorso flavescente-viridi, capite caeruleo, alis caudaque viridibus.

Latham,

(s) Ist nicht mit *Tanagra cayanensis* p. 894. n. 14. zu verwechseln.

Latham, Syn. II. 1. p. 232. — *Latham*, Vögel, II. 1. p. 229. n. 26. Var. A.

9. Atrata. *Der glänzendschwarze Tanager.*

Müller, Natursystem, II. p. 575. n. 9. *der Köhler.*

Onomat. histor. natur. III. p. 772. *der schwarze Emmerling.*

Büffon, Vögel, XII. p. 123. *der glänzend schwarze Tangara.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 236. n. 38. *die schwarze Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 430. n. 35. Tanagra (Atrata) atra nitens, dorso subviolaceo.

10. Mexicana. *Der mexicanische Tanager.*

Müller, Natursyst. II. p. 575. n. 10. *die mexicanische Merle.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 430. *die mexikanische Ammer.*

Brisson, ornith. I. p. 305. n. 2. Tanagra bleu de Cayenne.

Büffon, Vögel, XII. p. 55. *der schwarz und blaue kayennische Tangara.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 227. n. 24. *die schwarz und blaue Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 426. n. 23. Tanagra (Mexicana) nigra subtus flavicans, pectore uropygioque caeruleis.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 40. *die schwarz und blaue Meise.*

β. *Brisson*, ornithol. I. p. 305. n. 3. Tangara bleu de Barbades. (6)

Büffon, Vögel, XII. p. 74. *der blaue weißbäuchigte Tangara.*

Latham,

(6) Nach *Brisson* und *Büffon* eine eigne Gattung.

Latham, Syn. II. 1. p. 231. n. 24. Var. A. — *Latham*, Vögel, II. 1. p. 228. n. 24. Var. A.

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 426. n. 23. β. Tanagra nigra ſubtus alba, capite, collo inferiore pectoreque caeruleis, tectricibus caudae caeruleis.

30. GUJANENSIS. *Der grüne guianiſche Tanager.*

Büffon, Vögel, XII. p. 59. *der grüne Tangara mit rothbrauner Stirne.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 228. n. 25. *die graukopfige Merle.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 427. n. 24. Tanagra (Guianenſis) viridis capite cinereo-cano, fronte faſciaque verticis duplici rufis.

31. TATAO. *Der Paradiestanager.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 575. *Paradiesmerle.*

Onomat. hiſtor. natur. VII. p. 433. *der bunte Paradiesfink.*

Briſſon, ornithol. I. p. 304. n. 1. Tangara.

Büffon, Vögel, XII. p. 65. *der ſiebenfärbige Tangara;* m. 2. Figg.

Latham, Vögel, II. 1. p. 232. n. 32. *die Paradies Merle.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 428. n. 31. Tanagra (Tatao) violacea, dorſo nigro, uropygio fulvo, capite viridi, pectore alisque violaceis.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 39. *Paradiesmeiſe.*

Samml. zur Phyſ. und N. G. II. p. 639. *der Septicolor.*

Jonſton, av. p. 209. Tangara prima Braſilienſibus.

Salerne, ornith. p. 250. Tangara de Cayenne?

31. Nigricollis. *Der schwarzkehlige Tanager.* (*)

Büffon, Vögel, XII. p. 76. *der schwarzkehlige Tangara;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 233. n. 33. *die schwarzkehlige Merle.*

12. Albirostris. *Der weißschnäblige Tanager.*

Müller, Natursyst. II. p. 575. *Weißschnabel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 425. *der Weißschnabel.*

Büffon, Vögel, XII. p. 121. *der weißschnäblichte Tangara.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 236. n. 39. *die weißschnäblige Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 430. n. 37. Tanagra (Albirostris) nigra, macula alarum basique caudae flavis, rostro albo.

β. *Müller*, Natursyst. II. p. 577. n. 18. *der Weißschnabel.*

13. Gularis. *Der purpurkehlige Tanager.*

Müller, Natursystem, II. p. 576. n. 13. *die Purpurkehle.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 429. *der amerikanische Ammer mit rother Kehle.*

Brisson, ornith. I. p. 320. n. 34. Cardinal d'Amerique.

Büffon, Vögel, XII. p. 50. *der rothköpfige Tangara.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 226. n. 21. *die rothkappige Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 425. n. 20. Tanagra (Gularis) nigra, subtus alba, capite rubro, iugulo purpureo.

14. Ca-

(*) Ist nach *Latham* mit *Motacilla Guira*, p. 988. n. 36. einerley.

14. CAYENENSIS. *Der Negertanager.*

Müller, Natursyst. II. p. 576. n. 34. *die cajennische Merle.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 427. *der schwarze Ammer aus Cayenne.*

Brisson, ornith. I. p. 311. n. 17. Tangara noir de Cayenne.

Büffon, Vögel, XII. p. 105. *der schwarze Tangara.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 235. n. 36. *die Neger-Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 430. n. 34. Tanagra (Cayanensis) nigra nitida, pectore utrinque alisque subtus flavis.

32. RUFICOLLIS. *Der rothkehlige Tanager.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 236. n. 37. *die rothkehlige Merle.*

Nach *Latham*, Syst. ornithol. I. p. 441. eine Varietät von *Fringilla noctis.*

15. BRASILIENSIS. *Der türkisblaue brasilianische Tanager.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 576. n. 15. *die brasilianische Merle.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 425. *der blaue Fink aus Brasilien.*

Brisson, ornith. I. p. 306. n. 4. Tanagra bleu du Brésil.

Büffon, Vögel, XII. p. 36. *der dunkelblaue brasilianische Tangara*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 223. n. 16. *die dunkelblaue Merle.*

Latham,

(7) Ist nicht mit *Tanagra brasilia* n. 2. zu verwechseln. Ich begreife nicht, wie *Latham* und *Brisson*, *Kleins Fringilla caerulea* hier anführen können. Dies Synonym gehört ohnstreitig zu *Emberiza cyanea* p. 876. n. 4.

Latham, Syst. ornith. I. p. 424. n. 15. Tanagra (Brasiliensis) nigra, subtus alba, iugulo uropygioque caerulescentibus, facie pectoreque nigris.

Jonston, av. p. 203. Guiraienoia Brasiliensibus.

16. DOMINICA. *Der domingische Tanager.*

Müller, Natursyst. II. p. 576. n. 16. *die domingische Merle.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 429. *die Ammer von St. Domingo.*

Brisson, ornithol. I. p. 314. n. 21. Tangara de S. Domingue, ou Esclave.

Buffon, Vögel, XII. p. 44. *der Sklave*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 224. n. 17. *die Domingische Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 424. n. 16. Tanagra (Dominica) nigro-maculata, supra olivaceo-fusca, subtus albida.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 638. *der domingische Tangara.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 211. Tanagra Mancipium.

17. MILITARIS. *Der Kriegstanager.*

Müller, Natursyst. II. p. 577. n. 17. *der Cardinal.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 174. n. 3. *die braune Merle.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 431. *der braune amerikanische Fink.*

Klein, av. p. 98. n. 16. Fringilla fusca americana.

Klein, Vorbereit. p. 183. n. 16. *brauner amerikanischer Diestelfinke.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 98. n. 16. *brauner Fink*, (mit *Loxia bicolor* p. 865. n. 48. verwechselt.)

Brisson, ornithol. I. p. 317. n. 30. Cardinal brun.

Büffon, Vögel, XII. p. 114. *der braune Cardinal des Herrn Brissons.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 237. n. 40. *die Kriegs-Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 431. n. 38. Tanagra (Militaris) fusca, pectore iugulo gula humerisque sanguineis.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 59. *der größere Rothschwanz.*

Seligmann, Vögel, IX. tab. 32. *der Schirley.*

Bankroft, N. G. von Guian. p. 108. *der größere Rothschwanz des Edwards.*

33. LEUCOCEPHALA. *Der weißköpfige Tanager.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 743. *Quatoztli.*

Brisson, ornithol. I. p. 313. n. 20. Tangara à tête blanche du Brésil.

Büffon, Vögel, XII. p. 110. *ein kleinerer Vogel als der Stieglitz, oder der brasilianische Quatozli des Seba.*

Latham, Syn. II. 1. p. 243. n. 21. White-headed Tanager.

Latham, Vögel, II. 1. p. 238. n. 41. *die weißköpfige Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 431. n. 39. Tanagra (Albifrons) fusco-nigra, subtus flavescens, gula iuguloque pallide rubris, pectore alisque purpureo-rubris, fronte alba.

34. FLAVA. *Der gelbe Tanager.*

Brisson, ornith. I. p. 314. n. 22. Tangara jaune du Brésil.

Büffon, Vögel, XII. p. 108. *der brasilianische Guira-perea des Marcgrave.*

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 238. n. 42. *die gelbe Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 431. n. 40. Tanagra (Flava) obscure flava, abdomine nigro maculato, collo inferiore pectoreque nigris.

Jonston, av. p. 206. Guiraperea Brasiliensibus.

Salerne, ornith. p. 273. Guira-perea.

35. AMBOINENSIS. *Der amboinische Tanager.*

Onomat. histor. natur. II. p. 399. *Calatti.*

Klein, av. p. 92. n. 7. Emberiza Amboinensis, Calatti dicta.

Klein, Vorbereit. p. 171. n. 7. *amboinischer Fettammer.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 94. n. 9. *amboinischer Fettammer.*

Brisson, ornithol. I. p. 306. n. 5. Tangara bleu d'Amboine.

Büffon, Vögel, XII. p. 111. *der Calatti des Seba.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 238. n. 43. *die Amboinische Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 431. n. 41. Tanagra (Amboinensis) nigro cyaneoque varia, subtus nivea, macula tectricum purpurea, cauda fusca, apice ruso.

36. CANORA. *Der himmelblaue Tanager.*

Brisson, ornith. I. p. 307. n. 7. Tangara bleu de la nouvelle Espagne.

Büffon, Vögel, XII. p. 106. *der Kräutervogel, oder der Xiuhtototl des Fernandez.*

Latham, Syn. II. 1. p. 245. n. 44. Caerulean Tanager.

Latham, Vögel, II. 1. p. 239. n. 44. *die himmelblaue Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 432. n. 43. Tanagra (Canora) cyanea, maculis fulvis varia, alis cyaneis fulvo nigroque variis, rectricibus nigris, apice albis.

19. Episcopus. *Der Bischoff.*

Müller, Natursyst. II. p. 577. n. 19. *der Bischoff.*

Onomat. hist. nat. III. p. 807. *der Bischoff.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 344. n. 157. *der Bischoff.*

Brisson, ornith. I. p. 314. n. 23. Evêque.

Büffon, XII. p. 47. *der blaue Tangara oder Bischof.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 224. n. 18. *die Bischofs-Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 424. n. 17. Tanagra (Episcopus) cinerea, alis caudaque extus caeruleis.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 367. n. 5. *der Bischoff.*

β. Tanagra cinereo livida, alis caudaque caerulescentibus, macula humerali albicante. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 424. n. 17. β.

Mus. carlson. fasc. III. tab. 54.

Bechstein, Zusätze zu Lathams Vögeln, p. 730. n. 13. *die blaue Atzel.* Gracula Glauca.

20. Sayaca. *Der Sayacu.*

Müller, Natursyst. II. p. 577. n. 20. *die graue Merle.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 432. *der bunte brasilianische Fink.*

Brisson, ornith. I. p. 308. n. 10. Tanagra varié du Brésil.

Büffon, Vögel, XII. p. 87. *der gefleckte brasilianische Tangara.*

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 225. n. 19. *die Sayaku-Merle.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 425. n. 18. Tanagra (Sayaca) cana, alis subcaeruleis.
Seligmann, Vögel, IX. tab. 41. *Sayacu.*
Jonston, av. p. 189. Sayacu Brasiliensibus.

21. PUNCTATA. *Der gefleckte Tanager.* (8)
Müller, Natursyst. II. p. 577. n. 21. *die gesprenkelte Merle.*
Onomat. hist. nat. VII. p. 432. *der punctirte Indianische Ammer.*
Brisson, ornith. I. p. 309. n. 11. Tangara verd piqueté des Indes.
Büffon, Vögel, XII. p. 85. *der Sayacu;* m. e. Fig.
Latham, Vögel, II. 1. p. 225. n. 20. *die gefleckte Merle.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 425. n. 19. Tanagra (Punctata) viridis, nigro-punctata, subtus flavescente-albida.
Seligmann, Vögel, VIII. tab. 52. *die grüngefleckte Meise.*

22. VIRENS. *Der grüne Tanager.*
Müller, Natursystem, II. p. 578. *der brasilianische Grünling.*
Onomat. hist. nat. VII. p. 434. *der grüne brasilianische Ammer.*
Brisson, ornith. I. p. 310. n. 14. Tangara vert du Brésil.
Büffon, Vögel, XII. p. 52. *der grüne brasilianische Tangara.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 226. n. 22. *die grüne Merle.*

(8) Ist nach *Büffon* mit dem vorhergehenden einerley. Nach *Latham* vielleicht das Weibchen oder ein Junges davon.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 426. n. 21. Tanagra (Virens) viridis, subtus flavescens, loris gulaque nigris, fascia maxillari caerulea.

37. SINENSIS. *Der chinesische Tanager.* (*)

Latham, Vögel, II. 1. p. 227. *die chinesische Merle.*

Latham, Syn. Suppl. p. 161.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 426. n. 22. Tanagra (Sinensis) viridi-olivacea, subtus flava, remigibus rectricibusque flavo-marginatis, basi remigum ferruginea.

34. CRISTATA. *Der gehäubte Tanager.*

Müller, Natursyst. II. p. 578. n. 24. *die Haubenmerle.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 174. n. 4. *die Haubenmerle.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 428. *die gehaubte Amsel aus Cayenne.*

Brisson, ornith. I. p. 319. n. 33. Tangara noir hupé de Cayenne.

Büffon, Vögel, XII. p. 11. *der gehäubte oder kuppichte Tangara*; m. 2. Figg.

Latham, Vögel, II. 1. p. 219. n. 8. *die Haubenmerle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 422. n. 9. Tanagra (Cristata) nigricans, crista aurantia, gula uropigioque fulvis.

38. BONARIENSIS. *Der violette Tanager.*

Büffon, Vögel, XII. p. 14. *der violette Tangara.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 220. n. 9. *die violette Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 430. n. 36. Tanagra (Bonariensis) atro-violacea, alis caudaque viridi-nitentibus.

39. ATRA.

(*) S. die Anmerk. 2. bey *Fringilla Sinica*, n. 20.

39. Atra. *Der Tanager mit schwarzem Gesichte.*
Büffon, Vögel, XII. p. 30. *der Tangara mit schwarzer Kappe;* m. e. Fig.
Latham, Vögel, II. 1. p. 220. n. 10. *die Merle mit schwarzem Gesichte.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 422. n. 10. Tanagra (Melanopis) cinerea, capite anterius, colloque toto inferiore nigris.

40. Pileata. *Der Huttanager.*
Büffon, Vögel, XII. p. 77. *der schwarzplattige Tangara;* m. e. Fig.
Latham, Vögel, II. 1. p. 221. n. 11. *die Hutmerle.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 423. n. 11. Tanagra (Pileata) caerulescente-cinerea subtus alba, vertice strigaque lateribus colli nigris, inter rostrum et oculos macula alba. *(mas.)*

β. *Brisson*, ornith. I. p. 308. n. 9. Tangara cendré du Brésil. (9)
Büffon, Vögel, XII. p. 77. *der schwarzplattige Tangara.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 221. n. 11. das Weibchen.
Latham, Syst. ornith. I. p. 423. n. 11. β. Tanagra caerulescente-cinerea subtus alba *(femina).*

41. Melanictera. *Der schwarzkappige Tanager.*
Büffon, Vögel, XII. p. 124. *der schwarzköpfige Tangara;* m. 2. Figg. M. u. W.
Latham, Vögel, II. 1. p. 222. n. 12. *die schwarzkappige Merle.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 423. n. 12. Tanagra (Melanictera) ferrugineo-fusca, subtus lutea, pileo

(9) Nach *Brisson* eine eigene Gattung.

pileo genisque nigris, alis albo longitudinaliter striatis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 214. Tanagra melanictera.

42. SIBIRICA. *Der sibirische Tanager.* ([10])

Latham, Vögel, II. 1. p. 239. n. 46. *die Sibirische Merle.*

Latham, Syn. Suppl. p. 177.

43. ATRICAPILLA. *Der schwarzköpfige Tanager.*

Büffon, Vögel, XII. p. 32. *der mordorefarbigte Tangara;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 222. n. 13. *die schwarzköpfige Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 423. n. 13. Tanagra (Atricapilla) rufo-rubra, capite, alis caudaque nigris, striga alarum alba.

44. STRIATA. *Der Tanager mit gefurchten Klauen.*

Büffon, Vögel, XII. p. 33. *der Tangara mit gefurchten Krallen.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 222. n. 14. *die Merle mit gefurchten Klauen.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 423. n. 13. Tanagra (Striata) nigra subtus flava, capite caeruleo nigroque striato, dorso infimo aurantio.

45. NIGERRIMA. *Der schwarze guianische Tanager.* ([1])

Büffon, Vögel, XII p. 34. *der schwarze Tangara, und der braunrothe Tangara.*

Latham,

(10) Nach *Latham* mit *Alauda tatarica* p. 795. n. 15. einerley.

(1) Im Syst. ornith hat *Latham* seinen *Guiana Tanager*, und *Büffons Tangara noir* als das Männchen; — *Büffons Tangara roux* aber als das Weibchen von *Oriolus Leucopterus* p. 392. n. 40. angenommen.

Latham, Vögel, II. 1. p. 223. n. 15. *die Guianische Merle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 183. n. 31. β. Oriolus fusco-cinnamomeus subtus cinerascens.

46. Capensis. *Der capsche Tanager.* (2)

Latham, Vögel, II. 1. p. 240. n. 47. *die Capsche Merle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 335. n. 30. β. Turdus ferrugineo-fuscus, subtus ferrugineo alboque varius, cauda in medio nigricante lateribus fusco-rufescentibus.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 315. n. 6. Tanagra Cyanea.	p. 876. n. 54. Emberiza Cyanea.
p. 316. n. 18. T. Albirostris.	p. 894. n. 12. β. Var.
p. 317. n. 23. T. Chlorotica.	p. 890. n. 5. β. Variat.

Das Geschlecht ist mit 22. Gattungen vermehrt. Da aber 2. der XII. Edit. in andere Geschlechter versetzt, und 1 als Var. von einer andern angenommen worden, so beträgt die Anzahl der neuhinzugekommenen Gattungen überhaupt 25. — Bey der 2ten Gattung sind *drey*, bey der 3ten *zwey*, bey der 8ten *zwey*, bey der 10ten *zwey* Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. Tanagra rudis. Mus. Carls. IV. n. 94.

Latham, Vögel, II. 1. p. 240. n. 48. *die rostrothe Merle.*

(2) Nach *Latham* eine Varietät von *Turdus Crassirostris* p. 815. n. 43.

2. Tanagra ornata. Muf. Carlf. IV. n. 95.
Latham, Vögel, II. 1. p. 240. n. 49. *die geputzte Merle.*

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der stille Tanager.*
Büffon, oif. IV. p. 304. Oifeau filentieux.
Büffon, pl. enl. p. 742. Tangara de la Guiane.
Büffon, Vögel, XII. p. 119. *der stille Vogel; der guianische Tangara;* m. e. Fig.
Latham, Vögel, II. 1. p. 241. n. 50. *die stille Merle.*
Latham, Syft. ornith. I. p. 432. n. 42. Tanagra (Silens) viridis capite fubtusque incana, fuperciliis vitta oculari, fafciaque iugulari nigris.
Hermann, tab. affin. anim. p. 214. Tanagra taciturna.
Samml. zur Phyf. u. N. G. II. p. 735. *der stille Vogel.*

2. *Der schöne Tanager.*
Latham, Syn. Suppl. p. 162. tab. 112. Capital Tanager.
Latham, Vögel, II. 1. p. 239. n. 45. *die schöne Merle;* tab. 47. Fig. 2.
Latham, Syft. ornith. I. p. 432. n. 44. Tanagra (Capitalis) fupra viridis, fubtus flava, capite colloque inferiore nigris.

112. GESCHLECHT. FRINGILLA. *Der Fink.*

Müller, Naturfyft. II. p. 579. Gen. CXII.
Leske, Naturgefch. p. 262. Gen. XLIV.
Borowsky, Thierreich, III. p. 136. Gen. LXII.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 186. Gen. XXXIV.
Bechstein, Naturgefch. I. p. 512. Gen. LXXI.

Ebert,

Ebert, Naturl. II. p. 136.
Pennant, arct. Zool. II. p. 345.
Neuer Schaupl. der Natur, III. p. 52.
Onomat. hist. nat. III. p. 970.
Klein, av. p. 87 Gen. X. trib. 1.
Halle, Vögel, p. 366. Gen. I. p. 390. Gen. III. p. 407. Gen. V.
Brisson, ornith. I. p. 320. Gen. XXXII. Carduelis. p. 327. Gen. XXXIII. Passer.
Büffon, Vögel, XI. p. 5. ff.
Batsch, Thiere, I. p. 318. Gen. LXXVII.
Latham, Vögel, II. 1. p. 242. Gen. XXXVII.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 432. Gen. XXXVIII.
Hermann, tab. affin. anim. p. 216. 218.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 367. Gen. LXXX.

1. Lapponica. *Der lappländische Fink.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 579. n. 1. *der lappländische Fink.*
Müller, Natursyst. Suppl. p. 161. n. 40. *Spornfink.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 351. n. 176. *der Lappländische Fink.*
Onomat. hist. nat. II. p. 643. *der lappländische Diestelfink.*
Klein, av. p. 92. n. 10. Emberiza capite nigro, luteis maculis vario.
Klein, Vorbereit. p. 172. n. 10. *Schwarzköpfiger Goldammer.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 93. n. 10. *schwarzköpfiger Goldammer.*
Brisson, ornith. I. p. 350. n. 38. Pinçon de montagne.
Büffon, Vögel, XI. p. 133. *der große Bergfink.* p. 139. *der gespornte Fink.*

Batsch,

(3) Länge 5. Zoll, Flügelweite 7 Zoll, Gewicht 1/2 Unze. *Penn.*

Batsch, Thiere, I. p. 356. *der gespornte Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 256. n. 14. *der Lerchenfink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 410. n. 18. Fringilla (Lapponica) capite nigro, corpore griseo nigroque, superciliis albis, rectricibus extimis macula alba cuneiformi.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 11. n. 20. Fringilla calcarata; Tab. E.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 5. Carduelis lapponica.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 180. n. 5. Fringilla (Lapponica) capite nigricante maculato, macula pone oculos alba.

Müller, Zool. dan. prodr. p. VIII. Fringilla (Lapponica) capite nigro, corpore griseo nigroque superciliis albis, rectricibus extimis macula alba cuneiformi.

Jonston, av. p. 99. Montifringillae congener.

Hermann, tab. affin. anim. p. 221. Fringilla calcarata.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 367. n. 1. *der lappländische Fink.*

5. SURINAMA. *Der surinamische Fink.*

Müller, Natursyst. II. p. 580. n. 2. *der surinamische Fink.*

Büffon, Vögel, XI. p. 182. *der surinamische Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 270. n. 41. *der Surinamische Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 447. n. 47. Fringilla (Surinama) grisea, remigibus utrinque albis, rectricibus lateralibus intus albis.

6. LONGIROSTRIS. *Der langschnäblige Fink.*

Büffon, Vögel, XI. p. 163. *der langschnäblichte Fink.*

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 271. n. 42. *der langschnäblige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 447. n. 48. Fringilla (Longirostris) fusco flavoque varia, subtus subfulva, capite nigro, collo torque castaneo, rectricibus olivaceis intus flavo-marginatis.

3. Caelebs. *Der Buchfink.* (†)

Müller, Natursyst. II. p. 580. n. 3. *der Buchfink.*

Leske, Naturgesch. p. 262. n. 1. *der Finke.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 137. n. 2. *der Buchfink; Garten-, Roth-, Waldfink.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 186. n. 1. Fringilla (Caelebs) artubus nigris, remigibus utrinque albis, tribus primis immaculatis; rectricibus duabus oblique albis; *der Buchfink.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 512. n. 1. *der gemeine Fink.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 584. *der gemeine Fink.*

Funke,

(†) Das Finkennest ist eines der künstlichsten. Es ist eine Halbkugel, oder vielmehr eine oben eingedrückte Kugel, rund wie gedrechselt, unten mit Spinngewebe und Haaren fest auf die Aeste geflochten, mit Moos und einzelnen Reischen künstlich durchwebt, inwendig mit Federn, Diestelflocken, und allerhand Thierhaaren gut ausgefüttert, und auswendig mit Flechtenmoos von dem Baume, auf dem es steht, vermittelst Spinnengewebe so fest wie angeleimt, völlig umlegt, so, dass es Mühe kostet, das Nest von der Rinde des Baumes, auf welchem es steht, zu unterscheiden. — *Linnés* Bemerkung, dass im Winter die Weibchen nach Süden ziehen, und nur die Männchen bleiben, finde ich bey *Pennant*, *White*, *Borkhausen*, u. a. bestätigt. *Bechstein* aber leugnet die Richtigkeit dieser Beobachtung; und versichert, dass nur so viel gegründet wäre, dass im Frühjahre die Männchen in eignen Schaaren 14 Tage eher wiederkämen als die Weibchen, und dass es eine Seltenheit sey, wenn man unter einer Schaar von etlichen hunderten 1. oder 2. Weibchen anträfe, und so umgekehrt.

Funke, Naturgesch. I. p. 266. *der Buchfink.*
Ebert, Naturl. II. p. 136. *der eigentliche gemeine Fink.*
Halle, Vögel, p. 407. n. 418. *der Fink; Buchfink.* Fig. 27.
Meyer, Thiere, II. tab. 30. *der Fink.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 406. n. 34. *der Fink.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 355. F. *der Buchfink.*
Neuer Schaupl. d. Nat. III. p. 53. *gemeine Fink.*
Onomat. hist. nat. IV. p. 674. *der Buchfink; eigentliche Fink.*
Handb. der Naturgesch. II p. 238. *der Fink.*
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 130. *gemeiner Fink; Schildfink.*
Klein, av. p. 96. n. 1. Fringilla simpliciter.
Klein, Vorbereit. p. 179. n. 1. *Buchfinke.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 96. n. 1. *Buchfink.*
Klein, Vögeleyer, p. 29. tab. 9. Fig. 9.
Gesner, Vögelb. p. 110. *Fink;* m. e. mittelm. Fig.
Brisson, ornithol. I. p. 346. n. 36. Pinçon.
Büffon, Vögel, XI. p. 83. *der Fink;* m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 355. *der Buchfink.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 250. n. 10. *der gemeine Fink.*
Latham, Syn. Suppl. p. 165. Chaffink.
Latham, Syst. ornith. I. p. 437. n. 12. Fringilla (Caelebs) artubus nigris, remigibus utrinque albis, tribus primis immaculatis, rectricibus duabus oblique albis.
Frisch, Vögel, tab. 1. Fig. 1. 2. *Fink.*
Beseke, Vögel Kurl. p. 78. n. 171. *der Buchfink.*
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 115. n. 1. *der Buchfink; Bootfink; Dorpfink.*

Bock,

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 426. *der Buchfink.*
Fischer, Livl. p. 99. n. 152. *Buchfink.*
Cetti, Sardin. II. p. 195. *der Buchfink.*
White, N. G. von Engl. p. 23. *Buchfinken.*
Pallas, Reis. Ausz. III. p. 476. *Buchfinken.*
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 9. *die Finken.*
Storr, Alpenreise, I. p. 79. *Buchfink.*
Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 1. *Buchfinke.*
Pontoppidan, Norweg. II. p. 130. *Bogfinke.*
Linné, Abhandl. II. p. 303. n. 127. *der Buchfink.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 178. n. 217. *der gemeine Fink.*
Borkhausen, Magaz. I. p. 149. n. 15. *Buchfink.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 330. *gemeine Fink.*
Naturforsch. XVII. p. 93. n. 187. *der Buchfinke.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 62. *Fink.*
Naumann, Vogelsteller, p. 58. *Finke.*
Krünitz, Encykl. XIII. p. 415. *Fink.*
Oekonom. Zool. p. 99. n. 44. *der Bachfinke.*
Goeze, nützl. Allerl. II. p. 388. n. 9. *Fink.*
André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 258. 261.
Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 294. *Buchfinke.*
Neue Schwed. Abhandl. IV. p. 49. *der Buchfink.*
Meidinger, Vorl. p. 149. n. 1. *der Buchfink.*
Anweisung. Vögel zu fang. p. 189. *der Fink.*
Beckmann, Naturhist. p. 54. *b. der Buchfink.*
Hervieux, Canarienvög. p. 137. *Fink.*
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 629. *der Fink.*
Forst- Fisch- und Jagdlex. I. p. 745. *Finke.*
Lonicer, Kräuterb. p. 682. *Buchfink.*
Eberhard, Thiergesch. p. 80. *der Fink.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 333. *Fink.*
Naturgesch. der schönst. Vögel, II. p. 16.
Schröder, Jagdkunst, p. 138.
König, Helvetia curiosa, p. 831.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. Fringilla.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 1. Fringilla.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 179. n. 2. Fringilla (Coelebs) artubus nigris, remigibus utrinque albis, tribus primis immaculatis, rectricibus duabus oblique albis.

Charleton, exercitat. p. 88. n. 3. Fringilla.

Charleton, onom. zoic. p. 80. n. 3. Fringilla.

Moehring, av. gen. p. 41. n. 27. Fringilla.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 261. Fringilla. *Finke; Buch-Finke; Rotte-Finke.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 379. Fringilla; Vinelia avis *Alberti.*

Sibbald, Scot. illustr. p. 18. Fringilla.

Barrere, ornith. p. 55. Passer subtus spadiceus, superne subcaeruleus et subvirescens.

Salerne, oif. p. 266. Pinson commun, fringilla, etc.

Belon, nat. des oif. p. 371. Grinson, Pinson, Quinson.

Jonston, av. p. 98. Fringilla.

Zinnan. Uov. p. 61 tab. 9. Fig. 52. Frinquello.

Levin, britt. Birds, II. tab. 79.

Roman. ornith. I. p. 142. tab. 22. Fig. 11.

Faun. Arragon. p. 87 — *Russ.* Alepp. p. 70.

Bomare, Diction. VII. p. 35. Pinçon ou Pinson.

Turner, histor. av. voc. *Fringilla.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 367. n. 2. *der Buchfink.*

b. Das Weibchen.

Müller, Natursyst. II. p. 581. ad n. 3. *Waldfink.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 180. n. 6. Fringilla (Sylvatica) artubus remigibus rectricibusque nigris, duabus utrinque extimis a medio extrorsum albis.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Ed. XII. I. p. 318. n. 3. β. Fringilla Sylvia.
Linné, fn. suec. II. p. 85. n. 232. β. Fringilla *Sylvatica* artubus remigibus rectricibusque nigris; duabus utrinque extimis a medio extrorsum albis.

β. *Latham*, Syst. ornith. I. p. 433. n. 12. ε.

γ. *Brisson*, ornith. I. p. 348. A. Pinçon à aîles et queues noires. (5)
Büffon, Vögel, XI. p. 106. *der Waldfink.*
Latham, Syn. II. 1. p. 258. n. 10. Var. A.
Latham, Vögel, II. 1. p. 252. n. 10. Var. A.
Latham, Syst. ornith. I. p. 437. n. 12. β. Fr. cinerascens, subtus incarnata, tectricibus alarum albis, medio nigris, remigibus rectricibusque nigris.

δ. *Brisson*, ornith. I. p. 359. C. Pinçon blanc.
Büffon, Vögel, XI. p. 112. *der weiße Fink.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 253. n. 10. Var. β.
Latham, Syst. ornith. I. p. 437. n. 12. γ.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 262. Fringilla candida.
Gesner, Vögelb. p. 110. *ganz weiße Finken.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 53. *schneeweiße Finken.*
Anweis. Vögel zu fangen, p. 191. *schloßweiße Finken.*
Angenehm. Zeitvertr. m. Vögeln, p. 101.
Angenehme Landlust, p. 135.

ε. *Brisson*, ornith. I. p. 349. D. Pinçon à collier.
Büffon, Vögel, XI. p. 113. *der Ringelfink.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 253. n. 10. Var. C.
Latham,

(5) Ist nach *Bechstein* ein junges Männchen, nach *Latham* eine Spielart vom Weibchen. *Brisson* rechnet die vorher bey *b* angeführten Synonymen hieher.

Latham, Syst. ornith. I. p. 437. n. 12. δ.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 262. Fringilla torquata.

ζ. *Latham*, Vögel, II. 1. p. 253. ad Var. C. not. h.
Latham, Syst. ornith. I. p. 438. n. 12. ζ.

η. *Latham*, Vögel, II. 1. p. 253. ad. Var. C. not. h.
Latham, Syst. ornith. I. p. 438. n. 12. η.

4. MONTIFRINGILLA. *Der Bergfink.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 581 n. 4. *der Bergfink.*
Leske, Naturgesch. p. 262. n. 3. *der Bergfink.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 136. n. 1. *der Quäker; Bergfink; Schnee-, Tannen-, Mistfink, Rowert, Gegler;* tab. 62.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 186. n. 2. Fringilla (Montifringilla) alarum basi subtus flavissima; *der Bergfink; Winterfink; Quäckfink; Nikawitz; Zetscher; Gegler*, etc.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 514. n. 2. *der Bergfink.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 589. *der Bergfink; Gräcker.*
Funke, Naturgesch. I. p. 265. *Bergfink.*
Ebert, Naturl. II. p. 136. *Bergfink; Waldfink.*

Halle,

(6) Ist nicht mit *Fringilla montana*, p. 925. n. 37. zu verwechseln. — Findet sich häufig unter den gemeinen Finken, und kommt zuweilen in grossen Schaaren. In England nistet er nicht, zieht aber zuweilen dahin. *Latham* erzählt, dass ihm einst 18 auf einmal gebracht wären, die alle auf einen Schuss geschossen worden. In Frankreich sieht man sie zuweilen in unermesslichen Flügen so häufig, dass der Boden von ihrem Miste ganz bedeckt wird und jede Nacht über sechs hundert Dutzend getödtet werden. In Thüringen lassen sie sich vorzüglich vom Anfang des Octobers bis zu Ende des Märzes sehen, wo sie wieder in die nördlichen Gegenden zurück gehen. Einzeln sind sie unter den gemeinen Finken, Sperlingen und Goldammern, den ganzen Winter hindurch auf den Häusern, vor den Scheunen und Ställen anzutreffen.

Halle, Vögel, p. 409. n. 419. *der Bergfink.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 407. n. 344. *der Bergfink; Quecker; Nikabiz! Nikowiz, Zehrling,* etc.
Pennant, arct. Zool. II. p. 355. E. *der Bergfink.*
Neuer Schaupl. d. Nat. III. p. 54. n. 2. *Bergfink.*
Onomat. hist. nat. II. p. 643. *der angermannländische Diestelvogel.*
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 132. *der Buchfink; Bergfink,* etc.
Klein, av. p. 96. n. 2. Fringilla hyberna; montana.
Klein, Vorbereit. p. 179. n. 2. *Winterfinke.*
Klein, verb. Vögelh. p. 96. n. 2. *Bergfink.*
Klein, Stemmat. av. p. 19. tab. 19. Fig. 16. a—c.
Gesner, Vögelb. p. 111. *Waldfinke.*
Brisson, ornith. I. p. 349. n. 37. Pinçon d'Ardennes.
Büffon, Vögel, XI. p. 115. *der Bergfink, oder Gägler.* p. 127. n. 7. *Bergnachtigall.*
Batsch, Thiere, I. p. 356. *der Bergfink.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 254. n. 13. *der Bergfink.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 439. n. 17. Fringilla (Montifringilla) nigra, pennis rufo-marginatis, subtus uropygioque alba, iugulo pectoreque rufescentibus, rectricibus lateralibus nigricantibus, extus albo marginatis.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 116. n. 2. *der Bergfink.*
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 427. *der Bergfinke.*
Fischer, Livl. p. 99. n. 153. *Berg-, Tannen-, Wald-, Winterfink.*
Fischer, Zus. zur N. G. von Livl. p. 48. *der Bergfink.*
Cetti, Sardin. II. p. 195. *Bergfink.* *
Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 41. *Bergfinken.*

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. II. p. 5. *Berg-finken.*

Pallas, Reis. Ausz. III. p. 474. *Tannenfinken.*

Storr, Alpenreise, I. p. 79. *Bergfink.*

Linné, Abhandl. II. p. 304. n. 128. *Bergfink.*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 2. *Quäker, Buchfinkens Hurkind.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 341 *Bergfink; Gägler; Quäcker.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 150. n. 16. *Bergfink.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 62. *Quäcker, Zehrling, Buch-Fink.*

Naumann, Vogelsteller, p. 74. *Quäcker.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 179. n. 218. *der Bergfink.*

Krünitz, Encykl. XIII. p. 419. *Bergfink.*

Naturforsch. XIII. p. 185. XVII. p. 93. *Bergfink.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 630. *der Bergfink.*

Meidinger, Vorlesung. I. p. 150. n. 2. *der Bergfinke.*

Anweis. Vögel zu fang. p. 435. *Quäcker; Nicabitz.*

Forst-Fisch- u. Jagdlex. I. p. 750. *Buchfink. Gögler.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 180. *Buchfink, Bergfink.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 7. Montifringilla.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 179. n. 3. Fringilla (Montifringilla) alarum basi subtus flavissima.

Kramer, Austr. p. 367. n. 3. *Nicowitz*, a corrupta voce *Jcawetz*; alibi *Quecker*, *Pienken.*

Charleton, onom. zoic. p. 80. n. 4. Montifringilla.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 262. Fringilla hyberna. Ὀϱοσπιζη. *Wald-Finke; Winter-Fink, Dannen-Fink.*

Schwenk-

Schwenkfeld, av. Silef. p. 229. Aurivittis. *Queck; Quecker; Goldfinke; Quetschfinke; Laubfinke.*
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 379. Fringilla montana. Montifringilla.
Jonston, av. p. 99. Fringilla montana.
Belon, hist. des oif. p. 372. Montan ou Montain; Pinson d'Ardennes, nommé par quelques-uns Paisse de bois, ou Moineau de bois.
Salerne, hist. nat. des oif. p. 269. Pinson de montagne, etc.
Turneri hist. av. voc. *Montifringilla.*
Amoenit. academ. IV. p. 596.
Roman. orn. p. 146. tab. 22. Fig. 2. Fringilla montana.
Levin, britt. Birds. II. tab. 80.
Bomare, diction. VII. p. 36. Pinçon de montagne ou des Ardennes.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 368. n. 2. *der Bergfink.*

β. *Latham*, Syn. II. 1. p. 262. n. 13. Var. A.
Latham, Vögel, II. 1. p. 256. n. 13 Var. A.
Latham, Syst. ornith. I. p. 439. n. 17. β. Fringilla superciliis fasciaque nuchae nigris, corpore subtus uropygioque albis, gula pectoreque rufescentibus, tectricibus alarum fascia albente.

γ. *Brisson*, ornith. I. p. 330. A. Pinçon d'Ardennes à tête blanche.
Buffon, Vögel, XI. p. 129. *Bergfinken mit einem ganz weißen Kopfe.*
Latham, Syn. II. 1. p. 262. n 13. Var. B.
Latham, Vögel, II. 1. p. 256. n. 13. Var B.
Latham, Syst. ornith. I. p. 439. n. 17. β.
Aldrov. ornith. p. 131. Montifringilla leucocephalos.

5. Lulensis. *Der schwedische Fink.*

Müller, Natursyst. II. p. 582. n. 5. *der schwedische Fink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 354. B. *der Fink von Lulea.*

Onomat. hist. nat. II. p. 643. *der westgothische Diestelfink.*

Brisson, ornithol. I. p. 324. n. 2. Chardonneret de Suede.

Büffon, Vögel, XI. p. 296. *der Stieglitz mit vier Streifen.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 280. n. 56. *der schwedische Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 452. n. 63. Fringilla (Lulensis) fusca, pectore humerisque rufis, alis nigris macula rufa, collo corporeque subtus albis.

Schrift. der berl. Gesellsch. N. Fr. VII. p. 465. n. 54. *der schwedische Fink.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 6. Carduelis Lulensis.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 180. n. 4. Fringilla (Lulensis) fusca, pectore humerisque rufis, alis nigris macula rufa.

40. Erythrocephala. *Der rothköpfige Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 279. n. 55. *der rothköpfige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 452. n. 62. Fringilla (Erythrocephala) olivacea capite colloque coccineis, orbitis nigris, fascia tectricum duplici alba.

41. Psittacea. *Der Papageyfink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 279. n. 54. *der Papagey-Fink.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 451. n. 61. Fringilla (Psittacea) viridis, facie uropygio rectricibusque coccineis, lateralibus intus fuscis.

7. CARDUELIS. *Der Stieglitz.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 582. n. 7. *der Diestelfink*; tab. 25. Fig. 5.

Leske, Naturgesch. p. 262. n. 3. *der Stigliz.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 138. n. 3. *der Stieglitz.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 187. n. 4. Fringilla (Carduelis) fronte iuguloque coccineis, remigibus antrorsum flavis, rectricibus duabus extimis medio, reliquisque apice albis; *der Stieglitz.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 516. n. 5. *der Stieglitz*; tab. 1. Fig 2.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 585. *der Stieglitz.*

Funke, Naturgesch. I. p. 267. *der Stieglitz.*

Ebert, Naturl. II. p. 137. *der Stieglitz.*

(7) Hält sich des Sommers über in Gärten, Feldhölzern und Vorhölzern auf, bleibt den ganzen Winter bey uns, und zieht nur seiner Nahrung halber bald da bald dort hin. Diese besteht in allerhand Sämereyen von Diesteln, Wegbreit, Habichtskraut, Kletten, Sallat, Kohl, Rüben, Cichorien, Lein und Dotter, etc. Blattläuse aber frisst er nicht, wie man gemeiniglich glaubt Im Käfig giebt man ihm Mohn und Hanf. Von dem Genuss des letztern soll er schwarz werden. — Wird 20 bis 24. Jahr alt. — Im Herbst versammeln sich diese Vögel familienweise aufs Höchste zu Heerden von 15 bis 20 — Selten paart sich ein Stieglitz Weibchen mit dem Kanarienmännchen. — In Persien füttert man sie wegen Mangel des Hanfsaamens, mit Wallnüssen *(Pallas)* Dass dieser Vogel mehr als andere mit der fallenden Sucht behaftet wird, wenn man ihn im Käfig hält, ist bekannt; dass diese Krankheit aber von einem Wurme herrühre, der in den Schenkeln sitzet, wird von aufmerksamen Beobachtern billig geleugnet.

Halle, Vögel, p. 411. n. 421. *der Stieglitz.*
Meyer, Thiere, I. tab. 92. *der Stieglitz.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 408. n 345. *der Stieglitz*, *Stechlitz*, *Jupitersfink.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 357. H. *der Goldfink; Stieglitz.*
Beckmann, Naturhist. p. 54. c. *der Stieglitz.*
Neuer Schaupl. d. N. III. p. 54. VIII. p. 573. *Stieglitz.*
Onomat. hist. nat. II. p. 642. *der Stieglitz.*
Handb. der Naturgesch. II. p. 226. *der Diestelfink.*
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 130. *Stieglitz.*
Klein, av. p. 97. n. 4. Fringilla Jovis. Carduelis.
Klein, Vorbereit. p. 180. n. 4. *Diestelfinke; Stieglitz; Rothvogel.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 96. n. 4. *Diestelfink.*
Klein, Stemmat. av. p. 20. tab. 19. Fig. 18. a—c.
Klein, Vögeleyer, p. 30. tab. 9. Fig. 11.
Gesner, Vögelb. p. 55. *Diestelfink;* m. e. Fig.
Brisson, ornith. I. p. 320. n. 1. Chardonneret.
Büffon, Vögel, XI. p. 260. *der Stieglitz; Truns, Rothvögelchen*, *Kletter*, *Distelfink;* p. 264. *Stechlick;* m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 354. *der Stieglitz.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 274. n. 51. *der gemeine Stieglitz.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 449. n. 58. Fringilla (Carduelis) remigibus antrorsum luteis, extima immaculata.
Beseke, Vögel Kurl. p. 79. n. 172. *der Diestelfink.*
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 117. n. 3. *der Stieglitz.*
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 427. *der Stieglitz.*
Cetti, Sardin. II. p. 203. *der Stieglitz.*
Fischer, Livl. p. 99. n. 154. *Stieglitz.*

Pontop-

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 3. *Stieglitz.*
Pontoppidan, Norweg. II. p. 186. *Stillitz.*
Leem, Finnm. p. 136. *der Stieglitz.*
Storr, Alpenreis. I. p. 79. Fringilla Carduelis.
Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *Stieglitze.* IV. p. 9. *Diestelfink.*
Linné, Abhandlung. II. p. 304. n. 129. *der Diestelfink.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 174. n. 211. *der Stieglitz.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 333. *der Diestel-Fink.*
Hervieux, Canarienvög. p. 179. *der Stieglitz.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 63. *Stiegelitz.*
Naumann, Vogelsteller, p. 69. *der Stieglitz.*
Eberhard, Thiergesch. p. 79. *der Diestefink.*
André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 320.
Naturforsch. XVII. p. 93. n. 189. *der Diestelfink.*
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 634. *der Stieglitz.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 529. *Stieglitz.*
Naturgesch. der schönsten Vögel, p. 64.
Lemmery, Materiallex. p. 241.
Loniceri, Kräuterb. p. 682. *Diestelvogel.*
Geoffroy, mater. med. VII. p. 380. *Stieglitz.*
Neu Hamburg. Magaz. St. 37.
Oekonom. Zool. p. 99. *der Stieglitz.*
Schles. ökonom. Gesellsch. 1782. p. 102. *Diestelfink.*
Reinmann, de Carduele viginti duos annos nato, per integrum adhuc annum, pennis omnibus amissis, cantante et saltante. — Nov. act. nat. cur. II. p. 597. c. f.
Hartmanni anatome Carduelis fame peremtae. — Eph. nat. cur. Dec. II. an. 7. obs. 18. p. 39.
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. Carduelis.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 4. Carduelis vulgaris.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 180. n. 9. Fringilla (Carduelis) remigibus antrorsum luteis: extima immaculata, rectricibus duabus extimis medio, reliquisque apice albis.

Kramer, Austr. p. 365. n. 1. Fringilla remigibus antrorsum luteis, extima immaculata; rectricibus duabus extimis toto, reliquis apice albis. *Stiglitz.*

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 1. Carduelis; Chrysomitris; Aurivittis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 233. Carduelis. *Stieglitz; Distelvogel, Distel-Fink; Rottvogel.*

Sibbald, prodr. L. 3. c. 4. p. 18. Carduelis.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 370. Carduelis seu Astralaginas; Zena *Bellonii;* Aurivittis ornithologorum, Chrysomitris.

Jonston, av. p. 97. Carduelis.

Belon, hist. nat. des ois. p. 353. Chardonneret.

Barrere, ornithol. p. 57. Carduelis capite rubro, corpore fulvo, etc.

Salerne, hist. nat. des ois. p. 274. Chardonneret, etc.

Bomare, dictionn. II. p. 355. Chardonneret.

Schaefer, element. ornithol. tab. 24.

Zinnan. Uov. p. 58. tab. 8. 42. Cardellino.

Turner, hist. av. art. *Carduelis.*

Faun. Arragon. p. 87.

Roman. ornithol. p. 132. tab. 120.

Hist. Prov. I. p. 511.

Russel, Alepp. p. 70.

Levin, britt. Birds. II. tab. 81.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fr. Carduelis.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 369. n. 4. *der Stieglitz.*

β. Der

β. *Der weißköpfige Stieglitz.*

Brisson, ornith. I. p. 321. A. Chardonneret à tête blanche.

Büffon, Vögel, XI. p. 284. *der Stieglitz mit weißen Augenbraunen, und weißer Stirne.*

Latham, Syn. II. 1. p. 282. n. 51. Var. A.

Latham, Vögel, II. 1. p. 275. n. 51. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 450. n. 58. β.

Aldrov. ornith. II. p. 801. Carduelis ciliis et rostri ambitu niveo colore refulgentibus.

Jonston, av. tab. 36. Carduelis ciliis albis.

γ. *Der Stieglitz mit gestreiftem Kopfe.*

Brisson, ornith. I. p. 321. B. Chardonneret à tête rayée.

Büffon, Vögel, XI. p. 285. *der Stieglitz mit roth und gelb gestreiftem Kopfe.*

Latham, Syn. II. 1. p. 283. n. 51. Var. B.

Latham, Vögel, II. 1. p. 276. n. 51. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 450. n. 58. γ.

Browne, l. c. Fringilla subfusca, capite vario striato, striis quandoque rubris, quandoque flavis.

δ. *Der schwarzköpfige Stieglitz.*

Brisson, ornithol. I. p. 322. C. Chardonneret à tête jaune.

Büffon, Vögel, XI. p. 285. *der Stieglitz mit der schwarzen Kappe.*

Latham, Syn. II. 1. p. 283. n. 51. Var. C.

Latham, Vögel, II. 1. p. 276. n. 51. C.

Latham, Syst. ornith. I. p. 450. n. 58. δ.

Halle, Vögel, p. 412. n. 422. *der Schwalbenstieglitz.*

ε. *Der weißlichte Stieglitz.*

Brisson, ornithol. I. p. 322. D. Chardonneret blanchâtre.

Büffon,

Büffon, Vögel, XI. p. 286. *der weißlichte Stieglitz.*

Latham, Syn. II. 1. p. 283. n. 51. Var. D.

Latham, Vögel, II. 1. p. 276. n. 51. Var. D.

Latham, Syst. ornith. I. p. 450. n. 58. *ε*.

Aldrovand. orn. II. p. 801. Carduelis subalbida.

ζ. *Der weiße Stieglitz.*

Brisson, ornithol. I. p. 322. E. Chardonneret blanc.

Büffon, Vögel, XI. p. 286. *der weiße Stieglitz*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 283. n. 51. Var. E.

Latham, Vögel, II. 1. p. 276. n. 51. Var. E.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 450. n. 58. ζ.

Aldrovand. orn. II. p. 801. Carduelis alba, capite rubro.

Cetti, Sardin. II. p. 205. *weiße Stieglitze.*

Jonston, av. p. 97. Cardueles totae prorsus albae.

η. *Der schwarze Stieglitz.*

Brisson, ornithol. I. p. 323. F. Chardonneret noir.

Büffon, Vögel, XI. p. 288. *der schwarze Stieglitz.*

Latham, Syn. II. 1. p. 284. n. 51. Var. F.

Latham, Vögel, II. 1. p. 277. n. 51. Var. F.

Latham, Syst. ornith. I. p. 450. n. 58. η.

ϑ. *Der schwarze, gelbköpfige Stieglitz.*

Brisson, ornith. I. p. 323. G. Chardonneret noir à tête jaune.

Büffon, Vögel, XI. p. 290. *der schwarze Stieglitz mit orangefarbigem Kopfe.*

Latham, Syn. II. 1. p. 285. n 51 G.

Latham, Vögel, II. 1. p. 277. n. 51. Var. G.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 451. n. 58. ϑ.

Aldrov.

Aldrov. ornith. II. p. 801. Carduelì congener, rostro fasciola crocea circumdato.

ι. *Der Bastardstieglitz.*

Brisson, ornithol. I. p. 323. H. Chardonneret mulet.

Büffon, Vögel, XI. p. 291. *der Bastardstieglitz.*

Latham, Syn. II. 1. p. 285. n. 51. Var. H.

Latham, Vögel, II. 1. p. 277. n. 51. Var. H.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 451. n. 58. ι.

κ. *Der gelbbrüstige Stieglitz.* *

Büffon, oif. VII. p. 283. n. 1. Chardonneret à poitrine jaune.

Büffon, Vögel, XI. p. 284. *der Stieglitz mit gelber Brust.*

λ. *Das Rehlein.* *

Pennant, britt. Thiergesch. p. 122.

Büffon, Vögel, XI. p. 294. n. 10.

Latham, Vögel, II. 1. p. 278. not. k. Var. I.

μ. *Der Imperiale.* *

Cetti, N. G. von Sardin. II. p. 203.

Büffon, Vögel, XI. p. 294. n. 11.

Latham, Vögel, II. 1. p. 278. not. k. Var. K.

8. Melba. *Der grüne Stieglitz.*

Müller, Natursyst. II. p. 584. n. 8. *der grüne Stieglitz.*

Onomat. histor. natur. V. p. 135. *der grüne Fink.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 98. n. 19. *grüner Stieglitz.*

Brisson, ornithol. I. p. 326. n. 7. Chardonneret verd.

Büffon, Vögel, XI. p. 299. *der grüne Stieglitz, oder der Maracaxao;* m. e. Fig.

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 278. n. 52. *der grüne Stieglitz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 451. n. 59. Fringilla (Melba) viridis, facie caudaque rubris, abdomine albo nigroque undulato.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 62. *der grüne Stieglitz*, (das Männchen.)

Seligmann, Vögel, V. tab. 23. *der grüne Stieglitz*, (das Weibchen.)

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 180. n. 10. Fringilla (Melba) facie caudaque rubris, abdomine albo nigroque undato, dorso viridi.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla Melba.

42. Afra. *Der afrikanische Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 279. n. 54. *der Fink mit rothem Gesichte.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 451. n. 60. Fringilla (Afra) fusco-viridis, genis pallide coccineis, cauda coccinea, remigibus nigricantibus extus aurantiis.

9. Alario. *Der capsche Fink.*

Müller, Natursystem, II. p. 584. n. 9. *der capsche Spatz.*

Klein, av. p. 90. n. 21. Passer capensis.

Klein, Vorbereit. p. 169. n. 21. *Kapsperling.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 92. n. 19. *Capsperling.*

Brisson, ornithol. I. p. 336. n. 17. petit moineau du cap de bonne esperance.

Latham, Vögel, II. 1. p. 305. n. 85. *der Capsche Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 462. n. 95. Fringilla (Alario) capite collo pectoreque atris, corpore castaneo subtus albo, rectricibus quatuor lateralibus lineola nigra.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 179. n. 14. Emberiza (Alario) capite pectoreque atro, abdomine albo, alis rubris.

43. LEUCOTIS. *Der weißöhrige Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 304. n. 84. *der weißöhrige Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 462. n. 94. Fringilla (Leucotis) capite dorso tectricibusque alarum purpureis, subtus flava, remigibus primoribus caudaque caeruleis, macula aurium alba.

β. *Latham*, Vögel, II. 1. p. 304. n. 84. *der Erste.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 462. n. 94.

γ. *Latham*, Vögel, II. 1 p. 304. n. 84. *der Zweyte.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 462. n. 94. β.

δ. *Latham*, Vögel. II. 1. p. 304. n. 84. *der Dritte.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 462. n. 94. γ.

ε. *Latham*, Vögel, II. 1. p. 305. n. 84. *der Vierte.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 462. n. 94. δ.

ζ. *Latham*, Vögel, II. 1. p. 305. n. 84. *der Fünfte.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 462. n. 94. ε.

10. AMANDAVA. *Der amandavische Fink.* (8)

Müller, Natursyst. II. p. 584. n. 10. *der bengalische Spatz.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 187. n. 5. Fringilla (Amandava) fusca rufescensque albo-punctata; *der Fink von Bengalen.*

Onomat. hist. nat. III. p. 970. *der purpurfarbene ostindische Fink. Amaduvad.*

Klein, av. p. 98 n. 15. Fringilla rubra, minima.

Klein, Vorbereit. p. 182. n. 15. *rothe kleinste Stieglitz, Diestelfinke.*

Klein,

(8) Grösse eines Zaunkönigs; etwa 4. Zoll lang. *Latham.*

Klein, verbeff. Vögelhiftor. p. 98. n. 15. *rother kleinster Stieglitz.*

Briffon, ornith. I. p. 364. n. 62. Bengali piqueté.

Büffon, Vögel, XI. p. 68. *der punctirte Bengali*; m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 168. Amadavade Finch.

Latham, Vögel, II 1. p. 301. n. 82. *der getiegerte Bengali*, tab. 49.

Latham, Syft. ornithol. I. p. 461. n. 92. Fringilla (Amandava) fufca rufefcensque albo-punctata, rectricibus nigris apice puncto albo.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 45. fig. 1. *Amandavad.*

Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 180. n. 11. Fringilla (Amandava) rectricibus purpureis, medietate poftica atris.

Charleton, exercitat. p. 95. n. 2. — Onom. zoic. p. 89. n. 2. Regulus indicus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla Amandava.

β. *Briffon*, ornith. I. p. 363. n. 61. Bengali brun (9)

Büffon, Vögel, XI. p. 67. *der braune Bengali; braun getiegerte, eigentliche Bengali*; m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 312. n. 82. Var. A.

Latham, Vögel, II. 1. p. 301. n. 82. Var. A.

Latham, Syft. ornithol. I. p. 461. n. 92. β.

11. GRANATINA. *Der brafilianifche Fink.*

Müller, Naturfyftem, II. p. 584. n. 11. *der Granatvogel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 140. n. 5. *der Granatvogel*, tab. 62. B.

Onomat.

(9) Noch nicht vier Zoll lang. *Latham.* — Nach *Briffon* und *Büffon* eine eigene Gattung. *Bechftein* hat in einer Anmerk. bey der Ueberfetzung des *Lathamfchen* Werks l. c. aus eigener Erfahrung viel artige Bemerkungen hiebey geliefert.

Onomat. hist. nat. III. p. 671. *der brasilianische rothgelb und blaue Fink.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 98. n. 21. *rothschnäbliger Diestelfink.*

Brisson, ornithol. I. p. 367. n. 67. Grenadin.

Büffon, Vögel, XI. p. 221. *der rothschnäblichte Diestelfink;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 306. n. 87. *der Brasilische Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 463. n. 97. Fringilla (Granatina) cauda cuneiformi, corpore rufescente, rostro rubro, temporibus, uropygio abdomineque violaceis.

Seligmann, Vögel, VI. tab. 86. *der roth und blaue brasilianische Fink.*

Bankroft, N. G. von Guiana, p. 109. *der roth und blaue brasilische Finke.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 181. n. 16. Fringilla (Brasiliana) cauda cuneiformi, corpore rufescente, temporibus, uropygio abdomineque violaceis, rostro rubro.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fr. Granatina.

β. Fr. loris fuscis, corpore postice violaceo. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 463. n. 97. β.
Latham, Vögel, II. 1. p. 306. n. 87. Var. A.

γ. Fr. abdomine infimo femoribusque corpore concoloribus. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 463. n. 97. γ.
Latham, Vögel, II. 1. p. 306. n. 87. Var. B.

δ. Fr. cauda rubescente. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 463. n. 97. γ.
Latham, Vögel, II. 1. p. 306. n. 87. Var. C.

44. ZEYLONICA. *Der zeylanische Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 306. n. 88. *der Zeylanische Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 463. n. 98. Fringilla (Zeylanica) flava, dorso virescente, capite nigro, corpore subtus albo nigricante vario, remigibus rectricibusque nigricantibus.

β. *Latham*, Vögel, II. 1. p. 307. n. 88. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 463. n. 98. β. Fr. dorso viridi, pectore abdomineque flavescente-albis, capite fusco rubro. An *femina?*

45. FUSCICOLLIS. *Der braunkehlige Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 307. n. 89. *der braunkehlige Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 463. n. 99. Fringilla (Fuscicollis) ferruginea, vertice uropygio crissoque viridibus, gula fusca macula subrubra, macula remigum rectricibusque dimidiato-flavis.

46. IGNITA. *Der Feuerfink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 307. n. 90. *der Feuer-Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 464. n. 100. Fringilla (Ignita) fusco-rubra nitens, rostro, remigibus caudaque obscuris.

12. TRISTIS. *Der amerikanische Stieglitz.*

Müller, Natursyst. II. p. 585. n. 12. *der americanische Fink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 345. n. 159. *der Goldfink; der amerikanische Stieglitz.*

Onomat. histor. natur. III. p. 980. *der amerikanische Stieglitz.*

Klein, av. p. 97. n. 5. Fringilla, Carduelis americana.

Klein,

Klein, Vorbereit. p. 180. n. 5. *gelber Diestelfinke.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 97. n. 5. *gelber Diestelfink.*

Brisson, ornithol. I. p. 324. n. 3. Chardonneret d'Amerique.

Büffon, Vögel, XI. p. 303. *der gelbe Stieglitz*; m. e. Fig.

Halle, Vögel, p. 413. n. 423. *der gelbe Stieglitz.*

Latham, Syn. Suppl. p. 166. American Goldfinch.

Latham, Vögel, II. 1. p. 230. n. 57. *der Amerikanische Stieglitz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 452. n. 64. Fringilla (Tristis) flava, fronte nigra, alis fuscis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 86. *der americanische Stieglitz.*

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 64. *der americanische Stieglitz, ein Er und eine Sie.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 181. n. 14. Fringilla (Tristis) flava, fronte nigra, alis fuscis.

Fermin, Surin. II. p. 182. *Diestelfink oder Stieglitz.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla tristis.

Charlevoix, nouv. France. III. p. 156.

13. ZENA. *Der bahamische Fink.* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 587. n. 13. *der bahamische Fink.*

Halle, Vögel, p. 413. n. 424. *der schwarze Fink mit gelbrothem Unterleibe und Kinne.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 347. n. 164. *der Bahamafink.*

Onomat. hist. nat. III. p. 981. *der bahamische Fink.*

Klein, av. p. 97. n. 6. Fringilla bahamensis.

(10) Gewicht sechs Drachmen. *Büffon.*

Klein, Vorbereit. p. 180. n. 6. *der Finke von Bahama.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 97. n. 6. *bahamischer Fink.*

Brisson, ornithol. I. p. 353. n. 43. Pinçon de Bahama.

Büffon, Vögel, XI. p. 156. *der schwarz und weißköpfige Fink;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 270. n. 40. *der pomeranzengelbe Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 446. n. 46. Fringilla (Zena) nigra subtus alba, linea supra infraque oculos candida, pectore fulvo, gula macula flava.

Seligmann, Vögel, II. tab. 84. *der bahamische Fink.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 181. n. 15. Fringilla (Zena) capite nigro, fascia alba alarum supra infraque oculos, pectore fulvo.

14. Lepida. *Der havanische Fink.*

Müller, Natursyst. II. p. 585. n. 14. *der havanische Fink.*

Büffon, Vögel, XI. p. 183. *der havanische Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 289. n. 67. *der artige Fink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 167. lepid Finch.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 455. n. 73. Fringilla (Lepida) fusco-virens, fascia supra-oculari, infra-oculari gulaque fulvis, pectore nigro.

Hermann, tab. affin. anim. p. 219. Fringilla lepida.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 370. n. 5. *der havanische Fink.*

47. CARTHAGINENSIS. *Der Fink von Carthagena.*

Latham, Syn. Suppl. p. 169. n. 101. Carthagena Finch.

Latham, Vögel, II. 1. p. 309. n. 99. *der Fink von Carthagena.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 465. n. 108. Fringilla (Carthaginensis) tota cinerea fusco flavoque marginata, rostro pedibusque pallide fuscis.

48. AETHIOPS. *Der Negerfink.* (1)

Latham, Syn. Suppl. p. 165.

Latham, Vögel, II. 1. p. 263. n. 21. Var. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 442. n. 25. β. Fringilla tota nigra, rostro pedibusque concoloribus.

15. AUTUMNALIS. *Der Herbstfink.*

Müller, Natursyst. II. p. 585. n. 15. *der Herbstfink.*

Büffon, Vögel, XI. p. 184. *der Herbstfink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 288. n. 66. *der Herbstfink.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 455. n. 72. Fringilla (Autumnalis) virens, pileo ferrugineo, crisso testaceo.

16. CITRINELLA. *Der Citronenfink.* (2)

Müller, Natursyst. II. p. 586. n. 16. *der Citronenfink.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 139. n. 4. *der Citronenfink.*

Brisson, ornith. I. p. 357. n. 51. Serin d'Italie.

 Büffon,

(1) Nach *Latham* eine Varietät von *Fringilla Nitens*, p. 909. n. 49.

(2) Ist nicht mit *Emberiza Citrinella* p. 870. n. 5. zu verwechseln.

Büffon, X. p. 199. 200. 203. *der Verturon, oder italienische Kanarienvogel Citrinlein, Zitrinchen;* m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Vögel, II. 1. p. 288. n. 64. *der Citronen-Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 454. n. 70. Fringilla (Citrinella) subvirescens, dorso fusco-maculato, pedibus incarnatis, corpore subtus flavescente.

Gesner, Vögelb. p. 142. *Citrinlein;* m. e. Fig.

Charleton, onom. zoic. p. 80. n. 7. Citrinella.

Jonston, av. p. 101. Citrinella Gesneri, quam Galli *Tarin* vocant.

Zinnan. Uov. p. 62. tab. 9. fig. 53. Verzellino.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla Citrinella.

Amusemens innocens, ou le parfait Oiseleur. p. 42.

17. SERINUS. *Der Girlitz.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 586. n. 17. *der Grünfink.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 140. n. 6. *der Grünfink; Girlitz; Hirngrill.*

Ebert, Naturl. II. p. 138. *Hirngrillen; Girlitze.*

Halle, Vögel, p. 395. n. 403. *das Kanarienzeischen.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 511. n. 6. *der Hirngrill* (unter den *Loxiis*).

Gesner, Vögelb. p. 143. *Fädemlein; Schwäderlein; Girlitz*, m. e schl. Fig.

Brisson, ornith. I. p. 356. n. 50. Serin.

Büffon,

(3) Wird im Käfig an 15 Jahr alt: *Gesn.* — *Scopoli* und *Bechstein* zählen ihn des Schnabels halber unter die Loxias. — *Büffon* verwechselt ihn mit dem Kanarienvogel und dem Citronenfinken, und sieht alle drey als Abänderungen an. — Einige betrachten ihn so gar als einen wild gewordenen Bastard vom Kanarienvogel.

Büffon, Vögel, X. p. 199. 200. *Cini, Cinit, Cigni.* p. 201. *der grüne Kanarienvogel aus Provence.* p. 203. *Serin.*

Batsch, Thiere, I. p. 351. *der eigentliche Grünfink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 287. n. 63. *der Girlitz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 454. n. 69. Fringilla (Serinus) subvirescens, mandibula inferiore albida, dorso lateribus fusco-maculatis, fascia alarum flava.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 169. n. 205. *der gelbgrüne Dickschnabel.*

Naturforsch. XIII. p. 187. *Fringilla Serinus*, vergl. mit XV. p. 158. (4)

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 624. *der Cini.*

Kramer, Austr. p. 368. n. 7. Fringilla vertice collo antice pectore et uropygio flavis, dorso virescente; remigibus rectricibusque nigricantibus margine albidis. *Hirn-Grillerl.*

Belon, hist. nat. des ois. p. 354. Serin.

Belon, portr. des ois. p. 90. Serin; Senicle; Cerisin; Cinit; Cedrin.

Jonston, av. p. 101. Serinus Gesneri.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla Serinus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 370. n. 6. *der Grünfink; Girlitz.*

18. SENEGALA. *Der senegalische Fink.*

Müller, Natursystem, II. p. 586. n. 18. *der senegalische Fink.*

Brisson, ornithol. I. p. 364. n. 63. Sénégali rouge.

(4) *Sander* und *Götz* fanden beyde die braunen Flecken auf dem Rücken, und an der Seite nicht. Auch *Kramer* gedenkt ihrer nicht.

Büffon, Vögel, XI. p. 71. *der Senegali; rubinfarbene Senegali;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 303. n. 83. *der Senegalische Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 461. n. 93. Fringilla (Senegala) fusco ferruginea, vertice subtusque rufa, rostro rubro nigro-striato.

β. *Büffon*, IV. p. 100. n. 2. le Danbick. *

Büffon, Vögel, XI. p. 72. *der Danbick.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 304. *Danbik.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 462. n. 93. β.

19. Noctis. *Der Nachtfink.* (5)

Müller, Natursyst. II. p. 586. n. 19. *der Nachtfink.*

Brisson, ornith. I. p. 339. n. 23. Pere noir.

Büffon, Vögel, X. p. 155. *der schwarze Sperling,* p. 156. *Tohualtototl.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 262. n. 20. *der Fink mit gelbrothem Kinn.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 441. n. 24. Fringilla (Noctis) nigra, gula lorisque rufis, rostro nigro.

31. Martinicensis. *Der martinikische Fink.* (6)

Latham, Vögel, II. 1. p. 312. n. 110. *der Martinikische Fink.*

49. Nitens. *Der glänzende Fink.* (7)

Brisson, ornithol. I. p. 340. n. 24. Pere noir à bec rouge.

Büffon,

(5) *Latham* rechnet auch die *Tanagra ruficollis*, p. 894. n. 32. als Varietät hieher.

(6) Nach *Latham* eine Varietät vom vorhergehenden, und mit *Tanagra ruficollis* einerley.

(7) Nach *Büffon* eine Varietät von *Fringilla Noctis*, n. 19.

Büffon, Vögel, X. p. 157. *der brasilianische Sperling;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 262. n. 21. *der glänzende Sperling.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 442. n. 25. Fringilla (Nitens) chalybeo - nigra, rostro pedibusque carneis.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 13. 2. Passer indicus brachyurus.

Jonston, av. p. 96. Passer indicus brachyurus.

b. *Büffon*, Vögel, X. p. 156. *der cayennische Sperling;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 262. n. 21. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 442. n. 25. β. Fr. tota nigra rostro pedibusque concoloribus. (8)

50. Melanictera. *Der schwarz - und orangefarbene Fink.* (9)

Büffon, Vögel, X. p. 156. *der makaische Sperling;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 263. n. 22. *der schwarz- und orangefarbige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 442. n. 26. Fringilla (Melanictera) nigra, abdomine albo - maculato, alis caudaque ferrugineo - marginatis.

51. Melanoleuca. *Der weißbrüstige Sperling.* (10)

Büffon, Vögel, X. p. 156. *der javanische Sperling;* m. e. Fig.

(8) *Latham* ist noch ungewiss, ob *Büffons* Moineau de Cayenne als Spielart hieher gehöre; rechnet aber die *Fringilla Aethiops*, p. 908. n. 48. als Spielart hieher.

(9) Nach *Büffon* eine Varietät von *Fringilla Noctis*, n. 19.

(10) Nach *Büffon* eine Varietät von *Fringilla Noctis*.

Latham, Vögel, II. 1. p. 263. n. 23. *der weiss-brüstige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 442. n. 27. Fringilla (Melanoleuca) nigra, fascia pectoris alba.

52. PECORIS. *Der Kuhfink.*

Brisson, ornith. I. p. 352. n. 41. Pinçon de Virginie.

Büffon, Vögel, XI. p. 148. *der braune Fink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 345. n. 158. *der Kuhfink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 263. n. 24. *der Kuhfink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 443. n. 28. Fringilla (Pecoris) fusca, subtus dilutior, cauda subforcipata.

Latham, Syn. Suppl. p. 165. Cowpen Finch.

Seligmann, Vögel, II. tab. 68. *der braune Sperling.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 370. n. 7. *der Kuhfink.*

20. SINICA. *Der chinesische Fink.* (1)

Müller, Natursyst. II. p. 586. n. 20. *der chinesische Fink.*

Brisson, ornith. I. p. 355. n. 47. Pinçon de la Chine.

Büffon, Vögel, XI. p. 167. *der olivenfarbigte Fink.*

Latham,

(1) Ist nicht mit *Fringilla Sinensis* p. 915. n. 66 zu verwechseln. — Im Suppl. p. 161. sagt *Latham*, dass der *chinesische Tanager* p. 897. n. 37. der grössten Wahrscheinlichkeit nach, das Weibchen von diesem *chinesischen Finken* sey. Er muss aber in der Folge seine Meinung wieder geändert haben, denn er führt im Syst. ornith. nicht nur beyde als verschiedene Gattungen auf, sondern citirt auch die Stelle aus dem Suppl. nicht. — Cf. *Lath.* Vögel, II. 1. p. 227.

Latham, Vögel, II. 1. p. 271. n. 43. *der Chinesische Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 447. n. 49. Fringilla (Sinica) ruso-olivacea, subtus testacea, remigibus rectricibusque nigris basi luteis.

53. MELANOCEPHALA. *Der schwarzköpfige Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 272. n. 45. *der schwarzköpfige Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 448. n. 52. Fringilla (Melanocephala) ferrugineo-fusca, capite, iugulo remigibusque nigris, cervice abdomineque albis, rostro rubro.

54. FUSCA. *Der braune Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 272. n. 46. *der braune Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 448. n. 53. Fringilla (Fusca) fusca, marginibus pennarum nigricantibus, subtus fusco-alba.

55. NAEVIA. *Der weißwangige Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 272. n. 44. *der weißwangige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 448. n. 51. Fringilla (Naevia) cinerea maculis obscuris, subtus cinerea, genis albis, loris rufis, striga maxillari nigra.

56. EUSTACHII. *Der Fink von St. Eustach.*

Klein, av. p. 90. n. 15. Passer africanus eximius.

Klein, Vorbereit. p. 167. n. 15. *großer Africaner.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 91. n. 14. *großer Africaner.*

Brisson, ornithol. I. p. 356. n. 48. Pinçon de l'Isle de St. Eustache.

Büffon,

Büffon, Vögel, XI. p. 169. *der gelbe und rothe Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 272. n. 47. *der Fink von St. Eustach.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 448. n. 54. Fringilla (Eustachii) flava subtus aurantia, macula infra oculos caerulea, alis caudaque rubris.

57. VARIEGATA. *Der bunte Fink.*

Brisson, ornith. I. p. 356. n. 49. Pinçon varié de la nouvelle Espagne.

Büffon, Vögel, XI. p. 171. *der Tuite.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 273. n. 48. *der bunte Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 448. n. 55. Fringilla (Variegata) rubro flavo caeruleo alboque variegata, pectore lutescente-nebuloso, rectricibus apice margine albo.

21. NIVALIS. *Der Schneefink.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 587. n. 21. *der Schneefink.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 187. n. 3. Fringilla (Nivalis) fusca subtus nivea, remigibus secundariis tectricibusque albis; *der Schneefink.*

Brisson, ornith. I. p. 351. n. 39. Pinçon de neige ou Niverolle.

Büffon, Vögel, XI. p. 142. *der Schneefink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 259. n. 15. *der Schneefink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 440. n. 19. Fringilla (Nivalis) nigra subtus nivea, remigibus secundariis rectricibusque albis.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 370. n. 8. *der Schneefink.*

β. *Latham*,

(3) Ist nicht mit *Emberiza nivalis* zu verwechseln.

β. *Latham*, Vögel, II. 1. p. 259. n. 15. n. i.
Latham, Syst. ornith. I. p. 440. n. 19. β. Fr. hypochondriis nigro striatis, rectricibus extimis macula cuneiformi alba.

58. MONTICOLA. *Der canadische Bergfink* (4)

Pennant, arct. Zool. II. p. 347. n. 163. *der Baumfink; Feldsperling.*
Brisson, ornith. I. p. 335. n. 15. Moineau de Canada.
Büffon, Vögel, X. p. 187. *der canadische Sperling.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 260. n. 16. *der Bergsperling.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 434. n. 3. Fringilla (Canadensis) castaneo et griseo-fusco varia, subtus cinerascens, macula ad basin rostri rufescente, fascia alarum duplici alba.

59. CAPSA. *Der Dattelsperling.*

Büffon, Vögel, X. p. 161. *der Dattelsperling.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 260. n. 17. *der Dattelsperling; Capsa-Fink.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 440. n. 2. Fringilla (Capsa) rufo grisea, facie gulaque alba, alis caudaque nigris, cauda forficata.
Shaw, Reis. p. 164. *der Capsa-Sperling.*
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 624. *der Dattelsperling.*

60. AR-

(4) Ich finde bey *Pennant* in der arctischen Zoologie alle in unserm System hier und bey *Fringilla montana*, p. 925. n. 37. bemerkte Synonymen zusammen gezogen; gleichwohl scheint *Pennant* beyde für verschiedene Gattungen zu halten. Da er aber so sehr viel Aehnlichkeit mit unserm *Feldsperling* hat, so hat er die wenigen Veränderung vielleicht dem Clima zu danken, und ist weiter nichts als die amerikanische Art unsers Feldsperlings.

60. Arcuata. *Der Halbmondfink.*

Brisson, ornith. I. p. 336. n. 16. Moineau du cap de bonne espérance.

Büffon, Vögel, X. p. 194. *der kapsche Sperling oder Kernbeisser;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 269. n. 18. *der Halbmond-Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 440. n. 21. Fringilla (Arcuata) castanea, subtus alba, capite colloque inferiore nigris, torque taeniaque pone oculos albis.

61. Elegans. *Der schöne Fink.*

Büffon, Vögel, X. p. 179. *der bunte afrikanische Sperling;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 261. n. 19. *der schöne Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 441. n. 22. Fringilla (Elegans) supra viridis collo cinereo, pectore flavo, capistro gula uropygio caudaque rubris, abdomine maculis lunatis albis.

22. Butyracea. *Der gelbe Fink.* (5)

Müller, Natursyst. II. p. 587. n. 22. *der indianische Grünling.*

Onomat. hist. nat. III. p. 671. *der indianische Grünling.*

Klein, av. p. 89. ad. n. 13.

Klein, Vorbereit. p. 167. ad n. 13. in fin.

Klein, verb. Vögelhist. p. 91. ad n. 13.

Brisson, ornith. I. p. 360. n. 55. Verdier des Indes.

Büffon, Vögel, XI. p. 251. *der indianische Grünling;* m. e. Fig.

Latham,

(5) Ist wahrscheinlich doch wohl mit *Loxia butyracea*, p. 855. einerley. *Latham* rechnet so gar *Büffons Vert brünet*, und *Verdier du Cap de b. E.* zu Loxia butyracea.

Latham, Vögel, II. 1. p. 289. n. 68. *der gelbe Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 455. n. 74. Fringilla (Butyracea) virens, superciliis pectore abdomineque flavis, remigibus primoribus margine exteriore albis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 63. *der indianische Grünling.*

Bankroft, N. G. von Guian. p. 109. *der guianische Grünling.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla butyracea.

23. CANARIA. *Der Kanarienvogel.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 587. n. 23. *der Canarienvogel;* tab. 25. Fig. 7.

Leske, Naturgesch. p. 263. n. 4. *der Kanarienvogel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 141. n. 7. *der Canarienvogel.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 188. n. 6. Fringilla (Canaria) rostro corporeque albo-flavescente, rectricibus remigibusque virescentibus; *der Canarienvogel*, ehedem *Zuckervöglein.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 521. n. 9. *der Canarienvogel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 895. *der Kanarienvogel.*

Funke, Naturgesch. I. p. 260. *der Kanarienvogel.*

Ebert, Naturl. II. p. 137. *der Canarienvogel, Canariensperling, Zuckerspatz.*

Halle, Vögel, p. 369. n. 364. *der Kanarienvogel.*

Meyer, Thiere, II. tab. 32. *Kanarienvogel.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 409. n. 346. *der Canarienvogel.*

Neuer

(6) Gewicht 220. Gran *Halle.*

Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 23. *Canarienvogel.*
Onomat. hist. nat. II. p. 490. *Canarienvogel.*
Handb. der Naturgesch. II. p. 239. *Canarienvogel.*
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 132. *Canarienvogel.*
Klein, av. p. 88. n. 3. Passer canarius. Avis canaria.
Klein, Vorbereit. p. 164. n. 3. *der kanarische Sperling.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 90. n. 3. *Canariensperling.*
Klein, Stemmat. av. p. 17. tab. 18. Fig. 3. a. b.
Brisson, ornith. I. p. 358. n. 52. Serin des Canaries.
Büffon, Vögel, X. p. 195. *der Kanarienvogel;* m. 2. Figg. M. u. W.
Batsch, Thiere, I. p. 351. *der Canarienvogel.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 284. n. 62. *der Canarienvogel.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 454. n. 68. Fringilla (Canaria) rostro corporeque albo - flavicante, remigibus rectricibusque virescentibus.
Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 427. *der Canarienvogel.*
Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 4. *Kanarienvogel.*
Beckmann, Naturhist. p. 54. d. *der Kanarienvogel.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 68. *Canarienvogel.*
Naturforsch. XVII. p. 94. n. 190. *der Canarienvogel.*
Wirsing, Vögel, tab. 18. et 29. *Canarien-Vogel.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 356. *der Canarien-Vogel.*
Oekonom. Zool. p. 100. n. 45. *der Kanarienvogel.*

Her-

Hervieux, traité des Serins des Canaries. Par. 1713. 12.

Hervieux, Nachricht von den Canarienvögeln. Nürnb. 1771. 8.

Unterricht von den verschiedenen Arten der Canarienvögel und der Nachtigallen. Frcf. u. Lpz. 1772. 8. m. K.

Beckmann, Beytr. zur Gesch. der Erfind. I. p. 562. *Canarien-Vögel.*

Beckmann, Bibl. IV. p. 468. VI. p. 476. *Canarienvogel.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 624. *der Canarienvogel.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 153. n. 18. *Canarienfink.*

Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. I. 3. p. 63.

Anweis. Vögel zu fangen, p. 124. 608.

Angenehme Landlust, p. 349—406.

Angenehm. Zeitvertreib, p. 47. sqq.

Coler. oeconom. rural. et domest. Frcf. 1680. fol. * I. p. 621.

Allgem. Gesch. von Amerika mit *Baumgartens* Vorr. I. p. 557.

Barrington: philos. transact. LXIII. p. 249.

Krünitz, Encykl. VII. p. 576. *Canarien-Vogel.*

Smellie, Philos. der Naturgesch. I. p. 182.

Amusemens innocens, p. 51. 61.

Journal encycl. 1773. p. 538.

Gazette litter. de Berlin, 1773. p. 230.

Bresl. Samml. VII. Vers. Febr. 1719. p. 193. Vom Canarienvögel-Handel.

H. B. D. kurze doch gründliche Nachricht von den Canarienvögeln. — Stuttg. select. phys. oeconom. 1749. I. p. 65.

Abhandl. von den Canarienvögeln, aus dem XIV. B. des englischen kurzen Systems der natürlich.

Geschichte, p. 156. — Hannöv. gel. Anz. 1754. St. 90.

Von der Canarienvögel Zucht und Lust. — Lpzg. Samml. 1758. St. 155. p. 933.

Neue lustige und vollständige Jagdkunst, so wohl von den Vögeln als auch andern Thieren, nebst einer Nachricht von den Canarienvögeln. Leipz. 1760. 8.

Eine Erfahrung über die Krankheit der Canarienvögel. Wittenb. Wochenbl. 1769. p. 350.

Le Serin de Canarie; Poeme, p. Mr. l'Abbé B. Lond. 1755. 8.

Acanthides Canariae s. Spini; gallice les Serins. Carmen Auth. *Ioh. Lud. Clairambault* Paris, 1737. 8.

Von den Canarienvögeln, nach Anleitung eines lateinischen Gedichts des Herrn Clairambault. Phys. ökonom. Patriot. Hamb. 1758. 4. p. 203.

Luc. Schroeckii obs. de raro passerum canariensium colore. Misc. nat. cur. A. 1675. et 76. obs. 230.

Naturgesch. der schönsten Vögel, p. 65.

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 389.

Von den Krankheiten und Kur der Canarienvög. — Neues berlin. Intelligenzbl. 1785. p. 1693.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. Canaria.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 9. Canaria.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 181. n. 18. Fringilla (Canaria) rostro corporeque albicante, rectricibus remigibusque virescentibus.

Brünniche, ornith. bor. p. 69. n. 259. Fringilla Canaria.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 12. Passer Canarius.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 298. Luteola Canaria. Canaria avicula. Citrina canariensis. Avicula saccha-

saccharina. *Canarien-Vogel*; *Zucker-Vogel*; *Canarien-Zeisle.*

Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 303. Passer Canarius.

Jonston, av. p. 98. Passer Canarius.

Zinnan. Uov. p. 60. tab. 8. Fig. 49. tab. 9. Fig. 50. Passere di Canaria.

Hist. Prov. I. p. 512. Serin des Canaries.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla Canaria.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 371. n. 9. *der Kanarienvogel.*

β. *Büffon*, Vögel, X. p. 274. *der Zeisig von Mozambique*; m. 2. Figg.

Latham, Syn. II. 1. p. 296. n. 62. Var. A.

Latham, Vögel, II. 1. p. 286. n. 62. Var. A. *der Fink von Mozambik.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 454. n. 68. β.

γ. *Brisson*, ornith. I. p. 258. n. 52. A. Serin mulet.

Büffon, Vögel, X. p. 208.

24. Flaveola. *Der Saffranstirnige Fink.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 589. n. 24. *der Gelbfink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 288. n. 65. *der saffranstirnige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 455. n. 71. Fringilla (Flaveola) flava, dorso virescente, fronte fulva, remigibus rectricibusque nigris, flavo-marginatis.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 428. *der Gelbfinke*, *Graufinke*, *Goldfinke.*

25. Spinus. *Der Zeisig.* (8)

Müller, Natursyst. II. p. 598. n. 25. *der Zeisig.*

 Leske,

(7) *Latham* vermuthet, es sey ein *Bastardvogel.*

(8) Nistet in Schwarzwäldern, besonders in Fichtenwäldern auf den äussersten Spitzen der hohen Zweige, seltener auf Erlenbäumen

Leske, Naturgesch. p. 363. n. 5. *der Zeisig.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 142. n. 8. *der Zeisig.*
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 188. n. 7. Fringilla (Spinus) remigibus medio luteis: primis quatuor immaculatis, rectricibus basi flavis, apice nigris; *der Zeisig; Erlenfink.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 520. n. 8. *der Zeisig.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 594. *der grüne Hänfling oder Zeislein.*
Funke, Naturgesch. I. p. 268. *der Zeisig.*
Ebert, Naturl. II. p. 139. *der Zeisig, Ziesel, Ziesschen, grüne schwarzplattige Hänfling.*
Halle, Vögel, p. 393. n. 400. *das Zeischen.*
Meyer, Thiere, II. tab. 76. *Zeislein.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 410. n. 347. *der Zeisig; Zeissig; Zinsle; Ziesel; Zising; Erlenfink; Zeisgen; Ziesgen; Zeislein; Zischen, Zeischen; Zeisichen.*
Beckmann, Naturhist. p. 54. e. *das Zeisgen.*

Pen-

bäumen, die an Waldbächen stehen. Das Nest ist auswendig mit Puppengehülsen und haarigem Corallenmoos an den Zweig befestigt. Auswendig sind einige Reischen und Würzelchen mit diesen Haarflechten, Distelbürsten und Pflanzenwolle verwebt, und die inwendige Fütterung besteht aus ganz kleinen Würzelchen. Uebrigens ist es sehr gut gebauet und halbkugelförmig. Dass sehr selten ein solches Nest gefunden wird, kommt wohl ohnstreitig daher, weil es nicht nur sehr hoch angelegt, sondern auch klein und von den Blättern und Zweigen, besonders in der Entfernung schwer zu unterscheiden ist. Daher sagt auch *Kramer*, dass man in den Waldungen an der Donau junge Zeisige zu tausenden anträfe, bey denen die ersten Federn noch nicht verlohren gegangen, und dass es doch selten sey, Junge im Neste zu finden. Das Weibchen legt 5. bis 6. weissgrüne Eyer. Brütet wahrscheinlich mehrmals im Jahre. — Das Männchen begattet sich gern mit der Kanariensie. So auch umgekehrt. — Wird etwa 10 Jahr alt. — Das Fleisch ist fett und wohlschmeckend. — In Preussen fängt man oft viele tausende.

Pennant, arct. Zool. II. p. 357. I. *der Zeisig.*
Neuer Schaupl. d. N. III. p. 617. X. p. 166. *Zeisig.*
Onomat. hist. nat. VII. p. 259. *der Zeißig.*
Handb. der Naturgesch. II. p. 228. *der Zeisich.*
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 131. *Zeisig.*
Klein, av. p. 94. n. 6. Linaria viridis.
Klein, Vorbereit. p. 174. n. 6. *Zeisgen.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 99. n. 6. *Zeisichen.*
Klein, Stemmat. av. p. 20. tab. 18. Fig. 4. a—c.
Gesner, Vögelb. p. 555. *Zinßlein; Zeiselein; Zieselein; Zischen; Gelbvogel; Sisgen*; m. e. Fig.
Brisson, ornith. I. p. 325. Tarin.
Büffon, Vögel, XI. p. 321. *der Zeisig*; m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 355. *der Zeisig.*
Latham, Syn. Suppl. p. 166. *Siskin.*
Latham, Vögel, II. 1, p. 281. n. 58. *der gemeine Zeisig.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 452. n. 65. Fringilla (Spinus) remigibus medio luteis, primis quatuor immaculatis, rectricibus basi flavis, apice nigris.
Beseke, Vögel Kurl. p. 79. n. 173. *der Zeisig.*
Siemßen, mecklenb. Vögel, p. 118. n. 4. *der Zeisig, Ziesk.*
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 428. *das Zeischen.*
Cetti, Sardin. II. p. 205. *der Zeisig.*
Fischer, Livl. p. 99. n. 155. *Zeisig.*
Pontoppidan, Norweg. II. p. 178. *Siisgen.*
Pennant, britt. Thiergesch. p. 125. n. 6. tab. 57. Fig. 5. *Zeischen.*
Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *Zeisige.*
Linné, Abhandl. II. p. 304. n. 130. *der Zeisig.*
Storr, Alpenreise, I. p. 79. *Zeisig.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 175. n. 212. *das Zeislein.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 65. *Zeisig.*

Naturforsch. XVII. p. 95. n. 192. *der Zeisig.* XXV. *der Strumpfweber.*

Naumann, Vogelsteller, p. 68. *der Zeisig.* p. 71. *der Strumpfweber.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 352. *das grün-gelbe Zeislein.*

Onomat. forestal. I. p. 752. *Erlenfinke.*

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 635. *der Zeisig.*

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 385. 390. *Zeisig.*

Oekonom. Zool. p. 100. *der Zeisig.*

Hamb. Magaz. XVIII. p. 243.

Dresdner Magazin, I. p. 7. tab. 1. (Ein Nest mit 6. Eyern.)

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 389. n. 11. *der Zeisig.*

Krünitz, Encykl. XIII. p. 419. *Erlenfink.*

Schlef. ökonom. Gesellsch. 1781. p. 103. Fringilla Spinus.

Meidinger, Vorlesung. I. p. 150. n. 5. *der Zeisig.*

Eberhard, Thiergesch. p. 79. *der Zeisig.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 1430. *Zeislein.*

Anweis. Vögel zu fang. p. 578. *das Zeislein.*

Loniceri, Kräuterb. p. 683. *Zeislein.*

Hannöv. neue gesellsch. Erzähl. IV. p. 138.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 8. Spinus.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 181. n. 19. Fringilla (Spinus) remigibus medio luteis; primis quatuor immaculatis, rectricibus basi flavis, apice nigris.

Kramer, Austr. p. 366. n. 2. Fringilla remigibus medio luteis; primis quatuor immaculatis, rectricibus duabus extimis, reliquisque apice albis; *Zeisel; Zeiserl.*

Charleton, exercitat. p. 87. Spinus seu Ligurinus.

Charle-

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 2. Spinus seu Ligurinus.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 297. Luteola germanica. Χλωρις Euberi et Peuceri. Serinus quasi Syren. Seris. Citrina. *Zeisich*, *Zeisel; Zeisgen; Zensle; Zißle.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 420. Spinus seu Ligurinus; Serinus; Citrina; Luteola; Zizela.

Jonston, av. p. 94. Acanthis.

Belon, hist. nat. des ois. p. 355. Θραυπις. Traupis, Tarin.

Barrere, ornith. p. 57. Carduelis virescens, capite et alis nigris.

Salerne, hist. nat. des ois. p. 288.

Roman. ornith. p. 118. tab. 18. Fig. 2.

Histoir. Prov. I. p. 513.

Levin, britt. Birds. II. tab. 82.

Bomare, diction. VIII. p. 431. Tarin.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla Spinus.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 371. n. 10. *der Zeisig.*

β. *Der schwarze Zeisig.*

Klein, av. p. 93. n. 5. Linaria s. Luteola nigra?

Klein, Vorbereit. p. 174. n. 5. *schwarzer Hänfling?*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 99. n. 5. *schwarzer Hänfling?*

Brisson, ornithol. I. p. 325. A. Tarin noir.

Büffon, Vögel, XI. p. 340. *der schwarze Zeisig.*

Latham, Syn. II. 1. p. 291. n. 58. Var. A.

Latham, Vögel, II. 1. p. 283. n. 58. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 453. n. 65. β.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 297. Luteola nigra.

γ. *Der Zeisig von Neuyork.* (9)

Pennant, arct. Zool. II. p. 346. n. 160. *der Zeisig von Neuyork.*

Büffon, Vögel, XI. p. 338. *der neuyorksche Zeisig;* m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Syn. II. 1. p. 291. n. 58. Var. B.

Latham, Vögel, II. 1. p. 283. n. 58. Var. B.

Latham, Syst. ornith. I. p. 452. n. 64. β. Fringilla olivaceo-fusca, subtus alba, collo, pectore uropygioque flavis, remigibus rectricibusque nigris, albo marginatis.

δ. *Der olivenfarbige Zeisig.*

Büffon, Vögel, XI. p. 339. *der olivenfarbne Zeisig.*

Latham, Syn. II. 1. p. 291. n. 58. Var. C.

Latham, Vögel, II. 1. p. 283. n. 58. Var. C.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 453. n. 65. γ.

ε. *Der schwarzbrüstige Zeisig.* Bechst. *

Latham, Vögel, II. 1. p. 283. not. m. Var. B.

ζ. *Der bunte Zeisig.* Bechst. *

Latham, Vögel, II. 1. p. 284. not. o. Var. C.

η. *Der weiße Zeisig.* Bechst. *

Latham, Vögel, II. 1. p. 284. not. o. Var. D.

ϑ. *Der Bastardzeisig?*

Büffon, Vögel, XI. p. 337. *der Bastardzeisig.*

62. Mexi-

(9) In der ersten Ausgabe des arct. Zool. giebt *Pennant* diesen Zeisig von Neuyork für eine eigne Gattung aus. In der neuen Ausgabe 1792. aber versichert er, dass er mit *Fringilla Tristis*, p. 907 n. 12. einerley sey. *Latham* hat ihn in der Synops. als Varietät vom *Zeisig*, im Syst. ornith. aber ebenfalls als Spielart vom *amerikanischen Stieglitz* aufgeführt.

62. MEXICANA. *Der mexicanische Zeisig.*

Brisson, ornithol. I. p. 326. n. 5. Tarin du Mexique.

Büffon, Vögel, XI. p. 342. *der Acatechili.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 284. n. 59. *der Mexicanische Zeisig.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 453. n. 66. Fringilla (Mexicana) fusco-virescens, subtus albida.

Fernandez, hist. av. nov. Hisp. c. 13. Acatechichictli seu avis confricans se ad arundines.

63. CATOTOL. *Der schwarze mexicanische Zeisig.*

Brisson, ornithol. I. p. 326. n. 6. Tarin noir du Mexique.

Büffon, Vögel, XI. p. 341. *der Catotol.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 284. n. 60. *der schwarze Mexikanische Zeisig.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 453. n. 67. Fringilla (Cacatototl) nigricante fulvoque varia, subtus candida.

Fernand. nov. Hisp. c. 197. Cacatototl.

64. BARBATA. *Der bärtige Fink.*

Molin. N. G. von Chili, p. 219. *der Siu;* Span. *Gilghero.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 312. n. 111. *der bärtige Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 456. n. 76. Fringilla (Barbata) lutea, alis viridibus, nigro rubroque maculatis, gula barbata.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 372. n. 11. *der Siu.*

65. DIUCA. *Der Diuka.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 313. n. 112. *der Diuka-Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 456. n. 77. Fringilla (Diuca) caerulea gula alba.

66. SINENSIS. *Der chinesische Zeisig.* (10)

Latham, Vögel, II. 1. p. 284. n. 61. *der Chinesische Zeisig.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 477. n. 50. Fringilla (Asiatica) olivacea subtus flava, capite nigro, tectricibus alarum minoribus fasciis duabus nigris, remigibus rectricibusque nigris, basi flavis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 157. *der chinesische Tarrain.*

36. FLAMMEA. *Der Brandfink.* (1)

Müller, Natursyst. II. p. 590. n. 26. *der Brandfink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 354. D. *der feuerfarbige Fink.*

Onomat. histor. natur. III. p. 375. *der rothgehaubte Fink.*

Klein, Vorbereit. p. 174. n. 5. *schwarzer Hänfling?*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 99. n. 5. *schwarzer Hänfling?*

Brisson, ornithol. I. p. 349. n. 36. E. Pinçon hupé.

Büffon, Vögel, XI. p. 110. *der Brandfink.*

Latham,

(10) Ist nicht mit *Fringilla Sinica* p. 910. n. 20. zu verwechseln.

(1) Nach *Brisson* eine Varietät von *Fringilla Coelebs.* — *Kleins Luteola nigra* rechnet *Brisson* zur Var. β von *Fringilla Spinus. Latham* ist ihm hierin gefolgt, führt aber den *Klein* bey *Fringilla flammea* ebenfalls an. Eins ist wohl ein Schreibfehler. — *Linné* hat zwar schon in der X. Edition *Kleins Luteola nigra* zu seiner *Fringilla flammea* gerechnet. Aber Klein sagt von dem Vogel nichts weiter, als dass er *verticem flavicantem* habe, und beruft sich auf *Schwenkfeld.* Wohin soll nun das Synonym gehören?

Latham, Vögel, II. 1. p. 253. n. 11. *der rothhaubige Fink*, tab. 48. fig. 1.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 438. n. 13. Fringilla (Flammea) fusca, crista flammea, corpore subtus roseo.

Beseke, Vögel Kurl. p. 79. n. 174. *der Brandfink?*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 428. *der Brandfinke.*

Naturforsch. XVII. p. 95. n. 193. *der Brandfink.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 158. n. 20. *schwarzer Hänfling; Brandfink.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 2. Fringilla crista flammea.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 182. n. 20. Fringilla (Flammea) fusca, crista flammea.

27. Flavirostris. *Der gelbschnäblige Fink.* (2)

Müller, Natursyst. II. p. 915. n. 27. *der Gelbschnabel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 353. A. *der arctische Fink.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 176. *der braune Riset.*

Brisson, ornithol. I. p. 348. n. 36. B. Pinçon brun.

Büffon, Vögel, XI. p. 108. *der gelbschnäblichte Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 254. n. 12. *der Arktische Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 438. n. 16. Fringilla (Flavirostris) fusca, rostro flavicante, pennis pectore apice roseis, cauda subforcipata.

Fischer, Liv. p. 99. n. 156. *Gelbschnabel.*

Pallas,

(2) Nach *Brisson* eine Varietät von *Fringilla Coelebs.*

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 11. n. 21. Fringilla *flavirostris* Lin.

Borkhausen, Magazin, I. p. 158. n. 21. *Gelbschnabel.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 3. Fringilla fusca.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 182. n. 21. Fringilla (Flavirostris) fusca, rostro flavicante.

28. Canabina. *Der Bluthänfling.* (3)

Müller, Natursystem, II. p. 590. n. 28. *der Hänfling.*

Leske,

(3) Bey dieser und den 4. folgenden Gattungen findet nicht nur eine grosse Verwechselung der Synonymen Statt, sondern es scheint auch nach neuern Bemerkungen noch nicht ganz ausgemacht, ob dies wirklich lauter verschiedene Gattungen oder zum Theil nur Spielarten sind. Die auffallende Verschiedenheit in den Farben der Hänflingsmännchen, die bloss im Alter und in der Jahrszeit ihren Grund hat, hat zu grossen Verwirrungen Anlass gegeben. *Bechstein* hat aus vieljährigen Beobachtungen und Erfahrungen es neuerlich sehr wahrscheinlich gemacht, dass die *Fringilla Canabina*, *Linota*, und *Montium* ein und eben derselbe Vogel sind, und auch *Fringilla Argentoratensis* als Spielart hieher gehöre. Ihm nach ist denn die *Fringilla Canabina* ein altes Männchen des gemeinen Hänflings, oder der *Linota*; und die *Fringilla montium* ein einjähriges Männchen, so im gemeinen Ausdruck *grauer Hänfling*, *Weißhänfling*, *Mehlhänfling* heisst, dahingegen jenem, wenn es wenigstens 3. Jahr alt ist, der Name *Bluthänfling* zukommt. — *Steinhänfling* oder *gelber Hänfling*, ist der graue Hänfling nach dem zweyten Mausern. S. *Lath.* Vögel, II. 1. p. 292. not. 9. — Den *Bluthänfling* und *gemeinen Hänfling* hat schon *Zorn* für einerley gehalten; und *Büffon* ist gleichfalls der Meinung, dass der *Steinhänfling* (Fr. montium) nur als Abart hieher gerechnet werden möge. So viel ist gewiss, dass die rothe Farbe der Kopfplatte und der Brust sich im Zustande der Gefangenschaft beym ersten Mausern verlieret, und nie wiederkömmt, und dass sie bey denen, die jung in die Stube gebracht werden, niemals zum Vorschein kommt. — Der Vogel soll über 16. Jahr alt werden.

Leske, Naturgesch. p. 263. n. 6. *der Hänfling.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 142. n. 9. *der Hänfling.*

Blumenbach, Handb. der N. G. p. 189. n. 8. Fringilla (Canabina) remigibus primoribus rectricibusque nigris, utroque margine albis; *der Hänfling; Leinfink; die Artsche.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 518. n. 6. *der Hänfling.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 593. *der Bluthänfling.*

Funke, Naturgesch. I. p. 264. *der Bluthänfling.*

Ebert, Naturl. II. p. 138. *Hänfling; Flachsfinke.*

Halle, Vögel, p. 390. n. 395. *der Karminhänfling.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 411. n. 348. *Hänfling, Braunhänfling; Grauhänfling; Steinhänfling; Leinfink; Artsche.*

Neuer Schaupl. der Nat. III. p. 615. *Hänfling.*

Onomat. hist. nat. III. p. 671. *der große Hänfling; Stockhänfling.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 352. n. 178. *der größere Rothkopf; Hänfling.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 131. *Hänfling.*

Klein, av. p. 93. n. 1. Linaria *simpliciter.*

Klein, Vorbereit. p. 173. n. 1. *Bluthänfling; blutrothe Brüstling; Flachsfink; Krauthänfling.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 99. n. 1. *Bluthänfling.*

Klein, stemmat. av. p. 18. tab. 18. fig. 8. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 29. tab. 9. fig. 13.

Brisson, ornithol. I. p. 343. n. 30. grande Linotte de vignes.

Büffon, Vögel, XI. p. 5. *der Bluthänfling;* m. c. Fig.

Batsch,

Batsch, Thiere, I. p. 353. *der Bluthänfling.*
Latham, Syn. Suppl. p. 167. greater Redpole.
Latham, Vögel, II. 1. p. 294. n. 74. *der Bluthänfling.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 458. n. 82. Fringilla (Canabina) fusco-castanea, subtus albo-rufescens, fascia alarum longitudinali alba, macula verticis pectoreque rubris.
Beseke, Vögel Kurl. p. 79. n. 176. *der Hänfling.*
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 119. n. 5. *der Bluthänfling; Rothböster; Hemperling.*
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 429. *der Hänfling.*
Fischer, Liv. p. 99. n. 157. *Bluthänfling.*
White, N. G. von Engl. p. 24. *Hänfling.*
Pallas, Reis. Ausz. III. p. 475. *Bluthänfling.*
Linné, Abhandl. II. p. 304. n. 131. *der Hänfling.*
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 48. *der Hänfling.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 180. n. 219. *der Hänfling; Flachsfink.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 338. *der Hänfling oder Leinfink.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 63. *Hänfling.*
Naumann, Vogelsteller, p. 70. *Hänfling.*
Hervieux, Canarienvög. p 146. *Hänfling.*
Naturgesch. der schönsten Vögel, p. 26. *Hänfling.*
Naturforsch. XVII. p. 96. n. 195. *der rothbrüstige Hänfling; Krauthänfling.*
Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 627. *der Bluthänfling.*
André u. Bechstein, Spazierg. IV. p. 61. 65. 132. 136.
Günther, Nest. u. Ey. tab. 58. *Hänfling.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 284. *Hänfling.*

Forst-

Forst-Fisch-u. Jagdlex. II. p. 26. *Hänfling; Hanfsinke; Flachsfinke.*

Krünitz, Encykl. XX. p. 686. *Hänfling.*

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 56. Linaria rubra.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 10. Linaria maior.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 182. n. 22. Fringilla (Canabina) remigibus primoribus rectricibusque nigris, utroque margine albis.

Kramer, Austr. p. 368. n. 8. Fringilla remigibus nigris: primoribus margine utroque albis; rectricibus nigris, utroque margine albis. *Hanefferl; Hämpfling.*

Charleton, onom. zoic. p. 80. n. 6. 2. Linaria marina Aldrovandi.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 295. Linaria mitior. *Henffling; Krauthenffling.*

Jonston, av. p. 99. Linaria marina.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 390. Linaria rubra maior.

Faun. Arragon. p. 87.

Levin, britt. Birds, II. tab. 84.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla canabina.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 372. n. 12. *der Hänfling.*

β. *Der weiße Hänfling.* *

Büffon, Vögel, XI. p. 31. n. 1.

Latham, Vögel, II. 1. p. 293. n. 4.

Zorn, Petinotheol. II. p. 52.

Naturforsch. XIX. p. 86.

γ. *Der schwarze Hänfling.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 293. n. 5.

Naturforsch. II. p. 2. n. 3.

δ. *Der*

δ. *Der Hänfling mit schwarzen Füßen, grünlichem Schnabel, und gabelförmigem Schwanz.* *

Büffon, Vögel, XI. p. 31. n. 2.

Latham, Vögel, II. 1. p. 294.

ε. *Der Bastardhänfling.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 293. n. 6.

67. Linota. *Der gemeine Hänfling.* (4)

Brisson, ornith. I. p. 343. n. 29. Linotte.

Büffon, Vögel, XI. p. 13. *der gemeine Hänfling*, p. 14. *der graue Hänfling*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 291. n. 73. *der gemeine Hänfling.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 457. n. 81. Fringilla (Linota) fusco-castanea, subtus albida, fascia alarum longitudinali alba, rectricibus nigris, marginibus undique albis.

Halle, Vögel, p. 392. n. 398. *der gemeine graue Hänfling, ohne Karmin.*

Cetti, Sardin. II. p. 202. *der braune Hänfling?*

Beseke, Vögel Kurl. p. 79. ad n. 176. *einfärbig brauner Hänfling.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 120. n. 5. β. *der graue Hänfling.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 156. n. 23. *gemeiner grauer Hänfling; gemeiner Hänfling.*

Gesner, Vögelb. p. 367. Linaria. *Leinfink; Schößzlein; Flachsfink; Henffling; Rubin.* Fig. p. 368.

Charleton, onom. zoic. p. 80. n. 6. Linaria.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 294. Linaria. *Henffling; Leinfinke; Flachs-Finke.*

Sibbald, Scot. prodr. P. II. L. 3. p. 18. Linaria vulgaris.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 390. Linaria; Aegithus; Miliaria; Linota; Papaverina.

Jonston,

(4) S. die vorhergehende Anmerkung.

Jonston, av. pag. 99. Linaria.
Belon, oiſ. p. 356. Αιγιθος; Salus. Linotte; Leinotte; Lunotte; Linette.
Barrere, ornithol. p. 55. Paſſer ex cinereo baeticus.
Zinnan. Uov. p. 61. tab. 9. fig. 51. Fanello.
Hiſt. Prov. I. p. 511.
Levin, britt. Birds. II. tab. 83.

29. Linaria. *Der Flachsfink.*

Müller, Naturſyſtem, II. p. 591. n. 29. *der Flachsfink.*
Leske, Naturgeſch. p. 264. n. 7. *der kleine rothplättige Hänfling.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 143. n. 10. *der Flachsfink; Citrinchen; Ziſerinchen.*
Blumenbach, Handb. der N. G. p. 189. n. 9. Fringilla (Linaria) remigibus rectricibusque fuſcis, margine obſolete pallido, litura alarum albida; *das Citrinchen; Gräslein; Steinſchößlein; der Bergzeiſig; Meerzeiſig; Flachsfink; Carminhänfling.*
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 520. n. 7. *der Flachsfink.*
Halle, Vögel, p. 391. n. 396. *der kleine Karminhänfling*, p. 392. n. 397. *der kleine Karminhänfling.*
Meyer, Thiere, II. tab. 25. *rothplattige Hänfling.*
Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere, II. p. 412. n. 349. *der Flachsfink; Zwitſcherling; Tſchezke; Bluthänfling; Rothhänfling; Krauthänfling; Schwarzbärtchen*, etc.
Pennant, arct. Zool. II. p. 353. n. 179. *der kleine Rothkopf; Karminhänfling.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 811. *der gemeine Hänfling.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 131. *Zwitscherlein.*

Klein, av. p. 93. n. 3. Linaria rubra minor.

Klein, Vorbereitung, p. 174. n. 3. *das Schwarzbärtchen; Zitzcherlein, Tschätzke.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 99. n. 3. *Schwarbärtchen; rothplattiger Hänfling; Tschätschke.*

Klein, stemmat. av. p. 18. tab. 18. fig. 10. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 29. tab. 9. fig. 14.

Gesner, Vögelb. p. 368. *Schößzerlein; Stockhenffling; Tschütscherlein; Finet*, m. e. Fig.

Brisson, ornithol. I. p. 344. n. 31. petite linotte de vignes.

Büffon, Vögel, XI. p. 310. *das Zitscherlein oder der Meerzeisig;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 354. *das Zitscherlein.*

Latham, Syn. Suppl. p. 167. Lesser Redpole.

Latham, Vögel, II. 1. p. 295. n. 75. *der Flachsfink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 458. n. 83. Fringilla (Linaria) fusco griseoque varia, subtus albo rufescens, fascia alarum duplici albida, vertice pectoreque rubris.

Beseke, Vögel Kurl. p. 80. n. 176. *der Flachsfink.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 121. n. 7. *der Flachsfink.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 429. *Tschetzschke.*

Cetti, Sardin. II. p. 202. *der karmosinrothe Hänfling?*

Fischer, Livl. p. 99. n. 158. *Schwarzbärtchen; Flachsfink.*

Olafsen, Isl. I. p. 312. c. *Audna-Tytlingr?*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 6. *Graasisken.*

Pontoppidan, Norweg. II. p. 154. *Irisk?*

Lepechin,

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. III. p. 13. *Hänflinge.*

Egede, Grönl. p. 88. *Irsker?*

Cranz, Grönl. p. 112. *kleine Singvögel, die den Hänflingen gleichen?*

Pennant, britt. Thiergesch. p. 127. n. 9. *Flachsfink mit kleinerm Kopfe.*

Storr, Alpenreise, I. p. 79. *Flachsfink.*

Linné, Abhandlung. II. p. 304. n. 132. *der Lein-Fink.*

Naturforsch. XVII. p. 95. n. 194. *der Hänfling; grauer Hänfling; Steinhänfling*, p. 96. n. 196. *Schwarzbärtchen; Tschetzschke.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 635. *das Zitscherlein.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 65. *Zwitscherling*, p. 66. *Zitscherling.*

Naumann, Vogelsteller, p. 69. *Schättgen, Schitscherling.*

Anweis. Vögel zu fang. p. 249. *Gräslein, oder Meerzeißlein.*

Börner, schles. ökonom. Gesellsch. 1782. p. 103. *Flachsfink.*

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 314.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 10. Linaria minor.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 182. n. 23. Fringilla (Linaria) remigibus rectricibusque fuscis margine obsolete pallido, litura alarum albida.

Kramer, Austr. p. 369. n. 9. *Grasel; Meerzeisel; Tschötscherl.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 343. Querula. *Zötscherlin; Schößerle; Stockhenffling; Todtenvogel; Meusevogel.*

Charleton, onom. zoic. p. 80. n. 6. 1. Linaria rubra.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 391. Linaria rubra minor.

Jonston, av. p. 99. Linaria rubra.

Faun. Arragon. p. 87. —

Roman. ornithol. p. 137. tab. 21.

Borrington, miscellan. p. 217.

Levin, britt. Birds. II. tab. 85.

Bomare, dictionn. V. p. 151. petite Linote de vigne.

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla Linaria.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 373. n. 12. *das Citrinchen.*

68. Montium. *Der Berghänfling.* (5)

Klein, av. p. 93. n. 2. Linaria fera.

Klein, Vorbereit. p. 173. n. 2. *Steinhänfling.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 99. n. 2. *Steinhänfling.*

Klein, stemmat. av. p. 18. tab. 18. fig. 9. a. b.

Brisson, ornith. I. p. 346. Linotte de montagne.

Büffon, Vögel, XI. p. 33. *der Steinhänfling.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 297. n. 76. *der Berghänfling.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 459. n. 84. Fringilla (Montium) nigro rufescenteque varia, subtus albida, pennis in collo inferiore medio nigris, fascia alarum alba, uropygio rubro.

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 627. *der Steinhänfling.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 294. Linaria fera; Saxatilis. *Stein-Henffling.*

β. Der

(5) S. vorher. Anmerk. 3. cf. *Bechstein*, N. G. Deutschl. III. p. 593. 594. *Latham*, Vögel, II. 1. p. 293. n. 1. — Uebrigens muss man sich hüten, dass man nicht wegen der Aehnlichkeit in der Benennung die Synonymen *Fr. Montana*, *Monticula*, *Montifringilla* und *Montium* mit einander verwechsele.

β. *Der kleine Berghänfling.* (6)

Klein, av. p. 93. n. 4. Linaria pectore subluteo.

Klein, Vorbereit. p. 174. n. 4. *gelber Quittenhänfling.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 99. n. 4. *gelber Quittenhänfling; gelbkehliger Hänfling.*

Brisson, ornith. I. p. 345. n. 32. petite Linotte ou Cabaret.

Büffon, Vögel, XI. p. 36. *der kleine Hänfling;* m. e. Fig.

Pennant, arct. Zool. II. p. 354. C. *der Berghänfling.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 297. n. 76. Var. A. *der kleine Hänfling.*

Leem, Finnm. p. 137. *noch eine Art von lieblich singenden Vögeln*, etc.?

Belon, hist. nat. des ois. III. p. 31. Picaveret.

Levin, britt. Birds. II. tab. 86.

69. ARGENTORATENSIS. *Der Straßburgische Hänfling.* (7)

Brisson, ornithol. I. p. 346. n. 34. Linotte de Strasbourg.

Büffon, Vögel, XI. p. 32. *der straßburgische Hänfling oder Gyntel.*

Gesner, Vögelb. p. 150. *Gintel;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 298. n. 77. p. 293. n. 3. *der Straßburger Hänfling.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 460. n. 87. Fringilla (Argentoratensis) fusca, subtus rufa, fusco-maculata, abdomine infimo albido.

Aldrovand. orn. p. 825. Gyntel.

(6) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

(7) Nach *Bechstein* eine Varietät vom gemeinen Hänfling. S. vorher. Anmerk. 3.

70. Angolensis. *Der angolische Fink.* (*)

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 100. n. 9. *angolischer Hänfling.*

Brisson, ornithol. I. p. 368. n. 71. Linotte d'Angola.

Büffon, Vögel, XI. p. 41. *die Vengaline;* m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Vögel, II. 1. p. 299. n. 78. *der Angolische Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 460. n. 87. Fringilla (Angolensis) fusco-cinerea, fusco maculata, subtus spadicea, capistro gulaque nigris, genis guttureque albo-maculatis, uropygio luteo.

Seligmann, Vögel, V. tab. 24. *zweyerley Hänflinge aus Angola.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 628. *die Vengaline.*

Philos. Transact. LXIII. p. 254. †

71. Atra. *Der dunkelbraune Fink.*

Büffon, Vögel, XI. p. 51. 53. *der braune Hänfling.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 299. n. 79. *der dunkelbraune Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 460. n. 89. Fringilla (Obscura) fusco-nigricans, pectore uropygioque cinerascentibus, pennis apice dilutioribus.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 60. *der braune Hänfling.*

72. Macroura. *Der langschwänzige Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 300. n. 80. *der langschwänzige Fink.*

Latham,

(*) Ist nicht mit *Fringilla Angolensis* Ed. XII. p. 323. n. 31. — XIII. p. 920. n. 32. *b.* zu verwechseln.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 460. n. 90. Fringilla (Macroura) cauda elongata cuneiformi, corpore fusco-nigricante maculato, subtus cinerascente, rectricibus duabus intermediis marginibusque lateralium virescentibus.

30. PETRONIA. *Der Graufink.*

Müller, Natursyst. II. p. 591. n. 30. *der Waldfink.*

Halle, Vögel, p. 410. n. 420. *der graubraune Fink; mit gelben Flekken an der Brust.*

Klein, av. p. 96. n. 3. Fringilla subcana, macula lutea in pectore.

Klein, Vorbereit. p. 179. n. 3. *Graufinke.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 96. n. 3. *Graufink.*

Klein, Stemmat. av. p. 17. tab. 18. fig. 2. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 29. tab. 9. fig. 8.

Brisson, ornithol. I. p. 331. n. 6. Moineau de bois.

Büffon, Vögel, X. p. 181. *der Graufink;* m. e. Fig. it. p. 130. not. g.

Batsch, Thiere, I. p. 352. *der Graufink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 164. Ring Sparrow.

Latham, Vögel, II. 1. p. 248. n. 4. *der Graufink; Ringsperling.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 435. n. 6. Fringilla (Petronia) grisea, superciliis albis, gula lutea, rectricibus lateralibus apice intus macula alba.

Cetti, Sardin. II. p. 198. *der wilde Sperling?*

Pallas, Reis. Ausz. III. p. 476. *graue Hänflinge.*

Naturforsch. XVII. p. 94. n. 191. *der Graufinke.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 624. *der Graufink.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 183. not. q. *ein anderer rarer Sperling.*

Jonston, av. p. 96. passer torquatus.

Belon, hist. des ois. p. 362. Moineau à la Sulcie ou à collier jaune.

Zinnan. Uov. p. 80. tab. 11. fig. 71. *Passera marina.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 218. 219. Fringilla Petronia.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 273. n. 14. *der Waldfink.*

β. Fringilla supra nigro et rufescente varia, subtus cinereo-alba, fascia alarum alba, rectricibus griseo-fuscis extus rufescentibus. * (8)

Latham, Syst. ornithol. I. p. 435. n. 6. *β.*

Brisson, ornithol. I. p. 329. n. 3. Passer campestris. *Moineau de campagne ou Friquet.*

Klein, av. p. 88. n. 2. Passer arboreus, montanus ferus.

Klein, Vorbereit. p. 164. n. 2. *Baumsperling, Gersten-Felddieb; Wald-Weidensperling.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 90. n. 2. *Baumsperling.*

Raj. av. p. 88. 16. Passer Sylvestris.

Albin, orn. III. tab. 65. Red-headed Sparrow.

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 5. Passer sylvestris.

Jonston, av. p. 96 Passer in juglandibus degens.

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 291. Passer campestris; poln. *Ir.*

Frisch, Vögel, tab. 1. fig. 2. *Baumsperling?*

γ. *Passer torquatus.* Briss. ornith. I. p. 330. n. 4 *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 436. n. 6. γ.

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 6. Passer torquatus.

Schwenk-

(8) *Brisson* nimmt diese und die folgende Var. γ. als eigne Gattungen an; *Latham* aber als Spielarten von *Fringilla Petronia.* Die Ornithologen mögen hier entscheiden.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 323. Paſſer torquatus. *Ringel-Sperling; Ringelſpatz; Feld-Sperling; Wald-Sperling.*

Rzaczynsky, auct. hiſt. nat. Polon. p. 405. Paſſer torquatus, ſeu paſſer campeſtris. Paſſer Sylvaticus; poln. *Wrobel lesny, polny, Mazurek.*

73. Stulta. *Der dumme Sperling.* (*)

Briſſon, ornith. I. p. 330. n. 5. Moineau fou.

Büffon, Vögel, X. p. 167. *der italieniſche Sperling.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 249. n. 5. *der dumme Sperling.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 436. n. 7. Fringilla (Stulta) griſeo-rufeſcens, ferrugineo maculata, ſubtus flaveſcens, faſcia alarum duplici alba.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 10. Paſſer ſtultus.

Jonſton, av. p. 96. Paſſer ſtultus Bononienſium.

Rom. ornith. I. p. 108.

74. Bononiensis. *Der geſprenkelte Sperling.*

Briſſon, ornith. I. p. 332. n. 7. Moineau de Bologne.

Latham, Vögel, II. 1. p. 249. n. 6. *der geſprenkelte Sperling.*

Latham, Syſt. ornith. I. p. 436. n. 8. Fringilla (Bononienſis) alba nigro ſubflavoque maculata, ſubtus albo flaveſcens, capite albo maculis ſubluteis vario, rectricibus ſubflavis.

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 2. Paſſer maculatus, flava cauda.

(*) Nach *Büffon* eine Varietät von *Fringilla montana*, p. 925. n. 37.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 406. Passer montanus, tricolor. *Moschowiter-Sperling.*

Jonston, av. p. 95. Passer maculatus.

75. Leucura. *Der weißschwänzige Sperling.*

Brisson, ornith. I. p. 332. n. 8. Moineau de Bologne à queue blanche.

Latham, Vögel, II. 1. p. 249. n. 7. *der weißschwänzige Sperling.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 436. n. 9. Fringilla (Leucura) flavicans, castaneo-maculata, lineolis candidis variegata, subtus capiteque albo-lutescens, rectricibus cinereo candicantibus.

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 4. Passer Albicilla.

Jonston, av. p. 96. Passer Albicilla.

76. Brachyura. *Der kurzschwänzige Sperling.*

Brisson, ornith. I. p. 332. n. 9. petit moineau de Bologne.

Latham, Vögel, II. 1. p. 250. n. 8. *der kurzschwänzige Sperling.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 436. n. 10. Fringilla (Brachyura) flavescens, pectore abdomineque magis albicantibus, remigibus rectricibusque flavescentibus.

Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 9. Passer brachyurus nostras.

Jonston, av. p. 96. Passerculus brachyurus nostras.

77. Dalmatica. *Der dalmatische Sperling.* (9)

Brisson, ornith. I. p. 333. n. 10. Moineau d'Esclavonie.

Latham.

(9) *Latham* vermuthet, dass diese, und die vier vorhergehenden Gattungen vielleicht blosse Spielarten von einer andern, z. E. von *Fringilla Domestica, Montana,* oder *Petronia* seyn möchten.

Latham, Vögel, II. 1. p. 250. n. 9. *der Dalmatische Sperling.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 437. n. 11. Fringilla (Dalmatica) rufescens, subtus albida remigibus rectricibusque rufescentibus.

Raj. Syn. p. 87. n. 5. Passer Illyricus.

32. Bengalus. *Der bengalische Fink.*

Müller, Natursyst. II. p. 591. n. 32. *der bengalische Fink.*

Brisson, ornith. I. p. 363. n. 6. Bengali.

Büffon, Vögel, XI. p. 62. *der Bengali.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 300. n. 81. *der blaubäuchige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 461. n. 91. Fringilla (Benghalus) dilute caerulea, capite dorsoque griseis, lateribus capitis purpureis.

b. Müller, Natursyst. II. p. 591. n. 31. *der angolische Spatz.*

Onomat. hist. nat. III. p. 671. *der angolische Finke mit blauem Bauche.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 100. n. 12. *Purpurhänfling.*

Büffon, Vögel, XI. p. 64. *Azulinha.* (portugies.)

Seligmann, Vögel, V. tab. 26. *der Fink mit dem blauen Bauch.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 182. n. 24. Fringilla (Angolensis) dorso fusco, abdomine caudaque caeruleis.

33. Jamaica. *Der Pisang-Fink.*

Müller, Natursyst. II. p. 591. n. 33. *der jamaikaische Fink.*

Klein, av. p. 89. n. 12. Passer caeruleo-fuscus.

Klein, Vorbereit. p. 167. n. 12. *blaubunter Sperling.*

Klein,

Klein, verb. Vögelhist. p. 91. n. 11. *blaubunter Sperling.*

Brisson, ornith. I. p. 352. n. 42. Pinçon de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, XI. p. 151. *der Banana.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 264. n. 25. *der Pisan-Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 443. n. 29. Fringilla (Jamaica) grisea pectore viridi-caerulescente, remigibus rectricibusque nigris.

78. Cana. *Der grauköpfige Fink.*

Klein, av. p. 89. n. 13. Passer Serino affinis, e cinereo luteo et fusco varius.

Klein, Vorbereit. p. 167. n. 13. *Kanarienbastard*,]
Klein, verb Vögelh. p 91. n 12. *Canarienbastart*,]
mit *Muscicapa atricapilla*, p. 935. n. 10. verwechselt.

Brisson, ornith. I. p. 359. n. 53. Serin de la Jamaique.

Latham, Vögel, II. 1. p. 264. n. 26. *der grauköpfige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 443. n. 30. Fringilla (Cana) luteo-fusca subtus lutea, capite gulaque griseis, rectricibus fuscis lineolis albis.

79. Savannarum. *Der Erdfink.*

Klein, av. p. 89. n. 11. Passer pratorum.

Klein, Vorbereit. p. 166. n. 11. *Erd-, Wiesensperling.*

Klein, verb. Vögelh. p. 91. n. 10. *Wiesensperling.*

Brisson, ornith. I. p. 334. n. 13. Moineau de la Jamaique.

Latham, Vögel, II. 1. p. 265. n. 27. *der Erdfink.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 443. n. 31. Fringilla (Savannarum) nebulosa abdomine albo, jugulo pectoreque fuscescentibus, remigibus apice superciliisque luteis.

80. Coccinea. *Der Scharlachfink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 265. n. 28. *der Scharlachfink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 444. n. 32. Fringilla (Coccinea) fulvo-coccinea, alis caudaque nigricantibus, remigibus fulvo-marginatis, rectricibus apice nigris.

81. Punicea. *Der rothbrüstige Fink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 346. n. 162. *der Fink mit der rothen Brust.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 266. n. 30. *der rothbrüstige Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 444. n. 34. Fringilla (Punicea) nigra, genis corporeque toto subtus coccineis, tectricibus alarum fasciolis duabus albis.

82. Ferruginea. *Der rostfarbige Fink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 349. n. 168. *der rostfarbige Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 266. n. 31. *der rostfarbige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 445. n. 35. Fringilla (Ferruginea) fusca ferrugineo-marginata, subtus pallida, pectore maculis obscuris, regione oculorum alba.

83. Albicollis. *Der weißkehlige Fink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 348. n. 165. *der Fink mit weißer Kehle.*

Brisson,

Brisson, ornith. I. p. 367. n. 68. Moineau de Pensilvanie.

Latham, Vögel, II. 1. p. 267. n. 32. *der weißkehlige Fink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 166. White-throated Finch.

Latham, Syst. ornith. I. p. 445. n. 36. Fringilla (Pensilvanica) nigricans rufo varia, subtus genisque cinereo-alba, fascia oculari nigricante, superciliis fulvis, gula alba.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 94. *der Sperling mit weißer Brust.*

84. Fasciata. *Der bandirte Fink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 349. n. 169. *der bandirte Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 267. n. 33. *der bandirte Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 445. n. 37. Fringilla (Fasciata) maculata, supra ferruginea, subtus alba, cauda fusca, fasciis numerosis nigricantibus.

85. Graminea. *Der Grasfink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 349. n. 170. *der Grasfink; graue Grasvogel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 268. n. 34. *der Grasfink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 445. n. 38. Fringilla (Graminea) cinereo ferrugineo nigroque varia, subtus alba, pectore lateribusque maculatis, genis remigibus rectricibusque fuscis.

86. Cinerea. *Der aschgraue Fink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 352. n. 177. *der aschgraue Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 268. n. 35. *der aschgraue Fink.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 445. n. 39. Fringilla (Cinerea) fusca, ferrugineo-marginata, capite lateribus lineis duabus gulaque griseis, iugulo grisescente, abdomine medio albo.

87. Nortoniensis. *Der Fink von Nortonsund.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 350. n. 173. *der Fink von Nortonsund.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 268. n. 36. *der Nortonsundfink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 446. n. 42. Fringilla (Nortoniensis) nigra subtus alba, iugulo ferrugineo-maculato, remigibus caudaque nigricantibus, rectrice extima linea longitudinali alba.

88. Hiemalis. *Der Winterfink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 350. n. 171. *der Winterfink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 269. n. 37. *der Winterfink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 446. n. 43. Fringilla (Hiemalis) fusca, nigro-nebulosa, subtus alba, collo inferiore pectore lateribusque fusco-maculatis.

89. Striata. *Der gestreifte Fink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 348. n. 167. *der gestreifte Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 269. n. 38. *der streifköpfige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 446. n. 44. Fringilla (Striata) fusca nebulosa, subtus genis gulaque alba, capite vittis tribus nigris, fronte lorisque flavis.

90. PURPUREA. *Der Purpurfink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 351. n. 175. *der purpurrothe Fink.*

Brisson, ornithol. I. p. 399. n. 8. Bouvreuil violet de la Caroline.

Latham, Vögel, II. 1. p. 269. n. 39. *der Purpurfink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 446. n. 45. Fringilla (Purpurea) subviolacea, ventre candido, remigibus intus, caudaque a medio ad apicem fuscis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 82. *der purpurfarbne Fink.*

91. ROSEA. *Der rosenfarbige Fink.*

Büffon, Vögel, XI. p. 136. *der rosenfarbigte Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 311. n. 105. *der rosenfarbige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 444. n. 33. Fringilla (Rosea) rosea, capistro argenteo, dorso lituris ex griseo fuscescentibus vario, alis caudaque nigricantibus, rectricum margine exteriori roseo.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 9. n. 26. Fringilla *rosea.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 351. ad n. 174. Fringilla rosea.

β. Fringilla nigricans, pennis margine rubris, capite pectoreque coccineis, priore maculis fuscis, abdomine incarnato. *

Latham, Syst. ornith. I. p. 444. n. 33. β.

Latham, Vögel, II. 1. p. 311. ad n. 105.

Pennant, arct. Zool. II. p. 350. n. 174. *der Fink mit carmoisinrothem Kopfe.*

92. Iliaca. *Der Drosselfink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 313. n. 113. *der Drosselfink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 438. n. 15. Fringilla (Iliaca) cinereo-olivacea, pennis apice fuscis, subtus alba, pectore maculis griseo-fuscis, remigibus fuscis margine rufis, uropygio caudaque rufis.

84. Tricolor. *Der dreyfarbige Fink.*

Müller, Natursyst. II. p. 592. n. 34. *der dreyfarbige Fink.*

Büffon, Vögel, XI. p. 185. *der dreyfarbigte Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 307. n. 91. *der Fink mit blauem Gesichte.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 464. n. 101 Fringilla (Tricolor) nigra, capite uropygioque cyaneis, humeris viridibus, abdomine flavescente.

Bankroft, N. G. von Guian. p. 110. *der amerikanische Sperling des Seba.*

93. Cyanomelas. *Der blauköpfige Fink.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 172. *der schwarz und blaue Zartschnabel;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 508. n. 92. *der blauköpfige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 464. n. 102. Fringilla (Cyanomelas) caerulea, linea frontali gula lunulaque dorsali nigris, remigibus fuscis, cauda nigricante.

94. Picta. *Der azurköpfige Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 308. n. 93. *der azurköpfige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 464. n. 103. Fringilla (Picta) purpurascens, vertice alis caudaque caeru-

caeruleis, uropygio flavo, collo pectore crissoque rubris.

95. Cyanocephala. *Der blauhaubige Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 308. n. 94. *der blauhaubige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 464. n. 104. Fringilla (Cyanocephala) rubro-fusca, vertice uropygioque cyaneis, subtus flava, nucha rubra, orbitis albis.

96. Torquata. *Der Ringelfink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 308. n. 95. *der Ringelfink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 465. n. 105. Fringilla (Torquata) subrubra, uropygio caeruleo, lunula gulari nigra, remigibus nigris, caeruleo terminatis, ad apicem macula alba.

97. Multicolor. *Der vielfarbige Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 309. n. 96. *der Fink mit grünem Steiße.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 465. n. 106. Fringilla (Multicolor) nigra, subtus flavescens, dorso infimo femoribusque viridibus, tectricibus alarum macula remigumque secundariarum fascia alba.

35. Maja. *Der Maja.* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 592. n. 35. *der Purpurfink.*

Brisson, ornithol. I. p. 366. n. 66. Maia de Cuba.

Büffon, Vögel, XI. p. 79 *der Maja;* m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 315 n. 86. Cuba Finch.

Latham, Vögel, II. 1. p. 305. n. 86. *der Fink von Cuba.*

Latham,

(10) Ist nicht mit *Loxia Maja*, p. 849. n. 11. zu verwechseln.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 462. n. 96. Fringilla (Maia) purpurascens fascia pectorali saturatiore.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 629. *der Maia.*

Charleton, onom. zoic. p. 112. n. 4. *Maja.*

Jonston, av. p. 171. Maia.

36. Domestica. *Der gemeine Sperling.* (1)

Müller, Natursyst. II. p. 592. n. 36. *der Sperling.*

Leske, Naturgeschichte. p. 364. n. 8. *der Haussperling.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 144. n. 11. *der Sperling; Spatz.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 189. n. 10. Fringilla (Domestica) remigibus rectricibusque fuscis, gula nigra, temporibus ferrugineis; *der Sperling; Lüning.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 514. n. 3. *der Haussperling.*

Funke, Naturgesch. I. p. 304. *der Sperling.*

Halle, Vögel, p. 366. n. 361. *der Haussperling.*

Meyer, Thiere, II. tab. 87. *Sperling.* M. u. W.

(1) Brütet gewöhnlich vier Mal im Jahr, und legt zwar gemeiniglich nur 5. bis 6. zuweilen aber auch wohl 8. Eyer. Die Männchen streiten so heftig um die Weibchen, dass sie oft zur Erde niederfallen. Man hat gesehen, dass sie sich wohl 20. Mal nach einander begatten. Vielleicht ist daher der Vogel so sehr zu Krämpfen geneigt. Sechszehn Paar Sperlinge in einem Dorfe, geben 12800. Junge, oder 6400. Paar Sperlinge. Man will auch berechnet haben, dass jeder Sperling jährlich für einen Gulden Getraide und Feldfrüchte verzehre, und dass in einem Lande von 300. Dörfern sechs Millionen Sperlinge befindlich sind, die jährlich sechs Millionen Gulden Schaden thäten. Dem ohnerachtet steht der Nutzen des Sperlings mit dem Schaden den er thut, im Verhältniss. Man hat beobachtet, dass zwey Sperlinge zur Fütterung ihrer Jungen in einer Woche 3360. Raupen gebraucht haben. Das Fleisch ist essbar.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 413. n. 351. *der Sperling; Spatz; Felddieb; Hausdieb; Gerstendieb; Haussperling; Kornsperling; Lüning; Speicherdieb; Kornwerfer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 356. G. *der Sperling.*

Neuer Schaupl. d. Nat. VIII p. 341. *Haussperling.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 200. *der gemeine Sperling.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 230. *der Sperling.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 132. *Sperling.*

Klein, av. p. 88. n. 1. Passer domesticus.

Klein, Vorbereit. p. 163. n. 1. *Speicherdieb, Kornwerfer, Spatz.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 90. n. 1. *Spatz.*

Klein, Stemmat. av. p. 17. tab. 18. Fig. 1. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 29. tab. 9. Fig. 7.

Gesner, Vögelb. p. 469. *Spatz; Spar; Hausspar; Sperck; Sperlingk;* m. e. mittelm. Fig.

Brisson, ornith. I. p. 327. n. 1. Moineau franc.

Büffon, Vögel, X. p. 124. *der Haussperling;* m. 2. Figg.

Batsch, Thiere, I. p. 352. *der Haussperling.*

Latham, Syn. Suppl. p. 163. House Sparrow.

Latham, Vögel, II. 1. p. 242. n. 1. *der Haussperling.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 432. n. 1. Fringilla (Domestica) remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo nigroque, fascia alarum alba solitaria.

Beseke, Vögel Kurl. p. 80. n. 177. *der Sperling.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 122. n. 8. *der Haussperling; Spaarling; Lüning.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 429. *der Sperling.*

Cetti, Sardin. II. p. 197. *der Haussperling.*

Fischer, Livl. p. 100. n. 159. *Sperling.*

Pallas, Reise Ausz. III. p. 373. *Sperlinge.*

Pontop-

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 7. *Spurv.*
Pontoppidan, Norweg. II. p. 185. *Spurre; Huus-Kald.*
S. G. Gmelin, Reis. d. Rußl. III. p. 327. 328.
Linné, Abhandl. II. p. 305. n. 133. *der Sperling.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 181. n. 220. *der Haussperling.*
Günther, Nest. u. Ey. tab. 57. *Rauch-Sperling.*
Sander, oekonom. Naturgesch. II. p. 34. *Sperling.*
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 623. *der Haussperling.*
Goeze, nützl. Allerl. II. p. 391. n. 12. *der Sperling.*
Goeze, Natur, Menschenl. u. Vors. III. p. 165. *Sperling.*
Bechstein, Must. schädl. Th. p. 135. n. 3. *der Haussperling.*
André u. Bechstein, Spazierg. VI. p. 360. *der Haussperling.*
Naturforsch. XVII. p. 96. n. 197. *der Sperling; Haussperling.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 349. *Hauß-Sperling.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 66. *Haus-, Hof-Sperling.*
Naumann, Vogelsteller, p. 201. *Sperling.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 1103. *Sperling.*
Breidenstein, Naturgesch. des Sperlings deutscher Nation. Gies. 1779. 8.
Borkhausen, Magaz. I. p. 158. *Sperling; Dorfsperling.*
Forst-u. Jagdlex. III. p. 437. *Sperling.*
Neue Mannigfalt. 1776. p. 468. *Spatz.*
Geoffroy, mater. med. VIII. p. 593. *der Haussperling.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 302. *Sperling.*
Merklein, Thierreich, p. 362. *Sperling.*
Kraft, Ausrott. grauf. Th. I. p. 564. *Spatz.*

Beckmann, Naturhist. p. 54. a. *der Sperling.*
Schrift. der berlin. Gesellsch. N. Fr. V. p. 153. *Sperlinge.*
Allgemein. Magaz. II. p. 104. *Sperlinge.*
Bresl. Nat. u. Kunstgesch. XXIX. Vers. p. 71. XVIII. Vers. p. 70.
Bresl. Samml. II. p. 97. 180.
Leche: Schwed. Abh. VII. p. 154.
Wittenberg. Wochenbl. IV. p. 245. n. 257. XIII. p. 89.
Berlin. Intell. Bl. 1784. p. 625.
Berlin. Samml. VIII. p. 278. V. p. 493.
Beckmann, phys. ökon. Bibl. XVI. p. 391. X. p. 392.
Loniceri, Kräuterb. p. 680. *Spatz; Spar.*
Eberhard, Thiergesch. p. 80. *der Sperling.*
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 56. Passer domesticus.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 30. n. 12. Passer domesticus.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 183. n. 27. Fringilla (Domestica) remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo nigroque, fascia alarum alba solitaria.
Kramer, Austr. p. 369. n. 10. Fringilla remigibus rectricibusque fuscis, gula nigra, temporibus ferrugineis, uropygio testaceo. *Hausspatz.*
Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 1. Passer domesticus.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 321. Passer domesticus. *Sperling; Sperg.*
Sibbald, Scot. p. 159. Passer domesticus.
Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 297. — Auct. p. 406. Passer domesticus.
Belon, hist. des oif. p. 361. Moineau.
Prosp. Alpin. Aegypt. I. p. 197. Passer.
Jonston, av. p. 98. Passer domesticus.

Schae-

Schaefer, element. ornithol. tab. 53.
Roman. ornith. I. p. 99. tab. 16. Fig. 1.
Faun. Arragon. p. 87.
Hist Prov. I. p. 518.
Russel, Alepp. p. 70.
Cheseld. Anatom. cap. 5. ad init. (Scelet.)
Levin, britt. Birds. II. tab. 77.
Zinnan, Uov. p. 79. tab. 11. Passera domestica.
Bomare, diction. V. p. 421. Franc-moineau.
Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla domestica.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 36. L. 30. c. 3. c. 11. c. 15. Passeres.
Aelian. de nat. anim. L. 4. c. 38. Στρουθοι.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 373. n. 15. *der Sperling.*

β. *Der weiße Sperling.*

Brisson, ornith. I. p. 328. A. Moineau blanc.
Büffon, Vögel, X. p. 128. *weiße Sperlinge.*
Latham, Syn. II. 1. p. 250. — Suppl. p. 163. White Sparrow.
Latham, Vögel, II. 1. p. 243. Var. A. *der weiße Sperling.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 433. n. 1. β.
Beseke, Vögel Kurl. p. 80. n. 177.
Siemßen, meklenb. Vögel. p. 123. n. 8. β.
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 182.
Fischer, N. G. von Livl. p. 100.
Naturforsch. I. p. 62. n. 6. — XVI. p. 48. n. 3 XVII. p. 97. XIX. p. 86.
Zorn, Petinotheol. II. p. 51.
Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 117. n. 6.
Borkhausen, Magaz. I. p. 158
Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. VI. 2. p. 118.

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 1. Passer albus.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 322. Passer niveus.

Müller, zool. dan. prodr. p. 32. ad n. 263. Variat. alba.

Brünniche, ornith. bor. p. 69. Passeres albi.

Mus. Wormian. p. 310. Passer niveus.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 407.

Jonston, av. pag. 95. Passer albus.

γ. *Der gelbe Sperling.*

Brisson, ornith. I. p. 328. B. Moineau jaune.

Büffon, Vögel, X. p. 129. *gelbe Sperlinge.*

Latham, Syn. II. 1. p. 251. Yellow Sparrow.

Latham, Vögel, II. 1. p. 244. Var. B. *der gelbe Sperling.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 433. n. 1. γ. Fr. flava, supra castaneo adumbrata.

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 1. Passer flavus.

Jonston, av. p. 95. Passer flavus.

δ. *Der schwarze Sperling.*

Büffon, Vögel, X. p. 129. *ganz schwarze Sperlinge.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 244. Var. C. *der schwarze Sperling.*

Latham, Syn. Suppl. p. 163. Black Sparrow.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 433. n. 1. δ. Fr. tota nigra.

Müller, zool. dan. prodr. p. 32. ad n. 263. Var. tota nigra.

Brünniche, ornith. bor. p. 69. n. 266. Var. tota nigra.

Aldrov. ornith. II. p. 556. f.

ε. *Der blaue Sperling.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 245. not. p. Var. D.

Scopoli,

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 182. not. q. *schwarzblauer oder dunkelbleyfarbiger Sperling.*

ζ. *Der aschgraue Sperling.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 245. not. p. Var. E.

η. *Der bunte Sperling.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 244. not. l.
Naturforsch. I. p. 63. n. 7.

ϑ. *Der lohgelbe Sperling.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 245. not. p. Var. G.
Lapeirouse: neue Schwed. Abhandl. III. p. 109.

ι. *Der blaßsemmelfarbene Sperling.* *

Naturforsch. I. p. 63. n. 8.

κ. *Der dunkelbleyfarbene oder mattschwarze Sperling.*

Naturforsch. II. p. 2. n. 2.

λ. *Der Bastardsperling.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 245. not. p. Var. H. et I.

37. MONTANA. *Der Feldsperling.* (2)

Müller, Natursystem, II. p. 593. n. 37. *der Baumsperling.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 145. n. 12. *der Baum- Bergsperling.*

(2) Wohnt nicht so wohl in, als neben den Dörfern und Städten, und nistet in den hohlen Bäumen, in Gärten und Weiden, die an Bächen stehen. Findet sich doch aber auch oft in Dörfern auf dem Misthof unter den Haussperlingen. Brütet 2. bis 3. Mal des Jahrs, und legt jedesmal 5, 6, auch 7, Eyer. Die Eyer sind bläulich weiss, und haben dunkel purpurfarbene Flecken, die am stumpfen Ende zusammenfliessen. Das Fleisch schmeckt noch angenehmer, als das vom Haussperling. — Nach *Latham* gehört auch die *Loxia Hamburgensis* hieher.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 515. n. 4. *der Feldsperling; Feldspatz.*

Halle, Vögel, p. 367. n. 362. *der Feldsperling.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 409. n. 352. *der Feldsperling; Rothsperling; Bergsperling; Baumsperling; Holzsperling; Muschelsperling.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 347. n. 163. *der Baumfink; Feldsperling?*

Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 342. *Feld- Baum- Rothsperling.*

Onomat. histor. natur. VI. p. 204. *der Baumsperling.*

Klein, av. p. 90. n. 20. Passer montanus, minimus.

Klein, Vorbereit. p. 168. n. 20. *Bergsperling.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 92. n. 18. *Bergsperling.*

Brisson, ornith. I. p. 328. n. 2. Moineau de montagne.

Büffon, Vögel, X. p. 163. *der Feldsperling.*

Batsch, Thiere, I. p. 353. *der Feldsperling.*

Latham, Syn. Suppl. p. 163. Tree Sparrow.

Latham, Vögel, II. 1. p. 245. n. 2. *der Feldsperling.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 433. n. 2. Fringilla (Montana) remigibus rectricibusque fuscis, corpore grisco nigroque, alarum fascia alba gemina.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 59. *zwey Gebirg-Sperlinge; ein Er und eine Sie.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 124. n. 9. *Feldsperling; Feldspaarling; Boomspaarling.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 431. *Wald- Weiden- Berg- Baumsperling.*

Fischer, Liv. p. 100. n. 160. *Bergsperling.*

Pontop-

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 8. *Skovspurv.*

Pennant, britt. Thiergesch. p. 124. *Baumsperling.*

Naturforsch. XVII. p. 97. n. 198. *der Baumsperling; Zätschker.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 352. *Feld- oder Rothsperling.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 183. n. 221. *der Feldsperling.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 624. *der Baumsperling.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 67. *Holzmuschel, oder wilder Sperling.*

Bechstein, Must. schädl. Th. p. 137. n. 4. *der Feldsperling.*

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 232. *Feldsperling.*

Frisch, Vögel, tab. 7. fig. 2. *der Baumsperling.*

Forst- u. Jagdlex. III. p. 437. *Sperling.*

Anweis. Vögel zu fang. p. 515. *Feldsperling.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 158. n. 27. *Feldsperling.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 183. n. 28. Fringilla (Montana) remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo nigroque, alarum fascia alba gemina.

Kramer, Austr. p. 370. n. 11. Fringilla remigibus rectricibusque fuscis, vertice spadiceo, uropygio virescente. — Passer vertice rubro in cavitatibus arborum nidulans. *Alberti.* — *Feldspatz; Rohrspatz.*

Charleton, onom. zoic. p. 78. n. 3. Passer montanus.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 322. Passer montanus; *Wald-Sperling; Weiden-Sperling.*

Rzaczyns-

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 406. Passer montanus.

Jonston, av. p. 95. Passer montanus.

Belon, hist. des ois. p. 363. Friquet.

Roman. ornith. p. 105. tab. 16. Fig. 2.

Histoir. Prov. I. p. 519.

Zinnan. Uov. p. 81. tab. 12. Fig. 72. Passera montanino.

Levin, britt. Birds, II. tab. 78.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 374. n. 16. *der Feldsperling.*

β. *Der weiße Feldsperling.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 247. not. z. Var. A.

γ. *Der bunte Feldsperling.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 247. not. z. Var. B.

δ. *Der gehaubte Feldsperling.* *

Latham, Vögel, II. 1. p. 247. not. z. Var. C.

ε. *Der Bastard-Feldsperling?*

Latham, Vögel, II. 1. p. 247. not. z. Var. D.

98. Pinetorum. *Der Fichtenfink.* (3)

Lepechin, Tageb. der russ. Reis. II. p. 188. *der Bergspatz;* (russ. *Gornajä Owsjänka*) tab. 7. fig. 1.

Büffon, Vögel, XI. p. 187. *der Bergspatz;* m. c. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 314. n. 115. *der Fichtenfink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 445. n. 40. Fringilla (Pinetorum) supra ex rufescente-testacea, subtus flava, fascia pectorali transversa ferruginea.

99. Syl-

(3) Ist nach *Bechstein* mit *Emberiza Aureola* einerley. S. N. G. Deutschl. III. p. 596.

99. SYLVATICA. *Der Waldfink.* (4)

Lepechin, Tageb. d. ruſſ. Reiſ. II. p. 189. *der Waldſperling;* (ruſſ. *Ljesnoi Worabei.*) tab. 7. fig. 2.

Büffon, Vögel, XI. p. 190. *der Waldſperling;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 314. n. 116. *der Waldfink.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 446. n. 41. Fringilla (Sylvatica) capite faſciato, corpore ſupra griſeo nigroque vario, pectore atque imo abdomine canis.

100. HUDSONIA. *Der Fink aus der Hudſonsbay.* (5)

Latham, Vögel, II. 1. p. 313. n. 114. *der Fink aus der Hudſonsbay.*

101. FLAVICOLLIS. *Der gelbkehlige Fink.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 348. n. 166. *der Fink mit gelber Kehle.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 309. n. 97. *der gelbkehlige Fink.*

Latham, Syn. Supplem. p. 168. Yellow-throated Finch.

Latham, Syſt. ornith. I. p. 465. n. 107. Fringilla (Flavicollis) cinerea ſubtus albicans, gula alba macula flaveſcente, remigibus obſcuris.

102. CRISTATA. *Der Fink mit ſchwarzem Geſichte.* (6)

Pennant, arct. Zool. II. p. 350. n. 172. *der Mohr.*

Büffon,

(4) Iſt nach *Bechſtein* mit *Emberiza Pithyornus* einerley. S. N. G. Deutſchl. l. c.

(5) Iſt nach *Pennant* und *Latham* mit *Emberiza Hyemalis* einerley.

(6) *Büffon* nimmt die 2te Fig. in den Pl. enl. n. 181. (Moineau de la Caroline) als das Weibchen der erſtern an. *Pennant* ſcheint

Büffon, Vögel, X. p. 177. *der gezopfte Sperling aus Karolina;* m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Syn. Suppl. p. 164.

Latham, Vögel, II. 1. p. 247. n. 3. *der Fink mit schwarzem Gesichte.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 434. n. 4. Fringilla (Cristata) cristata rubro-fusca, corpore subtus uropygio cristaque coccineis.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 435. n. 5. Fringilla (Carolinensis) rubro-fusca, abdomine albo, facie fasciaque pectoris nigra, iugulo uropygioque coccineis.

38. Bicolor. *Der Bahama-Fink.* (7)

Müller, Natursystem, II. p. 594. n. 38. *der zweyfärbige Sperling.*

Halle, Vögel, p. 377. n. 369. *der schwarze Waldsperling, mit grünlichem Hinterleibe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 347. n. 164. *der Bahamafink.*

Klein, av. p. 89. n. 9. Passerculus bicolor, Bahamensis.

Klein, Vorbereit. p. 166. n. 9. *Grünsperling aus Bahama.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 91. n. 8. *Grünsperling.*

Brisson, ornithol. I. p. 363. n. 59. Verdier de Bahama.

Büffon, Vögel, XI. p. 255. *der bahamische Grünfink.*

Latham,

scheint dies zu bezweifeln. *Latham* macht zwey verschiedene Gattungen daraus; rechnet *Büffons Friquet hupé*, und *Moineau de Cayenne* zu seiner *Fringilla Cristata;* — *Büffons Moineau de Caroline* aber und *Pennants black-faced Finch* zu seiner *Fringilla Carolinensis.* In der Synops. hielt er noch beyde für einerley.

(7) Ist nicht mit *Loxia Bicolor* zu verwechseln.

Latham, Vögel, II. 1. p. 290. n. 69. *der Bahamafink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 456. n. 75. Fringilla (Bicolor) capite pectoreque nigris, dorso alis caudaque obscure virescentibus.

Seligmann, Vögel, II. tab. 74. *der bahamische Sperling.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 183. n. 31. Fringilla (Zena) capite pectoreque nigris, dorso alis caudaque obscure virescentibus.

103. Abyssinica. *Der Worabé.*

Büffon, Vögel, X. p. 279. *der Worabé.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 290. n. 70. *der Fink mit schwarzem Halsbande.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 457. n. 79. Fringilla (Abyssinica) flava, subtus collarique cervicis nigra, alis caudaque nigris marginibus flavescentibus.

104. Ultramarina. *Der Lasur-Vogel.*

Büffon, Vögel, X. p. 281. *der Lasur Vogel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 290. n. 71. *der Ultramarinfink.*

Latham, Syst. ornithol I. p. 457. n. 78. Fringilla (Ultramarina) tota intense caerulea, rostro albo, pedibus rubris.

105. Syriaca. *Der Habesch.*

Büffon, Vögel, X. p. 282. *der Syrische Habesch.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 291. n. 72. *der Tripolische Fink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 457. n. 80. Fringilla (Syriaca) fusco nigricante flavoque varia, subtus albida maculis obscuris, vertice rubro.

39. Cris-

39. Crispa. *Der Krausfink.*

Müller, Naturfyst. II. p. 594. n. 39. *der Krausfink.*

Brisson, ornithol. I. p. 370. n. 74. Pinçon frisé.

Büffon, Vögel, XI. p. 173. *der gekrausste Fink*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 273. n. 49. *der krauss Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 449. n. 56. Fringilla (Crispa) olivacea subtus lutea, capite nigro, pennis plurimis recurvatis.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 61. *der gekrausste gelb und schwarze Sperling.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 220. Fringilla crispa.

106. Indica. *Der indianische Fink.*

Brisson, ornith. I. p. 369. n. 73. Pinçon à collier des Indes.

Büffon, Vögel, XI. p. 175. *der Fink mit doppeltem Halsbande.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 273. n. 50. *der Fink mit dem Halsbande.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 449. n. 57. Fringilla (Indica) cinereo-fusca, subtus rufo-alba, capistro iugulo torque colli albis, fascia pectorali alis caudaque nigris.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 62. *der Fink mit einem Halsstreif.*

107. Ochracea. *Der ockergelbe Fink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 169. Oker Finch.

Latham, Vögel, II. 1. p. 310. n. 101. *der ockergelbe Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 465. n. 109. Fringilla (Ochracea) alba, capite collo inferiore pectore tectricibusque alarum ochraceis, rostro pedibusque flavis.

108. Tes-

108. Testacea. *Der ziegelrothe Fink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 169. Testaceous Finch.

Latham, Vögel, II. 1. p. 310. n. 102. *der ziegelrothe Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 465. n. 110. Fringilla (Testacea) testaceo-ferruginea, nigro nebulosa, remigibus rectricibusque fuscis, rostro pedibusque carneis.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 318. n. 6. Fringilla Erythrophthalma.	p. 874. n. 44. Emberiza Erythrophthalma.
p. 323. n. 31. Fr. Angolensis.	p. 920. n. 32. Fr. Bengalus. *b.*

Das Geschlecht ist mit *neun und sechszig* Gattungen vermehrt. Da aber 2. Gattungen der XII. Edit. anderswohin versetzt, und an deren Stelle neue eingeschaltet worden, so beträgt die Anzahl der neuhinzugekommenen Gattungen überhaupt *ein und siebenzig.* — Bey der 3ten Gattung sind *sieben*, bey der 4ten *drey*, bey der 7ten *neun*, bey der 21ten *zwey*, bey der 23ten *drey*, bey der 25ten *vier*, bey der 36ten *vier* Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Der niedliche Fink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 168. Lovely Finch.

Latham, Vögel, II. 1. p. 309. n. 98. *der niedliche Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 441. n. 23. Fringilla (Formosa) viridis, gula iuguloque flavescentibus, abdo-

abdomine albo nigroque fasciato, rostro pedibusque rubris.

Vielleicht das Weibchen von *Fringilla Elegans*, p. 912. n. 61.?

2. *Der Nootka-Fink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 170. Nootka Finch.

Latham, Vögel, II. 1. p. 310. n. 104. *der Nootka-Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 442. n. 35. β. Fringilla tota nigra rostro albo.

Vielleicht eine Spielart von *Fringilla Nitens*. p. 909. n. 49.?

3. *Der ostindische Sperling.* Fringilla Inda.

Latham, Vögel, II. 1. p. 312. n. 108. *der ostindische Sperling.*

Lichtenstein, hamburgisches Naturalienverzeichniss 1793. p. 46. n. 446.

4. *Der rothschwänzige Fink.* Fringilla Phoenicurus.

Latham, Vögel, II. 1. p. 312. n. 109. *der rothschwänzige Fink.*

Lichtenstein, Naturalienverzeichniss, p. 47. n. 447.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der spitzschwänzige Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 311. n. 106. *der spitzschwänzige Fink.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 459. n. 85. Fringilla (Caudacuta) fusco rufoque varia, superciliis, gula cerviceque rufis, cauda integra, rectricibus omnibus apice acutis.

2. *Der georgische Fink.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 311. n. 7. *der Georgische Fink.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 460. n. 86. Fringilla (Georgiana) fusca subtus albida, tectricibus alarum minoribus toto, remigibus rectricibusque extus rufis, gula iuguloque murinis, striga submaxillari divaricata nigra.

3. *Der Kaiserfink;* (in China.)

Latham, Vögel, II. 1. p. 310. n. 100. *der Kaiser-Fink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 169. Imperial Finch.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 466. n. 111. Fringilla (Imperialis) ferrugineo-fusca, vertice subtusque flava, remigibus caudaque breviore obscuris.

4. *Der Fink mit rostfarbenem Halsbande;* (auf Terra del Fuego)

Latham, Vögel, II. 1. p. 310. n. 103. *der Fink mit rostfarbenem Halsbande.*

Latham, Syn. Supplem. p. 170. Rusty-collared Finch.

Latham, Syst. ornith. I. p. 466. Fringilla (Australis) fusca, collari ferrugineo.

* EINGESCHOBENES GESCHLECHT. PHYTOTOMA. *Der Pflanzensäger.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 511. Gen. LXX.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 189 Gen. LXXVI.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 466. Gen. XXXIX.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 375. Gen. LXXXI.

1. RARA. *Die Rara.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 512. *der seltene Pflanzenmäher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 190. *der seltene Pflanzenmäher.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 466. n. 1. Phytotoma Rara.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 375. *die Rara.*

113. GESCHLECHT. MUSCICAPA. *Der Fliegenfänger.* (Fliegenschnäpper.)

Müller, Natursyst. II. p. 595. Gen. CXIII.
Leske, Naturgesch. p. 268. Gen. XLIX.
Borowsky, Thierreich, III. p. 175. Gen. LXX.
Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 190. Gen. XXXV.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 529. Gen. LXXIII.
Pennant, arct. Zool. II. p. 358.
Neuer Schaupl. der Nat. III. p. 127.
Onomat. hist. nat. V. p. 668.
Brisson, ornithol. I. p. 257. Gen. XXIV.
Büffon, Vögel. XIV. p. 5. ff.
Batsch, Thiere, I. p. 359.
Latham, Vögel, II. 1. p. 314. Gen. XXXVIII.
Latham, Syst. ornith. II. p. 467. Gen. XL.
Hermann, tab. affin. anim. p. 228.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 375. Gen. LXXXII.

1. PARADISI. *Der paradiesartige Plattschnabel oder Katondieb.*

Ist schon p. 445. n. 11. unter dem Namen *Todus Paradiseus* vorgekommen, und muss also hier wegfallen. — S. zool. Beytr. II. 1. p. 559. n. 11. not. 4.

2. MUTATA. *Der veränderliche Fliegenfänger.*

Müller, Natursyst. II. p. 596. n. 2. *der madagaskarische Fliegenfänger.*

Onomat.

Onomat. hist. nat. IV. p. 371. *der Fliegenfänger aus Madagascar.*

Brisson, ornith. I. p. 276. n. 36. Gobe-mouche à longue queue de Madagascar.

Büffon, Vögel, XIV. p. 113. *der Fliegenfänger Schet;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 336. n. 45. *der veränderliche Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II p. 481. n. 55. Muscicapa (Mutata) capite cristato, cauda cuneata, rectricibus intermediis longissimis, palpebris caeruleis.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 116. *der madagaskarische Schet.*

β. *Der Schet-all.* (8)

Brisson, ornithol. I. p. 275. n. 34. Gobe mouche à longue queue de Madagascar.

Büffon, Vögel, XIV. p. 115. *der Schet-all.*

Latham, Syn. II. 1. p. 348. n. 45. Var. A.

Latham, Vögel, II. 1. p. 377. n. 45. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 481. n. 55. β.

γ. *Der Schet-Vululu.* (9)

Brisson, ornithol. I. p. 276. n. 35. Gobe mouche à longue queue blanche de Madagascar.

Büffon, Vögel, XIV. p. 116. *der Schet-Vululu.*

Latham, Syn. II. 1. p. 348. Var. B.

Latham, Vögel, II. 1. p. 337. n. 45. Var. B.

Latham, Syst. ornith. II. p. 481. n. 55. γ.

7. Striata. *Der gestreifte nordamerikanische Fliegenfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 363. n. 194. *der gestreifte Fliegenfänger.*

(8) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

(9) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

Latham, Vögel, II. 1. p. 338. n. 46. *der gestreifte Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 481. n. 56. Muscicapa (Striata) cinereo-virens, dorso nigro striato, subtus flavescens, gula lateribusque pectoris fusco-maculatis, rectricibus extimis tribus apice albis.

3. Martinica. *Der martinikische Fliegenfänger.*

Müller, Natursyst. II. p. 596. n. 3. *der martinikische Fliegenfänger.*

Onomat. hist. nat. V. p. 371. *der Martinikische Fliegenfänger.*

Brisson, ornithol. I. p. 259. n. 3. Gobe-mouche hupé de la Martinique.

Büffon, Vögel, XIV. p. 49. *der martinikische geschopfte Fliegenfänger;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 341. n. 52. *der Martinikische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 483. n. 62. Muscicapa (Martinica) capite cristato, corpore fusco subtus cinereo, remigum margine exteriore albido.

8. Fusca. *Der schwarzkappige Fliegenfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 360. n. 186. *der Schwarzkopf.*

Klein, av. p. 74. n. 5. Luscinia nigricans. Muscipeta nigrescens.

Klein, Vorbereit. p. 139. n. 5. *schwarze Grasmück.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 75. n. 5. *schwärzliche Grasmücke.*

Brisson, ornithol. I. p. 260. n. 6. Gobe mouche brun de la Caroline.

Büffon,

Büffon, Vögel, XIV. p. 52. *der schwärzliche carolinische Fliegenschnäpper*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 341. n. 53. *der schwarzkappige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 483. n. 63. Muscicapa (Fusca) fusca subtus albo flavicans, pileo nigro, cauda subforficata.

Seligmann, Vögel, III. tab. 6. *schwarzer Fliegenstecher.*

4. Tyrannus. *Der gabelschwänzige Fliegenfänger.*

Müller, Natursystem, II. p. 597. n. 4. *der Tyrann.*

Onomat. histor. natur. V. p. 374. *der Tyrann.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 359. n. 182. *der Gabelschwanz.*

Brisson, ornithol. I. p. 268. n. 2. Tyran à queue fourchue.

Büffon, Vögel, XIV. p. 93. *der Savannenfliegenfänger*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 343. n. 59. *der gabelschwänzige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 484. n. 69. Muscicapa (Tyrannus) cauda longissima forficata, corpore nigro, subtus albo.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 114. *der Savanna.*

Sander, Groſs. u. Schön. d. Nat. III. p. 172. *der Tyrann.*

22. Forficata. *Der schwalbenschwänzige Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 108. *der Fliegenfänger mit gespaltenem Schwanze*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 344. n. 60. *der schwalbenschwänzige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 485. n. 70. Muscicapa (Forficata) cauda longissima forficata, corpore pallide griseo, subtus albo, tectricibus alarum cinereis albido undulatis, inferioribus rubris.

Samml zur Phys. und N. G. III. p. 115. *der mexikanische Fliegenschnäpper.*

5. Surinama. *Der surinamische Fliegenfänger.*

Müller, Natursyst. II. p. 597. n. 5. *der surinamische Fliegenfänger.*

Onomat. hist. nat. V. p. 374. *der surinamische Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 348. n. 69. *der Surinamsche Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 487. n. 78. Muscicapa (Surinama) cauda rotundata, apice albo, corpore nigro subtus albo.

23. Fuliginosa. *Der dunkelbraune Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 54. *der braune Fliegenschnäpper von Cayenne;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 348. n. 70. *der dunkelbraune Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 487. n. 79. Muscicapa (Fuliginosa) fusca, flavescente-marginata, subtus albida, pectore subrufo.

24. Aurantia. *Der orangenbrüstige Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 48. *der gelbrothe Fliegenschnäpper mit pomeranzfarbigter Brust;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 348. n. 71. *der orangenbrüstige Fliegenfänger.*

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 487. n. 80. Muscicapa (Aurantia) rufo virescens, subtus alba, pectore pallide-aurantio, capite cerviceque olivaceo fuscis.

Berlin. Samml. IX. p. 196. *der pomeranzenfarbige Fliegenschnäpper.*

25. Coronata. *Der gekrönte Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 80. *der rubinrothe geschopfte Fliegenschnäpper;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 348. n. 72. *der gekrönte Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 487. n. 81. Muscicapa (Coronata) crista erecta rotundata, corpore supra fusco, subtus crista lateribusque capitis coccineis.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 112. n. 9. *der rothe gehäubte Fliegenschnäpper.*

26. Rufescens. *Der gelbrothe Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 82. *der gelbrothe Fliegenschnäpper von Cayenne;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 349. n. 73. *der gelbrothe Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 487. n. 82. Muscicapa (Rufescens) rufescente-nitens, subtus rufo-alba, remigibus nigris, vertice macula rufa.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 111. n. 4. *der braune cayennische Fliegenschnäpper.*

27. Cinerea. *Der aschgraue Fliegenfänger.*

Brisson, ornith. I. p. 277. n. 38. Gobe-mouche roux de Cayenne.

Latham, Vögel, II. 1. p. 349. n. 74. *der grauhälsige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 488. n. 83. Muscicapa (Cinerea) rufo-fusca, abdomine rufescente, capite colloque cinereis, uropygio pectore caudaque rufis.

28. Pygmaea. *Der Zwergfliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 88. *der kleine gefleckte Fliegenvogel von Cayenne. — der kleinste Mückenfänger*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 349. n. 75. *der Zwergfliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 488. n. 84. Muscicapa (Pygmaea) fusco-cinerea, subtus flavescens, capite cerviceque rufis nigro maculatis sub oculis fascia pallida.

29. Minuta. *Der kleinste Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 88. *die erste Art Mückenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 350. n. 76. *der kleinste Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 488. n. 85. Muscicapa (Minuta) olivaceo-grisea, dorso supremo corporeque subtus viridi adumbratis, striis alarum flavescentibus sparsis.

30. Barbata. *Der bärtige Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 46. *der bärtige Fliegenschnäpper*; m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Vögel, II. 1. p. 350. n. 77. *der bärtige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 488. n. 86. Muscicapa (Barbata) olivaceo-fusca, subtus uropygioque virescente-flava, vertice aurantio.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 111 n. 3. *der bärtige cayennische Fliegenschnäpper.*

Donn-

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 176. n. 1. *der bärtige Fliegenschnäpper.*

31. Rubricollis. *Der Piauhau.*

Brisson, ornith. I. p. 265. n. 15. Grand Gobe-mouche noir de Cayenne.

Büffon, Vögel, XIV. p. 149. *der Piauhau*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 350. n. 78. *der purpurkehlige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 489. n. 87. Muscicapa (Rubricollis) nigra iugulo maris speciosa purpureo-coccinea.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 119. *der Piauhau.*

6. Crinita. *Der amerikanische Fliegenfänger.* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 597. n. 6. *der amerikanische Fliegenfänger.*

Onomat. hist. nat. V. p. 370. *der amerikanische Fliegenfänger.*

Klein, av. p. 69. n. 28. Turdus cristatus. Muscicapa cristata, ventre luteo.

Klein, Vorbereit. p. 132. n. 28. *Schuppdrossel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 69. n. 29. *Schopfdrossel.*

Brisson, ornithol. I. p. 272. n. 28. Gobe-mouche hupé de Virginie.

Büffon, Vögel, XIV. p. 111. *der grüngezopfte Fliegenfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 360. n. 184. *der Fliegenfänger mit dem Federbusche.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 344. n. 61. *der Fliegenfänger mit dem Federbusche.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 485. n. 71. Muscicapa (Crinita) capite cristato colloque caerulescenti-

(10) Gewicht 1. Unze. *Penn.*

scentibus, abdomine flavescente, dorso virescente, remigibus rectricibusque rufis.

Seligmann, Vögel, III. tab. 4. *der gehaubte Fliegenflecher mit gelbem Bauch.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 116 *der virginische Fliegenschnäpper mit grüner Kuppe.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 170. n. 10. Turdus (Crinitus) capite colloque caerulescente, abdomine flavescente, dorso virescente, rectricibus remigibusque rufis, capite cristato.

Gentl. Magaz. XXII. tab. p. 556.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 376. n. 2. *der amerikanische Fliegenschnäpper.*

32. Ferox. *Der Tyrannenfliegenfänger.*

Brisson, ornith. I. p. 268. n. 21. Tyran de Cayenne.

Büffon, Vögel, XIV. p. 137. *der Tyrann von Cayenne;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 345. n. 62. *der Tyrannen-Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 485. n. 72. Muscicapa (Ferox) fusca, subtus flavescens, collo inferiore pectoreque coccineis.

13. *Der kleine cayennische Tyrann.* (1)

Brisson, ornith. I. p. 269. n. 22. petit Tyran de Cayenne.

Büffon, Vögel, XIV. p. 138. *der kleine cayennische Tyrann.*

Latham, Syn. II. 1. p. 358. n. 62. Var. A.

Latham, Vögel, II. 1. p. 345. n. 62. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 485. n. 72. β.

33. Lu-

(1) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

33. **Ludoviciana.** *Der louisianische Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 141. *der Louisianische Tyrann.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 345. n. 63. *der Louisianische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 486. n. 73. Muscicapa (Ludoviciana) griseo fusca, subtus flavescens, gula cinerea, tectricibus alarum majoribus albo variegatis, remigibus rectricumque marginibus rufis.

Samml. zur Physſ. u. Naturgesch. III. p. 113. *der louisianische Tyrann.*

34. **Audax.** *Der Caudec.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 139. *der Tyrann Caudec;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 345. n. 64. *der gelbkappige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 486. n. 74. Muscicapa (Audax) nigricans rufo undulata, subtus flavicans, vertice flavo, capistro albo, uropygio caudaque rufis.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 118. *der Caudec.*

9. **Atricapilla.** *Der gemeine Fliegenschnäpper.* (2)

Müller, Natursyst. II. p. 598. n. 9. *der schwarze Fliegenfänger.*

Leske,

(2) Die richtige Auseinandersetzung der zu dieser Gattung, und den dahin gerechneten Varietäten, gehörigen Synonymen ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Ich habe sie indessen so geordnet, wie sie nach Anleitung unsers Systems geordnet werden mussten. Neuerlich aber hat *Bechstein* durch die Bekanntmachung vieljähriger eigner Beobachtungen hierüber ein ganz neues Licht verbreitet, dass ich also nothwendig seine Bemerkungen

Leske, Naturgesch. p. 268. n. 1. *der schwarzrükkige Fliegenfänger.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 176. n. 2. *der schwarze Fliegenfänger.*

Blumen-

kungen hier mittheilen muss. Er macht aus diesen Vögeln *drey verschiedene Gattungen* 1) *Der Fliegenfänger mit dem Halsbande*, den er *Muscicapa collaris* genannt wissen will. Diess ist *Muscicapa atricapilla Gmel.* n. 9. γ. — *Pied Fly-catcher Lath.* Var. B. — *Gobe-mouche noir à collier Buff.* — Er ist oben schwarz, um den Hals geht ein weisser Kragen, und die äussere Schwanzfeder hat einen weissen Streifen. Findet sich nur einzeln in Europa und Deutschland. Kommt unter den Vögeln seines Geschlechts zuerst in Thüringen an. Fliegt einzeln, bis zur Mitte des Mayes in den Gärten am Fuss des Thüringer Waldes herum, begiebt sich alsdann tief in die Berge in die Buchwälder, und zieht zu Ende des Augusts wieder weg. Nistet in hohlen Eichen oder auf niedrigen Buchästen jährlich Einmal. Das Nest besteht aus Moos und Thierhaaren. Legt 4. bis 6. bläulich grüne braungefleckte Eyer. Brütet 14. Tage. — 2) *Der schwarzrückige Fliegenfänger. Muscicapa atricapilla Linn.* — *Gobe-mouche de Lorraine Buff.* — *Pied Fly-catcher Lath.* — *Frisch tab.* 24. *Fig.* 2. — Ist oben schwarz, unten und an der Stirn weiss, und die beyden äussersten Schwanzfedern haben einen weissen Streifen. — Er ist der dümmste Vogel unter seinen Verwandten, der sich fast mit Steinen todt werfen lässt. Kommt in Thüringen zu Ausgange des Aprills oder zu Anfange des Mayes, etliche Tage nach der vorhergehenden Art in Gesellschaft von 12. bis 20. an, und verschwindet im September unvermerkt. Nistet in hohlen Eichen, Buchen und besonders Aspen. Das Nest besteht nur aus einer Unterlage von Moos und Haaren. Legt 4. bis 6. braunlich gewässerte Eyer. — 3) *Der schwarzgraue Fliegenfänger. Muscicapa Muscipeta Bechst.* — *Traquet* — Ist am Oberleibe graubraun, und die drey äussersten Schwanzfedern haben einen weissen Fleck Er kommt in der ersten Hälfte des Mayes etliche Tage nach dem vorhergehenden an, und wird einzeln auf den Feldbäumen, in Alleen und Gärten, und in gebürgigen Gegenden, wo Hölzer, Bäume und Hecken sind, angetroffen. Ist sehr scheu, und versteckt sich gern in den be-

laubten

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 190. n. 1. Muscicapa (Atricapilla) nigra, subtus frontisque macula alarumque speculo albis, rectricibus lateralibus extus albis; *der Fliegenschnäpper.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 530. n. 2. *der schwarzrückige Fliegenfänger.*

Funke, Naturgesch. I. p. 269. *der Fliegenschnäpfer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 364. B. *der scheckige Fliegenfänger.*

Onomat. hist. nat. V. p. 668. *der schwarze Fliegenfänger.*

Klein, av. p. 75. n. 12. Luscinia alis variegatis.

Klein, Vorbereit. p. 141. n. 12. *schwarze Grasmücke mit bunten Flügeln.*

Klein, verb. Vögelh. p. 76. n. 12. *schwarze Grasmücke mit bunten Flügeln.*

Brisson, ornithol. I. p. 431. n. 27. Traquet d'Angleterre.

Büffon, Vögel, XV. p. 249. *das englische Weißkehlchen.*

Martini, Naturlex. V. p. 50. *englische Bachstelze.*

Halle, Vögel, p. 343. n. 323. *der schwarze Fliegenstecher?*

Latham, Vögel, II. 1. p. 316. n. 2. *der bunte Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 467. n. 2. Muscicapa (Atricapilla) nigra, subtus frontisque macula

laubten Aesten, wo ihm die Insecten, die im Schatten ihre Zuflucht suchen, zur Beute werden. Er nistet in Hecken, Büsche und die dichten Zweige der Bäume, z. E. in Lindenalleen, auch in hohle ofne Bäume. Sein Nest besteht aus Moos, zarten Wurzeln, und ist inwendig mit Haaren gefüttert. Er hat unter allen Fliegenfängern noch den meisten Kunsttrieb. Legt 3. bis 5. Eyer, die auf weissem Grunde braune Punkte haben. S. *Latham*, Vögel, II. 1. p. 317. not. v. — Ist nicht mit *Motacilla Atricapilla* zu verwechseln.

cula alarumque speculo albis, rectricibus lateralibus extus albis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 59. *die schwarze Grasmücke mit bunten Flügeln.* M. u. W.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 125. n. 1. *der schwarze Fliegenfänger.*

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 432. *der schwarze Fliegenfänger.*

Naturforsch. XVII. p. 97. n. 200. *der schwarze Fliegenfänger.* (Lauter Mischmasch.)

Fabric. Reis. nach Norwegen, p. 334. Muscicapa atricapilla?

Neue schwed. Abhandl. IV. p. 50. Muscicapa atricapilla.

Sander, Grofs. u. Sch. in der Nat. III. p. 171. *der schwarze Fliegenschnapper.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 172. n. 44. *der schwarze, braune Fliegenfänger.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 228. 229. Muscicapa Atricapilla.

Müller, zool. dan. prodr. p. 32. n. 268. Motacilla (Leucomela) nigra, subtus macula alarum lineaque transversa pone rostrum albis?

Levin, britt. Birds. III. tab. 88.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 376. n. 3. *der gemeine Fliegenschnäpper.*

β. *Brisson*, ornith. I. p. 264. n. 13. Gobe-mouche noir. (3)

Latham, Vögel, II. 1. p. 316. n. 2. Var. A. cf. not. 1. et p. 319. n. 3.

Latham, Syst. ornith. II. p. 468. n. 2. β.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. 17. Ficedula secunda.

Jonston, av. p. 311. Ficedula tertia Aldrovandi.

γ. *Büffon*,

(3) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

γ. *Büffon*, Vögel, XIV. p. 17. *der schwarzplattige Fliegenfänger;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 316 n. 2. Var. B. cf. p. 318. n. 2.

Latham, Syst. ornith. II. p. 468. n. 2. γ.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 110. *der schwarzrückige, oder der lothringische Fliegenschnäpper.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 199. *Meerschwarzplättchen.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 383. *der schwarz und weißscheckigte schmätzende Fliegenvogel.*

Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 104. Muscicapa atricapilla.

Kramer, Austr. p. 377. n. 16. Motacilla, fronte, torque, pectore et alarum macula albis, vertice tergo et cauda nigris. *Meerschwarzplattl; Baumschwalbl.*

10. Ruticilla. *Der rothschwänzige Fliegenfänger.*

Müller, Natursyst. II. p. 598. n. 10. *der Rothschwanz.*

Onomat. hist. nat. V. p. 373. *der Rothschwanz.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 370. n. 199. *der Schwarzkopf.*

Brisson, ornith. I. p. 264. n. 14. Gobe-mouche d'Amerique.

Büffon, Vögel, XIV. p. 73. *der rothschwänzige Fliegenschnäpper.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 473. n. 22. Muscicapa (Ruticilla) nigra subtus alba, pectore macula alarum basique remigum rectricumque flavis.

Seligmann, Vögel, III. tab. 34. *amerikanisches Rothschwänzlein.*

Seligmann, Vögel, IV. tab. 55. *das kleine amerikanische Rothschwänzlein.*

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 20. *die fünfte Art Plattschnabel.*

β. *Seligmann*, Vögel, VII. tab. 47. *der Fliegenfänger mit gelbem Schwanz.* (das Weibch.)

Büffon, Vögel, XIV. p. 77. *Edwards Fliegenschnäpper mit gelbem Schwanz.*

11. VIRENS. *Der grünliche Fliegenfänger.* (4)

Müller, Natursyst. II. p. 599. n. 11. *der grüne Fliegenfänger.*

Halle, Vögel, p. 324. n. 288. *die falbe Grasmükke, mit braunen Flügeln.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 361. n. 187. *der aschgraue Fliegenfänger.*

Onomat. hist. nat. V. p. 375. *der grüne Fliegenfänger.*

Klein, av. p. 74. n. 7. Luscinia, Muscicapa fusca.

Klein, Vorbereit. p. 140. n. 7. *Fahle Grasmücke mit braunen Flügeln.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 75. n. 7. *Falbe Grasmücke mit braunen Flügeln.*

Brisson, ornithol. I. p. 261. n. 7. Gobe-mouche cendré de la Caroline.

Büffon, Vögel, XIV. p. 66. *der braune Fliegenschnäpper aus Carolina;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 339. n. 47. *der aschgraue Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 482. n. 57. Muscicapa (Virens) fusco-virens, subtus lutea, superciliis albis.

Seligmann, Vögel, III. tab. 8. *der kleine braune Fliegenstecher.*

35. VIRI-

(4) Gewicht, nach *Pennant*, neun Pfenniggewicht.

35. VIRIDIS. *Der geschwätzige Fliegenfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 359. n. 183. *der Schwätzer.*

Klein, av. p. 69. n. 26. Turdus pectore luteo.

Klein, Vorbereit. p. 131. n. 26. *gelbbrüstige Drossel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 69. n. 27. *gelbe Drossel.*

Brisson, ornithol. I. p. 245. n. 55. Merle vert de la Caroline.

Büffon, Vögel, IX. p. 157. *die grüne karolinische Amsel.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 339. n. 48. *der geschwätzige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 482. n. 58. Muscicapa (Viridis) obscure viridis, subtus lutea, superciliis maculaque sub oculis candidis, imo ventre sordide albo, rectricibus fuscis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 100. *die gelbbrüstige Drossel.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 171. n. 16. Turdus (Virens) subtus lutescens, superciliis albis.

36. SIBIRICA. *Der sibirische Fliegenfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 364. A. *der braune Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 340. n. 49. *der Sibirische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 482. n. 59. Muscicapa (Sibirica) fusca subtus cinerea, gula, crissoque albo maculatis.

37. ERYTHROPIS. *Der rothstirnige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 340. n. 50. *der Fliegenfänger mit rothem Gesichte.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 482. n. 60. Muscicapa (Erythropis) supra varia subtus alba, fronte rubra, sub alis rufa.

12. Cayanensis. *Der cayennische Fliegenfänger.*

Müller, Natursyst. II. p. 599. *der cajennische Fliegenfänger.*

Onomat. hist. nat. V. p. 360. *der Cajennische Fliegenfänger.*

Brisson, ornith. I. p. 270. n. 24. Gobe-mouche de Cayenne.

Büffon, Vögel, XIV. p. 84. *der Fliegenschnäpper mit gelbem Bauche;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 343. n. 58. *der Cayennische Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 346. n. 65. *der gelbbäuchige Fliegenfänger.*

Latham, Syn. Suppl. p. 173. Cayenne Flycatcher.

Latham, Syst. ornith. II. p. 484. n. 68. Muscicapa (Cayanensis) fusca, subtus lutea, superciliis albis, vertice subaurantio.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 111. n. 4. *der braune cayennische Fliegenfänger.*

13. Canadensis. *Der canadische Fliegenfänger.*

Müller, Natursyst. II. p. 599. n. 13. *der canadische Fliegenfänger.*

Onomat. hist. nat. V. p. 369. *der canadische Fliegenfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 362. n. 190. *der Canadische Fliegenfänger.*

Brisson, ornith. I. p. 270. n. 25. Gobe-mouche cendré de Canada.

Latham, Vögel, II. 1. p. 342. n. 55. *der Canadische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 484. n. 65. Muscicapa (Canadensis) cinerea subtus lutea, loris luteis, vertice nigro maculato.

38. Cin-

38. CINNAMOMEA. *Der zimmetfarbige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 342. n. 56. *der zimmetbraune Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 484. n. 66. Muscicapa (Cinnamomea) flavo-cinnamomea nebulosa, subtus uropygio fasciaque tectricum flavescentibus, rectricibus obscuris ferrugineo maculatis.

39. SPADICEA. *Der Fliegenfänger mit gelbem Steiße.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 342. n. 57. *der Fliegenfänger mit gelbem Steiße.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 484. n. 67. Muscicapa (Spadicea) rubro-fusca, subtus obscure flavescens, uropygio flavo, remigibus rectricibusque fuscis.

14. OLIVACEA. *Der olivenfarbige Fliegenfänger.*

Müller, Natursystem, II. p. 599. n. 14. *der olivenfarbige Fliegenfänger.*

Onomat. histor. natur. V. p. 372. *der olivenfarbige Fliegenfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 361. n. 188. *das Rothauge.*

Klein, av. p. 74. n. 6. Luscinia, Muscicapa oculis rubris.

Klein, Vorbereit. p. 139. n. 6. *die bunte Grasmücke mit rothen Augen.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 75. n. 6. *Rothauge*, p. 167. n. 2. *olivenfarbiger Fliegenstecher.*

Brisson, ornithol. I. p. 271. n. 27. Gobe-mouche de la Jamaique.

Büffon, Vögel, XIV. p. 57. *der olivenfarbige Fliegenschnäpper von Jamaika;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 340. n. 51. *der rothäugige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 482. n. 61. Muscicapa (Olivacea) olivacea, subtus albidior, superciliis albis, oculis rubris.

Seligmann, Vögel, III. tab. 8. *der rothaugige Fliegenstecher.*

Seligmann, Vögel, IV. tab. 43. *der olivenfarbige Fliegenstecher.*

Browne, Jam. p. 476. Oriolus subolivaceus, canorus, rostri apice attenuato, adunco.

β. *Brisson*, ornith. I. p. 271. n. 26. Gobe-mouche olive de Canada. (5)

Latham, Vögel, II. 1. p. 341. n. 51. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 483. n. 6. β.

15. Senegalensis. *Der senegalische Fliegenfänger.*

Müller, Natursyst. II. p. 600. n. 15. *der Senegalische Fliegenfänger.*

Onomat. histor. natur. V. p. 373 *der Senegallische Fliegenfänger.*

Brisson, ornithol. I. p. 262. n. 10. Gobe-mouche à poitrine rouge du Sénégal.

Büffon, Vögel, XIV. p. 34. *der senegalsche Fliegenschnäpper mit rother Brust.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 321. n. 5. *der Senegalsche Fliegenschnäpper.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 470. n. 8. Muscicapa (Senegalensis) varia, superciliis albis, rectricibus extimis dimidiato-albis.

β. *Brisson*, ornithol. I. p. 263. Gobe-mouche à poitrine noire du Senegal. (6)

Büffon,

(5) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

(6) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

Büffon, Vögel, XIV. p. 35. *der Senegalsche Fliegenschnäpper mit schwarzer Brust.*
Latham, Syn. II. 1. p. 329. n. 5. Var. A.
Latham, Vögel, II. 1. p. 322. n. 5. Var. A.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 470. n. 8. β.

40. CRISTATA. *Der gehaubte Senegalische Fliegenfänger.*
Brisson, ornithol. I. p. 274. n. 33. Gobe-mouche hupé du Senegal.
Büffon, Vögel, XIV. p. 37. *der geschopfte Senegalsche Fliegenschnäpper;* m. e. Fig.
Latham, Vögel, II. 1. p. 322. n. 6. *der gehäubte Senegalsche Fliegenfänger.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 470. n. 9. Muscicapa (Cristata) cristata castanea, subtus cinerea, capite colloque inferiore nigro-virescentibus, rectricibus castaneo-purpureis, cauda elongata.
Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 110. *der gehäubte senegallische Fliegenschnäpper.*

41. BORBONICA. *Der bourbonische Fliegenfänger.* (7)
Brisson, ornithol. I. p. 274. n. 32. Gobe-mouche hupé de l'isle de Bourbon.
Büffon, Vögel, XIV. p. 37. *der geschopfte Fliegenschnäpper von der Insel Bourbon;* m. e. Fig.
Latham, Syn. Suppl. p. 171. Bourbon Flycatcher.
Latham, Vögel, II. 1. p. 322. n. 7. *der Bourbonische Fliegenfänger.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 470. n. 10. Muscicapa (Borbonica) cristata spadicea, subtus cinerea, capite nigro-virescente, rectricibus pallide spadiceis.

(7) Nach *Büffon* eine Abart vom vorigen.

42. MELANOPTERA. *Der braunkehlige Fliegenfänger.*

Brisson, ornithol. I. p. 261. n. 8. Gobe-mouche à collier du Sénegal.

Büffon, Vögel, XIV. p. 42. *der braunkehligte Fliegenschnäpper*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 323 n. 8. *der braunkehlige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 471. n. 11. Muscicapa (Collaris) plumbeo-cinerea, subtus fasciaque alarum alba, collo inferiore subcastaneo, rectricibus nigris, lateralibus apice albis.

43. NIGRIFRONS. *Der schwarzstirnige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 323. n. 9. *der schwarzstirnige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 471. n. 12. Muscicapa (Nigrifrons) fusca, subtus fusco-olivacea, fronte lateribusque capitis nigris, gutture flavo.

44. LEUCURA. *Der weißschwänzige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 323. n. 10. *der weißschwänzige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 471. n. 13. Motacilla (Leucura) cinereo-grisea, subtus alba, rectricibus lateralibus nigro alboque oblique dimidiatis.

45. PONDICERIANA. *Der coromandelische Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 324. n. 11. *der Coromandelsche Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 471. n. 14. Muscicapa (Pondiceriana) cinereo-grisea, subtus alba, superciliis albis, tectricibus alarum albo-maculatis,

tis, rectricibus lateralibus griseo alboque dimidiatis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 154. *die Grasmücke von Pondichery; Indianische Nachtigall.*

46. AFRA. *Der gelbgefleckte Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 324. n. 12. *der gelbgefleckte Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 472. n. 15. Muscicapa (Afra) sordide flava, maculis obscuris, vertice rufo nigro striato, alis caudaque rufis.

47. CANA. *Der Kinki-Manou.*

Brisson, ornithol. I. p. 266. n. 17. Grand gobemouche cendré de Madagascar.

Büffon, Vögel, XIV. p. 142. *der Kinki-Manou;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 324. n. 13. *der aschfarbige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 472. n. 16. Muscicapa (Cana) cinerea, capite saturatiore, rectricibus nigris, duabus extimis apice cinerascentibus, remigibus intus albis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 119. *Kinkimanou.*

48. MADAGASCARIENSIS. *Der Vira-ombé.*

Brisson, ornith. I. p. 442. n. 46. grand Figuier de Madagascar.

Latham, Vögel, II. 1. p. 325. n. 14. *der Madagaskarische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 472. n. 18. Muscicapa (Madagascariensis) viridi-olivacea, gutture flavo, collo inferiore pectoreque flavescentibus.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 154. *der Vira-ombé aus Madagascar.*

49. UNDULATA. *Der wellenförmig gezeichnete Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 32. *der Fliegenschnäpper von der Insel Frankreich.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 325. n. 15. *der wellenförmige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 472. n. 19. Muscicapa (Undulata) albido fuscoque undulatim varia, capite fusco-nigricante, alis rufo-fuscis.

50. TECTEC. *Der Tectec.*

Brisson, ornithol. I. p. 258. n. 2. Gobe-mouche de l'isle de Bourbon.

Büffon, Vögel, XIV. p. 38. 39. not. 1. Muscicapa borbonica.

Latham, Vögel, II. 1. p. 325. n. 16. *der Indische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 473. n. 20. Muscicapa (Tectec) fusca, pennis rufescente-marginatis, subtus rufescens, collo inferiore sordide albo.

51. RUFIVENTRIS. *Der Fliegenfänger mit gelbrothem After.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 38. not. o.

Latham, Vögel, II. 1. p. 326. n. 17. *der Fliegenfänger mit gelbrothem After.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 473. n. 21. Muscicapa (Rufiventris) nigra, abdomine crisso macula alarum basique caudae fulvo-rufis.

52. COMATA. *Der koppige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 326. n. 18. *der koppige Fliegenfänger.*

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 474. n. 25. Muscicapa (Comata) nigra, capite cristato, corpore subtus, uropygio rectricibusque duabus intermediis apice albis, crisso flavo.

53. HAEMORRHUSA. *Der Fliegenfänger mit rothem After.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 326. n. 19. *der Fliegenfänger mit rothem After.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 475. n. 26. Muscicapa (Haemorrhusa) fusco-undulata, capite subcristato caudaque nigris, pectore abdomineque albis, crisso rubro.

β. *Latham*, Vögel, II. 1. p. 326. n. 19. Var. A. *Der Fliegenfänger mit gelbem After.*

Latham, Syn. II. 1. p. 335. n. 19. Var. A. Yellow-vented Flycatcher.

Latham, Syst. ornith. II. p. 475. n. 26. β. Muscicapa fronte verticeque cristato nigris, lateribus colli, pectore abdomineque albis, crisso flavo.

54. PSIDII. *Der Guava-Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 326. n. 20. *der Guava-Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 475. n. 27. Muscicapa (Psidii) fusca, subtus superciliisque albis, crisso flavescente, fascia suboculari nigra.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 24. *der kleine Kujavier.*

55. MELANICTERA. *Der Malkala-kourla.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 327. n. 21. *der gelbbrüstige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 475. n. 28. Muscicapa (Melanictera) cinereo-fusca luteo mixta, pectore luteo, capite nigro, remigibus rectricibusque obscuris flavescente-marginatis.

56. Nitens. *Der grünglänzende Fliegenfänger.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 337. n. 22. *der grüne Fliegenfänger.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 475. n. 29. Muscicapa (Nitens) viridis nitens, gutture pectoreque rufis, uropygio abdomineque flavis, cauda longiore.

57. Sinensis. *Der chinesische Fliegenfänger.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 327. n. 23. *der bekränzte Fliegenfänger.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 475. n. 30. Muscicapa (Sinensis) virescenti-grisea, subtus flavescens capite nigro, superciliis gulaque albis, collo inferiore pectoreque griseis.

58. Grisea. *Der graukehlige Fliegenfänger.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 328. n. 24. *der graukehlige Fliegenfänger.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 476. n. 31. Muscicapa (Grisea) nigra subtus rubescens, collo inferiore saturate-griseo, fascia alarum alba.

59. Flavicollis. *Der gelbhälsige Fliegenfänger.*
Latham, Vögel, II. 1. p. 328. n. 25. *der gelbhälsige Fliegenfänger.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 476. n. 32. Muscicapa (Flavicollis) viridis, fronte mystacibusque nigris, vertice orbitis collo inferiore maculisque tribus abdominis flavis, rectricibus 2. intermediis apice albis.

60. Flammea. *Der pomeranzenfarbige Fliegenfänger.*
Latham, Syn. Suppl. p. 171. Flammeous Flycatcher.
Latham, Vögel, II. 1. p. 328. n. 26. *der pomeranzenfarbige Fliegenfänger.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 474. n. 23. Muscicapa (Flammea) nigra, corpore subtus dorso postico fascia alarum caudaque apice fulvis.

61. Fuscescens. *Der Fliegenfänger mit orangefarbenem After.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 329. n. 27. *der Fliegenfänger mit orangefarbenem After.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 476. n. 33. Muscicapa (Fuscescens) subcristata fuscescens, subtus albida, uropygio crissoque fulvis, cauda subforficata.

62. Luzoniensis. *Der Tessacourbé.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 329. n. 28. *der schwarze Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 476. n. 34. Muscicapa (Luzoniensis) violaceo-atra, subtus obscure grisea, macula alarum alba.

Sonnerat, Reis. nach Neuguinea, p. 24. *der schwarze Fliegenschnapper.*

63. Philippensis. *Der philippinische Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 110. *der philippinische Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 330. n. 29. *der Philippinische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 476. n. 35. Muscicapa (Philippensis) griseo-fusca, subtus alba superciliis albis.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 115. *der philippinische Fliegenfänger.*

64. Caerulea. *Der azurblaue Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 44. *der blaue philippinische Fliegenschnäpper.*

Latham,

Latham, Syn. Suppl. p. 172. Azure Flycatcher.

Latham, Vögel, II. 1. p. 330. n. 30. *der azurblaue Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 476. n. 36. Muscicapa (Caerulea) caeruleo-nitens, subtus caerulescenti-alba, macula occipitis pectorisque nigra.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 111. *der blaue philippinische Fliegenfänger.*

65. CYANOCEPHALA. *Der blauköpfige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 330. n. 31. *der blauköpfige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 477. n. 37. Muscicapa (Cyanocephala) saturate rubra, pennis apice nigris, subtus fuscescens, capite atro-caeruleo, cauda forficata, apice nigro.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 23. *der blauköpfigte Fliegenschnäpper von der Insel Luçon.*

66. MANILLENSIS. *Der gelbkehlige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 330. n. 32. *der gelbkehlige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 477. n. 38. Muscicapa (Manillensis) grisea subtus flava, dorso alisque castaneis, fascia genarum duplici, alarum solitaria, rectricibusque lateralibus albis.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 23. *der gelbkehlige Fliegenschnapper der Insel Luçon.*

67. FLABELLIFERA. *Der Fächerschwänzige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 331. n. 33. *der Fächerschwänzige Fliegenfänger*, tab. 50.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 477. n. 39. Muscicapa (Flabellifera) fusco-olivacea, capite torqueque

queque colli nigris, corpore subtus superciliis macula alarum rectricibusque lateralibus albis.

68. Superciliosa. *Der Fliegenfänger mit Augenbraunen.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 332. n. 34. *der Fliegenfänger mit Augenbraunen.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 477. n. 40. Muscicapa (Superciliosa) cinerea, subtus incarnata, superciliis rectricibusque duabus intermediis nigris, lateralibus albis.

69. Caledonica. *Der neucaledonische Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 232. n. 35. *der olivenfarbige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 478. n. 45. Muscicapa (Caledonica) viridi-olivacea, subtus flavo albida, gula crissoque flavis, remigibus ferrugineis.

70. Lutea. *Der dunkelgelbe Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 232. n. 36. *der dunkelgelbe Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 478. n. 46. Muscicapa (Lutea) obscure-flava, tectricibus alarum remigibusque nigricante-nebulosis, cauda ad apicem nigricante.

71. Ochrocephala. *Der gelbköpfige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 232. n. 37. *der gelbköpfige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 479. n. 47. Muscicapa (Ochrocephala) flavescente viridis subtus alba, capite collo pectoreque aureo-flavis.

72. Flavifrons. *Der gelbstirnige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 333. n. 38. *der gelbstirnige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 479. n. 48. Muscicapa (Flavifrons) flavo olivacea, subtus fronteque flava, pone oculos lunula alba, alis caudaque fuscis.

73. Naevia. *Der gesprenkelte Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 333. n. 39. *der gesprenkelte Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 479. n. 49. Muscicapa (Naevia) nigricans subtus pallidior, dorso medio humerisque albo nebulosis.

74. Multicolor. *Der rothbäuchige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II 1. p. 333. n. 40. *der rothbäuchige Fliegenfänger;* tab. 51.

Latham, Syst. ornith. II. p. 479. n. 50. Muscicapa (Erythrogastra) nigra fronte fasciaque alarum albis, pectore abdomineque coccineis.

75. Sandwichensis. *Der Sandwichische Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 333. n. 41. *der Sandwichische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 479. n. 51. Muscicapa (Sandvicensis) fusca subtus superciliisque albidis, pectore ferrugineo, tectricibus alarum remigibus rectricibusque lateralibus apice albis.

76. Obscura. *Der dunkelfarbige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 334. n. 42. *der dunkelfarbige Fliegenfänger.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. II. p. 479. n. 52. Muscicapa (Obscura) fusca subtus cinerascens, abdomine rufo imbuto, cauda longiore integra, rectricibus apice acutiusculis.

77. MACULATA. *Der gefleckte Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 334. n. 43. *der buntflüglige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 480. n. 53. Muscicapa (Maculata) ferrugineo-fusca, subtus fusco-rufescens, tectricibus alarum apice ferrugineo-albis, rectrice extima apice intus alba.

16. CAPENSIS. *Der capsche Fliegenfänger.* (8).

Müller, Natursystem, II. p. 600. n. 16. *der capsche Fliegenfänger.*

Onomat. histor. natur. V. p. 369. *der Capische Fliegenfänger.*

Brisson, ornithol. I. p. 262. n. 9. Gobe-mouche du Cap de bonne espérance.

Latham, Syn. II. 1. p. 327. n. 3. Var. A.

Latham, Vögel, II. 1. p. 320. n. 3. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 468. n. 3. β. M. fusca subtus alba pectore nigro, fascia alarum rufa, rectricibus apice albis.

17. TORQUATA. *Der Fliegenfänger mit dem Halsbande.*

Müller, Natursystem, II. p. 600. n. 17. *der Ringkragen.*

Onomat. hist. nat. V. p. 774. *der Fliegenfänger mit dem Ringkragen.*

Brisson, ornithol. I. p. 263. n. 12. Gobe-mouche à collier du Cap de B. E.

Latham,

(8) Nach *Latham* eine Spielart vom Folgenden.

Latham, Vögel, II. 1. p. 318. n. 3. *der Capsche Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 468. n. 3. Muscicapa (Torquata) nigra subtus alba, pectore rufo, remigibus intimis apice albis.

78. Bicolor. *Der schwarz und weiße Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 63. *der weißbäuchige Fliegenschnäpper von Cayenne; — der schwarz und weiße Fliegenfänger des Edwards;* mit e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 320. n. 4. *der schwarz und weiße Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 469. n. 4. Muscicapa (Bicolor) corpore subtus fronte orbitis uropygio fascia alarum rectricibusque apice albis.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 38. *der schwarz und weiße Fliegenfänger.*

β. *Büffon*, Vögel, XIV. p. 62. *der Gillit von Cayenne;* m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 1. p. 328. n. 4. Var. A.

Latham, Vögel, II. 1. p. 321. n. 4. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 469. n. 4. β. M. alba, occipite cervice alis uropygio caudaque nigris.

18. Carolinensis. *Der Katzenvogel.*

Müller, Natursystem, II. p. 600. n. 18. *der Carolinische Fliegenfänger.*

Onomat. histor. natur. V. p. 360. *der Carolinische Fliegenfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 362. n. 189. *der Katzenvogel.*

Brisson, ornithol. I. p. 260. n. 6. Gobe-mouche brun de la Caroline.

Büffon,

Büffon, Vögel, XIV. p. 104. *der virginische Fliegenfänger*; m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 341. n. 54. *der Katzen-Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 483. n. 64. Muscicapa (Carolinensis) fusca, subtus cinerea, capite nigro, crisso rubro.

Seligmann, Vögel, III. tab. 32. *der Fliegenschnapper mit schwarzer Platte; der Katzenvogel.*

Seligmann, Vögel, IX. tab. 15.

Bartram, Reis. durch Carolina, p. 297. *der Katzenvogel.*

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 15. *der virginische Fliegenschnäpper.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 377. n. 4. *der Katzenvogel.*

79. OCHROLEUCA. *Der goldkehlige Fliegenfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 363. n. 193. *die Goldkehle.*

Latham, Syn. Suppl. p. 173. Goldenthroat Flycatcher.

Latham, Vögel, II. 1. p. 351. n. 80. *der goldkehlige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 489. n. 89. Muscicapa (Ochroleuca) olivacea, subtus albida, gula margineque alarum fulvis, remigibus rectricibusque olivaceo-viridibus.

80. ATRA. *Der Phoebus-Fliegenfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 363. n. 192. *der dunkelbraune Fliegenfänger.*

Latham, Syn. Suppl. p. 173. Phoebe Flycatcher.

Latham, Vögel, II. 1. p. 351. n. 79. *der Phöbus-Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 489. n. 88. Muscicapa (Phoebe) cinereo-olivacea subtus flavescens, pectore cinerascente, rectrice extima latere exteriore alba.

81. Noveboracensis. *Der Fliegenfänger von Neuyork.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 362. n. 191. *der grüne Fliegenfänger.*

Latham, Syn. Suppl. p. 174. Hanging Flycatcher.

Latham, Vögel, II. 1. p. 352. n. 83. *der blaßgrüne Fliegenfänger; kleiner grüner Hängevogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 489. n. 92. Muscicapa (Noveboracensis) pallide viridis, capite cinerascente, abdomine medio albo, fascia alarum duplici alba, macula narium lateribusque corporis flavis.

82. Acadica. *Der neuschottländische Fliegenfänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 360 n. 185. *der Neuschottländische Fink.*

Latham, Syn. Suppl. p. 174. Lesser crested Flycatcher.

Latham, Vögel, II. 1. p. 352. n. 82. *der Neuschottländische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 489. n. 91. Muscicapa (Acadica) subcristata cinereo viridis, subtus flavescente-alba, fascia alarum duplici alba.

83. Aedon. *Der rothgraue Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 357. n. 95. *der rothgraue Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 478. n. 42. Muscicapa (Aedon) fusco-ferruginea, subtus flavescenti-albida, cauda elongata, rectricibus intermediis

diis subaequalibus, extima utrinque longe breviore.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 5. n. 11 * Muscicapa Aëdon.

84. Ferruginea. *Der braunrothe Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 357. n. 96. *der braunrothe Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 477. n. 41. Muscicapa (Ferruginea) fusco-murina, subtus flavo-alba, gutture candido, alis nigris, pennarum margine ferrugineo.

85. Nigra. *Der Societäts-Fliegenfänger.*

Latham, Syn. Suppl. p. 174. Society-Flycatcher.

Latham, Vögel, II. 1. p. 352. n. 84. *der Societäts-Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 474. n. 24. Muscicapa (Nigra) nigra, corpore toto nigro, rostro capite interscapulio pedibusque atris.

86. Ochracea. *Der afrikanische Fliegenfänger.*

Latham, Syn. Suppl. p. 175. African Flycatcher.

Latham, Vögel, II. 1. p. 353. n. 87. *der Afrikanische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 472. n. 17. Muscicapa (Ochracea) collo et pectore cinereo-ferrugineis, alis caudaque nigro-cinereis.

87. Albifrons. *Der weißstirnige Fliegenfänger.*

Latham, Syn. Suppl. p. 175. White-fronted Flycatcher.

Latham, Vögel, II. 1. p. 353. n. 85. *der weißstirnige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith II p. 469. n. 5. Muscicapa (Albifrons) supra nigro-fusca, iugulo et pectore

 sordide

sordide albis, abdomine dilute ferrugineo, fronte albida, pedibus nigris.

88. MELANOLEUCA. *Der schäckige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 357. n. 97. *der schäckige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p 469. n. 6 Muscicapa (Melanoleuca) nigra, dorso albo, femoribus albo nigroque annulatis, rectricibus albis apice nigris.

19. PETECHIA. *Der Peteschen-Fliegenfänger.* (*)

Müller, Natursyst. II. p. 601. n. 19. *der gefleckte Fliegenfänger.*

Onomat. hist. nat. V. p. 772. *der gefleckte Fliegenfänger.*

Brisson, ornithol. I. p. 259. n. 4. Gobe-mouche brun de la Martinique.

Büffon, Vögel, XIV. p. 106. *der braune martinikische Fliegenfänger;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 347. n. 66. *der Peteschen-Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 486. n. 75. Muscicapa (Petechia) fusca subtus cinerea ruso-maculata, gutture crissoque rufis.

89. VIRGATA. *Der gestrichelte Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 71. *der gefleckte Fliegenschnäpper von Cayenne;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 347. n. 67. *der gestrichelte Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 486. n. 76. Muscicapa (Virgata) subcristata fusca, subtus sordide alba fusco-striata, fascia alarum duplici rufa.

90. AGI-

(*) Ist nicht mit *Motacilla Petechia*, p. 983. n. 30. zu verwechseln.

90. Agilis. *Der geschäftige Fliegenfänger.*

Büffon, Vögel, XIV. p 69. *der olivenfarbige Fliegenschnäpper aus Cayenne;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 347. n. 68. *der geschäftige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 486. n. 77. Muscicapa (Agilis) fusco-olivacea subtus albida, gutture subrufo, remigibus caudaque nigricantibus.

20. Grisola. *Der gestreifte europäische Fliegenfänger.*

Müller, Natursyst. II. p. 601. n. 20. *der gestreifte Fliegenfänger.*

Leske, Naturgesch. p. 268. n. 2. *der gestreifte Fliegenfänger.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 176. n. 3. *der gestreifte Fliegenfänger.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 530. n. 1. *der gestreifte Fliegenfänger.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 606. *der graue Fliegenfänger.*

Onomat. histor. natur. V. p. 371. *der gestreifte Fliegenfänger.*

Klein, av. p. 79. n. 12. Sylvia pestilentialis.

Klein, Vorbereit. p. 147. n. 12. *Todtenvogel; Pestilenzvogel; Nosselfinke.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 79. n. 16. *Todtenvogel.*

Klein, Stemmat. av. p. 14. tab. 16. fig. 9. a—c. Sylvia fusca.

Klein, Vögeleyer, p. 25. tab. 10. fig. 7. 8.

Brisson, ornithol. I. p. 257. n. 1. Gobe-mouche.

Büffon, Vögel, XIV. p. 10. *der graue gestreifte Fliegenschnäpper;* m. e. Fig.

Latham, Vögel, II. 1. p. 314. n. 1. *der gestreifte Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 467. n. 1. Muscicapa (Grisea) subfusca subtus albicans, collo longitudinaliter maculato, crisso rufescente.

White, N. G. von Engl. p. 11. Stopparola?

White, N. G. von Engl. p. 34 n. 19. p. 49. *Fliegenschnepper.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 432. *der Todtenvogel.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 126. n. 2. *der gestreifte Fliegenfänger; Graag Hüting.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 172. n. 45. *graubrauner Fliegenfänger.*

Naturforsch. XVII. p. 98. n. 202. *der gestreifte Fliegenfänger.*

Neue schwed. Abhandl. IV. p. 50. Muscicapa Grisola.

Zorn, Petinotheol. II. p. 382. *der Hauß-Schmäzzer.*

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 110. *der gemeine oder gestreifte Fliegenschnäpper.*

Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 104. Muscicapa Grisola.

Levin, britt. Birds. III. tab. 87.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 277. *der gestreifte Fliegenschnäpper.*

21. VARIEGATA. *Der bunte Fliegenfänger.* (9)

Müller, Natursyst. II. p. 607. n. 21. *der bunte Fliegenfänger.*

Onomat. hist. nat. V. p. 375. *der bunte Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 317. n. 2. Var. C.

Latham,

(9) Nach *Latham* eine Spielart von Muscicapa Atricapilla.

Latham, Syst. ornith. II. p. 468. n. 2. ♂. M. fusca, subtus fronte lateribus capitis lineaque longitudinali ab humero ad dorsum albis.

91. Dichroa. *Der zweyfarbige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 355. n. 91. *der zweyfarbige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 490. n. 94. Muscicapa (Dichroa) corpore supra cinereo subtus ochraceo, cauda et rectricibus ochraceis cinereisque.

92. Deserti. *Der rusige Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. 1. p. 355. n. 92. *der rusige Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 478. n. 44. Muscicapa (Deserti) corpore ex ferrugineo nigricante-fuliginoso, alis caudaque nigricantibus, rostro flavicante.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 324. n. 1. Muscicapa Paradisi.	p. 445. n. 11. Todus Paradiseus.
p. 326. n. 7. Muscicapa Emeria.	p. 305. n. 23. Lanius Emeria.
p. 326. n. 8 Muscicapa Rubra.	p. 889. n. 25. Tanagra Aestiva.

Das Geschlecht ist um 71. Gattungen vermehrt. Da aber die 1ste Gattung, weil sie schon anderswo aufgeführt worden, hier wegfallen muss; zwey hingegen in andere Geschlechter versetzt, und an deren Stelle neue aufgenommen worden, so beträgt die Anzahl der

neu hinzugekommenen Gattungen überhaupt *zwey und siebenzig.* — Bey der 2ten Gattung sind *drey*, bey der 9ten *drey*, bey der 10ten *zwey*, bey der 14ten *zwey* Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. Muscicapa Meloxanthia. *Mus. Carls.* IV. n. 97.
Latham, Vögel, II. 1. p. 346. n. 5. *der gelbbäuchige Fliegenfänger.*

2. *Der weiße Fliegenfänger.*
Mus. Carlson. III. tab. 74. Muscicapa alba.
Latham, Vögel, II. 1. p. 354. not. q. *der weiße Fliegenfänger.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 490. n. 96. Muscicapa (Alba) tota alba, capite sulphureo-flavicante.
Vielleicht eine Spielart von *Motacilla Flava?*

3. Muscicapa superciliosa. *Mus. Carls.* IV. n. 96.
Latham, Vögel, II. 1. p. 335. n. 90. *der stolze Fliegenfänger.* Muscicapa superba.

4. *Der dunkle Fliegenfänger.*
Lichtenstein, hamburg. Naturalienverzeichniss, 1793. p. 48. n. 462. Muscicapa obscura.
Latham, Vögel, II. 1. p. 358. n. 98. *der dunkle Fliegenfänger.*

5. *Der fuchsköpfige Fliegenfänger.*
Lichtenstein, l. c. p. 48. n. 463. Muscicapa assimilis.
Latham, Vögel, II. 1. p. 358. n. 99. *der Fuchsköpfige Fliegenfänger.*

6. *Der grünbeinige Fliegenfänger.*
Lichtenstein, l. c. p. 48. n. 464. Muscicapa Chloropus.

Latham,

Latham, Vögel, II. I. p. 358. n. 100. *der grünbeinige Fliegenfänger.*

7. *Der weißgefranzte Fliegenfänger.*

Lichtenstein, l. c. p. 48. n. 462. Muscicapa Striata.

Latham, Vögel, II. I. p. 358. n. 101. *der weißgefranzte Fliegenfänger.*

8. *Der Fliegenfänger mit weißem Gesichte.*

Lichtenstein, l. c. p. 49. n. 466. Muscicapa Cristatella.

Latham, Vögel, II. I. p. 358. n. 102. *der Fliegenfänger mit weißem Gesichte.*

9. *Der blaubunte Fliegenfänger.*

Lichtenstein, l. c. p. 49. n. 467. Muscicapa naevia.

Latham, Vögel, II. I. p. 358. n. 103. *der blaubunte Fliegenfänger.*

10. *Der kleine Todtenvogel.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 432. n. 202.

Naturforsch. XVII. p. 98. n. 202.

Borkhausen, Magazin, I. p. 174. ad n. 45.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der neuholländische Fliegenfänger.*

Latham, Vögel, II. I. p. 354. n. 88. *der Neuholländische Fliegenfänger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 478. n. 43. Muscicapa (Novae Hollandiae) fusca, subtus albida, sub oculis utrinque ad aures striga flava.

White, voy. to New South-Wales. tab. p. 161. Yellow-eared Flycatcher.

White, Reis. n. Neusüdwallis; in dem Magaz. merkw. Reisebeschr. V. p. 188. *der gelböhrige Fliegenfänger.*

Meyer.

Meyer, Uebers. der zool. Entdeck. p. 53. n. 1. Muscicapa novae Hollandiae.

2. *Der nette Fliegenfänger*; in China.
Latham, Syn. Suppl. p. 173. Nitid Flycatcher.
Latham, Vögel, II. 1. p. 352. n. 81. *der nette Fliegenfänger*.
Latham, Syst. ornith. II. p. 489. n. 90. Muscicapa (Nitida) pallide viridis, tectricibus alarum margine albo; remigibus rectricibusque nigricantibus, margine flavo.

3. *Der Sperlingsfliegenfänger*; auf der Insel Tanna.
Latham, Syn. Suppl. p. 175. Passerine Flycatcher.
Latham, Vögel, II. 1. p. 353. n. 86. *der Sperlingsfliegenfänger*.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 490. n. 93. Muscicapa (Passerina) nigricans subtus alba, cauda nigra.

4. *Der javanische Fliegenfänger*.
Latham, Vögel, II. 1. p. 354. n. 89. *der Javanische Fliegenfänger*.
Latham, Syst. ornith. II. p. 490. n. 95. Muscicapa (Javanica) cauda longissima rotundata, corpore nigro ferrugineoque vario subtus albo, iugulo nigro, superciliis albis.
Mus. Carlson. III. tab. 95. Muscicapa Javanica.

5. *Der cambajische Fliegenfänger*.
Latham, Vögel, II. 1. p. 556. n. 93. *der Cambajische Fliegenfänger*.
Latham, Syst. ornith. II. p. 490. n. 97. Muscicapa (Cambaiensis) nigra nitens dorso viridiflavescente, corpore subtus fulvo-flavo, tectricibus alarum fascia duplici alba.

6. *Bechsteins kleiner Fliegenfänger*.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 531. n. 4. *der kleine Fliegenfänger*.

Latham,

Latham, Vögel, II. 1. p. 356. n. 94. *der kleine Fliegenfänger.* Muscicapa parva. Abbild. auf dem Titelblatt.

114. GESCHLECHT. MOTACILLA. *Die Motacille. (Bachstelze; Wedelschwanz; Sänger.)*

Müller, Natursyst. II. p. 602. Gen. CXIV.
Leske, Naturgeschichte, p. 269. Gen. L.
Borowsky, Thierreich, III. p. 183. Gen. LXXII.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 190. Gen. XXXVI.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 531. Gen. LXXIV.
Ebert, Naturl. II. p. 140.
Halle, Vögel, p. 317. Gen. I. p. 327. Gen. II. p. 330. Gen. III.
Pennant, arct. Zool. p. 370.
Onomat. hist. nat. V. p. 259.
Klein, av. p. 73. trib. I. Luscinia. p. 76. trib. II. Troglodytes. p. 77. trib. III. Sylvia.
Brisson, ornith. I. p. 413. Gen. XL. Ficedula.
Büffon, Vögel, XV. u. XVI. B.
Batsch, Thiere, I. p. 318. Gen. LXXX.
Latham, Syst. ornith. II. p. 501. Gen. XLII. Motacilla. p. 506. Gen. XLIII. Sylvia.
Hermann, tab. affin. anim. p. 225. sqq.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 377. Gen. LXXXIII.

1. LUSCINIA. *Die Nachtigall.* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 602. n. 1. *die Nachtigall.*
Leske, Naturgesch. p. 269. n. 1. *die Nachtigall.*

Borows-

(10) Kommt in Deutschland in der Mitte des Aprils an, wenn die Knospen des Weissdorn gebrochen sind. Die Männchen treffen etwa 8 Tage eher als die Weibchen ein, zuweilen noch etwas

Borowsky, Thierreich, III. p. 185. n. 2. *die Nachtigall.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 190. n. 1. Motacilla (Luscinia) rufo-cinerea, armillis cinereis; *die Nachtigall; Philomele.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 531. n. 1. *die Nachtigall; Rothvogel.*

Funke, Naturgesch. I. p. 253. *die Nachtigall.*

Ebert, Naturl. II. p. 141. *die Nachtigall.*

Halle, Vögel, p. 317. n. 281. *die Nachtigall; Tagphilomele; Rothvogel;* Fig. 18.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 421. n. 357. *die Nachtigall.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 388. A. *die Nachtigall.*

Neuer Schaupl. d. Nat. VI. p. 11. *Nachtigall.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 885. *die Nachtigall; Tagschläger; Dörling; Rothvogel.* Ἀηδών.

Handb. der Naturgesch. II. p. 264. *die Nachtigall.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 133. *die Nachtigall.*

Klein,

etwas früher, und singen alle des Nachts vor und nach Mitternacht, um die bey hellen Nächten vorüber streichenden Weibchen an sich zu locken. Nachher hört man sie nicht alle mehr des Nachts schlagen, sondern nur beym herannahenden Morgen, und den Tag über abwechselnd; am fleissigsten zu der Zeit, wenn die Weibchen brüten; nachher haben sie mit Fütterung der Jungen zu thun. Die Singzeit dauert etwa drey Monathe. Jede Nachtigall hat ihren eignen Stand, den sie alle Jahre wieder aufsucht, und duldet in der Nähe keine andere. In ihrem Gesange hat man 16. verschiedene Absätze gezählt; und der Kreis, den ihre Stimme erfüllt, mag, wenn die Luft stille ist, an eine englische Meile im Durchmesse betragen. Dass das Weibchen so gut als das Männchen singe, ist eine alte aber irrige Behauptung. Der Gesang ist das einzige untrügliche unterscheidende Zeichen des männlichen Geschlechts. Sonst sind M. u. W. dem äussern Ansehen nach, nicht zu unterscheiden. Zu Anfang des Septembers ziehen die Nachtigallen wieder weg. — Wird im Käfig 10—17. Jahr alt.

Klein, av. p. 73. n. 1. Luscinia simpliciter. Avis rubicunda.
Klein, Vorbereit. p. 138. n. 1. *kleine Nachtigall; Rothvogel; Dörling.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 74. n. 1. *kleine Nachtigall.*
Klein, Stemmat. av. p. 13. tab. 16. Fig. 1. a. b.
Klein, Vögeleyer, p. 24. tab. 10. Fig. 5.
Gesner, Vögelb. p. 380 *Nachtigall;* m. e. Fig.
Brisson, ornith. I. p. 420. n. 13. Rossignol.
Büffon, Vögel, XV. p. 7. *die Nachtigall;* m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 360. *die Nachtigall.*
Latham, Syn. Suppl. p. 180. Nightingale.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 506. n. 1. Sylvia (Luscinia) ruso-cinerea, subtus cinereo-alba, rectricibus fusco-rufis, armillis cinereis.
Beseke, Vögel Kurl. p. 80. n. 178. *die Nachtigall.*
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 127. n. 1. *die Nachtigall.*
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 433. *die Nachtigall.*
Cetti, Sardin. II. p. 210. *die Nachtigall.*
Fischer, Livl. p. 101. n. 161. *Nachtigall.*
White, N. G. von Engl. p. 33. n. 7. p. 59. n. 7. p. 62. n. 1. p. 65. n. 4. p. 77. *die Nachtigall.*
Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 1. *Nachtigall.*
Kämpf, Japan; in *Du Halde* Chin. IV. p. 142. *Nachtigallen.*
Isert, Reis. n. Neuguinea, p. 117. *Nachtigall.*
Linné, Reis. d. Schwed. I. p. 320.
Hasselquist, Palaest. p. 343. n. 13. Motacilla Luscinia.
Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *Nachtigall.*
Linné, Abhandl. II. p. 283. n. 38. p. 305. n. 134. *Nachtigall.*

Pennant,

Pennant, britt. Thiergesch. tab. 54. *Nachtigall.*
Dieskau, Naturgesch. der Nachtigall. Römh. 1779. 8.
Scopoli, Bem. aus der N. G. p. 189. n. 227. *die Nachtigall.*
Beckmann, Naturhist. p. 55. a. *die Nachtigall.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 150. 369. 688. *Nachtigall.*
Aedologie, ou traité du Rossignol franc, ou Chanteur. Paris, 1751. 12.
Aedologie oder Abhandl. von der Nachtigall. Strasb. 1752. 12. c. f.
Eberhard, Thiergesch. p. 84. *die Nachtigall.*
Unterricht von den verschiedenen Arten der Canarienvögel und Nachtigallen. Frcf. u. Lpzg. 1732. 8.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 63. *Nachtigall.*
Naumann, Vogelsteller, p. 143. *Nachtigall.*
Hervieux, von Canarienvög. p. 162. *die Nachtigall.*
Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 203. 223. *die Nachtigall.*
Allerneueste Mannigfalt. II. p. 714.
Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. II. 1. p. 110. *die Nachtigall.*
Berl. Samml. X. p. 156. *die Nachtigall.*
Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 226.
Goeze, nützl. Allerl. II. p. 394. n. 13.
Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorseh. III. p. 193.
Beckmann, phys. ökon. Bibl. IV. p. 468. XVI. p. 37.
Anweis. Vögel zu fang. p. 396.
Naturforsch. XVII. p. 98. n. 203.
Merklein, Thierreich, II. p. 318.
Börner, Stadt- u. Landwirthsch. II. p. 249.
Neu hamburg. Magaz. XIV. p. 459.
Beckmann, Churmark Brandenb. I. p. 614.

Elshol-

Elsholzens Tischbuch, p. 164.
Tänzer, notabil. venatoris, p. 96. n. 121.
André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 238. 240.
Olla potrida, 1785. p. 70.
Allgemein. Magaz. der Nat. etc. XII. p. 95.
Preuss. Sammler, II. p. 1616.
Wittenberg. Wochenbl. 1777. p. 267.
Neue Anmerk. über alle Theile der Naturl. III. p. 565.
Hannöv. Magazin, 1778. p. 379.
Aldrov. encomium Lusciniae, — in Donav. Amph. I. p. 386.
Petri Fradelii laus Lusciniae, 4.
Bresl. Nat. und Kunstgesch. VIII. Vers. p. 453.
Loniceri, Kräuterb. p. 681.
Jablonsky, allgem. Lex. p. 715.
Oekonom. Zool. p. 100. n. 46.
Meidinger, Vorles. I. p. 153. n. 1.
Schles. ökonom. Gesellsch. 1781. p. 104.
Naturgesch. aus den best. Schriftst. VIII. p. 708.
Onomatol. forestal. II. p. 891.
Zückert, mater. aliment. p. 113.
Wirsing, Vögel, tab. 55. — *Günther*, Nest. u. Ey. tab. 65. *Nachtigall.*
Hist. Prov. I. p. 498.
Voy. en Barbarie, I. p. 273.
Zinnan. Uov. p. 54. tab. 8. fig. 42. Rusignuolo.
Russel, Alepp. p. 7.
Gentl. Magaz. XXII. tab. p. 265.
Bomare, dictionn. X. p. 95. — Dictionn. des anim. III. p. 714. — Cours d'hist. nat. IV. p. 48.
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. Luscinia.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 8. Luscinia.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 184. n. 1. Motacilla (Luscinia) rufo-cinerea, genuum annulis cinereis.

Kramer, Austr. p. 375. n. 9. Motacilla rufo-cinerea, genuum annulis cinereis; *Au-Vogel; Auen-Nachtigall.*

Kramer, Austr. p. 376. n. 10. Motacilla toto corpore rufo, subtus pallidiore. *Wald-Nachtigall; Wald-Vogel.*

Charleton, onomast. zoic. p. 92. n. 14. Luscinia.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 295. Luscinia, p. 296. Luscinia minor. *Dörling.*

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 286. Luscinia seu Philomela, Aedon, Acredula.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 391. Luscinia minor seu montana.

Belon, hist. nat. des ois. p. 335. Rossignol; Roussignol.

Moehring, av. gen. p. 44. n. 34. Luscinia.

Sibbald, Scot. III. 2. p. 18. obs. 12. Luscinia seu Philomela.

Barrere, ornithol. p. 42. G. 18. sp. 5. Ficedula tota fulva, canora.

Salerne, hist. nat. des ois. p. 230. Rossignol franc; rossignol chanteur; rossignol de bois.

Jonston, av. p. 123. Luscinia.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 29. Luscinia.

Turner, histor. av. voc. *Luscinia.*

Aelian. de nat. animal. L. 1. c. 43. L. 3. c. 40. L. 5. c. 38. L. 12. c. 28. Ἀηδών.

Aristot. hist. anim. L. 4. c. 9. L. 5. c. 9. L. 9. c. 15. 49 Ἀηδών.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 377. n. 1. *die Nachtigall.*

β. Die

β. *Die große Nachtigall.* [1]

Borowsky, Thierreich, III. p. 185. *der Sprosser.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 534. n. 2. *der Sprosser; Winternachtigall.* Motacilla Philomela.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 604. *b.* oben.
Onomat. hist. nat. IV. p. 886. *Nachtphilomele; Sprosser; Sproßvogel; Nachtsänger; Schläger; Φιλομηλη.*
Halle, Vögel, p. 318. n. 282. *die Nachtphilomele; Sprosser.*
Klein, av. p. 73. n. 1. *Nacht-Schläger.*
Klein, Vorbereit. p. 138. n. 1. *Sproßvogel; Sprosser; Nachtschläger.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 74. n. 1. *große Nachtigall; Nachtschläger.*
Brisson, ornithol. I. p. 421. A. grand Rossignol.
Büffon, Vögel, XV. p. 59. *die große Nachtigal.*
Latham, Syn. II. 2. p. 411. Var. A. Greater Nightingale.
Latham, Syst. ornith. II. p. 506. n. 1. β. Luscinia maior.
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 128. n. 1. β. *der Sprosser.*
Fischer, Livl. p. 101. n. 161. *der Nachtschläger.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 63. *Sprosser.*
Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 229. *der Sprosser.*
Borkhausen, Magazin, I. p. 177. n. 50. *die große Nachtigall.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 594. *Sprosser.*
Dierkau, Naturgesch. der Nachtigall, p. 12. *der Sprosser.*
Frisch, Vögel, tab. 21. fig. 1. a.

(1) Nach *Halle*, *Bechstein*, *Borkhausen*, u. a. eine eigne Gattung.

γ. *Die weiße Nachtigall.* (2)

Brisson, ornithol. I. p. 421. B. Rossignol blanc.

Büffon, Vögel, XV. p. 62. *die weiße Nachtigall.*

Latham, Syn. II. 2. p. 412. Var. B. White Nightingale.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 507. n. 1. β. Luscinia candida.

Naturforsch. XVI. p. 49. *weiße Nachtigall.*

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 229.

Allerneueste Mannigfaltigk. IV. p. 250.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 29. Luscinia candida.

2. CALIDRIS. *Die jamaicaische Motacille.*

Müller, Natursyst. II. p. 604. n. 2. *die Grasmücke.*

Onomat. hist. nat. V. p. 262. *die amerikanische Nachtigall.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 76. n. 18. *Jamaicanische Nachtigall.*

Brisson, ornithol. I. p. 457. n. 75. grand Figuier de la Jamaique.

Büffon, Vögel, XVI. p. 163. *der große Jamaikasche Feigenfresser;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 543. n. 134. Sylvia (Calidris) fusco-virescens, subtus fulva, linea oculari subocularique nigra, rectricibus apice luteis.

Seligmann, Vögel, V. tab. 16. *die amerikanische Nachtigall.*

Martini, Naturlex. V. p. 143. *amerikanische Nachtigall.*

Neueste

(2) *Büffon* will im *Plinius* gelesen haben, daſs eine weiſse Nachtigall in Rom 6000 Sestertien gekostet habe. In einigen Exemplaren, die ich nachgeschlagen habe, lese ich nur *sechs* Sestertien.

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 248. *amerikanische oder spanische Nachtigall.*

Naturgesch. mit Merian. Kupf. p. 798. n. 35. *der große Feigenvogel von Jamaika.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 184. n. 2. Motacilla (Calidris) supra fusco-virescens, subtus fulva, linea oculari suboculari que nigra.

52. Bonariensis. *Die Motacille mit weißem Kinne.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 174. *der schwarz und rothgelbe Zartschnabel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 543. n. 135. Sylvia (Bonariensis) nigra subtus ferruginea, gula loris abdomine medio rectricibusque extimis apice albis.

53. Palmarum. *Der Bimbele.* (3)

Büffon, Vögel, XVI. p. 176. *der Bimbele, oder unächte Hänfling.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 544. n. 136. Sylvia (Palmarum) fusca, subtus albo-flavescens, uropygio olivaceo, remigibus rectricibusque fuscis.

54. Bananivora. *Der Bananist.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 179. *der Bananist.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 544. n. 137. Sylvia (Bananivora) griseo-nigricans, subtus uropygioque flavescente, fascia per oculos nigra, superciliis macula alarum rectricibusque apice albis.

55. Vermivora. *Der Wurmfresser.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 378. n. 217. *der Wurmfresser.*

Qq 3 *Brisson,*

(3) Flügelweite 7. Zoll. Gewicht noch nicht 2 1/2 Drachmen.

Brisson, ornithol. I. p. 457. n. 76. Figuier de Pensilvanie.

Büffon, Vögel, XVI. p. 169. *der Wurmfresser.*

Onomat. hist. nat. III. p. 903. *die Bachstelze aus Pensylvanien.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 544. n. 138. Sylvia (Vermivora) viridi-olivacea subtus albida, capite collo subtus pectoreque aurantiis, fascia per oculos arcuque supra nigris, superciliis albis.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 95. *der Wurmfresser.*

Martini, Naturlex. V. p. 151. *pensylvanische Bachstelze.*

Naturgesch. mit Merian. Kupf. p. 800.

Encycl. meth. Oiseaux, I. p. 666.

56. MADAGASCARIENSIS. *Der Foudi-jala.* (4)

Brisson, ornithol. I. p. 422. n. 14. Rossignol de Madagascar.

Latham, Syst. ornith. II. p. 507. n. 2. Sylvia (Madagascariensis) fusco-olivacea, subtus rufo-fusca, capite rufo, gutture albo, macula pone oculos fusca.

3. MODULARIS. *Die Winternachtigall.* (5)

Müller, Natursyst. II. p. 604. n. 3. *die Baumnachtigall.*

Leske,

(4) Die Trivialbenennung *Madagascariensis*, kommt p. 981. n. 28. nochmals vor.

(5) Nährt sich im Frühjahr von Insekten und Gewürmen. Im Herbst von Beeren, sonderlich Wacholderbeeren; frisst auch Hanfsaamen, und anderes kleines Gesame. Zahm kann man sie mit Brodt, gekochtem Fleisch, Hirsenkleyen mit Milch, und dergl. unterhalten. Nistet jung aufgezogen, auch im Zimmer. Soll die Blattern bekommen und häufig daran sterben.

Leske, Naturgesch. p. 269. n. 2. *die braungefleckte Grasmücke.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 186. *die Braunelle; Baumnachtigall.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 536. n. 7. *die Braunelle: Isserling.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 604. n. 6. *braunfleckige Grasmücke.*

Halle, Vögel, p. 322. n. 283. *die graufalbe Gesanggrasmücke, Baumnachtigall.* Curruca canora.

Halle, Vögel, p. 336. n. 308. *das Bleikehlchen.*

Halle, Vögel, p. 336. n. 309. *der braune Fliegenstecher.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 424. n. 358. *Baumnachtigall; Braunelle; Wollentramper.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 391. H. *die Baumnachtigall.*

Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 950. *Braunelle; Braunellchen.*

Onomat. histor. natur. V. p. 267. *die schön singende Bachstelze.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 136. *Braunkehlchen, Braunellein.*

Klein, av. p. 77. n. 4. Sylvia gula plumbea.

Klein, Vorbereit. p. 145. n. 4. *Bleykehlein mit gelbgefleckten Augen.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 79. n. 6. *Bleykehlein mit gelbgefleckten Augen.*

Gesner, Vögelb. p. 474. *Prunelle.*

Brisson, ornith. I. p. 420. n. 12. Fauvette de Haye ou Passe-buse.

Büffon, Vögel, XV. p. 129. *die Prunell-Grasmücke, oder die Winternachtigall*, p. 130. *Wintergrasmücke*, p. 131. *wilder Sperling;*

Strauchgrasmücke; Falkensperling, p. 132. *Zaunsperling*; m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 360. *die Baumnachtigall.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 511. n. 13. Sylvia (Modularis) supra griseo-fusca, tectricibus alarum apice albis, pectore caerulescente-cinereo.

Beseke, Vögel Kurl. p. 80. n. 579. *die Baumnachtigall.*

Fischer, Liv. p. 101. n. 163. *Baumnachtigall.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 436. *die Baumnachtigall.*

Cetti, Sardin. II. p. 212. *die braune Grasmükke.*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 2. *Graairisk; grauer Hänfling?*

Leem, Finnm. p. 136. * * *Graairisk.*

Naturforsch. XVII. p. 100. n. 204. *die Baum-Nachtigall.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 153 390. *die Brunelle.*

Martini, Naturlex. V. p. 17. *die Baumnachtigall.*

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 234. *die braunfleckigte Grasmücke, oder Brunelle.*

Sander, Grofs. u. Sch. in der Nat. II. p. 77. *das Braunellein.*

Neueste Mannigfaltigk. III. p. 775. *Baumnachtigall.*

Neues hamburg. Magaz. St. 37. *Baumnachtigall.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 10. Passer canus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 184. n. 3. Motacilla (Modularis) supra griseo-fusca, tectricibus alarum apice albis, pectore caerulescente-cinereo.

Charleton, onomast. zoic. p. 89. n. 3. Curruca Hypolais; Passer sepiarius.

Kramer,

Kramer, Austr. p. 376. n. 14. Motacilla fusca, capite cinereo, pectore ochraceo-testaceo, iridibus croceis? — *Braunellerl, Prunellerl.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 416. Prunella.

Jonston, av. p. 121. Muscicapa altera, Muscicapa quinta.

Belon, hist. des ois. p. 375. petit mouchet; m. e. schl. Fig.

Zinnan. Uov. p. 45. tab. 6. fig. 30. Magnanima Aldr.

Bomare, diction. IV. p. 370. — Diction. des anim. II. p. 174.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 378. n. 2. *die Winternachtigall.*

57. JUNCORUM. *Der Buschsänger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 397. n. 240. *der Buschsänger.*

Klein, av. p. 89. n. 10. Passerculus simpliciter.

Klein, Vorbereit. p. 166. n. 10. *brauner Zwerg.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 91. n. 9. *brauner Zwerg.*

Brisson, ornithol. I. p. 335. n. 14. Moineau de Virginie.

Büffon, Vögel, XI. p. 51. *der kleine braune Sperling des Catesby.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 511. n. 14. Sylvia (Juncorum) fusca tota, subtus dilutior, cauda subforcipata.

Seligmann, Vögel, II. tab. 70. *der kleine Sperling.*

58. AQUATICA. *Die Wassermotacille.* (6)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 510. n. 11. Sylvia (Aquatica) rufescens, fusco-maculata, abdomine,

(6) Ich weiss keinen Grund von dieser Benennung anzugeben. *Scopoli* hält den Vogel für die *Binsennachtigall.*

mine, uropygio, maculaque pone oculos albidis, fascia alarum alba.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 195. n. 235. Sylvia Schoenobaenus.

4. SCHOENOBAENUS. *Die Binsennachtigall.*

Müller, Natursystem, II. p. 604. n. 4. *die Binsennachtigall.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 391. I. *die Binsennachtigall.*

Brisson, ornithol. I. p. 419. n. 11. Fauvette de bois, ou Roussette.

Büffon, Vögel, XV. p. 106. *die Waldgrasmücke, oder Roussette.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 510. n. 10. Sylvia (Schoenobaenus) testaceo-fusca, subtus pallide testacea, capite maculato, remigibus extus rufo-marginatis.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 232. *die Waldgrasmücke.*

Neue Schwed. Abhandl. IV. p. 52. M. Schoenobaenus.

Neueste Mannigfaltigk. III. p. 779. *Binsennachtigall.*

Forskål, fn. arab. p. 6. n. 17. *Abussaej.* — Descript. anim. p. 6. n. 17. Motacilla (Schoenobaenus) supra nigro cinereoque maculata, rectricibus, intermediis exceptis, basi albis.

Hasselquist, Palaest. (Ed. germ.) p. 37. n. 50. Motacilla (Yvica) corpore fusco-virideſcente, pectore ferrugineo.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 9. Schoenobaenus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 184. n. 4. Motacilla (Schoenobaenus) testaceo-fusca, subtus pallide testacea, capite maculato.

Charlton,

Charleton, exercitat. p. 97. Lusciniola Bellonii.
Charleton, onom. zoic. p. 92. Lusciniola Bellonii.
Jonston, av. p. 123. Lusciniola.
Belon, hist. nat. des ois. p. 338. Roussette; m. e. schl. Fig.
Bomare, diction. X. p. 114. — Dict. des anim. III. p. 725.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 379. n. 3. *die Binsennachtigall.*

5. Campestris. *Die Feldnachtigall.*

Müller, Natursyst. II. p. 608. n. 5. *die jamaicaische Nachtigall.*
Onomat. histor. natur. V. p. 262. *die Grasmücke aus Jamaika.*
Klein, verbess. Vögelhistor. p. 81. n. 31. *Heckenwenzel.*
Brisson, ornithol. I. p. 456. n. 74. Fauvette de Haye de la Jamaique.
Büffon, Vögel, XVI. p. 185. *der einfarbige Zartschnabel;* m. e. Fig.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 544. n. 139. Sylvia (Campestris) grisea, capite virescente-cinereo, rectricibus concoloribus, abdomine albido.
Seligmann, Vögel, V. tab. 17. *die americanische Grasmücke.*
Martini, Naturlex. V. p. 144. *Jamaikaische Nachtigall; Feldnachtigall.*
Neueste Mannigfalt. IV. p. 249. *Feldnachtigall.*
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 184. n. 5. Motacilla (Campestris) grisea, capite cinereo, rectricibus concoloribus, abdomine albido.

59. Macroura. *Die langschwänzige capsche Motacille.*

Büffon, Vögel, XV. p. 147. *die gefleckte Grasmücke vom Vorgeb. d. g. H.* m. e. Fig.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 545. n. 140. Sylvia (Macroura) fusca, subtus albo-flavescens, maculis nigricantibus, superciliis albis, cauda cuneiformi elongata.

Martini, Naturlex. V. p. 96. *capische Bachstelze.*

60. Longicauda. *Die langschwänzige chinesische Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 545. n. 141. Sylvia (Longicauda) olivaceo-virescens, vertice rufescente, remigibus fuscis, cauda cuneiformi elongata.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 161. *die kleine langgeschwänzte Grasmücke aus China.*

6. Curruca. *Die Grasmücke.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 605. n. 6. *der Nachtsänger.*

Leske, Naturgesch. p. 269. n. 3. *die fahle Grasmücke.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 187. n. 4. *der Nachtsänger; große graue Grasmücke; Spottvogel.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 191. n. 2. Motacilla (Curruca) supra fusca, subtus albida, rectricibus fuscis, extima margine tenuiore alba; *die Grasmücke, der Heckenschmatzer, Weidenzeisig.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 535. n. 5. *die gemeine Grasmücke.*

Funke, Naturgesch. I. p. 256. *die fahle Grasmücke.*

Ebert, Naturl. II. p. 142. *die Grasmücke.*

Halle, Vögel, p. 323. n. 284. *die gemeine Grasmücke; Kukkuksammer; schnarrende schwarzröthliche Grasmükke.*

Gatterer,

(7) Von ihr werden die meisten Kuckukseyer ausgebrütet. Kann über 10. Jahr alt werden.

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere II. p. 424. n. 359. *die Grasmücke; Grasemücke; Grasemunke*, etc.

Pennant, arct. Zool. II. p. 395. U. *die Grasmücke.*

Neuer Schaupl. d. Nat. III. p. 507. *Grasmücke.*

Onomat. hist. nat. III. p. 532. *die Grasmuck.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 892. *die Baumnachtigall; Grasmücke schlechtweg; hochgelbe Grasmücke; Grasmücke mit Nachtigallen Gesang.*

Klein, Vorbereit. p. 139. n. 3. *braungefleckte Grasmücke.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 75. n. 3. *braungefleckte Grasmücke.*

Klein, stemmat. av. p. 13. tab. 16. fig. 3. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 24. tab. 10. fig. 6.

Brisson, ornithol. II. p. 417. n. 7. Fauvette babillarde.

Buffon, Vögel, XV. p. 97. *die graue oder die geschwätzige Grasmücke;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 361 *die graue Grasmücke.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 509. n. 9. Sylvia (Curruca) supra fusca, subtus albida, rectricibus fuscis, extima margine tenuiore alba.

Beseke, Vögel Kurl. p. 80. n. 181. *der Nachtsänger.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 130. n. 2. *die Grasmücke; Grasmügg.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 436. *die Grasmücke; fahlgelbe Grasmücke.*

Fischer, Liv. p. 101. n. 162 *braungefleckte Grasmücke; Nachtigallsknecht.*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 3. *Gräßmutte.*

Linné, Abhandl. II. p. 283. n. 38. *Baumnachtigall.*

White,

White, N. G. von Engl. p. 60. n. 3. p. 63. n. 5. *Grasmücke.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 189. n. 228. *die graue Grasemücke; der Spottvogel.*

Martini, Naturlex. V. p. 148. *Grasmücke.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 375. *der dem Mönch nicht unähnliche Dornreich oder Hecken-Schmätzer.*

Naturforsch. XVII. p. 100. n. 205. *der Nachtsänger.*

Neue schwed. Abhandl. IV. p. 51. *die fahle Grasmücke; Krukan.*

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 232. *die fahle Grasmücke.*

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 397. n. 14. *graufleckige Grasmücke.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 250. *Nachtsänger.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 65. *die Grasemücke.*

Loniceri, Kräuterb. p. 684. *Graßmück.*

Elsholz. Tischb. p. 169. *Grasmücke.*

Zückert, mater. aliment. p. 114.

Seibiz. de aliment. fac. p. 894.

Tänzer, notab. venat. p. 100. n. 126. *Graß-Mücke.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 409. *Grasmücke.*

Eberhard, Thiergesch. p. 84. *die Grasmücke.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 179. n. 52. *Graßmücke.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 21. Curruca.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 184. n. 6. Motacilla (Curruca) supra fusca, subtus albida, rectricibus fuscis, extima margine tenuiore alba.

Charleton, onom. zoic. p. 91. n. 12. Cannevarola.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 255. Curruca. *Grasimücke; Grasemüsche.*

Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 17. Curruca.

Rzaczyns-

Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 278. Curruca, Andithia, Hypolais, Passer sepiarius.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 377. Curruca seu passer gramineus.

Jonston, av. p. 125. Hypolais seu Curruca.

Belon, hist. nat. des ois. p. 340. Fauvette brune; m. e. zieml. gut. Fig.

Barrere, ornithol. Cl. 3. Gen. 18. Sp. 2. Ficedula rostro et pedibus luteis maior.

Barrere, l. c. Gen. 24. Sp. 6. Parus subviridis seu Curruca.

Zinnan. Uov. p. 57. tab. 8. Fig. 46. Cannevarola.

Faun. Arragon. p. 88.

Aristot. hist. anim. L. 6. c. 6. n. 82. Ὑπολαις.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 379. n. 4. *die Grasmücke.*

61. Passerina. *Die kleine Grasmücke.*

Onomat. histor. natur. III. p. 533. *die kleine Grasmücke.*

Brisson, ornith. I. p. 414. n. 3. petite Fauvette.

Buffon, Vögel, XV. p. 72. *die kleine Grasmücke*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 508. n. 5. Sylvia (Passerina) grisea, subtus cinereo-alba, rufescente varia, abdomine albo, superciliis albidis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 230. *die kleine Graßmücke.*

Histoir. Prov. I. p. 507. Passerinette.

Zinnan. Uov. p. 46. tab. 6. Fig. 31.

7. Hippolais. *Die Bastardnachtigall.* (8)

Müller, Natursyst. II. p. 605. n. 7. *die Gelbbrust.*

Bechstein,

(8) Ich habe die Synonymen dieser und der folgenden Gattung so geordnet, wie sie nach Anleitung unsres Systems geordnet werden

Bechstein, Naturgesch. I. p. 542. n. 20. *die Bastardnachtigall.*

Onomat. hist. nat. V. p. 266. *die Grasmücke.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 390. G. *die Bastardnachtigall.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 507. n. 4. Sylvia (Hippolais) virescente - cinerea, subtus flavescens, abdomine argenteo, artubus fuscis, superciliis albidis.

Fischer, Zusätze zur N. G. von Livl. p. 50. n. 499. *Gelbbrust; Bastardnachtigall.*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 4. Motacilla Hippolais.

Martini, Naturlex. V. p. 70. *Gelbbrust.*

Neue schwed. Abhandl. IV. p. 51. Motacilla Hippolais.

Bechstein: Naturforsch. XVII. p. 39. n. 1. *die Bastardnachtigall.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 180. n. 53. *grünlichgraue Grasmücke.*

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 56. *Gelbbrust.*

Naumann,

werden mussten; muss aber bemerken, dass *Bechstein* beyde für einerley hält. Auch *Büffon* ist der Meinung, und *Brisson* giebt *Linnés Motacilla Hippolais* als Synonym von seiner *Curruca* an. So ordnete auch *Linné* die Synonymen in der XII. Edition p. 330. n. 7. So viel ist wohl richtig, dass *Bechsteins* Meinung, die *Hippolais* des *Linné*, die *Curruca* des *Brisson*, die *Petty-Chaps* des *Pennant*, und die *Fauvette* des *Büffon* mit einander zu vereinigen, die grösste Wahrscheinlichkeit hat, und ich trage kein Bedenken, meine vorige Meinung, da ich beyde trennte, zurückzunehmen. Ihm nach kommt der Vogel als Zugvogel in den letzten Tagen des Aprils, wenn schon die Knospen der Bäume völlig ausgebrochen sind, an, und zieht in den letzten Tagen des Augusts wieder weg. Macht ein sehr niedliches Nest auf kleine Fichten oder hohe Büsche in eine Gabel, legt 5. dunkelfleischfarbene ganz ovale, mit einzelnen dunkelrothen Punkten, besonders nach der Spitze zu, bestreuete Eyer, und brütet jährlich nur einmal.

Naumann, Vogelsteller, p. 148. *Schackruthgen.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 19. Ficedula septima.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 185. n. 7. Motacilla (Hippolais) virescente-cinerea, subtus flavescens, abdomine albido, artubus fuscis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 32. n. 270. Motacilla (Hippolais) virescente-cinerea, subtus flavescens, abdomine albido, artubus fuscis, superciliis albidis.

Kramer, Austr. p. 377. n. 18. Motacilla subtus albida, supra fusca? *braune Grasmücke; kleiner Spottvogel?*

Zinnan, Uov. p. 44. tab. 6. fig. 29?

Donndorff, Handb. d. Thiergeschich. p. 379. n. 5. *die Bastardnachtigall.*

62. HORTENSIS. *Die Gartengrasmücke.* (9)

Brisson, ornith. I. p. 414. n. 2. Fauvette.

Büffon, Vögel, XV. p. 64. *die grüngelbe Grasmücke, oder Bastard-Nachtigall;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 507. n. 3. Sylvia (Hortensis) griseo-fusca, subtus rufescente-alba, superciliis albidis, rectricibus fuscis, extus griseo-marginatis, extima oblique dimidiato alba.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 229. *die Grasmücke.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 379. n. 6. *die Gartengrasmücke.*

63. RUFA. *Die kleinste Grasmücke.* (10)

Brisson, ornith. I. p. 418. n. 8. Fauvette rousse.

Büffon,

(9) S. die vorhergehende Anmerkung.

(10) Nach *Bechstein* gehört *Frisch kleinste Grasmücke*, tab. 24. nicht hieher. Vgl. Naturgesch. Deutschl. III. p. 608. — Naturforsch. XXVII. p. 50.

Büffon, Vögel, XV. p. 118. *die kleine gelbrothe Grasmücke, oder der Weidenzeisig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 516. n. 27. Sylvia (Rufa) griseo-fusca, subtus superciliisque rufescentibus.

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 234. *die rothe Grasmücke.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 181. n. 54. *kleinste Grasmücke.*

Jonston, av. p. 115. Passer Troglodytes Bellonii.

Belon, hist. nat. des ois. p. 348. Petite fauvette; Fauvette rousse.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 380. n. 7. *die kleinste Grasmücke.*

8. Salicaria. *Der Rohrsänger.*

Müller, Natursyst. II. p. 606. n. 8. *der Rohrsänger.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 184. n. 1. *der Rohrsperling; Rohrsänger; Schilfschmätzer; Weidengucker.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 513. n. 22. *der Weiderich.*

Halle, Vögel, p. 323. n. 285. *die kleine braungelbe Grasmücke.*

Neuer Schaupl. der Natur, III. p. 508. n. 3. *kleine graugelbe Grasemücke.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 392. M. *der Weiderich; Rohrsänger.*

Klein, Vorbereit. p. 139. n. 4. *Weidenmücke; Weidenzeisig; kleine graugelbe Grasmücke.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 75. n. 4. *Weidenmücke.*

Klein, Stemmat. av. p. 13. tab. 16. fig. 2. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 25. tab. 10. fig. 10.

Gesner, Vögelb. p. 548. *Weidengückerlein*; m. e. Fig. schl.

Brisson,

Brisson, ornith. I. p. 415. n. 5. Fauvette de roseau.
Büffon, Vögel, XV. p. 112. *die Rohrgrasmücke; Weiderich;* m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 362. *der Rohrsperling oder Schilfschmatzer.*
Latham, Syn. Suppl. p. 118. Sedge-Warbler.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 516. n. 26. Sylvia (Salicaria) cinerea subtus alba, superciliis albis.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 436. *die Weidenmücke.*
Fischer, Zus. zur N. G. von Livl. p. 50. n. 500, *Weidenmücke; Weidenzeisig.*
White, N. G. von Engl. p. 40. p. 59. n. 16. p. 64. n. 15. *Weiderich.*
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 25. Curruca arundinacea *Briss.*
Tengmalm: neue schwed. Abhandl. IV. p. 52. M. Salicaria.
Bechstein: Naturforsch. XXVII. p. 45. *der Weiderich*, p. 47. *Rohrsänger; Schilfschmätzer; Weidengucker; Rohrsperling; Rohrgrasmücke; Rohrschliffer; Schilfdornreich; Weidenmücke; Wyderle; Zyste.*
Naturforsch. XVII. p. 101. n. 206. *der Rohrsänger.*
Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 233. *der Rohrsänger.*
Neueste Mannigfalt. IV. p. 322. *Rohrsänger.*
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 185. n. 8. Motacilla (Salicaria) cinerea subtus alba, superciliis albis.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 330. Petronella? *Steinfletsche?*
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 419. Salicaria.
Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 17. Avis Stopparolae similis.
Jonston, av. p. 121. Stopparola alia.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 380. n. 8. *der Rohrsänger.*

9. SYLVIA. *Der Waldsänger.* (1)

Müller, Natursyst. II. p. 606. n. 9. *der Waldsänger.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 188. n. 5. *der Waldsänger.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 536. n. 6. *das Müllerchen; kleine graue Grasmücke.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 604. *die fahle Grasmücke.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 394. S. *das Weißkehlchen; die Steinfletsche.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 309. *der Waldsänger.*

Brisson, ornith. I. p. 415. n. 4. Fauvette grise ou Grisette.

Büffon, Vögel, XV. p. 91. *der Waldsänger oder die graue Grasmücke;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 514. n. 23. Sylvia (Cinerea) supra cinerea, subtus alba, rectrice prima longitudinaliter dimidiato alba, secunda apice alba.

Frisch, Vögel, tab. 21. Fig. 2. a. *die fahle Grasmücke.*

Bock,

(1) Die *M. Curruca* und *M. Sylvia* sind einander so ähnlich, daſs sie leicht verwechselt werden können. Beyde sind oben grau und unten weiſs, mit einiger Beymischung von roth. Sie unterscheiden sich aber 1) durch die Gröſse. Denn *Mot. Sylvia* ist gröſser als die *Curruca.* 2) *M. Sylvia* ist am Kopfe aschgrau, am Rücken grau, rostfarbig. Die Schwungfedern an der äuſserlten Kante sind rostfarbig. *M. Curruca* hat nur eine Farbe, am Kopf und Rücken aschgrau und keine Beymischung von Rostfarbe; auſserdem noch einen kleinen dunklern Fleck hinter dem Ohre, der gar nicht bey der *Sylvia* ist. Beyde halten sich in Gärten auf, und werden *Erbsenvögel* genennet, weil die Gärtner meinen, daſs sie den Erbsen Schaden thun. *Tengmalm.*

Bock, Naturgesch. von Preuss. IV. p. 437. *der Waldsänger.*

Fischer, Livl. p. 102. n. 168. *Waldsänger.*

White, N. G. von Engl. p. 34. n. 9. p. 59 n. 10. p. 64. n. 12 p. 66. n. 5. *Weißkehlchen.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 25. Motacilla Sylvia.

Tengmalm: neue schwed. Abhandl. IV. p. 51. Motacilla Sylvia.

Borkhausen, Magaz. I. p. 181. n. 56. *der Waldsänger.*

Naturforsch. XVII. p. 101. n. 207. *der Waldsänger.*

Martini, Naturlex. V. p. 195. *Waldsänger.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 231. *die graue Grasmücke. Stopparola.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 415. *Waldsänger.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. 15. Cineraria.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 185. n. 9. Motacilla (Sylvia) supra cinerea, subtus alba, rectrice prima longitudinaliter dimidiato alba, secunda apice alba.

Jonston, av. p. 121. Stopparola pectore et ventre fere candido.

Faun. Arragon. p. 83. n. 5.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 380. n. 9. *der Waldsänger.*

β. *Brisson*, ornithol. I. p. 463. n. 4. Mesange cendrée. (2)

Büffon, Vögel, XVII. *die weißkehlichte Meise.*

(2) Nach *Brisson* eine eigne Gattung. — *Latham* hat die Synonymen hier dergestalt geordnet, dass er zur *Motacilla Sylvia Linnei*, *Brünn.* u. *Müll. M. Sylvia*, *Sepp. Turdus Calamoxenus*, *Briss. Parus cinereus*, *Büff mesange cendrée* u a. rechnet; *Brissons Curruca cinerea* aber als Spielart davon annimmt, und dazu die in unsrem System bemerkten Synonymen aus *Aldrov. Raj. Büffon*, *Salerne*, *Pennant* und *Willoughb.* zählet.

Latham, Syst. ornith. II. p. 515. n. 23. β. Sylvia supra rufo-cinerea, subtus rufo-alba, gula alba, rectrice extima extus toto, intus dimidiato, alba.

Raj. Synops. p. 77. A. 6. Ficedulae affinis?

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 25. Parus cinereus *Briss.*

γ. *Büffon*, Vögel, XV. p. 96. *die Bouscarle*; m. e. Fig.

10. FICEDULA. *Die Beccafige.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 606. n. 10. *der Feigenesser.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 191. n. 4. Motacilla (Ficedula) subfusca, subtus alba, pectore cinereo maculato; *die Beccafige.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 536. n. 8. *der Feigenfresser.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 605.

Pennant, arct. Zool. II. p. 391. K. *der Feigenfresser.*

Klein, av. p. 79. n. 13. Sylvia rectricibus alarum macula alba.

Klein, Vorbereit. p. 147. n. 13. *Braunellchen; brauner Fliegenschnepper mit einem weißen Flügelflecken.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 80. n. 17. *Braunellchen.*

Brisson, ornith. I. p. 413. n. 1. Becfigue.

Büffon,

(3) Ist schon lange als ein sehr schmackhafter Vogel berühmt, und besonders von der Insel Cypern, in Töpfen mit Weinessig und wohlriechenden Kräutern eingemacht, zu 1000. bis 1200 Töpfen alle Jahr versendet. — *Bechstein* vermuthet, ob es wohl nicht der schwarzgraue Fliegenfänger seyn möge. — S. vorher die Not. 2. bey *Muscicapa Atricapilla* n. 9. ingl. *Lath.* Vögel, II. 1. p. 320. not. *v.*

Büffon, Vögel, XV. p. 196. *der gemeine Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 517. n. 28. Sylvia (Ficedula) subfusca, subtus alba, pectore cinereo-maculato.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 437. *der Wüstling; Rothauge; Feigenesser.* (sogar mit *Muscicapa Olivacea* p. 938. n. 14. verwechselt)

Fischer, Livl. p. 101. n. 165. *kleine Grasmücke.*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 6. *Spitzlerke*, tab. 12.

Martini, Naturlex. V. p. 53. *der Feigenesser.*

Naturforsch. XVII. p. 101. n. 208. *der Feigenesser.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 182. n. 57. *Feigenfresser; Braunelle.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 240. *der braune Fliegenschnäpper.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 49. *Braunellchen.*

Günther, Nest. u. Ey. tab. 59. *Wüstling.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 18. Ficedula quarta.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 185. n. 11. Motacilla (Ficedula) subfusca, subtus alba, pectore cinereo maculato.

Charleton, onom. zoic. p. 81. n. 9. Ficedula; *m. e. unricht. Abbild.*

Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 280. Ficedula.

Barrere, ornithol. Cl. 3. gen. 18. sp. 1. Ficedula rostro et pedibus luteis.

Jonston, av. tab. 33. Ficedula.

Forskål, fn. orient. — descr. anim. p. 8. n. 13. Becquefigue?

Bomare, diction. II. p. 5. — Diction. des anim. I. p. 64. Becfigue.

Hermann, tab. affin. anim. p. 228. Motacilla Ficedula.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 381. n. 10. *die Beccafige.*

64. NAEVIA. *Die gefleckte Grasmücke.*

Onomat. hist. nat. III. p. 534. *die gefleckte Grasmücke.*

Brisson, ornithol. I. p. 418. n. 9. Fauvette tachetée.

Büffon, Vögel, XV. p. 126. *die graufleckige Grasmücke.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 517. n. 29. Sylvia (Naevia) fusco-rufescens, flavicante-varia subtus alba, pectore flavicante maculis albis, rectricibus nigricantibus albo extus marginatis.

Martini, Naturlex. V. p. 95. *bunte Grasmücke.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 234. *die gefleckte Grasmücke.*

Jonston, av. p. 121. Boarina.

65. ALPINA. *Die Alpengrasmücke.* (4)

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 191. n. 3. Motacilla (Alpina) griseo-ferruginea, gula alba maculis lunatis fuscis, tectricibus alarum nigricantibus, versus apicem linea punctatis alba; *die Flüe-* (d. h. Felsen-) *Lerche.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 546. n. 27. *die Alpengrasmücke; Flüelerche.*

Büffon, Vögel, XV. p. 141. *die Alpengrasmücke.*

Andrä, Briefe aus der Schweitz, p. 102. tab. 13. *Flüelerche.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 335. *die Grasmücke der Alpen.*

Martini,

(4) Ist nach *Blumenbach* (l. c.) *Bechstein* (N. G. Deutschl. III. p. 715.) und selbst nach *Latham* mit *Sturnus Montanus*, p. 804. n. 7. und *Sturnus collaris*, p. 805. n. 16. einerley.

Martini, Naturlex. V. p. 9. *Bachstelze der Alpen.*
Neue schwed. Abhandl. III. p. 110, Motacilla alpina.
Storr, Alpenreise, I. p. 79. Fringilla gularis.
Manetti, ornith. tab. 338. fig. 1. Fringilla seu Passer in Etruria *Sordone* dict.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 381. n. 11. *die Alpen-Grasmücke.*

66. PATAGONICA. *Die patagonische Motacille.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 517. n. 30. Sylvia (Patagonica) cinerea subtus albo-maculata, superciliis albis, alarum maculis fasciaque fusca, rectricibus extimis albis.

67. PROVINCIALIS. *Der Pitchou.*
Büffon, Vögel, XV. p. 145. *der Pitchou;* mit e. Fig.
Latham, Syn. Suppl. p. 181. Dartford Warbler.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 517. n. 31. Sylvia (Dartfordiensis) saturate rufo-fusca, subtus ferruginea, abdomine medio albo, palpebris iridibusque coccineis, pedibus flavis.
Martini, Naturlex. V. p. 155. *Pitschou.*
Samml. zur Phys. u. Naturgesch. III. p. 236. *der Pitchou.*

68. AFRICANA. *Die schwarze afrikanische Motacille.* (*)
Onomat. hist. nat. III. p. 534. *die Capische gefleckte Grasmücke.*
Brisson, ornith. I. p. 419. n. 10. Fauvette tachetée du Cap de bonne Espérance.
Büffon, Vögel, XV. p. 147. *die gefleckte Grasmücke vom Vorgeb. d. g. H.*

(*) Ist nicht mit *Motacilla afra*, p. 962. n. 83. zu verwechseln.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 518. n. 32. Sylvia (Africana) nigra rufescente-varia, subtus alba-rufescens, fascia utrinque sub gula nigra, rectricibus fuscis, ruso-marginatis.

Martini, Naturlex. V. p. 96. *capische Grasmücke.*

69. NOVEBORACENSIS. *Die Motacille von Neuyork.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 381. n. 225. *der Sänger von Neuyork.*

Büffon, Vögel, XV. p. 150. *die gefleckte Louisianische Grasmücke;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 518. n. 33. Sylvia (Noveboracensis) cinerea fusco-varia, subtus flavescens nigro striata, superciliis albis.

70. UMBRIA. *Die dunkelbraune Motacille.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 382. n. 226. *der dunkelbraune Sänger.*

Büffon, Vögel, XV. p. 151. *die dunkelfarbige Louisianische Grasmücke.*

Martini, Naturlex. V. p. 65. *die schattirte Louisianische Bachstelze.*

71. FLAVICOLLIS. *Das Gelbkehlchen.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 372. n. 203. *das Gelbkehlchen.*

Klein, av. p. 87. n. 14. Parus americanus, gutture luteo.

Klein, Vorbereit. p. 162. n. 14. *gelbkehlige Meise aus Amerika.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 89. n. 14. *gelbkehlige Meise.*

Brisson, ornithol. I. p. 467. n. 10. Mesange grise de la Caroline.

Büffon, Vögel, XVII. p. 150. *die graue gelbkehlige Meise;* m. e. Fig.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 518. n. 35. Sylvia (Flavicollis) grisea subtus alba, gutture luteo, fronte superciliis lateribusque colli nigris, fascia alarum duplici alba.

Seligmann, Vögel, III. tab. 24. *die americanische Meise mit gelber Kehle.*

Naturgesch. a. d. best. Schr. Vögel, p. 849. n. 4.

72. Ruficauda. *Die braunrothschwänzige Motacille.*

Büffon, Vögel, XV. p. 154. *die Cayennische Grasmücke mit rothgelbem Schwanze.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 519. n. 37. Sylvia (Ruficauda) rufo-fusca, subtus alba, gula rufo circumdata fusco maculata, tectricibus alarum caudaque rufis.

Martini, Naturlex. V. p. 43. *cayennische Bachstelze mit röthlichem Schwanze.*

73. Fuscicollis. *Die gelbbäuchige cayennische Motacille.*

Büffon, Vögel, XV. p. 155. *die Cayennische Grasmücke mit brauner Kehle und gelben Bauch.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 520. n. 38. Sylvia (Fuscicollis) fusco-virescens pectore abdomineque fulvo-flavis, alis fuscis, rubescente marginatis.

Martini, Naturlex. V. p. 43. *Cayennische Bachstelze mit brauner Kehle und gelben Bauche.*

74. Caerulescens. *Die blaugraue Motacille.*

Büffon, Vögel, XV. p. 156. *die blaulichte Domingische Grasmücke.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 520. n. 39. Sylvia (Caerulescens) cinereo-caerulescens, subtus alba, gula nigra, alis fuscis, tectricibus macula alba, remigibus extus cinereo-caerulescentibus.

Martini,

Martini, Naturlex. V. p. 29. *die blaulichte Domingische Bachstelze.*

75. Americana. *Die gelbrückige amerikanische Motacille.* (5)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 520. n. 40. Sylvia (Americana) cinereo-caerulescens, interscapularibus olivaceo-flavis, iugulo pectoreque flavis, abdomine fasciaque alarum albis.

76. Pensilis. *Die gelbhälsige Grasmücke.*

Büffon, Vögel, XV. p. 158. *die gelbhälsige Grasmücke;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 520. n. 41. Sylvia (Pensilis) grisea abdomine superciliisque albis, collo subtus flavo, alis albo nigroque fasciatis, rectricibus lateralibus quatuor albo-maculatis.

Martini, Naturlex. V. p. 80. *Gelbhals.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 381. n. 12. *die gelbhälsige Grasmücke.*

11. Alba. *Die gemeine Bachstelze.* (6)

Müller, Natursystem, II. p. 607. n. 11. *die weiße Bachstelze.*

Leske, Naturgesch. p. 270. n. 10. *die weiße Bachstelze.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 188. n. 6. *die weiße Bachstelze; Wassersterz.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 191. n. 5. Motacilla (Alba) pectore nigro, rectricibus duabus lateralibus dimidiato-oblique albis; *das Ackermännchen; weiße oder graue Bachstelze.*

Bechstein,

(5) *Latham* rechnet auch *Büff. Figuier cendré de la Caroline* (Gmel Syst. p. 1007 n. 4) mit hieher. Im System steht Habitat in *Europa*, durch einen Schreibfehler, für *America.*

(6) In den Eingeweiden hat man Iaspis und Porphyr gefunden. S. Schrift. der berlin. Gesellsch N. Fr. VI. p. 400.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 539. n. 14. *die weiße Bachstelze.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 607. *die weiß und schwarze Bachstelze.*

Funke, Naturgesch. I. p. 258. *Ackermännchen.*

Ebert, Naturl. II. p. 141. *die sogenannten weißen Bachstelzen.*

Halle, Vögel, p. 336. n. 310. *die gemeine Bachstelze.*

Meyer, Thiere, II. p. 21. tab. 77. *weiße und schwarze Bachstelze.* M. u. W.

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere II. p. 426. n. 362. *die Bachstelze; weiße blaue oder graue Bachstelze; Wasserstelze; das Ackermännchen; Stiftsfräulein; Klosterfräulein; Wegesterz; Queckstерz; Wackelstärt; Wackstärt; Wippstärt.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 368. E. *die weiße Bachstelze.*

Beckmann, Naturhist. p. 55. *b. die Bachstelze.*

Neuer Schaupl. d. Nat. I. p. 473. *Bachstelze.*

Onomat. hist. nat. V. p. 259. *die gemeine Bachstelze.*

Handb. der deutschen Thiergesch. p. 135. *graue Bachstelze; schwarzkehlichte Bachstelze.*

Klein, av. p. 78. n. 6. Sylvia pectore nigro.

Klein, Vorbereit. p. 146. n. 6. *Klosterfräulein; Quecksterze.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 79. n. 9. *Klosterfräulein; graues Schwarzkehlein.*

Klein, Stemmat. av. p. 14. tab. 16. fig. 6. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 26. tab. 10. fig. 19.

Gesner, Vögelb. p. 545. *weiße oder graue Wasserstelz;* m. e. mittelm. Fig.

Brisson, ornith. I. p. 437. n. 38. Lavandiere.

Buffon,

Büffon, Vögel, XVI. p. 28. *die weiße Bachstelze*; m. 2. Figg. M. u. W.

Batsch, Thiere, I. p. 362. *die weiße Bachstelze.*

Latham, Syn. Suppl. p. 178. White Wagtail.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 501. n. 1. Motacilla (Alba) pectore nigro, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 131. n. 3. *die weißbunte Bachstelze; witte Werpstirten; Queckstaart; Wippstaart; Schwienhierd.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 437. *die weiße Bachstelze.*

Fischer, Livl. p. 102. n. 166. *weiße Bachstelze; Bebeschwanz; Wipssteert.*

Cetti, Sardin. II. p. 208. not. 223.

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 7. *Steenpikker.*

Pontoppidan, Norweg. II. p. 137. *Erle?*

Olafsen, Reis. d. Isl. I. p. 310. *Mariu-Erla.*

White, N. G. von Engl. p. 60. n. 4. *weiße Bachstelze.*

Fermin, Surin. II. p. 163. *Bachstelze?*

Adanson, Senegall. p. 97. *Bachstelzen?*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 186. n. 224. *die graue Bachstelze.*

Naturforsch. XVII. p. 102. n. 209. *die weiße Bachstelze.*

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 251. *die weiße Bachstelze.*

Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 234. *weiße Bachstelze.*

Neue schwed. Abhandl. I. p. 299. *weiße Bachstelze.*

Linné, Abhandl. II. p. 287. n. 53. p. 305. n. 125. *weiße Bachstelze.*

Pennant, britt. Thiergesch. p. 178.

Zorn,

Zorn, Petinotheol. II. p. 432. *die blauliche Bachstelze.*

Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. IV. 4. p. 143. Beschr. einer weissen Bachstelze mit vier Füssen.

Martini, Naturlex. V. p. 87. *gemeine Bachstelze.*

Krünitz, Encykl. III. p. 329. *schwarzkehligte Bachstelze.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 65. *Bachstelze oder Ackermännlein.*

Naumann, Vogelsteller, p. 153. *Bachstelze.*

Angen. Landlust, p. 97. *schwarzkehligte Bachstelze.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 174. n. 46. *gemeine Bachstelze.*

André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 213. *gemeine Bachstelze.*

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 761. *die weiße Bachstelze.*

Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 105. Motacilla alba.

Anweis. Vögel zu fang. p. 106. *schwarzkehligte Bachstelze.*

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 130. *gemeine Bachstelze.*

Tänzer, notabil. Venator. p. 108. n. 136. *Bachstelze.*

Loniceri, Kräuterb. p. 677. *Bachstelz.*

Geoffroy, mater. med. VII. p. 551. *die gemeine Bachstelze.*

Merklein, Thierreich, p. 251. *Bachstelze; Queckstelze; Kloster-Nonne.*

Lemmery, Materiallex. p. 756.

Elsholz, Tischbuch, p. 165.

Zückert, mater. aliment. p. 113.

Onomatol. forestal. I. p. 182.

Onomat.

Onomat. oeconom. pract. I. p. 391.
Jablonsky, allgem. Lex. p. 98. *Bachstelze.*
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. Motacilla.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 1. Motacilla alba.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 185. n. 12. Motacilla (Alba) pectore nigro, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis.
Kramer, Austr. p. 373. n. 1. Motacilla pectore nigro; *graue Bachstelze.*
Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 1. Motacilla alba, albicula, *Aristoteli* Cnipologus.
Moehring, av. gen. p. 44. n. 33. Motacilla.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 306. Motacilla alba; *Bachstelze; weiße, graue Wasserstelze.*
Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. Motacilla alba.
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 396. Motacilla alba seu Codatremula, *Cnipologus* Turneri, *Cinclus* Sipontini.
Jonston, av. p. 120. Motacilla alba.
Barrere, ornithol. Cl. III. gen. 19. sp. 1. Motacilla alba.
Belon, hist. nat. des ois. p. 349. Lavandiere.
Bellon. observat. p. 16. Culicilega.
Zinnan. Uov. p. 51. tab. 7. fig. 38. Coda tremola.
Hist. Prov. I. p. 498.
Bomare, diction. II. p. 53. — Diction. des anim. I. p. 274.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 382. n. 13. *das Ackermännchen.*

β. *Die Bachstelze von der Insel Luçon.*
Latham, Syn. II. 2. p. 396. Collared Wagtail.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 502. n. 1. γ. M. cinerea, pectore nigro, capistro gula genis fascia alarum rectricibusque duabus extimis albis.
Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 24.

77. Al-

77. ALBIDA. *Die weißliche Bachstelze.* (7)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 501. n. 1. β. M. albida, dorso, tectricibus alarum caudaque cinerascentibus, rostro pedibusque purpurascentibus.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 608. * 1.

78. MADERASPATENSIS. *Die Bachstelze von Madras.* (8)

Brisson, ornithol. I. p. 440. n. 44. Bergeronette de Madrast.

Büffon, Vögel, XVI. p. 75. *der Sticherling von Madras.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 502. n. 2. Motacilla (Maderaspatensis) nigra, ventre albo, fascia alarum longitudinali alba, rectricibus duabus intermediis nigris, lateralibus albis.

79. CINEREA. *Die aschgraue Bachstelze.* (9)

Brisson, ornithol. I. p. 437. n. 39. Bergeronette grise.

Büffon, Vögel, XVI. p. 46. *der graue Sticherling:* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 502. n. 3. Motacilla (Cinerea) cinerea, subtus alba, fascia pectorali fusca, rectrice prima alba, secunda basi apiceque alba.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 608. * 2.

White,

(7) Nach *Latham* und *Bechstein* eine Varietät, oder vielmehr eine junge *Motacilla alba.*

(8) Ist nicht mit *Motacilla Maderaspatana.* Edit. XII. p. 334. n. 28. zu verwechseln, welches eigentlich *Madagascariensis* heissen soll.

(9) Besteht, nach *Bechstein*, theils nur aus den Jungen der *Motacilla alba*, theils *Boarula*, p. 997. n. 51.

White, N. G. von Engl. p. 60. n. 6. *graue Bachstelze?*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 307. Muscicapa I. Crucilega cinerea. *Sticherling; Fliegenstecher; Mückenstecher.*

Martini, Naturlex. V. p. 102. *graue Bachstelze.* Naturgesch. mit Merian. Kupf. p. 765.

Barrere, ornithol. Cl. III. gen. 19. sp. 2. Motacilla cinerea.

Belon, hist. nat. des ois. p. 351. Autre sorte de Lavandiere?

80. Indica. *Die Indianische Bachstelze.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 503. n. 7. Motacilla (Indica) griseo-virescens, subtus flavescens, pectore lunulis duabus nigris confluentibus, rectricibus duabus extimis femoribus crissoque albis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 162. *die graue indische Bachstelze.*

81. Viridis. *Die grüne Bachstelze.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 505. n. 13. Motacilla (Viridis) pallide viridis, subtus alba, capite cinereo, alis caudaque cinereis, albo marginatis.

82. Tschutschensis. *Die Tschutschische Bachstelze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 369. H. *die Tschutschische Bachstelze.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 505. n. 12. Motacilla (Tschutschensis) olivaceo-fusca, subtus loris fasciaque duplici alarum alba, rectrice prima tota, secunda latere interiore alba.

83. Afra.

83. AFRA. *Die gelbbraune afrikanische Motacille.* (10)

Büffon, Vögel, XVI. p. 72. *die kleine kapsche Bachstelze.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 505. n. 11. Motacilla (Afra) flavescente-fusca, subtus flava, crisso albo, superciliis, alis caudaque nigris.

Martini, Naturlex. V. p. 110. *die kleine kapsche Bachstelze.*

Naturgesch. aus den best. Schriftst. p. 771. *die kleine Bachstelze vom Vorgeb. der gut. Hoffnung.*

84. CITREOLA. *Die gelbköpfige Bachstelze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 369. G. *der Gelbkopf.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 69. *die zitrongelbe Bachstelze.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 504. n. 9. Motacilla (Citreola) cinereo-caerulescens, capite, collo corporeque subtus flavis, nucha lunula nigricante.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 6. n. 14. Motacilla Citreola.

Lepechin, Tageb. der russ. Reis. II. p. 187. *die Bachstelze mit dem gelben Bauch.* (russ. *Sheltobrjuschka.*) Motacilla pectore abdomine capiteque flavo, nucha nigra, rectricibus duabus lateralibus dimidiato-albis.

13. FLAVA. *Die gelbe Bachstelze.* (1)

Müller, Natursyst. II. p. 608. n. 12. *die gelbe Bachstelze.*

 Leske,

(10) Ist nicht mit *Motacilla africana*, p. 958. n. 68. zu verwechseln.

(1) Die Synonymen und Beschreibungen dieser und der 51ten Gattung (*Motacilla Boarula*, p. 997.) werden dergestalt verwechselt, dass man oft gar nicht herauskommen kann. Der eine sagt das von der *Flava*, was der andere von der *Boarula* sagt,

Leske, Naturgesch. p. 271. n. 11. *die gelbe Bachstelze.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 189. n. 7. *die gelbe Bachstelze.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 540. n. 15. *die gelbe Bachstelze.*

Funke, Naturgesch. I. p. 258. *die gelbe Bachstelze; Kuhstelze.*

Ebert, Naturl. II. p. 258. *Kuhstelzen.*

Meyer, Thiere, II. tab. 78. *gelbe Bachstelze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 369. F. *die gelbe Bachstelze.*

Onomat. hist. nat. V. p. 264. *die gelbe Bachstelze.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 135. *die gelbe Bachstelze.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 168. n. 4. *gelbe Bachstelze.*

Brisson, ornith. I. p. 438. n. 40. Bergeronette du Printems.

Büffon, Vögel, XVI. p. 54. *der Frühlings-Sticherling;* m. e. Fig.

Gesner, Vögelb. p. 545. *gelbe Wasserstelze;* m. e. schl. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 362. *die gelbe Bachstelze.*

Latham,

sagt, und so umgekehrt. So gehts auch mit Bestimmung der Charactere und Ordnung der Synonymen. Sie passen grösstentheils auf beyde. In der XII. Edit. p. 331. rechnete Linné die Synonymen von *M. Boarula* zu seiner *Motacilla flava.* Jetzt hat man beyde getrennt, aber sie sind gewiss noch nicht gehörig vertheilt. *Bechstein* rechnet sogar *Büffons Bergeronette jaune* zur *Motacilla flava* Linn. und die *Bergeronette de Printems* zur *M. Boarula.* Mir ist es sehr wahrscheinlich, dass, da vieles von dem, was von der einen gesagt wird, nach Verschiedenheit des Alters, des Geschlechts und der Jahrszeit, auch auf die andern passt, daher diese Verwirrung und Verwechselung entstanden seyn möge.

Latham, Syn. Suppl. p. 179. Yellow Wagtail.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 504. n. 8. Motacilla (Flava) pectore abdomineque flavis, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 132. n. 4. *die gelbe Bachstelze; das geele Wähpstierten; de Lämmerhierd.*
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 438. *die gelbe Bachstelze; Kuhstelze.*
Fischer, Liv. p. 102. n. 167. *Kuhstelze.*
Fischer, Zusätze zur N. G. von Livl. p. 49. *gelbe Bachstelze; Kuhstelze.*
Beseke, Vögel Kurl. p. 80. n. 180. *die gelbe Bachstelze.*
Cetti, Sardin. II. p. 208. *Bachstelze mit gelbem Bauch?*
White, N. G. von Engl. p. 60. n. 5. *gelbe Bachstelze.*
Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 8. *Gulspink.*
Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 253. *die gelbe Bachstelze.*
Naturforsch. XVII. p. 102. n. 210. *die gelbe Bachstelze.*
Seligmann, Vögel, VII. tab. 48. *die gelbe Bachstelze.*
Martini, Naturlex. V. p. 75. *Frühlingsbachstelze.*
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 187. n. 225. *die gelbe Bachstelze.*
Neueste Mannigfalt. IV. p. 57. *gelbe Bachstelze.*
Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 767. *die Frühlingsbachstelze.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 108. *die gelbe Bachstelze.*
Borkhausen, Magazin, I. p. 176. n. 48. *gelbe Bachstelze.*

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 178. *die gelbe Bachstelze?*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 2. Motacilla flava.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 185. n. 13. Motacilla (Flava) pectore abdomineque flavo, rectricibus duabus lateralibus dimidiato oblique albis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 307. Muscipeta. II. Crucilega flava. *Gelber Sticherling; Ixlin.*

Jonston, av. p. 121. Motacilla flava altera.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 383. n. 14. *die gelbe Bachstelze.*

β. *Büffon*, Vögel, XVI. p. 74. *der Sticherling von Timor.*

Latham, Syn. II. 2. p. 401. n. 6. Var. A. Timor Wagtail.

Latham, Syst. ornith. II. p. 504. n. 8. β. M. cinereo-grisea, subtus flava, superciliis flavis, remigibus rectricibusque nigris, fascia alarum alba.

Martini, Naturlex. V. p. 194. *Bachstelze von Timor.*

γ. *Büffon*, Vögel, XVII. p. 182. *die gelbe Meise des Gmelin;* m. e. Fig. (2)

Latham, Syst. ornith. II. p. 504. n. 8. γ.

δ. *Büffon*, Vögel, XVII. p. 185. *die kaspische Meise.* (3)

Latham, Syst. ornith. II. p. 504. n. 8. δ.

ε. *Büffon*,

(2) Zieht im Anfang des Frühlings heerdenweise nach Astrachan; nistet aber daselbst nicht, sondern begiebt sich über die Wolga nach Russland, um da zu brüten, und kömmt im Herbst nach den Ufern der caspischen See zurück. Nährt sich hauptsächlich von Samen; frisst aber auch Insekten.

(3) Ist vorzüglich bey Enpeli häufig vorhanden. Hält sich bey den Häusern, auf den Strassen, und am Strande heerdenweise auf,

a. *Büffon*, Vögel, XVII. p. 187. *die gesprengte Meise.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 504. n. 8. *ε.*

13. Tiphia. *Die Wasserstelze.* (4)

Müller, Natursyst. II. p. 608. n. 13. *die Wasserstelze.*
Onomat. histor. natur. III. p. 892. *die Bachstelze aus Benghala; der grüne indianische Sperling.*
Klein, av. p. 75. n. 17. Luscinia Bengalensis.
Klein, Vorbereit. p. 142. n. 17. *die bunte Grasmücke von Bengala.*
Klein, verbess. Vögelhistor. p. 76. n. 17. *bengalische Nachtigal.*
Brisson, ornithol. I. p. 442. n. 47. Figuier de Bengale.
Büffon, Vögel, XVI. p. 78. *der grün und gelbe Feigenfresser;* m. e. Fig.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 532. n. 91. (Siehe nachher *Motacilla Zeylonica*, n. 87.)
Seligmann, Vögel, IV. tab. 53. *der grüne indanische Fliegenschnäpper.*
Martini, Naturlex. V. p. 196. *Wasserstelze.*
Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 775: *der grüne und gelbe Feigenvogel.*
Neueste Mannigfalt. IV. p. 449. *die Wasserstelze.*
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 186. n. 14. Motacilla (Tiphia) viridis, subtus flavescens, alis nigris fasciis duabus albis.

85. Sinensis. *Die chinesische Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 533. n. 93. Sylvia (Sinensis) viridis, subtus incarnata, macula au-

 rium

auf, so dass ihrer oft mehr als zehn auf einen Schuss getödtet werden.

(4) Ist, nach *Latham*, mit *Motacilla Zeylonica*, p. 964. n. 87. einerley.

rium poneque oculos pallida, rectricibus mucronatis.

86. Singalensis. *Die cingalesische Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 533. n. 92. Sylvia (Cingalensis) viridis variegata, subtus flava, collo inferiore fulvo.

87. Zeylonica. *Die schwarz gescheitelte zeylonische Motacille.* (5)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 532. n. 91. Sylvia (Zeylonica) viridis subtus flavescens, vertice nucha alisque nigris, fascia alarum bifida alba.

Latham, Syn. Suppl. p. 474.

88. Olivacea. *Die olivenfarbige zeylonische Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 532. n. 90. Sylvia (Olivacea) olivacea, corpore subtus albo, capistro flavescente.

89. Caryophyllacea. *Die nelkenfarbige Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 352. n. 89. Sylvia (Caryophyllacea) dilute caryophyllea, alis caudaque obscuris, rostro pedibusque rubris.

90. Albicapilla. *Die weißgekrönte Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 532. n. 87. Sylvia (Albicapilla) viridis, subtus albida, gula macula verticis subocularique albis.

91. Grisea. *Der cayennische Grauling.* (6)

Büffon, Vögel, IX. p. 180. *der cayennische Grauling*; m. e. Fig. — XIII. p. 184. *der Grisin von Cayenne.*

Latham,

(5) Nach *Latham* mit *Motacilla Tiphia* p. 961. n. 13. einerley.

(6) Nach *Büffon* eine Abart von *Turdus Cirrhatus* p. 826. n. 91.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 532. n. 88. Sylvia (Grisea) cinereo-grisea, subtus fasciaque per oculos alba, vertice, collo inferiore pectoreque nigris.

92. Maculata. *Die Ortolanenpivote.*

Büffon, Vögel, XV. p. 208. *die Ortolanenpivote;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 532. n. 86. Sylvia (Maculata) nigro-maculata, supra fusca, subtus cinereo-alba, alis caudaque nigris, rectricibus duabus extimis margine exteriore apiceque toto albis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 241. *die Pivote.*

93. Massiliensis. *Der Fist.*

Büffon, Vögel, XV. p. 207. *der Fist von Provence;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 531. n. 85. Sylvia (Massiliensis) fusco rufoque varia, subtus rufo-alba, pectore nigro-maculato, sub oculis macula flavescente, rectricibus duabus extimis albis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 241. *der Fist.*

94. Pileata. *Die schwarzkappige Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 531. n. 84. Sylvia (Pileata) rufo-fusca, capite pectoreque nigris, fronte, gula, superciliis, uropygio rectricibusque lateralibus a basi ad medium albis.

95. Aurantia. *Die orangebrüstige Motacille.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 23. *der grünbraune Steinschmätzer;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 531. n. 83. Sylvia (Aurantia) nigricans, viridi nebulosa, subtus fulve-

fulvescens, gula macula tectricum tectricibus caudae rectricibusque lateralibus apice albis.

Martini, Naturlex. V. p. 189. *grünbrauner kapscher Steinschmätzer.*

Samml. zur. Physf. u. N. G. III. p. 250. *der braungrünlichte Weißschwanz.*

96. Hottentotta. *Die Hottentottenmotacille.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 21. *der große Capsche Steinschmätzer.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 531. n. 82. Sylvia (Hottentotta) fulvo-fusca, subtus gulaque albida, vertice pectoreque nebulosis, abdomine superiore uropygioque fulvis, rectricibus lateralibus basi albis.

Samml. zur Physf. u. N. G. III. p. 249. *der kapsche Weißschwanz.*

Martini, Naturlex. V. p. 188. *großer Steinschmätzer vom Kap.*

97. Leucorhoa. *Der senegalische Weißschwanz.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 25. *der senegalische Weißschwanz.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 531. n. 81. Sylvia (Leucorhoa) rufo-fusca, subtus albo-flavescens, pectore rubescente, uropygio basique caudae albis.

Martini, Naturlex. V. p. 190. *Senegalischer Steinschmätzer.*

Samml. zur Physf. u. N. G. III. p. 251. *der senegalische Weißschwanz.*

14. Stapazina. *Die spanische Motacille.*

Müller, Natursyst. II. p. 608. n. 14. *die spanische Bachstelze.*

Pen-

Pennant, arct. Zool. II. p. 394. Q. *der röthlichbraune Weißschwanz.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 756. *das schwarzkehlchen; rothe Bachstelze.*

Klein, av. p. 80. n. 26. Sylvia s. Nigricilla, gutture nigro nigrisque alis, corpore aeruginoso.

Klein, Vorbereit. p. 150. n. 26. *schwarzkehliger Schwarzschwanz.*

Klein, verb. Vögelh. p. 81. n. 29. *Schwarzkehliger Schwarzschwanz.*

Brisson, ornithol. I. p. 436. n. 37. Cul-blanc roux.

Büffon, Vögel, XIV. p. 17. et 19. *der rothe Weißschwanz.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 530. n. 80. Sylvia (Stapazina) ferruginea, area oculorum alis caudaque fuscis, rectricibus extimis latere albis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 61. *die röthlichbraune Grasmücke.*

Martini, Naturlex. V. p. 162. *die rothe Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 326. *die rothe Bachstelze.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 186. n. 16. Motacilla (Hispanica) ferruginea, area oculorum alis caudaque fuscis, rectricibus extimis latere albis.

β. *Brisson*, ornith. I. p. 435. n. 36. Cul-blanc roussatre. (7)

Büffon, Vögel, XVI. p. 18. *der rothgelbliche Weißschwanz.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 755. *die röthliche Bachstelze.*

Latham, Syn. II. 2. p. 469. n. 76. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 530. n. 80. β. Sylvia rufescens, subtus albida, taenia per oculos nigra,

(7) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

nigra, rectricibus 2. intermediis nigris, lateralibus albis utrinque versus apicem nigro fimbriatis.

Linné, Syst. Nat. Ed. XII. p. 332. ad n. 14. obs.

15. OENANTHE. *Der Weißschwanz.*

Müller, Natursyst. II. p. 609. n. 15. *der Weißschwanz.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 192. n. 11. *das Weißkehlchen.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 541. n. 17. *der Weißschwanz; Steinkletsche; Steinschwacker.*

Bechstein, N. G. Deutschl. III. p. 605. *der gelbbrüstige Fliegenvogel mit oberhalb weißem Schwanze; der Weißschwanz.*

Funke, Naturgesch. I. p. 258. *der Steinschwacker.*

Halle, Vögel, p. 339. n. 314. *das Weiskehlchen.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 426. n. 364. *das Weißkehlchen.*

Pennant, Arct. Zool. II. p. 393. P. *der Weißschwanz.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 752. *der Steinschmatzer.*

Klein, av. p. 78. n. 9. Sylvia buccis nigris.

Klein, Vorbereit. p. 147. n. 9. *schwarzrückige Grasmücke; Weißkehlein mit schwarzen Backen.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 79. n. 12. *Weißkehlein mit schwarzen Backen.*

Gesner, Vögelb. p. 387. *Oenanthe?*

Brisson, ornith. I. p. 434. n. 1. Cul-blanc, ou Vitrec, ou Moteux.

Büffon, Vögel, XVI. p. 5. *der große Steinschmätzer oder Weißschwanz;* m. 2. Figg. M. u. W.

Batsch, Thiere, I. p. 362. *das Weißkehlchen.*

Latham, Syn. Suppl. p. 182. Wheat-ear.

Latham, Syst. ornith. II. p. 529. n. 79. Sylvia (Oenanthe) dorso cano, fronte linea supra oculos,

los, uropygio basique caudae albis, per oculos fascia nigra.

Beseke, Vögel Kurl. p. 81. n. 182. *der Weiß-schwanz.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 183. n. 5. *die weißge-schwänzte Bachstelze.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 211. *Grasmücke mit schwarzem Rücken.*

Cetti, Sardin. II. p. 221. *der Weißbürzel.*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 9. *Steendolp; Steenspratte.*

Pontoppidan, Norweg. II. p. 185. *Steendulp, Steensquette; Quicastiert.*

White, N. G. von Engl. p. 25. *Steinquäcker.*

Olaffen, Reis. d. Isl. I. p. 311. *Steindepill.*

Pennant, Reis. d. Schottl. I. p. 285. *Weißschwänze.*

Pallas, nord. Beytr. III. p. 14. *der Steinquäcker.* IV. p. 22. Motacilla Oenanthe.

Linné, Abhandl. II. p. 305. n. 136. *das Weiß-kehlchen.*

Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 294. *fahle Gras-mücke.*

Pennant, britt. Thiergesch. p. 115. tab. 54. Fig. 5. 6.

Naturforsch. XVII. p. 103. n. 211. *der Weiß-schwanz.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 183. n. 58. *Stein-schmatzer.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 190. n. 230. *der Steinschmatzer.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 248. *der gelb-brüstige Fliegenschnäpper.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 378. *der größere Stein-schmätzer.*

Tänzer, notab. Venat. p. 100. n. 127. *Stein-Klatsche.*

Martini,

Martini, Naturlex. V. p. 185. *Steinschmacker.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 65. *Steinklatsche.*
Naturgesch. m. merian. Kupf. p. 756. *Weißschwanz.*
Landlust. p. 302. *Steinbeißer.*
Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 227. Mot. Oenanthe.
Neueste Mannigfalt. IV. p. 410. *Weißschwanz.*
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. Oenanthe.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. 4. Oenanthe.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 186. n. 17. Motacilla (Oenanthe) dorso cano, fronte alba, oculorum fascia nigra.
Kramer, Austr. p. 374. n. 4. Motacilla dorso cano, fronte, uropygio et linea supra oculos albis. *Steinschwatzer; Steinschnapperl.*
Charleton, onom. zoic. p. 91. n. 13. Oenanthe, Vitiflora s. Vitifera.
Belon, nat. des ois. p. 352. Cul-blanc ou Vitrec.
Hist. provenc. I. p. 498.
Voy. en Barbar. I. p. 273.
Zinnan, Uov. p. 41. tab. 6. Fig. 24. Culo-bianco.
Bomare, diction. III. p. 507. — Diction. des anim. I. p. 806.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 29. Oenanthe?
Aelian. de nat. animal. L. 12. c. 9. Κιγκλος?
Aristot. hist. anim. L. 9. c. 49. Οιναν϶η?
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 283. n. 15. *der Weißschwanz.*

β. *Der graue Weißschwanz.* (8)
Brisson, ornith. I. p. 434. n. 34. Cul-blanc gris.
Büffon, Vögel, XVI. p. 15. *der graue Weißschwanz.*
Onomat. hist. nat. VII. p. 754. *die graue Bachstelze.*

Latham,

(8) Nach *Brisson* eine eign: Gattung.

Latham, Syn. II. 2. p. 467. n. 75. Var. A. Grey Wheat-ear.

Latham, Syst. ornith. II. p. 530. n. 79. β. Sylvia corpore supra fulvo albidoque vario, collo infimo griseo maculato, rectricibus duabus intermediis toto nigris.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 186. n. 17. β. Motacilla subtus pallida, rectricibus introrsum albis, dorso undulato.

γ. *Der aschgraue Weißschwanz.* (9)

Brisson, ornith. I. p. 435. n. 35. Cul-blanc cendré.

Büffon, Vögel, XVI. p. 16. *der aschgraue Weißschwanz.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 753. *die aschgraue Bachstelze.*

Latham, Syn. II. 2. p. 468.

Latham, Syst. ornith. II. p. 530. n. 79. γ. Sylvia supra cinerea, griseo-fusco varia.

Martini, Naturlex. V. p. 14. *aschgraue Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. III. p. 773. *aschgraue Bachstelze.*

δ. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 530. n. 79. δ. Sylvia supra alba, gula alis rectricibus intermediis fere totis, aliarumque maculis binis atris.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 191. ad n. 230. *der oben weiße Steinschmatzer.*

16. Rubetra. *Das Braunkehlchen.*

Müller, Natursyst. II. p. 609. n. 16. *das Braunkehlchen.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 192. n. 12. *das Braunkehlgen; Todtenvogel; Pfäfgen.*

Bech-

(9) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 541. n. 18. *das Kohlvögelchen.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 605. *das Krautvögelchen.*

Halle, Vögel, p. 338. n. 313. *das schwarzbraune Braunkehlchen, Todtenvogel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 394. R. *das Braunkehlchen.*

Onomat. hist. nat. V. p. 272. *das schwarzbraune Braunkehlchen.*

Klein, av. p. 78. n. 11. Sylvia Petrarum.

Klein, Vorbereit. p. 147. n. 11. *Steinfletsche; Steinpatsche.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 79. n. 14. *Steinfletsche.*

Gesner, Vögelb. p. 504. *Todtenvögelein;* mit e. Fig.

Brisson, ornithol. I. p. 430. n. 26. grand Traquet ou Tarier.

Büffon, Vögel, XV. p. 452. *der kleine Steinschmätzer oder Braunkehlchen;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 362. *das Braunkehlchen.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 525. n. 58. Sylvia (Rubetra) nigricans, superciliis albis, macula alarum alba, gula pectoreque flavescente.

Beseke, Vögel Kurl. p. 81. n. 183. *das Braunkehlchen.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 134. *der Steinschmatzer; Steenbicker.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 439. *das Braunkehlchen.*

Fischer, Livl. p. 101. n. 164. *Braunkehlchen; Fliegenschnäpper.*

Fischer, Zus. zur N. G. von Livl. p. 50. n. 501. *Braunkehlchen.*

White,

White, N. G. von Engl. p. 61. n. 8. Motacilla Rubetra.

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 10. Motacilla Rubetra.

Pallas, nord. Beytr. IV. p 22. *der Steinschmazzer.*

Pennant, britt. Thiergeschichte, p. 116. tab. 55. fig. 3. 4.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 195. n. 237. *der bräunlichte Fliegenvogel.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 183. n. 59. *Gelbbrüstchen; Gelbkehlchen; Steinfletsche.*

Naturforsch. XVII. p. 103. n. 212. *das Braunkehlchen.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 380. *der kleine Stein-Schmätzer.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 245. *das Braunkehlchen.*

Martini, Naturlex. V. p. 36. *Braunkehlchen; Fliegenstecher, Nosselfink; Nesselfink; schwarzbraune Braunkehlchen.*

Neueste Mannigfalt. III. p. 804. *Braunkehlchen.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 5. Rubetra.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 186. n. 18. Motacilla (Rubetra) nigricans superciliis albis, macula alarum alba, gula pectoreque flavescente.

Kramer, Austr. p. 375. n. 5. Motacilla capite et dorso griseo nigroque variis; pectore testaceo, uropygio rufescente. *Gestettenschlager.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 307. Muscipeta III. *Nosselfinke; Todten Vogel.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 397. Muscipeta IV. Jonstoni.

Jonston, av. pag. 121. Muscicapa quarta. *Todtenvogel.*

Belon, hist. nat. des oiss. p. 361. Tarier.

Onomat. forestal. III. p. 490.

Bomare, diction. XI. p. 134. — Diction. des anim. IV. p. 272. 416.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 383. n. 16. *das Braunkehlchen.*

98. FERVIDA. *Das Senegalische Weißkehlchen.*

Büffon, Vögel, XV. p. 260. *das Senegalische Weißkehlchen*, *der Steinschmätzer.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 525. n. 59. Sylvia (Fervida) fusca rufo-marginata, subtus flavescente-alba, pectore rufescente, maculis alarum duabus albis.

99. MONTANELLA. *Die Sibirische Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 526. n. 60. Sylvia (Montanella) testacea, fusco-maculata, subtus superciliisque flavescentibus, macula aurium nigra.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 5. n. 12. Motacilla montanella.

100. MAGNA. *Das große Weißkehlchen.*

Büffon, Vögel, XV. p. 270. *das große Weißkehlchen.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 525. n. 57. Sylvia (Magna) fusca, subtus rufescens, gula albescente, remigibus rectricibusque rufo fuscoque dimidiatis, exterioribus duabus extus albis.

Martini, Naturlex. V. p. 201. *großes Weißkehlchen.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 246. *das große Braunkehlchen.*

101. Philippensis. *Der große philippinische Steinschmätzer.* (10)

Brisson, ornith. I. p. 433. n. 32. grand Traquet des Philippines.

Büffon, Vögel, XV. p. 266. *der große philippinische Steinschmätzer.*

Latham, Syn. II. 2. p. 453. n. 52. Philippine Warbler.

Latham, Syst. ornith. II. p. 525. n. 56. Sylvia (Philippensis) nigro-violacea, subtus capiteque rufo-albo, pectore caerulescente, rectrice extima extus rufescente alba.

Martini, Naturlex. V. p. 154 *philippinische große Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 256. *große pensylvanische Bachstelze.*

102. Coromandelica. *Die coromandelische Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 524. n. 55. Sylvia (Coromandelica) nigra flavescente-maculata, subtus nigro fasciata, uropygio et abdomine rufescentibus, remigibus caudaque nigris.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 161. *der kleine indianische schwarzrückige Fliegenfänger.*

103. Perspicillata. *Die Brillenmotacille.*

Büffon, Vögel, XV. p. 274. *der Clignot, oder der Blinzer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 524. n. 54. Sylvia (Perspicillata) nigra, macula alarum alba, orbitis nudis caranculatis flavis.

Martini, Naturlex. V. p. 31. *der Blinzer.*

(10) Vielleicht eine Spielart von Motacilla fulicata. p. 996, n. 39.

17. RUBICOLA. *Das Weißkehlchen.*

Müller, Natursyst. II. p. 610. n. 17. *das Weißkehlchen;* tab. 26. Fig. 1.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 542. n. 19. *der Steinpicker; Weißkehlchen; Christöffelchen.*

Halle, Vögel, p. 343. n. 323. *der schwarze Fliegenstecher, mit weißem Halsringe?*

Onomat. hist. nat. VI. p. 845. *das Weißkehlchen; der Fliegenstecher.*

Klein, av. p. 78. n. 8. Sylvia lutea, capite nigro,
Klein, Vorbereit. p. 146. n. 8. *gelber Sticherling,*
Klein, verb. Vögelh. p. 79. n. 11. *Gelbschwarzkehlein,*
mit *M. Rubetra* und *Flava* verwechselt.

Klein, Vögeleyer, p. 25. tab. 10. fig. 14.

Brisson, ornith. I. p. 429. n. 25. Traquet.

Büffon, Vögel, XV. p. 259. *das Weißkehlchen.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 523. n. 49. Sylvia (Rubicola) grisea, subtus rufescens, iugulo fascia alba, loris nigris, uropygio maculaque alarum albis.

Fischer, Zus. zur N. G. von Livl. p. 50. n. 502. *Weißkehlchen.*

White, N. G. von Engl. p. 61. n. 9. *Steinschmatzer.*

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 244. *das Weißkehlchen.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 184. *der Schollenhüpfer.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 194. n. 236. *der schwarze und weiße Fliegenschnäpper.*

Martini, Naturl. V. p. 198. *Weißkehlchen.*

Pennant, britt. Thiergeschichte. p. 118. tab. 55. Fig. 5. 6.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 450. *Weißkehlchen.*

Charleton, onom. zoic. p. 91. n. 7. Rubetra.

Charleton, exercit. p. 79. n. 7. Rubetra.

Kramer,

Kramer, Austr. p. 375. n. 6. Motacilla nigricans, macula alarum magna, superciliis albis, pectore et gula ochreis. *Christöffl.*

(Mit *Mot. Rubetra* verwechselt.)

Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. Oenanthe tertia.

Jonston, av. p. 121. Muscicapa.

Belon, nat. des ois. p. 360. Traquet; Groulard, Tharier, Thyon.

Hist. Prov. I. p. 508.

Zinnan, Uov. p. 52. tab. 7. fig. 40. Occhio di Bue.

Donndorff, Handb. d. Thiergeschich. p. 384. n. 17. *das Weißkehlchen.*

β. *Lepechin*, Tageb. d. russ. Reis. II. p. 186. Motacilla superne nigricans, torque albo interrupto, interne ferruginea, capite atro, nucha albicante, macula alarum oblonga candida, dorso nigro, marginibus pennarum rufescentibus. *Tschekantschik.* tab. 7. das Männch.

18. ATRICAPILLA. *Der Klosterwenzel.* (1)

Müller, Natursyst. II. p. 610. n. 18. *der Klosterwenzel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 193. n. 13. *der Klosterwenzel; Mönch.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 192. n. 6. Motacilla (Atricapilla) testacea, subtus cinerea, pileo obscuro; *der Klosterwenzel; Mönch.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 534. n. 3. *der Mönch; schwarzköpfige Grasmücke.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 606. *der Mönch mit der schwarzen Platte.* p. 607. *der Mönch mit der röthlichen Platte.*

Halle, Vögel, p. 340. n. 315. *der Mönch mit schwarzer Platte.*

(1) Ist nicht mit *Muscicapa Atricapilla* zu verwechseln.

Halle, Vögel, p. 341. n. 317. *der Mönch mit rothbrauner Platte?*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 427. n. 366. *der Mönch; Schwarzkopf; Grasspatz; Schwarzkäppchen*, etc.

Pennant, arct. Zool. II. p. 390. F. *die Schwarzkappe.*

Onomat. hist. nat. II. p. 43. *die schwarzköpfige Bachstelze.*

Klein, av. p. 79. n. 14. Sylvia atricapilla.

Klein, Vorbereit. p. 148. n. 14. *Mönch, Schwarzkopf; Grasspatz; Mönch mit schwarzer Platte.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 80. n. 18. *Klosterwenzel; Schwarzkopf*, etc.

Klein, av. p. 79. n. 15. Sylvia vertice subrubro. (das Weibch.)

Klein, Vorbereit. p. 148. n. 15. *Mönch mit röthlicher Platte. Cardinälchen.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 80. n. 19. *Mönch mit röthlicher Platte. Cardinal.*

Klein, Vögeleyer, p. 26. tab. 10. Fig. 17.

Gesner, Vögelb. p. 140. *Schwarzkopf; Münchlein.*

Brisson, ornithol. I. p. 416. n. 6. Fauvette à tête noire.

Büffon, Vögel, XV. p. 75. *die schwarzplattige Grasmücke;* m. 2. Fig. M. u. W.

Batsch, Thiere, I. p. 362. *der Mönch.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 508. n. 6. Sylvia (Atricapilla) testacea, subtus cinerea, pileo obscuro.

Beseke, Vögel Kurl. p. 81. n. 184. *der Klosterwenzel.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 135. n. 7. *der Mönch.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 439. *der Schwarzkopf; Mauskopf.*

Cetti, Sardin. II. p. 213. *der Schwarzkopf.*

White,

White, N. G. von Engl. p. 12. p. 34. n. 8. p. 58. n. 6. p. 63. n. 9. *der Klosterwenzel.*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 1. *Havſkade.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 190. n. 229. *der Mönch mit der ſchwarzen Platte.*

Martini, Naturl. V. p. 112. *Kloſterwenzel; Afternachtigall; Grasmückchen, Grasſpatz; Kardinälchen; Mönchlein*, etc.

Pennant, britt. Thiergeſch. p. 112. tab. 53. Fig. 5.

Tengmalm: neue Schwed. Abhandl. IV. p. 52. Motacilla Atricapilla.

Naturforſch. XVII. p. 103. n. 213. *der Kloſterwenzel.*

Borkhauſen, Magaz. I. p. 189. n. 68. *Kloſterwenzel.*

Friſch, Vögel, tab. 23. Fig. 1. et 2. *Mönch mit ſchwarzer* (M.) — *und mit röthlicher Platte.* (W.)

Zorn, Petinotheol. II. p. 372. *der Mönch, mit dem ſchwarzen Ober-Kopf, oder Platte.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 373. *der Mönch mit der röthlich-oder braunen Platte.*

Samml. zur Phyſ. u. N. G. III. p. 231. *der Mönch mit der ſchwarzen Platte.*

Neueſte Mannigfalt. IV. p. 142. *Kloſterwenzel.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 16. Atricapilla.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 187. n. 19. Motacilla (Atricapilla) teſtacea, ſubtus cinerea, pileo obſcuro.

Kramer, Auſtr. p. 377. n. 15. Motacilla teſtacea ſubtus ſubcinerea pileo obſcuro. *Schwarzplattl.*

Schwenkfeld, av. Sileſ. p. 227. Atricapilla. *Münchlin; Schwarzkopf; Graſeſpatz.*

Rzaczynsky, auct. hiſt. nat. Polon. p. 366. Atricapilla.

Jonston, av. p. 125. Atricapilla. p. 126. Atricapilla alia castaneo vertice.
Zinnan, Uov. p. 56. tab. 8. Fig. 45. *Capinero.*
Belon, obs. p. 19. Atricapilla.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 384. n. 18. *der Klosterwenzel.*

β. *Brisson*, ornith. I. p. 417. n. 6. A. Fauvette noire et blanche.
Latham, Syst. ornith. II. p. 509. n. 6. β.
Zinnan, Uov. p. 44. tab. 12. Fig. 29. 1.

γ. *Büffon*, Vögel, XV. p. 89. *die kleine Colombade.*
Latham, Syn. II. 2. p. 416.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 509. n. 6. γ. Sylvia supra nigricans, lateribus griseis, gula alba.

δ. *Büffon*, Vögel, XV. p. 152. *die grünliche louisianische Grasmücke.*
Latham, Syn. II. 2. p. 417.
Latham, Syst. ornith. II. p. 509. n. 6. δ. Sylvia fusco virescens, pileo nigricante, cervice cinereo, superciliis albis, alis caudaque nigricantibus.

104. MELANOCEPHALA. *Die schwarzköpfige Motacille.*

Cetti, Sardin. l. c. *noch eine kleinere Art Schwarzkopf.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 509. n. 7. Sylvia (Melanocephala) ex virescente cinerea, subtus grisea, vertice nigro, oculorum fascia rubra.

105. MOSCHITA. *Die Moschita.*

Cetti, Sardin. l. c. *Moschita oder Noschita.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 509. n. 8. Sylvia (Moschita) plumbea, pileo rufescente.

19. PEN-

19. PENSYLVANICA, *Das Blutrothkehlchen.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 610. n. 19. *die penſylvaniſche Bachſtelze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 377. n. 215. *das Blutrothkehlchen.* (Ed. angl. II. N. 298. Bloody ſide Warbler.)

Onomat. hiſt. nat. III. p. 905. *die Bachſtelze aus Penſylvanien mit einem gelben Kopf.*

Onomat. hiſt. nat. V. p. 268. *die Penſylvaniſche Bachſtelze.*

Briſſon, ornithol. I. p. 458. n. 78. Figuier à tête jaune de Penſilvanie.

Büffon, Vögel, XVI. p. 140. *der rothbrüſtige Feigeneſſer*; m. e. Fig.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 540. n. 120. Sylvia (Penſylvanica) pileo flaveſcente, hypochondriis ſanguineis.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 91. *Fliegenſchnäpper mit rother Bruſt.*

Martini, Naturlex. V. p. 84. *die gelbköpfige Bachſtelze aus Penſylvanien.*

Neueſte Mannigfaltigk. IV. p. 663. *gelbköpfige Bachſtelze.*

Naturgeſch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 792. *der Feigenvogel mit der rothen Bruſt.*

106. RUFICAPILLA. *Die martinikiſche Motacille.*

Onomat. hiſtor. natur. III. p. 902. *die Bachſtelze von der Inſel Martinique.*

Briſſon, ornithol. I. p. 444. n. 50. Figuier de la Martinique.

Büffon, Vögel, XVI. p. 137. *der Martinikiſche Feigenfreſſer.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 540. n. 119. Sylvia (Ruficapilla) viridi-olivacea, ſubtus flava, collo ſubtus pectoreque ſtrigis fuſcis, vertice rufo,

 rectrici-

rectricibus duabus exterioribus intus lutescentibus.

Martini, Naturlex. V. p. 123. *die Martinikische Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 199. *die Martinikische Bachstelze.*

Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 791. *der rothköpfige Feigenvogel.*

Feuillée obs. p. 113. Chloris Eritachoïdes?

20. CHRYSOPTERA. *Die goldflüglige Motacille.*

Müller, Natursystem, II. p. 611. n. 20. *der Gelbflügel.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 905. *die Bachstelze aus Pensylvanien mit einer schwarzen Kehle.*

Onomat. hist. nat. V. p. 263. *die Pensylvanische Bachstelze mit gelben Flügeln.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 376. n. 212. *der Goldflügel.*

Brisson, ornithol. I. p. 458. n. 77. Figuier à gorge noire de Pensylvanie.

Büffon, Vögel. XVI. p. 145. *der goldflügelichte Feigenfresser;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 541. n. 123. Sylvia (Chrysoptera) fusca, subtus alba, pileo maculaque alarum luteis, gula fasciaque per oculos nigris.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 89. *der Fliegenschnäpper mit goldnen Flügeln.*

Martini, Naturlex. V. p. 79. *Gelbflügel.*

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 61. *Gelbflügel.*

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. p. 794. *der Feigenvogel mit goldnen Flügeln.*

107. CHRYSOCEPHALA. *Die Motacille mit orangefarbigem Kopf.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 150. *der pomeranzenfarbige Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 541. n. 124. Sylvia (Chrysocephala) rufo-fusca subtus alba, capite anterius colloque subtus fulvis, tectricibus alarum albo nigroque variegatis, cauda nigra.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. p. 795. *der orangefarbige Feigenvogel.*

108. CRISTATA. *Die gezopfte Motacille.*

Müller, Natursyst. Supplem. p. 176. n. 57. *der Hayduck.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 151. *der gezopfte Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 541. n. 125. Sylvia (Cristata) virescens, supra fusca, subtus grisea, capite crista plicatili fusca albo-marginata.

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 55. *die gehäubte Bachstelze.*

109. MULTICOLOR. *Die schwarz und gelbe Motacille.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 152. *der schwarze Feigenfresser;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 541. n. 126. Sylvia (Multicolor) nigra, subtus alba, colli pectorisque lateribus cauda a basi ad medium fasciaque alarum rufis.

110. AEQUINOCTIALIS. *Die olivenfarbige Cayennische Motacille.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 143. *der olivenfarbige Feigenfresser;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 542. n. 127. Sylvia (Aequinoctialis) fusco-viridis, subtus flavescente-alba,

te-alba, gutture pectoreque pallide flavis, remigibus rectricibusque fuscis.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 796. *der olivenfarbene Feigenvogel.*

111. Protonotarius. *Der Protonotar.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 382. n. 227. *der Protonotar.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 154. *der Protonotaire.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 542. n. 128. Sylvia (Protonotarius) flava, dorso olivaceo, uropygio cinereo, remigibus rectricibusque cinereo et nigricante variis.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. p. 796. *der Protonotair.*

112. Semitorquata. *Die Motacille mit halbem Halsbande.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 382. n. 228. *der Sänger mit dem halben Halsbande.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 156. *der Feigenfresser mit halben Halsbande.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 542. n. 129. Sylvia (Semitorquata) fusca, subtus flavo-cinerascens, cervice infima lunula flava, rectricibus quatuor extimis intus albis.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. p. 797. *Feigenvogel mit der halben Halsbinde.*

113. Fulva. *Die orangegelbbäuchige Motacille.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 383. n. 229. *der Sänger mit orangengelbem Bauche.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 158. *der gelbkehlige Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 542. n. 130. Sylvia (Fulva) fulvo-olivacea, subtus rufa, collo inferiore, crissoque flavis.

Naturge-

Naturgesch. m. Merian. Kupf. p. 797. *der Feigenvogel mit gelber Kehle.*

114. FUSCA. *Die olivenbraune louisianische Motacille.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 175. n. 55. *der Flügelfleck.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 383. n. 230. *der olivenbraune Sänger.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 159. *der olivenbraune Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 543. n. 131. Sylvia (Fusca) fusco-olivacea, subtus albo-flavescens, collo subtus griseo alboque nebuloso, rectricibus duabus extimis intus ad apicem albo-maculatis.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. p. 797. *der olivenbraune Feigenvogel.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 53. *der Flügelfleck.*

115. PINGUIS. *Der Fettling.* (²)

Pennant, arct. Zool. II. p. 383. n. 231. *der Mönch.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 161. *der fette Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 543. n. 132. Sylvia (Pinguis) griseo-olivacea, subtus albida, macula verticis uropygioque flavis, rectricibus quatuor extimis intus albo maculatis.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. p. 798. *der Fettling.*

116. CANA. *Das Graukehlchen.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 283. n. 232. *das Graukehlchen.*

Büffon,

(2) Die Benennung *Fettling*, (Grassets) wird in Louisiana aufser dieser, auch den drey vorhergehenden, und der nächstfolgenden Gattung, wegen ihrer ausnehmenden Fettigkeit gegeben. Sie halten sich häufig auf den Tulpenbäumen auf, besonders aber lieben sie die grosse Magnolie (*Magnolia grandiflora* Linn.)

Büffon, Vögel, XVI. p. 162. *der aschgraue Feigenfresser mit aschgrauer Kehle.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 543. n. 133. Sylvia (Cana) cinerea, subtus grisea, cauda nigra, rectricibus 1, 1, toto, 2, 2, 3, 3, apice albis.

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. p. 798. *der aschfarbene Feigenvogel mit der aschfarbenen Kehle.*

21. Coronata. *Die gekrönte Motacille.*

Müller, Natursyst. II. p. 611. n. 21. *die gekrönte Bachstelze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 375. n. 211. *die Goldkrone.*

Onomat. hist. nat. III. p. 904. *die aschgraue gefleckte Bachstelze aus Pensylvanien.*

Onomat. hist. nat. V. p. 263. *die pensylvanische Bachstelze mit gelbem Kopfe.*

Brisson, ornith. I. p. 460. n. 81. Figuier cendré tacheté de Pensylvanie.

Büffon, Vögel, XVI. p. 174. *der gekrönte Feigenfresser;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 538. n. 115. Sylvia (Coronata) nigro-maculata, pileo hypochondriis uropygioque flavis, fascia per oculos gulaque nigra.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 88. *zwey Fliegenschnäpper mit goldenen Kronen, ein Er und eine Sie.*

Martini, Naturlex. V. p. 67. *die gekrönte Bachstelze.*

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 55. *gekrönte oder pensylvanische Bachstelze mit gelbem Kopfe.*

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. p. 794. *der Feigenvogel mit der goldenen Krone.*

22. Sene-

116. SENEGALENSIS. *Die braune Senegalische Motacille.*

Müller, Natursyst. II. p. 611. n. 22. *die Senegalische Bachstelze.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 849. *die Bachstelze von Senegal.*

Brisson, ornith. I. p. 432. n. 29. Traquet du Sénégal.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 526. n. 61. Sylvia (Senegalensis) fusca, remigibus intus rufis, rectricibus nigris, apice albis.

117. LEUCOMELA. *Die schwarz und weiße Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 469. n. 7. Muscicapa (Leucomela) nigra, pileo nucha uropygio abdomine rectricibusque maxima parte albis.

118. ERYTHROGASTRA. *Die rothbäuchige Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 513. n. 18. Sylvia (Erythrogastra) nigra, subtus abdomine uropygio caudaque castanea, pileo cinerascente, macula remigum alba, armillis nigris.

119. MAURA. *Das Mohrenköpfchen.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 174. n. 52. *das Mohrenköpfchen.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 526. n. 62. Sylvia (Maura) nigra griseo marginata, subtus alba, gula ferruginea, macula alarum uropygio basique caudae albis.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 9. n. 17. Motacilla *maura.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 202. *Mohrenköpfchen.*

β. Latham,

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 526. n. 62. β. Sylvia ruso-fusca, subtus albida, superciliis rufis, gula abdomine uropygio basique caudae albis.

120. SUPERCILIOSA. *Die Motacille mit gelben Augenbraunen.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 526. n. 63. Sylvia (Superciliosa) virescens subtus pallida, superciliis flavis, lineola verticis pallida.

121. FERRUGINEA. *Die braunrothkehlige Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 526. n. 64. Sylvia (Ferruginea) cinerea, subtus albida, gula colloque ferrugineis.

122. CYANURA. *Die blauschwänzige Motacille.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 155 n. 53. *der Blauschwanz.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 527. n. 65. Sylvia (Cyanura) cinereo-flavescens, subtus superciliisque flavo-albis, alis caudaque fuscis, uropygio rectricumque marginibus caeruleis.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 10. n. 18. Motacilla *cyanurus.*

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 801. *Blauschwanz.*

123. AURORBA. *Die daurische Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 125. n. 66. Sylvia (Aurorea) nigra, vertice griseo albo, fronte maculaque alarum albis, corpore subtus rectricibusque lateralibus fulvis, 2. intermediis nigris.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 6. n. 13. Motacilla *aurorea.*

124. STRIATA. *Der Seegler.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 373. n. 207. *der Schwarzkopf*, p. 374. (in Neuyork *der Seegler.*)

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 527. n. 67. Sylvia (Striata) nigro striata, supra cinerea, subtus alba, fascia alarum duplici alba, rectricibus duabus extimis apice macula alba.

125. INCANA. *Der Graukopf.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 374. n. 208. *der Graukopf.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 527. n. 68. Sylvia (Incana) laete grisea, subtus fasciaque alarum duplici alba, iugulo aurantio, gula pectoreque flavis.

126. FLAVIFRONS. *Die gelbstirnige Motacille.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 376. n. 213. *der Sänger mit der gelben Stirn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 527. n. 69. Sylvia (Flavifrons) griseo-caerulescens, subtus alba, pileo maculaque alarum flavis, iugulo fasciaque oculorum nigris, rectricibus extimis albo maculatis.

127. BLACKBURNIAE. *Die blackburnische Motacille.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 384. n. 234. *der Blackburnische Sänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 527. n. 17. Sylvia (Blackburniae) pileo atro, linea verticali et subocculari, loris pectoreque medio flavis, fascia alarum crisso rectricibusque extimis tribus albis, per oculos vitta magna.

128. MITRATA. *Die schwarzkappige Motacille.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 372. n. 204. *der Sänger mit der Kappe.*

Klein, av. p. 85. n. 5. Parus cucullo nigro.

Klein, Vorbereit. p. 159. n. 5. *schwarzgekappte Meise.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 38. n. 5. *schwarzgekappte Meise.*

Brisson, ornithol. I. p. 471. n. 16. Mesange à collier de la Caroline.

Büffon, Vögel, XVII. p. 146. *die Meise mit dem Halsbande*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 528. n. 71. Sylvia (Mitrata) olivacea, subtus capite antice gulaque luteis, torque nigro.

Seligmann, Vögel, III. tab. 20. *schwarzgekappte Meise.*

Naturgesch. a. d. best. Schr. Vögel, p. 848.

β. *Büffon*, Vögel, XIV. p. 56. *der citrongelbe Fliegenschnäpper*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 528. n. 71. β. Sylvia griseo-virescens, subtus flava, capite colloque inferiore nigro-sericeis, fronte lateribus capitis corporeque subtus flavis.

129. CALLIOPE. *Die rubinkehlige Motacille.* (3)

Latham, Syn. Suppl. p. 140. tab. in tit.

Pallas, Reis. Ausz. III. p. 211. *die sangreiche Motacilla Calliope.*

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 7. n. 17. Motacilla *Calliope.*

130. LITTOREA. *Die Strandmotacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 163. Sylvia (Littorea) supra obscure viridis, subtus ochroleuca, remigibus rectricibusque nigricantibus.

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 413. *die Strandbachstelze.*

131. LON-

(3) Ist nach *Latham* mit Turdus Camtschatkensis p. 817. n. 58. einerley.

131. LONGIROSTRIS. *Die langschnäblige Motacille.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 34. — p. 35. *Rapischkin* pers.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 165. Sylvia (Longirostris) cinerea subtus atra, rostro longo.

Martini, Naturlex. V. p. 119. *die langschnäblige Bachstelze*, *oder der persische Langschnabel.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 196. *langschnäblichte Bachstelze.*

132. OCHRURA. *Die gelbschwänzige persische Motacille.* (4)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 668. not. 2. et 3.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 165. Sylvia (Ochrura) capite cinereo, cervice et dorso antice atro, iugulo et pectore splendide nigris, abdomine flavo.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 129. *persischer Gelbschwanz.*

133. OBSCURA. *Die graubraune Motacille.*

S. unten die Anmerk. n. 4.

134. SUNAMISICA. *Die sunamische Motacille.* (5)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 608. not. 4.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 166. Sylvia (Sunamisica) ex cinereo rufescens, mente gulaque nigris, pectore et abdomine rufescentibus, pennarum apice albo, crisso niveo, rectricibus intermediis fuscis, lateralibus fulvis.

(4) *Latham* verwechselt Character und Synonymen bey dieser und der folgenden Gattung. Die *Mot. obscura* fehlt in seinem *Index ornithol.* ganz; und die Synonymen aus *Gmelin* und *Pallas* hat er zur *Mot. Ochrura* gezogen. *Bechstein* hält die *Mot. Ochrura* für eine alte *Motacilla atrata* s. *Erithacus.*

(5) Nach *Bechstein* eine junge *Motacilla Phoenicurus.*

135. MURINA. *Die mausefahle Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 528. n. 73. Sylvia (Murina) murina, subtus fasciaque per oculos alba, capite collo abdomineque medio nigris.

136. SPINICAUDA. *Die stachelschwänzige Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 528. n. 74. Motacilla (Spinicauda) fusca, subtus humerisque alba, pileo flavo nebuloso, cauda cuneiformi, rectricibus apice nudis subulatis.

137. MAGELLANICA. *Die magellanische Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 528. n. 75. Sylvia (Magellanica) fusco flavescens, nigro undulata, subtus cinereo-flava, nigricante transversim striata, cauda breviore nigra lineis transversis.

138. CITRINA. *Die citrongelbe Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 529. n. 76. Sylvia (Citrina) flava, striis nigricantibus, subtus uropygioque flavo, genis collo inferiore pectoreque albis, cauda breviore nigra apice flavescente.

139. LONGIPES. *Die langfüßige Motacille.*

Latham, Syn. Suppl. p. 181. Long-legged Warbler.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 529. n. 77. Sylvia (Longipes) pallide viridis, subtus cinerascens, fronte genis colloque lateribus cinereis, supra oculos lunula alba, cauda brevissima.

23. VARIA. *Die bunte Motacille.*

Müller, Natursystem, II. p. 612. n. 23. *die bunte Bachstelze.*

Pennant,

Pennant, arct. Zool. II. p. 375. n. 210. *der Weiß-kopf.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 896. *schwarz und weiß-bunte Grasmücke; schwarze Grasmücke mit weißgestreiftem Rücken.*

Klein, av. p. 75. n. 11. Luscinia, quae Muscicapa ex fusco et albo varia, *Sloan.*

Klein, Vorbereit. p. 141. n. 11. *schwarz und weiß-bunte Grasmücke.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 76. n. 11. *schwarz und weiße Grasmücke.*

Brisson, ornith. I. p. 454. n. 69. Figuier varié de S. Domingue.

Büffon, Vögel, XVI. p. 133. *der bunte Feigen-fresser;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 539. n. 118. Sylvia (Varia) albo nigroque maculata, fasciis alarum duabus albis, cauda bifida.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 90. *der schwarz und weiße Baumhacker.*

Martini, Naturlex. V. p. 40. *die bunte Bachstelze von Domingo.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 807. *bunte Bachstelze von St. Domingo.*

Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 791. *der gescheckte Feigenvogel.*

24. Capensis. *Die capsche Bachstelze.*

Müller, Natursyst. II. p. 612. n. 24. *die capsche Bachstelze.*

Onomat. hist. nat. V. p. 263. *die Bachstelze vom Vorgeb. d. g. H.*

Brisson, ornithol. I. p. 440. n. 43. Bergeronette du Cap de b. E.

Büffon, Vögel, XVI. p. 70. *der Kapsche Sticher-ling;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 505. n. 10. Motacilla (Capensis) fusca subtus albida, fascia pectorali fusca, superciliis albis, cauda nigra, rectricibus lateralibus oblique albis.

Martini, Naturlex. V. p. 110. *Bachstelze vom Kap.*

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 141. *kapische Bachstelze.*

Naturgeschichte aus den besten Schriftst. Vögel, p. 770.

25. Icterocephala. *Die gelbgescheitelte Motacille.*

Müller, Natursyst. II. p. 612. *Gelbkopf.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 380. n. 222. *der Sänger von Quebec.*

Onomat. hist. nat. III. p. 896. *die Bachstelze mit einem gelben Kopf von Canada.*

Brisson, ornithol. I. p. 451. n. 64. Figuier à tête jaune de Canada.

Büffon, Vögel, XVI. *der gelbköpfige Feigenfresser;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 538. n. 113. Sylvia (Icterocephala) grisea, subtus albida, pileo luteo, fascia oculari nigra, duabusque alaribus flavis.

Martini, Naturlex. V. p. 83. *die gelbköpfige Bachstelze aus Kanada.*

Naturgeschr. aus den best. Schriftst. Vög. p. 787. *der Feigenvogel mit gelbem Kopf.*

26. Dominica. *Die domingische Motacille.*

Müller, Natursyst. II. p. 612. n. 26 *die domingische Bachstelze.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 894. *die Harlekinsgrasmücke; die gelb, braun und blaue Grasmücke.*

Halle,

Halle, Vögel, p. 326. n. 296. *Harlekinsgrasmükke.*

Klein, av. p. 75. n. 16. Luscinia diversicolor.

Klein, Vorbereit. p. 142. n. 16. *gelb- braun- und blaue Grasmücke.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 76. n. 16. *gelbraune und blaue Grasmücke.*

Brisson, ornith. I. p. 462. n. 65. Figuier cendré de S. Domingue.

Büffon, Vögel, XVI. p. 122. *der aschgraue Feigenfresser mit gelber Kehle;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 538. n. 114. Sylvia (Dominica) cinerea, subtus alba, macula ante oculos lutea, pone alba, infra nigra.

Martini, Naturlex. V. p. 44. *die Domingoische aschgraue Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. III. p. 809. *domingoische aschgraue Bachstelze.*

Naturgesch. aus den best. Schriftst. m. Merian. Kupf. Vög. p. 788. *der aschfarbene Feigenvogel mit gelber Kehle.*

27. Cincta. *Die Motacille mit dem Gürtel.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 613. n. 27. *die canadische Bachstelze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 381. n. 223. *der Sänger mit dem Gürtel.*

Onomat. histor. natur. III. p. 894. *die aschgraue Bachstelze von Canada.*

Brisson, ornithol. I. p. 453. n. 67. Figuier cendré de Canada.

Büffon, Vögel, XVI. p. 127. *der Canadische Feigenfresser;* m. e. Fig.

(6) Da in der XII. Edition die Trivialbenennung *M. Canadensis* Nro. 42. nochmals vorkommt, so ist zu Vermeidung einer Zweydeutigkeit *hier* dafür *Cincta* gesetzt worden.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 539. n. 116. Sylvia (Cincta) cinerascens, subtus alba, vertice fasciaque abdominali lutea, pectore fusco maculato.

Martini, Naturlex. V. p. 14. *die aschgraue kanadensische Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. III. p. 774. *aschgraue kanadensische Bachstelze.*

Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 789. *der Feigenvogel mit dem Gürtel.*

28. Madagascariensis. *Der Cherik.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 613. n. 28. *die madagascarische Bachstelze.*

Onomat. hist. nat. V. p. 267. Motacilla Maderaspatana.

Brisson, ornith. I. p. 446. n. 55. petit Figuier de Madagascar.

Büffon, Vögel, XVI. p. 80. *der Cherik; Tcherik;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 533. n. 94. Sylvia (Madagascariensis) virescens, subtus albida, gula anoque flavis, palpebris albis.

Martini, Naturlex. V. p. 121. *maderaspatanische Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 198. *grünliche madagascarische oder maderaspatanische Bachstelze.*

Naturgesch. aus den best. Schriftst. m. Merian. K. Vög. p. 776. *der Cherik.*

140. Borbonica. *Die bourbonische Motacille.*

Onomat. histor. natur III. p. 893. *die Bachstelze von der Insel Bourbon.*

Brisson,

(7) In der XII. Edition steht hier durch einen Schreib- oder Druckfehler *Maderaspatana*, welcher Fehler auch in die *Onomat. hist. nat.* übergetragen worden. Uebrigens ist die Trivialbenennung *Madagascariensis*, p. 952. n. 56. schon einmal vorgekommen.

Brisson, ornith. I. p. 419. n. 60. Figuier de l'Isle de Bourbon, ou petit Simon.

Büffon, Vögel, XVI. p. 82. *der kleine Simon;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 533. n. 95. Sylvia (Borbonica) griseo-fusca, subtus griseo-flavescens, remigibus rectricibusque griseo marginatis.

Martini, Naturlex. V. p. 41. *Bachstelze der Insel Bourbon.*

Neueste Mannigfalt. III. p. 808. *Bachstelze der Insel Bourbon.*

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 777. *der kleine Simon.*

141. Mauritana. *Die blaugraue Motacille.* (8)

Büffon, Vögel, XVI. p. 84. *der blaue Feigenfresser; Feigenfresser der Insel Frankreich;* mit e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 534. n. 96. Sylvia (Mauritana) griseo-caerulescens, subtus alba, remigibus rectricibusque nigris, margine albis.

142. Livida. *Die blaue madagascarische Motacille.* (9)

Büffon, Vögel, XVI. p. 84. *der blaue Feigenfresser; madagascarische Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 534. n. 97. Sylvia (Livida) griseo-caerulescens, crisso albido, remigibus caudaque nigris, rectricibus duabus exterioribus albis.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 777. *der blaue Feigenfresser.*

(8) Nach *Büffon* das Weibchen von der folgenden Gattung.

(9) Nach *Büffon* das Männchen der vorhergehenden Gattung.

143. FLAVESCENS. *Die gelbbäuchige senegalische Motacille.* (10)

Büffon, Vögel, XVI. p. 85. *der Senegalische Feigenfresser;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 534. n. 98. Sylvia (Flavescens) fusca, subtus citrina, genis albidis, remigibus rectricibusque fuscis.

β. *Büffon*, Vögel, XVI. p. 86. *der Feigenfresser* Nro. 3. (1)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 534. n. 99. Sylvia (Rufigastra) olivaceo-fusca, subtus rufo-flavescens, remigibus rectricibusque fuscis.

144. UNDATA. *Die gefleckte Motacille.* (2)

Büffon, Vögel, XVI. p. 86. *der gefleckte Feigenfresser;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 534. n. 100. Sylvia (Undata) nigra, marginibus pennarum uropygioque rufis, subtus alba, remigibus caudaque cuneata fuscis.

145. FUSCATA. *Die braunrückige Motacille.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 87. *der braune Senegalische Feigenfresser;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 535. n. 101. Sylvia (Fuscata) fusca, subtus grisea, lateribus rufescentibus, remigibus rectricibusque obscurioribus, cauda elongata.

146. SUB-

(10) Nach *Büffon* eine Abart von *Motacilla Undata.*

(1) Nach *Büffon* eine Abart des Geschlechts oder des Alters von *Motacilla Undata.* Nach *Latham* eine eigne Gattung.

(2) Ist nach *Büffon* das Männchen, wovon N. 143. α und β Abarten seyn sollen.

146. SUBFLAVA. *Die blonde Motacille.* (3)
Büffon, Vögel, XVI. p. 87. *der blonde senegalische Feigenfresser;* m. e. Fig.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 535. n. 102. Sylvia (Subflava) rufo-fusca, subtus grisea, uropygio pallido, lateribus corporis rufescentibus, cauda cuneiformi.

β. *Büffon*, Vögel, XVI. p. 87. *der graubäuchige Senegalische Feigenfresser;* m. e. Fig. (4)

29. AUROCAPILLA. *Die goldfarbig gescheitelte Motacille.*

Müller, Natursyst. II. p. 613. n. 29. *der Goldkopf.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 315. n. 119. *der Goldkopf.*
Onomat. histor. natur. V. p. 261. *die gelbköpfige Bachstelze aus Pensylvanien.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 166. n. 4. *goldgekrönte Drossel.*
Brisson, ornithol. I. p. 448. n. 57. Figuier à tête d'or de Pensilvanie.
Büffon, Vögel, VIII. p. 315. *die kleine domingosche Drossel;* m. e. Fig.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 328. n. 6. Turdus (Aurocapillus) olivaceus, subtus albus, vertice aureo, superciliis nigris, pectore nigro-maculato.
Seligmann, Vögel, VII. tab. 42. *die goldgekrönte Drossel.*
Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 64. *die gelb- oder goldköpfige Bachstelze.*

30. PE-

(3) Nach *Büffon* eine Abart von *Motacilla Fuscata.*

(4) Nach *Büffon* das Weibchen von *Motcilla Fuscata.* Was für eine grosse Unbestimmtheit herrscht noch unter allen diesen Gattungen!

30. PETECHIA. *Die rothköpfige Motacille.*

Müller, Naturfyst. II. p. 613. n. 30. *die gefleckte Bachstelze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 373. n. 206. *der Rothkopf.*

Onomat. hist. nat. III. p. 904. *die Bachstelze aus Pensylvanien mit einem rothen Kopf.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 167. n. 4. *gelber Rothkopf.*

Brisson, ornithol. I. p. 443. n. 49. Figuier à tête rouge de Pensilvanie.

Büffon, Vögel, XVI. p. 91. *der rothköpfigte Feigenfresser*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 535. n. 103. Sylvia (Petechia) olivacea, subtus flava, rubro guttata, pileo rubro.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 46. *der Rothkopf mit gelbem Leib.*

Martini, Naturlex. V. p. 65. *gefleckte Bachstelze.*

Naturgesch. aus den best. Schriftst. p. 780. *der Feigenvogel mit rothem Kopfe.*

147. ALBICOLLIS. *Die olivenfarbige weißkehlige Motacille.*

Brisson, ornithol. I. p. 445. n. 52. Figuier de S. Domingue.

Büffon, Vögel, XVI. p. 94. *der weißkehligte Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 535. n. 104. Sylvia (Albicollis) viridi-olivacea, subtus albo-flavicans strigis rufescentibus, rectricibus lateralibus intus dimidiato-sulphureis.

Martini, Naturlex. V. p. 46. *domingoische olivenfarbige und schwefelgelbe Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. III. p. 810. *domingoische olivenfarbige, und schwefelgelbe Bachstelze.*

Naturgesch. a. d. best. Schrift. p. 780. *der Feigenvogel mit der weißen Kehle.*

148. Ludoviciana. *Die louisianische Motacille.* (5)

Pennant, arct. Zool. II. p. 380. n. 220. *der louisianische Sänger.*

Onomat. hist. nat. III. p. 900. *die ludovicianische Bachstelze.*

Brisson, ornith. I. p. 446. n. 55. Figuier de la Louisiane.

Büffon, Vögel, XVI. p. 96. *der gelbkehlige Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 535. n. 105. Sylvia (Ludoviciana) viridi-olivacea, subtus alba luteo varia, collo subtus flavo, fascia alarum duplici alba, rectricibus duabus exterioribus apice intus albis.

Naturgesch. a. d. best. Schrift. p. 780. *der Feigenvogel mit gelber Kehle.*

149. Chloroleuca. *Die grün und weiße Motacille.*

Onomat. hist. nat. III. p. 900. *die kleine Bachstelze von der Insel Dominique.*

Brisson, ornithol. I. p. 445. n. 53. petit Figuier de S. Domingue.

Büffon, Vögel, XVI. p. 98. *der grün und weiße Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 536. n. 106. Sylvia (Chloroleuca) viridi-olivacea, subtus flavicans, capite

(5) *Brisson* verwechselt diesen Vogel mit *Edw. Pine-creeper* (Certhia Pinus, p. 478. n. 16.)

capite colloque superius cinereis, rectricibus lateralibus intus dimidiato-luteis.

Martini, Naturlex. V. p. 45. *kleine Domingoische Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. III. p. 10. *Domingoische kleine Bachstelze.*

Naturgesch. a. d. best. Schrift. p. 782. *der grün und weiße Feigenvogel.*

150. Auricollis. *Die pomeranzenkehlige Motacille.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 380. n. 221. *der Sänger mit orangengelber Kehle.*

Onomat. hist. nat. III. p. 896. *die größere Bachstelze aus Canada.*

Brisson, ornith. I. p. 449. n. 59. grand Figuier de Canada.

Büffon, Vögel, XVI. p. 100. *der pomeranzenkehlige Feigenfresser;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 536. n. 107. Sylvia (Auricollis) olivacea, subtus flava, collo subtus pectoreque flavo-aurantiis, crisso rectricibusque lateralibus intus albis.

Martini, Naturlex. V. p. 104. *die große kanadensische Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 188. *große kanadensische Bachstelze.*

Naturgesch. a. d. best. Schrift. p. 782. *Feigenvogel mit orangenfarbener Kehle.*

151. Maculosa. *Die Motacille mit gelbem Steiß.* (6)

Pennant, arct. Zool. II. p. 373. n. 205. *der Sänger mit dem gelben Rumpfe.*

Brisson,

(6) Ist nicht mit *Motacilla maculata*, p. 965. n. 92. zu verwechseln.

Brisson, ornith. I. p. 447. n. 56. Figuier tacheté de l'Pensilvanie.

Büffon, Vögel, XVI. p. 102. *der grauköpfige Feigenfresser;* m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 182. Yellow-rumped Warbler.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 536. n. 108. Sylvia (Maculosa) nigro-maculata, supra viridi-olivacea, subtus uropygioque lutea, capite cinereo, fascia alarum duplici, rectricibusque lateralibus medio intus albis.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 45. *der Fliegenfänger mit gelbem Bürzel.*

Martini, Naturlex. V. p. 152. *pensylvanische bunte Bachstelze.*

Naturgesch. m. merian. Kupf. Vög. p. 783.

152. Fuscescens. *Die hellbraune Motacille.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 897. *die lichtbraune Mausfarbene Grasmücke.*

Klein, av. p. 75. n. 14. Luscinia, Muscicapa pallide fusca.

Klein, Vorbereit. p. 142. n. 14. *lichtbraune Grasmücke.*

Klein, verb. Vögelh. p. 76. n. 14. *lichtbraune Grasmücke.*

Brisson, ornith. I. p. 550. n. 61. Figuier de la Jamaique.

Büffon, Vögel, XVI. p. 105. *der braune Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 537. n. 109. Sylvia (Fuscescens) fuscescens, subtus rufo griseoque varia, per oculos iuguloque saturate fuscis.

Martini, Naturlex. V. p. 107. *Jamaizensische Bachstelze.*

Naturgesch. m. Merian. Kupf. p. 783.

153. Tigrina. *Die getiegerte Motacille.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 379. n. 219. *der gefleckte Sänger.*

Onomat. hist. nat. III. p. 895. *die dunkle Bachstelze von Canada.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 168. n. 3. *gelbbunter Fliegenstecher.*

Brisson, ornith. I. p. 451. Figuier brun de Canada.

Büffon, Vögel, XVI. p. 108. *der gelbflekkigte Feigenfresser;* m. e. Fig.

Lâtham, Syst. ornith. II. p. 537. n. 110. Sylvia (Tigrina) fusco et olivaceo-viridi varia, subtus flava, collo subtus pectoreque nigro-maculatis, pone oculos macula rufa, fascia alarum alba.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 47. *der gelbgefleckte Fliegenfänger.*

Martini, Naturlex. V. p. 35. *die braune kanadensische Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. III. p. 803. *braune oder dunkle kanadensische Bachstelze.*

Naturgesch. a. d. best. Schr. m. Merian. K. p. 785. *der braun und gelbe Feigenvogel.*

β. *Brisson*, ornith. I. p. 450. n. 62. Figuier brun de S. Domingue. (7)

Büffon, Vögel, XVI. p. 110. *der braune Feigenfresser von St. Domingo.*

Onomat. hist. nat. III. p. 899. *die dunkle Bachstelze von der Insel Dominique.*

Martini, Naturl. V. p. 34. *die braune Bachstelze von St. Domingo.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 537. n. 110. β.

Neueste

(7) Nach *Büffon* das Weibchen. Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

Neueste Mannigfalt. III. p. 802. *braune oder dunkle Bachstelze der Insel St. Domingo.*

154. VIRENS. *Die grünliche Motacille.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 377. n. 214. *der grüne Sänger.*

Onomat. hist. nat. III. p. 905. *die Bachstelze aus Pensylvanien mit einer schwarzen Kehle.*

Brisson, ornith. I. p. 458. n. 77. Figuier à gorge jaune de Pensilvanie.

Büffon, Vögel, XVI. *der schwarzkehlige Feigenfresser*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 537. n. 112. Sylvia (Virens) viridi-olivacea, subtus alba, genis, lateribus colli pectoreque flavis, collo subtus nigro, fascia alarum duplici alba.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 90. *der grüne Fliegenschnäpper mit schwarzer Brust.*

Naturg sch. a. d. best. Schr. p. 787. *der Feigenvogel mit der schwarzen Halskrause.*

31. DUMETORUM. *Der Heckenspringer.*

Müller, Natursyst. II. p. 614. n. 31. *der Heckenspringer.*

Onomat. hist. nat. V. p. 264. *die Bachstelze so sich in Dornhecken aufhält.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 535. n. 4. *die graue Grasmücke; die weiße, blasse Grasmücke; der Dornreich.* Motacilla dumetorum?

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 604. Motacilla dumetorum?

Halle, Vögel, p. 343. n. 324. *der braune Hekkenvogel?*

Halle, Vögel, p. 343. n. 325. *die Hekkenwittwe; kleinste Hekkenschmatzer; Wittwe?*

Zorn, Petinotheol. II. p. 377. *der kleinste Gattung Hecken-Schmätzer?*

Neueste Mannigfalt. III. p. 811. *Dorndreher?*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 522. n. 45. Sylvia (Dumetorum) cinereo-fusca, capite caerulescente, gula pectoreque albis.

Kramer, Austr. p. 377. n. 19. *blaue Grasmücke; Weißbartl; Dorngreul.*

32. CINNAMOMEA. *Der Zimmtvogel.* (8)

Müller, Natursyst. II. p. 614. n. 32. *der Zimmetvogel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 474. n. 23. β. Muscicapa cana subtus coccinea, gula nigra, remigibus quatuor primis basi rubris.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 464. *Zimmetvogel.*

155. NIGRIROSTRIS. *Die schwarzschnäblige Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 522. n. 46. Sylvia (Nigrirostris) fusco-olivacea subtus alba, pectore rufo nigro striato, loris gulaque rufo-flavis, striga maxillari nigricante, rectrice extima toto, sequente apice alba.

156. LUTESCENS. *Die schwarzgelbstirnige Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 523. n. 48. Sylvia (Lutescens) ferrugineo-fusca, subtus rufo-alba, fronte gulaque flavescentibus, macula aurium obscure rubra.

157. BOREALIS. *Die nördliche Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 522. n. 47. Sylvia (Borealis) viridi-olivacea, subtus flava, fronte genis

(8) Nach *Latham* eine Varietät von *Muscicapa Flammea*, p. 942. n. 60.

genis gulaque ferrugineis, rectricibus laterali-bus apice albis.

158. CAMTSCHATKENSIS. *Die kamtschatkische Motacille.*

Latham, Syst. ornithol II. p. 552. n. 162. Sylvia (Kamtschatkensis) fusco-olivacea, abdomine medio albo, fronte genis gulaque pallide fer-rugineis, rostro elongato.

Pennant, arct. Zool. II. p. 393. O. *der Lang-schnabel.*

159. AWATCHA. *Die Motacille von Awatcha.*

Pennant, arct. Zool. II. p 395. T. *der Sänger von Awatcha.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 553. n. 167. Sylvia (Awatcha) fusca, subtus alba, pectore nigro maculato, rectricibus lateralibus basi fulvis.

Latham, Syn. Suppl. p. 184. Awatcha Warbler.

33. CAPRATA. *Die luzonische Motacille.*

Müller, Natursyst. II. p. 614. n. 33. *der Zaun-hüpfer.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 847. *das Luçonische Weißkehlchen.*

Brisson, ornithol. I. p. 432. n. 30. Traquet de l'Isle de Luçon.

Büffon, Vögel, XV. p. 262. *der Traquet von der Insel Lüsson, oder der Zaunhüpfer;* m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 524. n. 52. Sylvia (Caprata) nigra, uropygio crisso maculaque tectricum albis.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 454. *der Zaunhüpfer.*

34. PHOENICURUS. *Der Hausröthling.* (9)

Müller, Naturſyſt. II. p. 618. n. 34. *das Schwarzkehlchen.*

Leske, Naturgeſch. p. 269. n. 4. *der Wiſtling.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 193. n. 14. *das Schwarzkehlchen; der Saulocker.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 192. n. 7. Motacilla (Phoenicurus) gula nigra, abdomine caudaque rufis, capite dorſoque cano; *das Schwarzkehlchen.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 539. n. 13. *das Rothſchwänzchen; Mauernachtigall.*

Halle, Vögel, p. 331. n. 302. *das Schwarzkehlchen; Rothkehlchen mit ſchwarzem Kinne; Hausrothkehlchen; Rothſchwanz.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 388. *der Wiſtling; das Schwarzkehlchen.*

Onomat. hiſt. nat. V. p. 269. *das Schwarzkehlchen.*

Handb. der deutſch. Thiergeſch. p. 136. *Stadtrothſchwänzlein; Hausrothſchwänzlein; Röthling; Rothſterz; Schwarzkehlchen.*

Klein,

(9) Einer der erſten Sänger des Frühlings, der ſich gern in den Städten und Dörfern von den Spitzen der Dächer, von hohen Bäumen und Stangen herab, früh Morgens und Abends ſpät, auf eine helltönende angenehme und erfreuliche Weiſe hören läſst. Nährt ſich zwar beſonders von Inſekten, friſst aber im Herbſt auch Wacholder- und Hollunderbeeren, und wird um dieſe Jahreszeit mit letztern in Sprenkeln gefangen. Bey trübem Wetter kömmt er zuweilen nach den Bienenſtöcken, und fängt Bienen weg. Brütet jährlich zwey Mal, und niſtet auch zwiſchen den Dachſparren unter den Ziegeln. Selten erfolgen nach ſeiner Ankunft noch ſtarke Nachtfröſte. Gewöhnlich verläſst er uns um die Herbſtnachtgleiche. Brütet auch Kukkukseyer aus, wenn dieſer dazu kommen kann ſein Ey in das Neſt zu legen, verläſst aber auch ſeine eignen Eyer, wenn ein Menſch ſie berührt hat, oder auch nur nahe dabey geweſen iſt. Siehe nachher Anmerk. 4. bey *Motacilla Erithacus.*

Klein, av. p. 77. n. 2. Sylvia thorace ex albo variegata.

Klein, Vorbereit. p. 144. n. 2. *Schwarzkehlein.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 78. n. 2. *Schwarzkehlein; Hausrötele, Wüstling, Rottzagel; Saulocker.*

Klein, Stemmat. av. p. 14. tab. 16. Fig. 8. a. b.

Gesner, Vögelb. p. 447. *Haußrötelein; Rothschwänzlein; Rotzägel; Rothstertz;* mit ein. schl. Fig.

Brisson, ornith. I. p. 422. n. 15. Rossignol de muraille.

Büffon, Vögel, XV. p. 165. *die schwarzkehlige Mauernachtigall*, m. 2. Figg. M. u. W.

Batsch, Thiere, I. p. 561. *das Schwarzkehlchen.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 511. n. 15. Sylvia (Phoenicurus) gula nigra, abdomine caudaque rufis, capite dorsoque canis, fronte alba.

Beseke, Vögel Kurl. p. 81. n. 185. *das Schwarzkehlchen.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 135. n. 8. *das Schwarzkehlchen; Hüting; Rothstiert.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 440. *das Schwarzkehlchen.*

Fischer, Livl. p. 102. n. 170. *Erizchen; Rothbäuchlein.*

White, N. G. von Engl. p. 34. n. 17. p. 59. n. 11. p. 64. n. 2. *Hausröteln.*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 12. *Blodfugl; Blodstert.*

Linné, Abhandl. II. p. 305. n. 137. *das Schwarzkehlchen.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 192. n. 232. *das Wald-Rothschwänzlein.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 185. n. 62. *Schwarzkehlchen; Gartenrothschwänzchen.*

Naturforsch. XVII. p. 104. n. 214. *das Schwarzkehlchen.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 64. *der Rothschwanz.*

Naumann, Vogelsteller, p. 148. *der gemeine Rothschwanz.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 386. *der Haus-Röthling; das Haus-Rothschwänzchen.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 239. *das Schwarzkehlchen.*

Goeze, Natur, Menschl. u. Vors. V. p. 195. *der Hausröthling.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 403. *das Schwarzkehlchen.*

Pennant, britt. Thiergesch. p. 111. tab. 53. Fig. 6. 7.

Anweis. Vögel zu fang. p. 502. *der Röthling oder Rothschwänzlein.*

Martini, Naturlex. V. p. 179. *Schwarzkehlchen.*

Tänzer, notab. Venatoris, p. 98. n. 124. *Roth-Schwanz.*

Anweis. Vögel zu fang. p. 502. *der Röthling, oder Rothschwänzlein.*

Meidinger, Vorles. I. p. 153. n. 4. *das Schwarzkehlchen.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. 11. Ruticilla.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 187. n. 21. Motacilla (Phoenicurus) gula nigra, abdomine rufo, capite dorsoque cano.

Kramer, Austr. p 376. n. 11. *Waldrothschweiffl.*

Charleton, onom. zoic. p. 91. n. 10. Ruticilla s. Phoenicurus.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 346. Rubicilla; Ruticilla; Rubecula domestica aestiva; Luscinia murorum. *Haus-Rötele; Wüstling; Rothschwanz; Rotzagel; Sommer-Rötele.*

Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. Ruticilla.

Rzaczyns-

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 418. Rubicilla.
Barrere, ornithol. Cl. 3. gen. 18. sp. 6. Ficedula seu Rubecula phoenicurus.
Belon, observ. p. 17. Ruticilla.
Belon, hist. nat. des ois. p. 347. Rossignol de mur ou de muraille.
Jonston, av. p. 122. Ruticilla seu phoenicurus.
Bomare, diction. X. p. 100. — Diction. des anim. III. p. 717.
Faun. Arragon. p. 89. — Hist. prov. I. p. 501.
Zinnan, Uov. p. 53. tab. 8. Fig. 41. Culo-ranzo, Culo-rosso.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 29. Phoenicurus.
Aristot. hist. anim. L. 9. c. 49. Φοινικουρος.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 385. n. 19. *der Hausröthling.*

β. *Der aschgraue Hausröthling.* (10)
Brisson, ornith. I. p. 423. A. Rossignol de muraille cendré.
Büffon, Vögel, XV. p. 179. *die aschgraue Mauernachtigall.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 512. n. 15. γ. Ruticilla cinerea.
Borkhausen, Magaz. I. p. 186. n. 62. β.
Neueste Mannigfalt. IV. p. 405. not. c.

γ. *Der Hausröthling mit gefleckter Brust.* (1)
Brisson, ornith. I. p. 423. B. Rossignol de muraille à poitrine tachetée.

Xx 4 *Büffon*,

(10) Ist, nach *Brisson*, eine Varietät vom Männchen; nach *Borkhausen* ein junges Weibchen.

(1) Ist, nach *Brisson*, eine Spielart vom Weibchen; nach *Bechstein* ein junges im Herbst gleich nach der Mauser gefangenes Männchen. Mit letzterm stimmt *Borkhausen* in so wiet überein, dass er es für das Männchen im Herbste hält, ehe es weggeht, zu welcher

Büffon, Vögel, XV. p. 179. *Mauernachtigall mit gelbroth gefleckter Brust.*

Klein, av. p. 78. n. 10. Sylvia thorace argentata.

Klein, Vorbereit. p. 147. n. 10. *Fleckkehlein mit silberstückenem Brustlatz.*

Klein, verb. Vögelh. p. 79. n. 13. *Fleckkehlein mit silberstückenem Brustlatz.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 512. n. 15. β. Ruticilla pectore maculato.

Frisch, Vögel, tab. 20. Fig. 2. *b. das Rothschwänzlein mit rothgesprengter Brust.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 603.

Borkhausen, Magaz. I. p. 186. n. 62. γ.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 406. not. d.

δ. *Motacilla Titys.* (2)

Latham, Syst. ornith. II. p. 512. n. 16. Sylvia (Tithys) remigibus nigricantibus, rectricibus rufis, intermedio pari nigro extrorsum rufescente.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 25. Motacilla Titys. *Linn.*

Halle, Vögel, p. 332. n. 303. *das Gartenschwarzkehlchen.*

Zorn,

welcher Zeit die sonst weisse Stirn grau wird, und die Kehle unrenher weisse Flecken bekömmt.

(2) Hier finde ich abermals eine grosse Verwechselung der Synonymen, und ganz verschiedene Meinungen der Naturforscher. In der X. Edit. nahm *Linné* die *Motacilla Titys* als eine eigne Gattung an. In der XIIten führt er sie als das Weibchen von *Motacilla Phoenicurus* auf. Unter den Neuern hat *Latham* l. c. sie wieder als eine eigne Gattung angenommen. *Borkhausen* ist eben der Meinung, zieht *Scopoli's Sylvia Tithys*, und *Gmelins Motacilla Gibraltariensis* als Synonymen zusammen; will aber doch *Linne's Motacilla Titys* davon getrennt wissen, ob sie gleich *Scopoli* mit der seinigen vereinigt. So viel hat seine Richtigkeit, dass die Beschreibungen bey dieser und den beyden folgenden Gattungen, dergestalt in einander laufen, dass es schwer hält, etwas mit Gewissheit darüber zu bestimmen.

Zorn, Petinotheol. II. p. 387. *das Wald - oder Gartenrothschwänzlein; der Garten Röthling?*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 13. Titys; tab. 12.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 192. n. 233. *das Haus - Rothschwänzlein.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 186. n. 64. Motacilla Titys. *Hausrothschwänzchen; Mauernachtigall; Schwarzbrüstchen.* p. 187. *graues Rothschwänzchen.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 139. *Hausrothschwänzchen.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. 14. Rubecula.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 187. n. 23. Motacilla (Titys) remigibus nigricantibus, rectricibus rufis: intermedio pari nigro extrorsum rufescente.

Kramer, Austr. p. 376. n. 12. Motacilla corpore nigro, cauda rufa? *Hausrothschweissl.*

160. GIBRALTARIENSIS. *Das Rothschwänzchen von Gibraltar.* (3)

Klein, av. p. 80. n. 25. Sylvia s. Ruticilla corpore griseo, gutture nigro.

(3) Nach *Borkhausen* gehört diese Gattung, wie ich eben vorher bemerkt habe, zu *Motacilla Titys Linn.* — *Brisson* führt sie für sich allein auf; und *Büffon* sieht sie als eine Abart von *Motacilla Phoenicurus* an. Vergleicht man vollends die verschiedenen Synonymen bey den Ornithologen, so wird die Verwirrung noch grösser. In unserm System ist *Edw. Grey Redstart*, von *Pennants Grey Redstart* getrennt; ersterer zu *M. Gibraltariensis*, und letzterer zu *M. Erithacus* gerechnet. Aber *Pennant* führt *Edwards* selbst mit an; citirt auch *Brissons* und *Büffons Rouge queue*, die unser System zu *M. Erithacus* zählt; beruft sich auch auf *Latham* Syn. IV. p. 423. n. 12. dies ist wieder *M Gibraltariensis*; und *Latham* vereinigt endlich *Edw.* und *Penn. Grey Redstart*, mit seinem *Grey - Redstaart*, und rechnet sie mit *Brisson* zu *Mot. Gibraltariensis.*

Klein, Vorbereit. p. 150. n. 25. *schwarzkehliger grauer Rothschwanz.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 81. n. 28. *schwarzkehlig grauer Rothschwanz.*

Handb. der Naturgesch. II. 272. *das Blaukehlchen von Gibraltar.*

Brisson, ornith. I. p. 424. n. 16. Rossignol de muraille de Gibraltar.

Büffon, Vögel, XV. p. 180. *Edwards grauer Rothschwanz.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 513. n. 17. Sylvia (Gibraltariensis) cinerea, fronte abdomineque albis, genis colloque subtus nigris, uropygio rectricibusque lateralibus rufis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 57. *das graue Rothschwänzlein.*

35. Erithacus. *Das gemeine Rothschwänzchen.* (4)

Müller, Natursyst. II. p. 618. n. 35. *der Rothschwanz.*

Leske,

(4) Ich habe die hieher gehörigen Synonymen nach Anleitung unsres Systems geordnet, finde aber bey genauer Untersuchung derselben wiederum nicht wenige Zweydeutigkeiten, die die richtige Auseinandersetzung derselben, in Rücksicht auf die vorhergehenden Gattungen, erschweren. Was ich über die Naturgeschichte dieses Vogels bey den Ornithologen gesagt finde, ist grossentheils auch auf die *M. Phoenicurus* so anwendbar, dass auch der genaueste Kritiker, wenn er der Wahrheit die Ehre geben will, oft nicht wissen wird, wohin die Beschreibung eigentlich gehört; dies ist um so gewisser, da man selbst bey denen, die beyde umständlicher beschrieben haben, findet, wie sehr sie an Sitten und Lebensart einander gleichen. Merkwürdig bleibt es immer, dass von der *M. Erithacus* sich weit weniger Synonymen, als von der *M. Phoenicurus* finden; dass *Siemssen* des ersten unter den meklenburgischen Vögeln gar nicht gedenkt; dass *Borkhausen* versichert, ihn nur *einmal* gesehen zu haben; dass

Leske, Naturgeschichte. p. 270. n. 5. *das Rothschwänzchen.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 538. n. 12 *der Wistling.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 389 C. *das Rothschwänzchen.*

Onomat. hist. nat. III. p. 819. *das Rothschwänzlein.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 136 *Gartenrothschwänzlein.*

Klein, av. p. 78. n. 4 Sylvia gula grisea, thorace longa, cauda tota rubra?

Klein, Vorbereit. p. 146. n. 4. *Graukehlein, mit rothem Schwanz, und langem Brustlatz?*

Klein,

dass *Barrere*, *Salerne*, *Belon*, u. a. seiner gar nicht erwähnen, u. d. gl. daher denn auch *Beseke* auf den Gedanken gefallen, dass die *M. Phoenicurus* und *Erithacus* ein und eben derselbe Vogel seyn mögen, wie denn auch schon *Brisson* beyde *Linneische* Synonymen, unter seinem *Phoenicurus* mit einander verbindet. Es kommt hierzu noch ein Umstand, der die Sache erschwert. In unserm System ist *Frisch*, tab. 20. citirt, aber die Figur nicht bemerkt. Eben so citirt auch *Latham* den *Frisch*. *Brisson* führt ihn gleichfalls an, und beruft sich auf *Klein*. Wenn aber das richtig ist, was *Bechstein* (Naturgesch. Deutschl. III. p. 602. sq.) über die *Frischischen* Vögel gesagt hat, so kann keine von den Figg. tab. 20. hieher gehören. Ihm nach ist a) *das Rothschwänzchen mit ganz rothem Schwanze* (Phoenicurus, Rubicilla) das Weibchen von *Motacilla Phoenicurus Linn.* und zwar eine Varietät, weil ihm die schwarzen mittlern Schwanzfedern fehlen. b) *Das Rothschwänzlein mit halb rothem, halb schwarzem Schwanze*, Phoenicurus inferiore parte caudae nigra) das Weibchen von *Motacilla Suecica Linn.* womit auch *Zorn* (II. p. 431.) und *Büffon* (XV. p. 191.) übereinstimmen. c) *Das Rothschwänzlein mit einer schwarzen Mittelfeder* (Phoenicurus media penna caudae subnigra) das alte Weibchen von *Motacilla Suecica L.* — Auf diese Art würde denn *Kleins* Sylvia gula grisea thorace longa, cauda tota rubra, zu *Motacilla Phoenicurus L.* — *Kleins* Sylvia gula grisea fimbricata aber zu *Motacilla Suecica L.* gehören.

Klein, verb. Vögelhist. p. 79. n. 7. *Graukehlein mit ganz rothem Schwanze, und langem Brustlatze.*

Klein, av. p. 78. n. 5. Sylvia gula grisea fimbricata?

Klein, Vorbereit. p. 146. n. 5. *Graukehlein schwarz verbrämt, mit halb roth, und halb schwarzem Schwanze?*

Klein, verb. Vögelhist. p. 79. Fig. 8. *Graukehlein, schwarz verbrehmt, mit halbrothem, und halb schwarzem Schwanze.*

Gesner, Vögelb. p. 448. *Rothschwänzlein.*

Brisson, ornith. I. p. 425. n. 18. Rouge-queue à collier.

Büffon, Vögel, XV. p. 184. *der Rothschwanz;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 513. n. 19. Sylvia (Erithacus) dorso remigibusque cinereis, abdomine rectricibusque rufis, extimis duabus cineris.

Beseke, Vögel Kurl. p. 82. n. 186. *der Rothschwanz.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 440. *das Rothschwänzlein; Gartenröthling; Bienenschnappe.*

Fischer, Livl. p. 102. n. 169. *Rothschwanz.*

Martini, Naturlex. V. p. 172. *Rothschwänzchen.*

Naturforsch. XVII. p. 104. n. 215. *der Rothschwanz.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 186. n. 63. *das Waldrothschwänzchen.*

Samml. zur Phys. u. N. G. III. p. 239. *der Rothschwanz.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 401. *Rothschwanz.*

Meidinger, Vorles. I. p. 153. n. 5. *Rothschwänzchen.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 12. *Phoenicurus.*

Linné,

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 187. n. 22. Motacilla (Erithacus) dorso remigibusque cinereis; abdomine rectricibusque rufis, extimis duabus cinereis.

Jonston, av. p. 122. Phoenicurus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 385. n. 20. *das Rothschwänzchen.*

β. *Brisson*, ornith. I. p. 424. n. 17. Rouge-queue. (5)

Büffon, Vögel, XV. p. 192. *der graue Rothschwanz.*

161. GUJANENSIS. *Der guianische Rothschwanz.*

Büffon, Vögel, XV. p. 195. *der Guianische Rothschwanz;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 514. n. 20. Sylvia (Guianensis) grisea subtus alba, alis caudaque rufis.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 240. *der guianische Rothschwanz.*

Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 741.

162. ATRATA. *Der schwarze Rothschwanz.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 514. n. 21. Sylvia (Atrata) nigra fusco-marginata, pileo cinereo, remigibus rectricibusque 2. intermediis fuscis, lateralibus rufis.

36. GUIRA. *Der Guira.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 616. n. 36. *die brasilianische Bachstelze.*

Halle,

(5) Nach *Brisson* eine eigne Gattung. Nach *Büffon* das Weibchen von *M. Erithacus.*

(6) Macht ein offenes, flaches, aus breitem welken Grase und Fasern zusammen gesetztes Nest zwischen den kleinen Zweigen eines Baums, und legt weisse, verlohren schwarz gefleckte Eyer. *Pennant.*

Halle, Vögel, p. 342. n. 320. *der grüne Mönch, mit hellblauem Kopfe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 384. n. 233. *der Guira.*

Onomat. hist. nat. V. p. 266. *der grüne Brustwenzel aus Brasilien.*

Brisson, ornithol. I. p. 455. n. 71. Pipit verd du Brésil.

Büffon, Vögel, XVI. p. 198. *der Guiraberaba;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 547. n. 147. Sylvia (Guira) viridis subtus uropygioque luteo, genis gulaque nigris, linea lutea cinctis.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 41. *der Guira Guacu beraba.*

Martini, Naturlex. V. p. 33. *die brasilianische Bachstelze.*

Salerne, ornith. p. 249. Guiraguacu beraba.

Jonston, av. p. 205. Guiraguacu beraba.

37. Suecica. *Das Blaukehlchen.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 616. n. 37. *das Blaukehlchen.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 194. n. 15. *das Blaukehlchen; die Wassernachtigall.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 538. n. 11. *das Blaukehlchen.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 601. 602.

Halle, Vögel, p. 334. n. 307. *das Blaukehlchen.*

Meyer, Thiere, I. tab. 93 *Blaukehlein?*

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere II. p. 429. *das Blaukehlchen; Bleykehlchen; Spiegelvogelchen; Wegflecklein; Weidenguckerlein; Carlsvogel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 289. E. *das Blaukehlchen.*

Onomat.

(7) S. zum Theil die Anmerk. 4.

Onomat. histor. natur. II. p. 52. *der Carlsvogel.*

Klein, av. p. 77. n. 2. Sylvia gula caerulea, thorace ex albo variegata.

Klein, Vorbereit. p. 145. n. 2. *Blaukehlein mit weißgefleckten Brustlatze.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 78. n. 4. *Blaukehlein mit weißgeflecktem Brustlatze.*

Klein, av. p. 80. n. 24. Sylvia, s. Ruticilla gutture albo, zona caerulea fimbriato.

Klein, Vorbereit. p. 150. n. 24. *Weißkehlein mit blauverbrämten Gürtel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 81. n. 27. *Rothschwanz mit weißer blau verbrehmter Kehle.*

Gesner, Vögelb. p. 548. *Weidengückerlein;* m. e. schl. Fig.

Brisson, ornithol. I. p. 425. n. 19. Gorge-bleue.

Büffon, Vögel, XV. p. 225. *das Blaukehlchen;* m. 2. Figg.

Batsch, Thiere, I. p. 361. *das Blaukehlchen.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 521. n. 43. Sylvia (Suecica) cinereo-fusca, pectore ferrugineo, fascia caerulea, rectricibus fuscis versus basin ferrugineis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 55. *das blaukehlige Rothschwänzlein.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 82. n. 187. *das Blaukehlchen.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 136. n. 9. *das Blaukehlchen.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 440. *das Blaukehlchen.*

Fischer, Zusätze zur N. G. von Livl. p. 49. n. 498. *das Blaukehlehen.*

Linné, Abhandl. II. p. 305. n. 138. *das Blaukehlchen.*

Natur-

Naturforsch. XVII. p. 104. n. 216. *das Blaukehlchen.*

Naturforsch. XXII. p. 139. *Blaukehlchen*, XXV. p. 19. *Rothschwanz; Schildnachtigall.*

Günther, Nest. u. Ey. tab. 74. *Blaukehlein.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 430. *die Blau-Kehle.*

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 243. *das Blaukehlchen.*

André und Bechstein, Spazierg. III. p. 220. 225. *Blaukehlchen.*

Börner, *Stadt- und Landwirthsch.* II. p. 249.

Neueste Mannigfalt. III. p. 781. *Blaukehlchen.*

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. V. p. 746.

Naumann, Vogelsteller, p. 148. *der zweyte Rothschwanz, oder die Schildnachtigall.*

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. Ruticilla.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 7. Avis carolina.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 187. n. 24. Motacilla (Suecica) pectore ferrugineo fascia caerulea, rectricibus fuscis, versus basin ferrugineis.

Kramer, Austr. p. 375. n. 7. Motacilla pectore caeruleo macula flavescente albedine cincta. *Blaukröpffl.*

Barrere, ornithol. Cl. 3. Gen. 19. sp. 6. Motacilla pyrenaica, cinerea, iugulo et pectore coeruleis.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 385. n. 21. *das Blaukehlchen.*

β. *Brisson*, ornith. I. p. 426. n. 20. Gorge bleue de Gibraltar. (8)

Büffon, Vögel, XV. p. 232. *das Rothkehlchen von Gibraltar.*

γ. *Büffon*,

(8) Nach *Brisson* eine eigne Gattung. Er rechnet *Kleins* Ruticilla gutture albo, und *Edwards blue throated Redstaart* dazu, den *Büffon* für das Weibchen annimmt.

γ. *Büffon*, Vögel, XV. p. 233. *der Spiegelvogel.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 522. n. 43. β. Sylvia macula pectoris argentea.

38. SIALIS. *Der Blauvogel.*

Müller, Natursyst. II. p. 616. n. 38. *die amerikanische Bachstelze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 370 n. 198. *das blaue Rothkehlchen.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 844. *das blaue Rothkehlchen aus Carolina.*

Klein, av. p. 77. n. 3. Rubecula americana caerulea.

Klein, Vorbereit. p. 145. n. 3 *Blaukehlein mit rothem Unterleibe, sonst blau.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 78. n. 5. *Brustwenzel mit rothem Unterleibe, sonst blau*

Klein, av. p. 80. n. 21. Sylvia thorace rubro, supremo corpore et cauda caeruleis.

Klein, Vorbereit. p. 150. n. 21. *Wenzel mit rothem Kamisol.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 80. n. 24. *Wenzel mit rothem Kamisol.*

Brisson, ornithol. I. p. 428. n. 23. Rouge-gorge bleue de la Caroline.

Büffon, Vögel, XV. p. 235. *das blauhälsige Rothkehlchen;* m. 2. Figg. M. u. W.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 522. n. 44. Sylvia (Sialis) supra caerulea, subtus rufo-rubra, abdomine albo.

Seligmann, Vögel, I. tab. 47. *das blaue Rothkehlein.*

Seligmann, Vögel, II. tab. 94. *der Blauvogel.*

Linné, Abhandl. II. p. 281. n. 18. *die Sialische Motacille.*

Martini, Naturlex. V. p. 12. *amerikanische Bachstelze.*

Samml. zur Physs. und N. G. III. p. 244. *der Blauvogel.*

Neueste Mannigfaltigk. III. p. 771. *die amerikanische Bachstelze.*

39. Fulicata. *Die philippinische Motacille.*

Müller, Natursystem, II. p. 617. n. 39. *die philippinische Bachstelze.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 848. *die philippinische Bachstelze.*

Brisson, ornith. I. p. 433. n. 31. Traquet des Philippines.

Büffon, Vögel, XV. p. 264. *der Philippinische Steinschmätzer;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 524. n. 53. Sylvia (Fulicata) nigro-violacea, crisso castaneo, macula tectricum alba.

Samml. zur Phys. u. Naturgesch. III. p. 246. *die philippinische Bachstelze.*

Martini, Naturlex. V. p. 153. *philippinische Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 255. *philippinische Bachstelze.*

40. Cayana. *Die blaue cayennische Motacille.*

Müller, Natursyst. II. p. 617. n. 40. *die mexicanische Bachstelze.*

Onomat. hist. nat. III. p. 769. *Elatototl.*

Brisson, ornithol. I. p. 455. n. 72. Pipit bleu de Cayenne.

Büffon, Vögel, XVI. p. 191. *der blaue Pitpit;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 445. n. 143. Sylvia (Cayana) caerulea, capistro humeris alis caudaque nigris.

Martini,

Martini, Naturlex. V. p. 125. *die mexikanische Bachstelze.*

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 201. *mexikanische Bachstelze.*

β. *Büffon*, Vögel, XVI. p. 193. *der blaue Manaki.*

Latham, Syn. II. 2. p. 503. n. 138. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 546. n. 143. β.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 53. *der blaue Manakin.*

γ. *Büffon*, Vögel, XVI. p. 193. *der blaue Pitpit von Cayenne;* m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 503. n. 138 Var. B.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 546. n. 143 γ.

163. CYANOCEPHALA. *Die blauköpfige Motacille.*

Brisson, ornith. I. p. 455. n. 70. Pipit verd.

Büffon, Vögel, XVI. p. 139. *der grüne Pitpit.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 546. n. 144. Sylvia (Cyanocephala) viridis, capite tectricibusque alarum caeruleis, gula griseo-caerulescente, remigibus fuscis.

Martini, Naturlex. V. p. 104. *die grüne cayennische Bachstelze.*

164. LINEATA. *Die blaukappige Motacille.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 197. *der blaukappige Pitpit.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 546. n. 145. Sylvia (Lineata) corpore subtus maculaque verticis caeruleis, fronte vitta superciliari lateribusque colli caeruleo nitidis, fascia pectoris abdominisque alba.

165. CYANEA. *Die blaue neuholländische Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 545. n. 142. Sylvia (Cyanea) nigro-cyanea, subtus alba, capite ni-

gro-sericeo tumido, sincipite genis lunulaque cervicis caeruleo-nitidis, fascia per oculos nigra.

Phillips, Bot. Bay. tab. p. 157. *(das Männch.)* p. 159. *(das Weibch.)* Superb Warbler.

White, voy. tab. p. 256.

Meyer, zool. Entdeck. p. 54. n. 2. Motacilla (Superba) nigra, remigibus fuscis, abdomine albo, fronte genisque caeruleis.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 545. n. 142. β. Sylvia griseo-nigricans, capite gula cerviceque cyaneis, tectricibus alarum fuscis, remigibus rectricibusque nigris.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 23. *der blauköpfigte Fliegenschnäpper von der Insel Luçon;* m. e. Fig.

41. Velia. *Der rothbäuchige Blauvogel.* (9)

Müller, Natursyst. II. p. 617. n. 41. *die surinamische Bachstelze.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 895. *purpurfarbige Grasmücke.*

Klein, av. p. 75. n. 15. Luscinia ex caeruleo et rubro varia.

Klein, Vorbereit. p. 142. n. 15. *blaurothe Grasmücke.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 76. n. 15. *blau und rothe Grasmücke.*

Brisson,

(9) *Latham* unterscheidet hier folgende Varietäten. β) M. fronte uropygioque aureis, corpore subtus caerulescente, ventre imo castaneo. *Briss.* av. III. p. 536. n. 73. Sylvia Surinamensis caerulea. — γ) M. Caerulea dorso imo abdomineque rufis. *Edw.* tab. 22. Red-billed Blue-bird. *Bankr.* Guian. p. 182? — δ) M. dorso fusco nigricante, pectore abdomineque coccineis *Fermin*, Surin. II. p. 194. Rouge-gorge. — vid. Syst. ornith. II. p. 547.

Brisson, ornith. I. p. 456. n. 73. Pipit bleu de Surinam.

Büffon, Vögel, XVI. p. 195. *der bunte Pitpit;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 546. n. 146. Sylvia (Velia) nigra, viridi-caeruleo-varia subtus rufa, collo subtus violaceo, uropygio viridi-aureo.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 43. *der Blauvogel mit dem rothen Bauch.*

Bankroft, N. G. von Guiana, p. 110. *der rothbäuchige Blauvogel?*

Fermin, Surin. II. p. 176. *Rothkehlchen?*

Martini, Naturlex. V. p. 193. *die surinamische Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 414. *surinamische Bachstelze.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 188. n. 26. Motacilla (Velia) caerulea, ventre clunibusque rufescentibus.

42. Canadensis. *Die canadische Motacille.*

Müller, Natursyst. II. p. 617. n. 42. *die canadische Bachstelze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 372. n. 202. *das canadische Schwarzkehlchen.*

Onomat. hist. nat. III. p. 894. *die aschgraue Bachstelze von Canada.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 167. *blauer Fliegenstecher.*

Brisson, ornithol. I. p. 453. n. 67. Figuier cendré de Canada.

Büffon, Vögel, XVI. p. 130. *der blaue Canadensische Feigenfresser;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 539. n. 117. Sylvia (Canadensis) supra caerulea subtus alba, iugulo remigibus rectricibusque nigris.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 42. *blauer Fliegenfächer.*

Martini, Naturlex. V. p. 108. *die kleine kanadensische graue Bachstelze.*

Naturgesch. m. Merian. Kupf. Vög. p. 790. *der blaue Feigenvogel.*

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 140. *die kleine graue kanadensische Bachstelze.*

43. CAERULEA. *Die schieferfarbene Motacille.*

Müller, Natursyst. II. p. 618. n. 43. *die blaue Bachstelze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 378. n. 216. *der himmelblaue Sänger.*

Onomat. histor. natur. V. p. 261. *die blaue Bachstelze.*

Brisson, ornithol. I. p. 559. n. 79. Figuier cendré de Pensilvanie.

Büffon, Vögel, XVI. p. 142. *der eisengraue Feigenfresser;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 540. n. 121. Sylvia (Caerulea) supra caerulea subtus alba, alis caudaque nigris.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 92. *kleiner eisengrauer Fliegenfänger.*

Martini, Naturlex. V. p. 23. *die blaue Bachstelze.*

Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 793. *der eisengraue Feigenvogel.*

Neueste Mannigfaltigk. III. p. 780. *blaue Bachstelze.*

β. *Büffon*, Vögel, XVI. *der schwarzköpfige cayennische Feigenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 540. n. 21. β.

166. Cyana. *Die weißbäuchige Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 541. n. 122. Sylvia (Cyane) saturate cyanea, subtus nivea, a rostro ad alas striga atra.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 7. n. 18. Motacilla *Cyane.*

167. Arundinacea. *Die Rohrmotacille.* (10)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 510. n. 12. Sylvia (Arundinacea) supra olivaceo-fusca, subtus albida, loris et orbitis fusco-albescentibus, angulo carpi subtus luteo-fulvo, cauda subcuneata fusca.

Lichtenberg u. Voigt, Magaz. für das Neueste, etc. IV. 1. p. 145. Motacilla arundinacea.

44. Sibilla. *Der Fitert.*

Müller, Natursystem, II. p. 618. n. 44. *der Zischer.*

Onomat. histor. natur. VI. p. 847. *die Bachstelze aus Madagascar.*

Brisson, ornithol. I. p. 431. n. 28. Traquet de Madagascar.

Büffon, Vögel, XV. p. 268. *der Fitert, oder das Madagascarische Weißkehlchen.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 523. n. 50. Sylvia (Sybilla) nigricans, subtus alba, pectore ruso, rectricibus nigris, macula alarum alba.

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 246. *der Zischer.*

(10) *Latham* rechnet hieher noch folgende Synonymen: Turdus arundinaceus minimus, *Sepp. Vog.* tab. p. 101. (Avis?) *id.* p. 97. (Nidus) Passer arundinaceus minor, *Raji Syn.* p. 47. A. 3? *Will.* p. 99? Rohrsperling, *Günth. Nest. u. Ey.* tab. 12? Bouscarle de Provence, *Büff.* V. p. 134? *Pl. enl.* 655. Fig. 2? Lesser Reed-Sparrow, *Will.* p. 144? Reed Wren, *Lath. Syn. Suppl.* p. 184. *Gentl. Mag.* LV. 462. t. p. 640.

Neueste Mannigfalt. IV. p. 197. *die madagaskarische Bachstelze.*

45. Rubecula. *Das Rothkehlchen.* (¹)

Müller, Natursyst. II. p. 618. n. 45. *das Rothkehlchen.*

Leske Naturgesch. p. 270. n. 6. *das Rothkehlchen.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 194. n. 16. *das Rothkehlgen.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 192. n. 8. Motacilla (Rubecula) grisea, gula pectoreque ferrugineis; *das Rothkehlchen; Rothbrüstchen; Rothbart.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 537. n. 10. *das Rothkehlchen.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 601. *das Rothkehlein.*

Funke, Naturgesch. I. p. 256. *das Rothkehlchen.*

Halle, Vögel, p. 330. n. 301. *das Rothkehlchen.*

Meyer, Thiere, I. tab. 93. *das Rothkehlchen?*

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere, II. p. 429. n. 371. *das Rothkehlchen; Rothkröpfchen; Waldrothlein*, etc.

Pennant, arct. Zool. II. p. 389. D. *das Rothkehlchen.*

Neuer Schaupl. der Nat. VII. p. 266. *Rothkehlchen.*

Onomat. hist. nat. V. p. 271. *das Rothkehlchen.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 273. *das Rothkehlchen.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 136. *das Rothkehlchen*, etc.

Klein, av. p. 77. n. 1. Sylvia sylvatica.

Klein, Vorbereit. p. 144. n. 1. *Rothkehlein; Rothbrüstlein; Waldrotklein; Rottkröpplein.*

Klein,

(¹) Die Jungen haben vor dem ersten Mausern das Orangeroth auf der Kehle und Brust nicht.

Klein, verbeff. Vögelhift. p. 78. n. 1. *Rothkehlein; Wald- oder Hausrötelein.*
Klein, Stemmat. av. p. 14. tab. 16. fig. 13. a — c.
Klein, Vögeleyer, p. 26. tab. 10. fig. 16.?
Gesner, Vögelb. p. 445. *Waldrötelein; Rötelein; Winterrötelein: Rotbrüstlein; Rotkropff.* Fig. p. 446. mittelm.
Brisson, ornithol. I. p. 427. n. 21. Rouge-gorge.
Büffon, Vögel, XV. p. 212. *das Rothkehlchen;* m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 361. *das Rothkehlchen.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 520. n. 42. Sylvia (Rubecula) grisea, gula pectoreque ferrugineis.
Beseke, Vögel Kurl. p. 83. n. 188. *das Rothkehlchen.*
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 137. n. 10. *das Rothkehlchen.*
Bock, N. G. von Preuff. IV. p. 440. *das Rothkehlchen.*
Fischer, Zuf. zur N. G. von Livl. p. 50. n. 503. *Rothkehlchen.*
Cetti, Sardin. II. p. 217. *das Rothkehlchen.*
White, N. G. von Engl. p. 60. n. 1. *Roeteln*, p. 63. n. 4. *Rothkehlchen.*
Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 14. *Rödfinke; Rödkielke.*
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *das Rothkehlchen.*
Linné, Abhandl. II. p. 306. n. 139. *das Rothkehlchen.*
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 191. n. 231. *das Rothkehlchen.*
Samml. zur Phyf. u. N. G. III. p. 242. *das Rothkehlchen.*
Naturforsch. XVII. p. 104. n. 217. *das Rothkehlchen*
Pennant, britt. Thiergesch. III. tab. 55. fig. 2.

Zorn, Petinotheol. II. p. 388. *das Rothkehlein.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 64. *Roth-Kehle.*

Naumann, Vogelsteller, p. 149. *Rothkehlgen.*

Anweis. Vögel zu fang. p. 497. *das Rothkehligen.*

Eberhard, Thiergesch. p. 84. *das Rothkehlgen.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 942. *Rothkehle.*

Goeze, Natur, Menschenl. und Vors. V. p. 204. *das Rothkehlchen.*

André u. Bechstein, Spazierg. I. p. 192. *das Rothkehlchen.*

Meidinger, Vorles. I. p. 153. n. 6. *das Rothkehlchen.*

Oekonom. Zool. II. p. 101. *das Rothkehlchen.*

Dieskau, Naturgesch. der Nachtigall, p. 42.

Martini, Naturlex. V. p. 164. *Rothkehlchen.*

Wirsing, Vögel, tab. 25. *Rothkehlein.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 185. n. 61. *Rothkehlchen; Rothbrüstchen.*

Tänzer, notabil. Venator. p. 98. n. 123. *Roth-Kehle.*

Neue Mannigfaltigk. III. p. 179. — Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 328. *Rothkehlchen.*

Loniceri, Kräuterb. p. 683. *Rothbrüstlein.*

Elsholz, Tischb. p. 169. *Rothkehlchen.*

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. Erithacus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 13. Erithacus.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 188. n. 28. Motacilla (Rubecula) grisea gula pectoreque fulvis.

Kramer, Austr. p. 376. n. 12. *Rothkröpfl.*

Charleton, onom. zoic. p. 91. n. 8. Rubecula, Erithacus.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 345. Rubecula. *Rottkählichen; Rottbrüstlin; Wald-Rötelin; Rottkröpfflin; Winter-Rötele.*

Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. Rubecula.

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 279. Erithacus Phoenicurus *Plinio;* Rubrica *Gesnero;* Rubecula et Ruticilla *Gazae;* Silvia aliis.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 418. Rubecula *Schwenkfeldii*, Erithacus Ruticilla *Gazae;* Sylvia.

Barrere, ornithol. Cl. 2 Gen. 18. sp. 4. Ficedula fulva, pectore rubro.

Belon, hist. nat. des oif. p. 348. — Obs. p. 16. Gorge-rouge; Rubeline; Rouge-bourse; Gadrille; Roupie; Berée.

Bomare, diction. V. p. 165. — Diction. des anim. III. p. 720.

Onomatol. forestal. III. p. 206.

Zinnan. Uov. p. 46. tab. 6. Fig. 32. Pettirosso.

Hist. Prov. I. p. 508. Rouge-gorge.

Jonston, av. p. 121. Rubecula.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 29. Erithacus?

Aelian. de nat. animal. L. 7. c. 7. Ἐριθακος.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 386. n. 22. *das Rothkehlchen.*

β. *Brisson*, ornithol. I. p. 427. n. 22. Rouge-gorge de Bologne. (2)

Latham, Syn. II. 2. p. 444. n. 38. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 521. n. 42. β. Sylvia cinerea, gula alba, collo inferiore pectoreque rufis, tectricibus alarum albo nigro rufoque variis, remigibus rectricibusque nigris rufo-marginatis.

Zinnan. Uov. p. 50. tab. 7. fig. 36. Spippola maggiore.

Jonston, av. p. 121. Spipola prima.

γ. Rubecula tota alba. *Das ganz weiße Rothkehlchen.*

Ist mir wenigstens noch nie vorgekommen.

46. Tro-

(2) Nach *Brisson* eine eigne Gattung.

46. TROGLODYTES. *Der Zaunkönig.* (*)

Müller, Naturſyſt. II. p. 619. n. 46. *der Zaunkönig.*

Leske, Naturgeſch. p. 270. n. 7. *der Schneekönig.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 190. n. 9. *der Zaunkönig; Schneekönig; Winterkönig; Zaunſchliefer.*

Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 192. n. 9. Motacilla (Troglodytes) griſea, alis nigro cinereoque undulatis. *Zaunkönig; Zaunſchlupfer.*

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 545. n. 26. *der Zaunkönig.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 609. *der Schneekönig; Winterzaunkönig.*

Funke, Naturgeſch. I. p. 259. *der Zaunkönig.*

Ebert, Naturl. II. p. 144. *Schneekönig.*

Halle, Vögel, p. 327. n. 298. *der Schneekönig.*

Meyer, Thiere, II. tab. 79. *der Schneekönig.*

Gatterer, vom Nutz. u. Schad. der Th. II. p. 430. n. 372. *der Zaunkönig; Schlupfkönig; Zaunſchlipflein*, etc.

Pennant, arct. Zool. II. p. 387. n. 239. *der Zaunkönig.*

Neuer Schaupl. der Nat. X. p. 159. *Zaunkönig.*

Onomat. hiſtor. natur. V. p. 273. *der Winterkönig.*

Handb. der Naturgeſch. II. p. 275. *der Schneekönig.*

Handb. der deutſch. Thiergeſch. p. 137. *Zaunkönig*, etc.

Klein, av. p. 76. n. 1. Troglodytes ſimpliciter.

Klein,

(*) Die deutſchen u. a. Benennungen, *dieſer*, der 48. und 49. Gattung werden häufig verwechſelt; auch nicht ſelten ihre Naturgeſchichte unter einander geworfen.

Klein, Vorbereit. p. 143. n. 1. *Winterkönig*, *Zaunschlipflein*, *Meisekönig*; *Nesselkönig*; *Dornkönig*, *Schupkönig*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 77. n. 1. *Winterkönig*.
Klein, Stemmat. av. p. 14. tab. 16. Fig. 4. a. b.
Klein, Vögeleyer, p. 25. tab. 10. Fig. 13.
Gesner, Vögelb. p. 473. *Zaunschlipfflein*; m. e. mittelm. Fig.
Brisson, ornith. I. p. 428. n. 24. Roitelet.
Büffon, Vögel, XVI. p. 215. *der Nesselkönig oder Troglodyt*; m. e. Fig.
Latham, Syst. ornith. II. p. 547. n. 148. Sylvia (Troglodytes) grisea, superciliis albidis, alis nigro cinereoque undulatis.
Beseke, Vögel Kurl. p. 83. n. 189. *der Zaunkönig*.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 138. *der Zaunkönig*. *Nettelkönning*: *Tuunkonning*; *Groote Jochen*.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 441. *der Zaunkönig*.
Fischer, Zus. zur N. G. von Livl. p. 51. n. 504. *der Zaunkönig*.
Cetti, Sardin. II. p. 224. *der Schneekönig*.
White, N. G. von Engl. p. 60. n. 2. p. 66. n. 7. p. 88. *der Zaunkönig*.
Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 15. *Thomas im Zaune*.
Pennant, Reis. d. Schottl. II. p. 280. *der Zaunkönig*.
Pennant, britt. Thiergesch. p. 114.
Naturforsch. XVII. p. 105. n. 218. *der Zaunkönig*.
Neue schwed. Abhandl. IV. p. 51. *der Schneekönig*; *Tomlingen*.
Zorn, Petinotheol. I. p. 324. II. p. 154. 393. 704. *der Zaunschlieffer*; *Zaunschlupfer*.
Borkhausen, Magaz. I. p. 190. n. 69. *Zaunkönig*.
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 196. 239. *der Zaunkönig*.

Döbel,

Döbel, Jägerprakt. I. p. 67 *Zaunkönig.*
Naumann, Vogelsteller, p. 149. *Zaunkönig.*
Goeze, Natur, Menschenl. u. Vors. VI. p. 109. *Zaunkönig.*
André u. Bechstein, Spazierg. III. p. 56. *Zaunkönig.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 575. *Zaunköniglein.*
Martini, Naturlex. V. p. 205. *Zaunschlüpfer*, etc.
Hanöv. Merkwürdigk. der Natur, I. p. 290.
Geoffroy, mater. med. VII. p. 602. *der Zaunkönig.*
Tänzer, notab. Venator. p. 110. n. 139. *Zaunkönig.*
Eberhard, Thiergesch. p. 85. *der Zaunkönig?*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 1427. *Zaunkönig.*
Neueste Mannigfalt. IV. p. 454. *Zaunkönig.*
Loniceri, Kräuterb. p. 684. *Königlein.*
Elsholz, Tischb. p. 170.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. Troglodytes.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 20. Troglodytes.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 188. n. 29. Motacilla (Troglodytes) grisea alis nigro cinereoque undulatis.
Kramer, Austr. p. 378 n. 20. *Schneekönig; Könickerl; Zaunschlupferl.*
Charleton, onom. zoic. p. 79. n. 11. Troglodytes.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 324. Passer Troglodytes. Regulus apricus; *Schneekönig*, *Meuse-König*, *Nösselkönig*, *Zaunschlipflin.*
Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. Passer Troglodytes Aldrovandi, perperam Regulus.
Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 290. Passer Troglodytes *Ornithologis*, Passer Sepium *Turnero.*
Rzaczynsky, auct. hist. nat Pol. p. 405. Passer Troglodytes *Gesneri*, Passer sepiarius, Trochilus.

Barre-

Barrere, ornith. Cl. 3. Gen 23. ſp. 1. Trochilus fulvus.

Belon, nat. des oiſ. p. 344. Obſ. p. 17. Roitelet; Boeuf de Dieu; Berichot; Roi bertaud.

Jonſton, av. p. 115. Paſſer Troglodytes.

Bomare, dictionn. X. p. 63. — Diction des anim. III. p. 607.

Onomat. foreſtal. III. p. 1048.

Faun. Arragon. p. 89. — Hiſt. Prov. I. p. 510.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 386. n. 23. *der Zaunkönig.*

β. *Der Zaunkönig von Buenosayres.* (3)

Büffon, Vögel, XVI. p. 231. *der Zaunkönig von Buenosayres;* m. e. Fig.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 548. n. 149. Sylvia (Platenſis) ſupra rufo nigroque varia ſubtus alba, remigibus rectricibusque faſciatis.

γ. *Der louiſianiſche Zaunkönig.* (4)

Büffon, Vögel, XVI. p. 232. *der Zaunkönig von Louiſiana;* m. e. Fig.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 548. n. 150. Sylvia (Ludoviciana) rufo-fuſca, ſuperciliis, genis ſubtusque flaveſcens, remigibus caudaque faſciatis.

168. Furva. *Der Surinamiſche Zaunkönig.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 548. n. 151. Sylvia (Furva) fuſca ſubtus pallidior, dorſo alis caudaque nigricante faſciatis.

Fermin, Surin. II. p. 184. *der Zaunkönig.*

47. Calendula. *Die Rubinkrone.* (5)

Müller, Naturſyſt. II. p. 611. n. 47. *der Ringelkönig.*

Onomat.

(3) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

(4) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

(5) Länge 4. Zoll; Gewicht 4. Drachmen. *Penn.*

Onomat. hist. nat. V. p. 262. *die Pensylvanische Calendula.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 386. n. 237. *die Rubinkrone.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 167. n. 2. *Zaunkönig mit der rubinfarbigen Krone.*

Brisson, ornithol. I. p. 473. n. 18. Poul ou Souci de Pensilvanie.

Büffon, Vögel, XVI. p. 246. *das pensylvanische Königlein.* p. 249. *das rubingekrönte Königlein;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 549. n. 154. Sylvia (Calendula) cinereo-virescens, linea verticali rubini colore, abdomine alisque subtus flavescentibus.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 44. *der rubingekrönte Zaunkönig.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 321. *der Ringelkönig.*

β. *Büffon*, Vögel, XVI. p. 251. *ein Vogel der hinten am Kopfe mit einer Art von karminfarbenen Krone umgeben ist.*

48. Regulus. *Das Goldhähnchen* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 620. n. 48. *der Haubenkönig.*

Leske, Naturgesch. p. 270. n. 8. *der Zaunkönig.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 189. n. 8. *das Goldhähnchen; der Haubenkönig, Sommerzaunkönig.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 193. n. 10. Motacilla (Regulus) remigibus secundariis exteriori margine flavis, medio albis, crista verticali crocea; *das Goldhähnchen.*

Rech-

(6) Gewicht 96. bis 120. Gran, nach *Büffon*. Wird oft mit dem Zaunkönig und Weidenzeisig verwechselt, ob er sich gleich von beyden sehr unterscheidet.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 544. n. 26. *das Goldhähnchen.*

Funke, Naturgesch. I. p. 260. *das Goldhähnchen.*

Ebert, Naturl. II. p. 145. *gekrönter Zaunkönig; Goldhähnchen; deutscher Colibrit.*

Halle, Vögel, p. 328. n. 300. *der Sommerzaunkönig, mit goldner Krone;* Fig. 19.

Meyer, Thiere, I. tab. 34. *Goldhänlein.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 431. n. 374. *der Haubenkönig.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 386. n. 238. *der Haubenzaunkönig.*

Neuer Schaupl. der Natur, III. p. 478. *Goldhänchen.*

Onomat. hist. nat. V. p. 270. *der Sommerzaunkönig.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 274. *das gekrönte Königchen; Goldhähnchen.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 137. *Goldhähnchen.*

Klein, av. p. 76. n. 3. Trochilus. Regulus cristatus.

Klein, Vorbereit. p. 143. n. 3. *Gekröntes Königchen; Sommerzaunkönig; Ochsenäuglein; Goldhähnlein; Streuslein.*

Klein, verb. Vögelh. p. 77. n. 3. *gekröntes Königchen.* p. 167. *Zaunkönig mit der goldnen Krone.*

Klein, Stemmat. av. p. 14. tab. 16. fig. 5. a—c. Id. tab. 28. fig. 2.

Gesner, Vögelb. p. 138. Regulus vel Trochilus. *Goldhendlein; König der Vögel; Parra.*

Brisson, ornith. I. p. 472. n. 17. Poul ou Souci, appellé vulgairement Roitelet hupé.

Büffon, Vögel, XVI. p. 234. *der Haubenkönig, das Goldhähnlein, oder das Königlein;* mit e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 361. *das Goldhähnchen.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 548. n. 152. Sylvia (Regulus) virescens, remigibus secundariis exteriori margine flavis, medio albis, vertice luteo.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 110. *der Zaunkönig.*

Seligmann, VII. tab. 44. *der goldgekrönte Zaunkönig.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 83. n. 190. *der Haubenkönig.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 140. n. 12. *das Goldhähnchen.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 442. *Goldhähnlein.*

Fischer, Livl. p. 102. n. 171. *gekrönter Zaunkönig.*

White, N. G. von Engl. p. 61. n. 10. *Ochsenauge.*

Pallas, nord. Betr. III. p. 2. *der gekrönte Zaunkönig.*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 16. *Fuglekonge.*

Olafsen, Isl. I. p. 311. f. *Rindill; Musarbroder?*

Linné, Abhandl. II. p. 306. n. 140. *der Sommerzaunkönig.*

Pennant, britt. Thiergeschichte. p. 114. tab. 53. Fig. 3.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 197. n. 240. *das Goldhähnlein.*

Naturforsch. XVII. p. 106. n. 219. *der Haubenkönig.*

Naturforsch. XXV. p. 19. *Goldämmerchen.*

Wirsing, Vögel, tab. 14. *Gold-Vögelein. M.* u. W.

Zorn, Petinotheol. I. p. 332. II. p. 94. 150. 395. *Gold-Hähnlein.*

Martini,

Martini, Naturlex. V. p. 211. *gekrönter Zaunkönig; Ochsenäuglein; Tannenmäuslein; Waldzeislein; Weidenmeise; Weidenzeislein*, etc.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 68. *Gold-Hähnchen.*

Naumann, Vogelsteller, p. 151. *Goldämmerchen.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 191. n. 70. *Goldhähnchen.*

Anweis. Vögel zu fang. p. 575. *Goldhähnlein.*

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 397. n. 18. *Goldhähnchen.*

Goeze, Natur, Menschenl. u. Vors. V. p. 226. *das Goldhähnchen.*

André u. Bechstein, Spatzierg. II. p. 337. *Goldhähnchen.*

Beckmann, Naturhist. p. 55. c. *der Zaunkönig.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 460. *gekrönter Zaunkönig.*

Hanöv. Seltenh. der Nat. I. p. 284.

Tänzer, notab. Venatoris, p. 111. *Goldhähnchen.*

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. Regulus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 22. Regulus cristatus.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 188. n. 30. Motacilla (Regulus) remigibus secundariis exteriori margine flavis, medio albis.

Kramer, Austr. p. 378. n. 21. Motacilla remigibus secundariis exteriori margine flavis, medio nigris. *Goldhannel.*

Charleton, onom. zoic. p. 89. n. 1. Regulus cristatus.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 344. Regulus. *Gold-Hänlin; Ochsen-Euglin; Streuslin; Tan-Meislin; Wald-Zinslin.*

Sibbald, Scot. illustr. III. 3. 4. p. 18. Parus sylvaticus.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 404 Parus sylvaticus; p. 417. Regulus cristatus; Cladorinchus, Regaliolus, Regillus, Senator, Rex avium, Calendula.

Belon, nat. des oiſ. p. 345. Poul; Soulcie, Soucie, Sourcicle.

Borlaſe, nat. hiſt. of Cornwall. p. 247. Regulus criſtatus; Wood-Titmouſe of Gesner.

Barrere, ornithol. Cl. 2. gen. 23. Trochilus criſtatus. gen. 24. Parus nigricans, macula rubente in vertice.

Salerne, nat. des oiſ. p. 239 Roitelet crete; Sucet; Suet; petit boeuf; Biſſourdet.

Bomare, diction. X. p. 65. — Diction. des anim. III. p. 707.

Hiſt. Prov. I. p. 509. Roitelet.

Philoſ. Transact. XXVIII. p. 170.

Jonſton, av. pag. 120. Parus ſylvaticus. p. 114. Regulus.

Plin hiſt. nat. L. 10. c. 74. Trochilus, Rex avium?

Hermann, tab. affin. anim. p. 224. ff. Mot. Regulus.

Donndorff, Handb. d. Thiergeſchich. p. 387. n. 24. *das Goldhähnchen.*

β. *Büffon*, Vögel, XVI. p. 255. *das Meiſenköniglein;* m. e Fig.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 549. n. 153. Sylvia (Elata) criſtata vireſcens, ſubtus cinereo-albida, occipite criſſoque pallide flavo, rectricibus alarum margine, rectricibusque lateralibus apice albis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 225. Regulo-Parus.

49. Tro-

49. TROCHILUS. *Der Weidenzeisig.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 620. n. 49. *der Läufer.*
Leske, Naturgesch. p. 270. n. 9. *der Weidenzeisig.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 191. n. 10 *der Zaunkönig; grüner König; die kleinste Grasmücke.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 543. n. 24. *der Weidenzeisig.*
Ebert, Naturl. II. p. 144. *der kleinste Zaunkönig; Winterkönig.*
Halle, Vögel, p. 328. n. 299. *der Zaunkönig.*

Zz 3 *Gatte-*

(7) Fast unter allen Motacillen ist bey keiner die Verwirrung und Verwechselung der Synonymen grösser als hier. Man hat diesen Vogel oft mit der *Motacilla Salicaria*, oft mit der *M. Hippolais*, oft auch mit dem Weibchen der *M Regulus* verwechselt. Eben so ist es auch mit den in unserm System hieher gerechneten Varietäten beschaffen, die ich hin und wieder theils bald als Spielarten von andern Gattungen, theils als ganz eigene Gattungen aufgeführt und wieder mit andern Synonymen verwechselt finde. Neuerlich hat *Bechstein* (Naturforsch. XXVII. p. 50. und 54.) die Sache auf eine ganz andere Art aus einander gesetzt. Er trennt den *Yellow Wren* des *Pennant*, von dem *Pouillot* des *Büffon*, nennt erstern den *Fitis* (Motacilla Fitis) und verbindet den letztern, den er *Weidenzeisig* nennt, mit der *Motacilla Trochilus Linn.* — Als deutsche Synonymen vom *Fitis* werden p. 54. angegeben: *Große Weidenzeisig; Sommerkönig; Wisperlein; Asilvogel*, in Thüringen: *Laubvögelchen.* — Vom *Weidenzeisig* finden sich p. 58. folgende Synonymen: *Kleiner Weidenzeisig; grüner König; kleinste Grasmücke; Tyrannchen; Schmittel; Weidenzeislein; eigentliche Grasemücke; kleine gelbrothe Grasemücke; Läufer; Mitwaldlein;* in Thüringen: *kleinstes Laubvögelchen* Das Gewicht des erstern beträgt 2. Quentchen, des letztern 1 1/2 Quentchen. — Der *Fitis* finde ich auch in *Naumanns* Vogelsteller p. 147. gedacht — Es soll *Frischens Weidenzeisig*, tab. 24 Fig. 1. seyn. S. Naturgesch. Deutschl. III. p. 608. it. N. G. des In- und Auslandes p. 543. n. 23. — *Latham* citirt hier noch *Frisch*, tab. 24. Fig. 2 so aber zu *Muscicapa atricapilla*, p. 934. n. 9. gehört S. oben Anmerk. 2. bey *Muscicapa atricapilla.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 431. n. 373. *der Sommerkönig; das Seidenvögelchen; Tyrannchen; Smittl.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 385. n. 326. *der gelbe Sänger.*

Onomat. hist. nat. III. p. 891. *der Asilvogel.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 137. *Sommerkönig; Weidenzeisig.*

Klein, av. p. 76. n. 2. Trochilus capite laevi.

Klein, Vorbereit. p. 143. n. 2. *Sommer-Tyrannchen.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 77. n. 2. *Sommerkönig-Tyrannchen.*

Brisson, ornith. I. p. 441. n. 45. Pouillot ou Chantre.

Büffon, Vögel, XVI. p. 201. *der Pouillot oder Sänger;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 362. *der Zaunkönig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 550. n. 155. Sylvia (Trochilus) cinereo-virens, alis subtus tectricibusque flavescentibus, superciliis luteis.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 141. n. 13. *die kleine Grasmücke.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 442. *der Läufer; gelber Sticherling.*

Cetti, Sardin. II. p. 222. *der Zaunkönig?*

White, N. G. von Engl. p. 32. 33. n. 1. p. 58. n. 2. p. 65. n. 4. *kleinster Zaunkönig?*

Pontoppidan, Dännem. p. 174. n. 17. *Spurrekonge; Fagerfis.*

Hasselquist, Palaest. (Ed. germ.) p. 338. n. 52. Motacilla hispanica.

Bartram, Reis. d. Carolina, p. 300. *der gelbbrüstige Sänger.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 14. *der Zaunkönig mit gelben Augenbraunen.*

Teng-

Tengmalm: neue Schwed. Abhandl. IV. p. 52. M. Trochilus.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 195. n. 238. *das Weidenzeißlein.*

Naturforsch. XVII. p. 106. n. 220 *der Laufer.*

Naturforsch. XXVII. p. 54. n. 6. *der Weidenzeisig.* (Siehe unten Anmerk. n. 7.)

Borkhausen, Magazin, I. p. 191. n. 71. *Sommerkönig; Bachkönig; Weidenzeischen.* p. 192. *Backöfchen.*

Zorn, Petinotheol. II p. 391. *die eigentliche Grasmücke; Weiden Zeißlein.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 68. *Weiden Zeisig.*

Martini, Naturlex. V. p. 116. *der Läufer.*

Tänzer, notabil. Venator. p. 111. *Weiden-Zeisig.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 194. *der Sänger*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 31. n. 23. Regulus non cristatus.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 188. n. 31. Motacilla (Trochilus) cinereo-virens, remigibus subtus flavescentibus, superciliis luteis.

Kramer, Austr. p 378. n. 22. Motacilla cinereovirescens, subtus flavescens, superciliis luteis. *Schmittl.*

Charleton, onom. zoic. p. 89. n. 2. Asilus.

Möhring, av. gen. p. 44. n. 35. Asilus.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 417. Regulus non cristatus.

Jonston, av. p. 114 Regulus non cristatus.

Barrere, ornithol. Cl. 3. gen. 23. sp. 2. Trochilus ex flavo cinereus, capite nigro.

Belon, nat. des oil. p. 344. Chantre ou Chanteur.

Salerne, ornithol. p. 242 Chafty.

Faun. Arragon. p. 89. — Hist. prov. I. p. 510.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 388. n. 25. *der Weidenzeisig.*

β. *Der* (sogenannte) *gelbe Zaunkönig.* (8)

Klein, av. p. 86. n. 11. Parus luteus Carolinensis.

Klein, Vorbereit. p. 161. n. 11. *gelbe Meise aus Karolina.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 89. n. 11. *gelbe Meise.*

Brisson, ornith. I. p. 443. n. 48. Figuier de la Caroline.

Büffon, Vögel, XVI. p. 111. *der braun und gelbe Feigenfresser;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 550. n. 155. β.

Seligmann, Vögel, III. tab. 26. *die carolinische gelbe Meise.*

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 68. *der gelbe Zaunkönig.*

Schriften der berlin. Gesellsch. N. Fr. III. p. 195. Motacilla Acredula.

Naturgesch. aus den best. Schriftst. m. Merian. Kupf. p. 785. *der braun und gelbe Feigenvogel.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 31. n. 24. Regulus cinereus.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 189. n. 22. Motacilla (Acredula) supra cinereo virescens, remigibus fuscis, septimo octavo nono apice albis.

γ. *Der große Weidenzeisig.*

Brisson, ornithol. I. p. 442. n. 45. A. grand Pouillot.

Büffon, Vögel, XVI. p. 213. *der große Sänger.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 550. n. 155. δ.

δ. *Hasselquist*, Palaest. (Ed. germ.) p. 337. n. 51. Motacilla corpore ex fusco viridescente, pectore ferrugineo.

Büffon, Vögel, XVI. p. 209. *die Bachstelze mit grünlichbraunem Leibe, und rostfarbiger Brust.*

Latham,

(8) Nach *Brisson*, u. a. eine eigene Gattung.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 551. n. 156. Sylvia (Mediterranea) fusco-virescens subtus ferruginea, collo subtus pectoreque fulvis. (9)

169. AESTIVA. *Die canadische Sommermotacille.* (10)

Pennant, arct. Zool. II. p. 374. n. 209. *der Gelbkopf.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 381. n. 224. *der olivenfarbige Sänger.*

Brisson, ornith. I. p. 444. n. 51. Figuier de Canada.

Büffon, Vögel, XVI. p. 89. *der gefleckte Feigenfresser;* m. e. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 183.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 551. n. 157. Sylvia (Aestiva) viridi-olivacea subtus flava, collo subtus pectoreque maculis rubescentibus, rectricibus lateralibus, intus luteis.

(9) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

(10) In unserm System ist *Büffons Figuier de Canada*, pl. enl. n. 58. Fig. 2. als Varietät: *Motacilla corpore supra fusco*, aufgeführt. Ich habe indessen alle Synonymen unter der Hauptbenennung zusammen gefasst und bemerke nur noch, wie sehr die Ornithologen auch hier in deren Auseinandersetung von einander abweichen. — *Büffon* hält den, in den *Pl. enl.* tab. 58. Fig. 1. abgebildeten Vogel *(Figuier de la Caroline)* für das Weibchen von Fig. 2 *(Figuier de Canada)* — *Pennant* hält beyde für ganz verschiedene Gattungen: rechnet *Brissons Ficedula canadensis*, *Büffons Figuier tacheté*, und Pl. enl. tab. 58. Fig. 2. *Figuier de Canada*, zu seinem *Yellow-poll Warbler;* — Pl. enl. Fig. 1. aber *Figuier de la Caroline*, zu seinem *Olive Warbler.* — *Latham* ist ihm hierin gefolgt, und führt den *Yellow-poll-Warbler*, mit den dahin gezogenen Synonymen unter der Trivialbenennung *Sylvia Aestiva;* den *Olive-Warbler* aber als *Sylvia Carolinensis* auf. Von ersterm sagt *Pennant:* Sein Nest sey sehr schön, und aus Daunen mit verwelktem Grase untermischt, gemacht; die inwendige Seite sey mit feinen Fasern gefüttert; die Eyer seyen an dem breiten Ende gefleckt. Der Vogel sey aus Neu-York unter dem Namen *Swamp-Bird* (Sumpfvogel) gesandt.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 551. n. 158. Sylvia (Carolinensis) viridi-olivacea subtus flavescens, remigibus caudaque fuscis, rectricibus flavo-marginatis.

170. Sutoria. *Der Schneidervogel* (1)

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 193. n. 11. Motacilla (Sartoria) tota pallide lutea; *der Schneidervogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 551. n. 159. Sylvia (Sutoria) tota flava.

Naturforsch. I. p. 270. n. 8. Motacilla Sutoria; Oiseau Tailleur; Taylor Bird; *die Schneider-Bachstelze; Nätherin.*

Smellie, Philos. der Naturgesch. II. p. 63. *der Schneidervogel*

Sander, Natur und Relig. p. 124. *der Schneidervogel.*

Berlinische Samml. IX. p. 192. *der Schneidervogel.*

Neueste Mannigfaltigk. I. p. 192. *der Schneidervogel;* m. e. Fig.

Göttingischer Taschenkalender 1781. *Schneidervogel.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 388. n. 26. *der Schneidervogel.*

50. Caffra. *Die caffersche Motacille.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 173. n. 51. *der Hottentot.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 514. n. 22. Sylvia (Caffra) olivacea, gula caudaque ferrugineis, superciliis albis.

Neueste Mannigfaltigk. IV. p. 140. *Hottentotten-Bachstelze.*

171. Gu-

(1) Gewicht, nach *Pennant*, 3/16. einer Unze.

171. Gularis. *Die schwarzkehlige Motacille.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 160. Sylvia (Gularis) supra ferruginea, subtus alba, gula alis caudaque nigris.

172. Flavicauda. *Die gelbschwänzige amerikanische Motacille.* (2)

Pennant, arct. Zool. II. p. 379. n. 218. *der Gelbschwanz.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 167. n. 2. *gelbschwänziger Fliegenstecher.*

Seligmann, Vögel, VII. tab. 47. *der Fliegenfänger mit gelbem Schwanz.*

173. Tschekantschia. *Die zwitschernde Motacille.* (3)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 552. n. 161. Sylvia (Tschecantschia) supra nigricans, subtus ferruginea, capite atro, nucha albicante, torque et macula alarum oblonga albis, dorso nigro.

Lepechin, Tageb. der russ. Reis. II. p. 186. tab. 7. fig. 2. *Tschekantschik.* Motacilla superne nigricans torque albo interrupto, inferne ferruginea, capite atro, nucha albicante, macula alarum oblonga candida, dorso nigro, marginibus pennarum rufescentibus.

174. Melanope. *Die schwarzfüßige Motacille.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 503. n. 5. Motacilla (Melanopa) caerulescenti-cinerea, subtus flava, loris et gutture nigris, superciliis et rectricibus utrinque 3. lateralibus albis, extima margine exteriore nigra.

Pallas, Reis. Ausz. III. Anh. p. 7. n. 16. Motacilla *Melanope.*

51. Boa-

(2) Nach *Latham* mit *Muscicapa Ruticilla*, p. 935. n. 10. einerley.

(3) Das russische Wort *Tschekanie* bedeutet *Zwitschern.*

51. Boarula. *Die Kuhstelze.* (4)

Müller, Natursyst. Suppl. p. 173. n. 50. *die Rinderstelze.*

Halle, Vögel, p. 337. n. 311. *die gelbe Bachstelze?*

Klein, av. p. 78. n. 7. Sylvia flava.

Klein, Vorbereit. p. 146. n. 7. *Kuhstelze.*

Klein, Stemmat. av. p. 16. tab. 7. fig. 7. a—c.

Klein, Vögeleyer, p. 26. tab. 20. fig. 18.

Klein, verb. Vögelhist. p. 79. n. 10. *Kühstelze; gelbbrüstige Bachstelze.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 540. n. 16. *die Kuhstelze.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 607. *gelbbrüstige Bachstelze.*

Brisson, ornithol. I. p. 439. n. 41. Bergeronette jaune.

Büffon, Vögel, XVI. p. 58. *der gelbe Sticherling;* m. e. Fig. cf. p. 66.

Latham, Syn. Suppl. p. 178.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 502. n. 4. Motacilla (Boarula) cinerea, subtus flava, rectrice prima tota, secunda latere interiore alba.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 49. *die graue Bachstelze.*

Frisch, Vögel, tab. 23. fig. 2. a. *die gelbbrüstige Bachstelze.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 187. n. 226. *die Kuhstelze.*

Samml. zur Phys. und N. G. III. p. 253 *die kleine gelbe Bachstelze.*

Martini, Naturlex. V. p. 74. *die gelbe Bachstelze.*

Neueste Mannigfalt. IV. p. 136. *graue oder gelbe Bachstelze.*

André

(4) S. oben die Anmerk. 1. bey *Motacilla flava*, n. 12.

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 177. *die gelbe Bachstelze.*

Naturgesch. mit Merian. Kupf. Vög. p. 768. *gelbe Bachstelze.*

Zorn. Petinotheol. II. p. 434. *die gelbe Bachstelze?*

Linné, Syst. Nat. Edit. XII. I. p. 331. ad n. 12. Motacilla cinerea.

Charleton, onomast. zoic. p. 90. n. 2. Motacilla flava.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 307. Motacilla flava. *Kuhstelze; kleine Bachstelze; geele Bachstelze; Kuhscheiße.*

Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. Motacilla flava.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 396. Motacilla flava; Motacilla minor; Florus.

Jonston, av. p. 121. Motacilla flava.

Barrere, ornithol. Cl. 3. Gen. 19. Sp. 3. Sylvia flava.

Belon, hist. nat. des ois. p. 351. Bergerette, ou Bergeronette jaune.

Schaefer, element. ornithol. tab. 23. fig. 1.

Faun. Arragon. p. 85. n. 11.

Zinnan. Uov. p. 51. tab. 7. Fig. 39. Coda tremola gialla.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 388. n. 27. *die Kuhstelze.*

β. *Pallas*, Reis. Ausz. III. p. 6. n. 15. Motacilla campestris.

γ. *Brisson*, ornithol. I. p. 440. n. 42. Bergeronette de Java. (5)

Büffon, Vögel, XVI. p. 64. *der Sticherling von Java.*

Latham, Syn. II. 2. p. 339. n. 4. A. Javan Wagtail.

Latham,

(5) Nach *Brisson* eine eigene Gattung.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 503. n. 4. β. Motacilla fusco-olivacea subtus flava, collo inferiore et pectore griseis, rectrice prima tota, secunda et tertia latere interiore, apiceque albis.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 125. Gattungen vermehrt. Bey der 1sten Gattung sind *drey*, bey der 9ten *drey*, bey der 11ten *zwey*, bay der 12ten *fünf*, bey der 14ten *zwey*, bey der 17ten *zwey*, bey der 18ten *vier*, bey der 35ten *zwey*, bey der 37ten *zwey* Varietäten aus einander gesetzt. Bey der 15ten sind die Varietäten γ und δ, bey der 34ten die Varietäten β und γ hinzugekommen.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Büffons Locustelle.*

Büffon, ois. V. p. 42. La Locustelle.

Büffon, Vögel, XIV. p. 214. *die Grillenlerche.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 515. n. 25. Sylvia (Locustella) fusco-viridis, maculis nigricantibus, subtus flavescens, pectore saturatiore, cauda cuneata, rectricibus apice mucronatis.

Halle, Vögel, p. 315. n. 277. *die Lerchenheuschrekke.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. VIII. p. 694. *die Lerchenheuschrekke.*

Ich weiss nicht, was ich aus diesem Vogel machen soll. *Latham* verwechselt — so scheint mirs wenigstens, — eine grosse Anzahl Synonymen, die zu *Alauda trivialis* p. 796. n. 5. gehören, mit dieser, mir ganz unbekannten Gattung, und zieht so gar seinen *Grashopper Warbler* II 2. p. 429. n. 20. hieher. Man muss die vorher angeführte Stelle selbst nachlesen.

2. *Sylvia*

2. *Sylvia Zya.* *Scopol.* ann. I. n. 234.

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 193. n. 234. *der braun und röthlicht bunte Fliegenvogel.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 188. n. 65. *Weißkehlchen; Braunellchen.*

Etwa ein Weibchen von *Motacilla Rubecula?*

3. *Die graue Grasmücke.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 535. n. 4. *die graue Grasmücke; weiße blasse Grasmücke; der Dornreich.* Motacilla dumetorum.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 604.

4. *Die Südliche Motacille.*

White, Reise nach Neusüdwallis — in dem Magazin merkw. Reisebeschr. V. p. 128. *die Südliche Bachstelze.* (Ed. angl. tab. p. 239.)

Meyer, zool. Entdeck. p. 54. n. 1. Motacilla (Australis) cinerea, subtus flava, gula fere albida.

Götting. gelehrt. Anzeig. 1791. p. 50.

An *Motacilla* aut *Muscicapa?*

5. *Der Traquet vom Vorgebürge der guten Hoffnung.*

Buffon, oif. V. p. 233. Traquet du Cap de bonne esperance.

Buffon, Vögel, XV. p. 272. *das Capische Weißkehlchen*

Latham, Syn. II. 2. p. 450. n. 47. Var. A. Sybil Warbler.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 523. n. 51. Sylvia (Sperata) fusco-viridis, subtus uropygioque rufo-grisea, rectricibus duabus intermediis nigricantibus, lateralibus fusco-fulvo oblique dimidiatis.

Martini,

Martini, Naturlex. V. p. 201. *Kapisches Weißkehlchen.*

Etwa das Weibchen von *Motacilla Sybilla?*

6. Motacilla (Cucullata) virens, subtus flava, fronte genisque nigris, cauda cuneiformi.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 528. n. 72. Sylvia cucullata.

Vielleicht eine Varietät von *Motacilla Mitrata.*

7. Motacilla (Minima) pallide fusca, subtus albida, rostro caudaque brevissima flavescentibus.

Latham, Syst. ornith. II. p. 529. n. 78. Sylvia Minima.

Vielleicht eine Varietät von *Motacilla Longipes;* oder von der nachher anzuführenden *Motacilla Pusilla.*

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der Spitzkopf.*

Bechstein: Naturforsch. XXVII. p. 43. n. 2. Motacilla (Longirostra) fronte fusca, et in fine caudae fuscae lineola flavescente.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 543. n. 21. *der Spitzkopf.*

2. *Das Laubvögelchen.*

Bechstein: Naturforsch. XXVII. p. 47. n. 4. Motacilla (Sibillatrix) superciliis luteis, supra virescens, subtus flavescens.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 544. n. 25. *das Laubvögelchen; der Zischer.*

3. *Die gesperberte Grasmücke.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 537. n. 9. Motacilla Nisoria. *Die gesperberte Graßmücke; großs Graßmücke; großer Feigenfresser.*

4. *Die*

4. *Die kleinliche Bachstelze.*

White, Voy. to new South-Wales, tab. p. 257.

White, Reis. nach Neusüdwallis; in dem Magaz. merkw. Reisebeschr. V. p. 128. *die kleinliche Bachstelze.*

Meyer, zool. Entdeck. p. 56. n. 3. Motacilla (Pusilla) fusca subtus pallida, cauda prope apicem fascia fusca.

5. *Die schöne Bachstelze.*

White, Reis. nach Neusüdwall. l. c. Motacilla elegans.

6. Motacilla (Sylviella) cinereo-fusca, subtus sordide alba, rectricibus duabus intermediis brevioribus subalatis.

Latham, Syn. Suppl. p. 185. Lesser White-throat, tab. 113.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 515. n. 24. Sylvia Sylviella.

7. Motacilla (Canescens) fusco-canescens, subtus alba, capite nigro, fronte albo-striata, pectore crissoque striis nigris, macula alarum rectricum basi marginibusque fulvis.

Latham, Syn. Supplem. p. 187. Van Diemens Warbler.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 553. n. 168. Sylvia canescens.

Meyer, zool. Entdeck. p. 57. n. 5. Motacilla canescens.

8. Motacilla (Aequinoctialis) fusco-testacea, subtus alba, uropygio pallido, rectricibus fasciis obsoletis.

Latham, Syn. Suppl. p. 187. Equinoctial Warbler.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 553. n. 169. Sylvia Aequinoctialis.

Ist nicht mit *Motacilla Aequinoctialis* p. 972. n. 110. zu verwechseln.

9. Motacilla (Nigricollis) subcristata, supra pallide grisea, subtus incarnata, pileo cervice remigibus rectricibusque nigris.

Latham, Syn. Suppl. p. 187. Black-necked Warbler.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 553. n. 170. Sylvia Nigricollis.

10. Motacilla (Plumbea) plumbea, subtus cinerea, remigibus rectricibusque obscuris.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 553. n. 171. Sylvia Plumbea.

11. Motacilla (Cambaiensis) fusco-nigricans, subtus nigra nitida, abdomine imo crissoque rufo-ferrugineis, tectricibus alarum albis.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 554. n. 172. Sylvia Cambaiensis.

12. Motacilla (Guzurata) virescens subtus alba, vertice spadiceo, remigibus caudaque fuscis.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 554. n. 173. Sylvia Guzurata.

* 13. Motacilla (Asiatica) fusca, subtus flavicans, capite colloque nigris, loris gulaque albis, cauda elongata.

β. Motacilla fusca, fronte superciliis corporeque subtus albis, rectricibus lateralibus dimidiato-albis.

Latham, Syst. ornith. II. p. 554. n. 174. Sylvia Asiatica.

115. GE-

115. GESCHLECHT. Pipra. *Der Manakin.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 621. Gen. CV. *Zeiſig.*
Leske, Naturgeſch. p. 264. Gen. XLVI.
Borowsky, Thierreich, III. p. 161. Gen. LXVI.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 192. Gen. XXXVII.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 550. Gen. LXXVI.
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 190. Gen. LXXIX.
Onomat. hiſt. nat. VI. p. 521.
Briſſon, ornithol. II. p. 166. Gen. LV. Rupicola, p. 167. Gen. LVI. Manacus.
Büffon, Vögel, XIII. p. 65. ſqq.
Latham, Syſt. ornithol. II. p. 554. Gen. XLIV.
Hermann, tab. affin. anim. p. 222.
Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 389. Gen. LXXXIV.

1. Rupicola. *Der Felſenhahn.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 621. n. 1. *der Steinzeiſig.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 161. n. 1. *der Felſenhahn.* tab. 66.
Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 193. n. 1. Pipra (Rupicola) criſta erecta margine purpurea, corpore croceo, tectricibus rectricum truncatis.
Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 550. *der Felſenhahn; Bergzeiſig.*
Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 190. *der Felſenhahn.*
Onomat. hiſtor. natur. VI. p. 859. *der gelbe Wiedehopf.*
Briſſon, ornith. II. p. 166. n. 1. Coq-de-roche.
Büffon, Vögel, XIII. p. 109. *der Klippenhahn.*
Latham, Syſt. ornith. II. p. 554. n. 1. Pipra (Rupicola) criſta erecta margine purpureo, corpore croceo, tectricibus rectricum truncatis.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 54. *der Wiedehopf.*
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 748. *der Felsenhahn.*
Götz: Naturforsch. XIX. p. 78. *der Felsenhahn.*
Neueste Mannigfalt. II. p. 125. *der Felsenhahn.*
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 21. n. 2. Upupa crocea.
Barrere, Franc. equinox. p. 132. Gallus ferus saxatilis, croceus, cristam e plumis constructam gerens.
Barrere, ornithol. Cl. 3. Gen. 21. sp. 2. Upupa americana, crocea saxatilis.
Gerin. ornith. II. p. 64. tab. 206. Upupa americana lutea.
Bomare, diction. II. p. 628. Coq de roche.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 389. n. 1. *der Felsenhahn.*

β. *Der peruanische Felsenhahn.* (6)
Büffon, Vögel, XIII. p. 115. *der peruanische Klippenhahn;* m. e. Fig.
Latham, Syn. II. 2. p. 519. n. 1. A. Peruvian Manakin.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 555. n. 2. Pipra (Peruviana) corpore croceo-rubro, tectricibus alarum maioribus cinereis, remigibus caudaque nigris, tectricibus rectricum non truncatis.
* Naturforsch. XVII. p. 14.
Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 749. *der peruvianische Felsenhahn.*

2. PAREOLA. *Der blaurückige Manakin.*
Müller, Natursystem, II. p. 622. n. 2. *der Meisenzeisig.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 162. n. 2. *der schwarze Manakin.*

(6) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

Brisson, ornithol. II. p. 172. n. 10. Manakin noir hupé.

Büffon, Vögel, XIII. p. 70. *der Tije oder große Manaki;* m. 2. Figg.

Latham, Syst. ornith. II. p. 555. n. 3. Pipra (Pareola) crista sanguinea, corpore nigro, dorso caeruleo.

Onomat. histor. natur. V. p. 29. Manacus cristatus niger.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 58. *der Manakin mit blauem Rücken.*

Jonston, av. p. 206. Tijeguacu Brasiliensibus.

14. SUPERBA. *Der dreyfarbige Manakin.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 556. n. 4. Pipra (Superba) aterrima, verticis mediis plumis longiusculis et flammeo-rubris, dorsi inter alas area lunata dilute caerulea, remigibus primoribus fuscescentibus.

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 11. *der dreyfarbige Manakin*, tab. 3. Fig. 1.

Onomat. hist. nat. V. p. 31. Manacus superbus *Pall.*

3. CRISTATA. *Der purpurfarbige Manakin.*

Müller, Natursyst. II. p. 622. n. 3. *Haubenzeisig.*

Halle, Vögel, p. 379. n. 374. *der purpurfarbene kleine Sperling mit dem güldnen Fließe.*

Onomat. histor. natur. V. p. 29. *gehaubter Rothschnabel.*

Klein, av. p. 90. n. 14. Passer cristatus, rostro rubro.

Klein, Vorbereit. p. 167. n. 14. *gehaupteter Rothschnabel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 91. n. 13. *gehaubter Rothschnabel.*

Brisson, ornith. II. p. 173. n. 12. Manakin rouge hupé.

Büffon, Vögel, XIII. p. 96. *Picicitli, oder der ganz kleine und gekappte brasilianische Vogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 559. n. 15. Pipra (Cristata) crista lutea, corpore purpureo, cauda rubra.

Fermin, Surin. II. p. 176. *das Surinamische Zeislein.*

4. RUBETRA. *Der rothgelbe Manakin.*

Müller, Natursystem, II. p. 622. n. 4. *der Gelbbusch.*

Halle, Vögel, p. 504. n. 566. *das gelbrothe Kolibrispechtchen, mit zerscheiteltem Federbusche.*

Onomat. hist. nat. V. p. 30. *der Gelbschups.*

Klein, av. p. 108. n. 10. Falcinellus rubetra.

Klein, Vorbereit. p. 199. *Gelbschups.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 110. n. 13. *Gelbschopf.*

Brisson, ornithol. II. p. 173. n. 11. Manakin roux hupé.

Büffon, Vögel, XIII. p. 94. *Rubetra, oder der gekappte Amerikanische Vogel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 559. n. 17. Pipra (Rubetra) crista lutea, corpore testaceo, remigibus rectricibusque *testaceis* (für *caeruleis*).

15. TORQUATA. *Der Manakin mit dem Halsbande.*

Brisson, ornithol. II. p. 172. n. 8. Manakin à collier.

Büffon, Vögel, XIII. p. 92. *der Vogel, der bey den Brasilianern den Namen Maizi de Miacatototl führt.*

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 560. n. 18. Pipra (Torquata) nigra, capite rubro, collo torque aureo cincto, alis caeruleis, cauda nigra.

16. Grisea. *Der graue Manakin.*

Halle, Vögel, p. 379. n. 376. *der buntflüglige Sperling mit liegendem Federbusche.*

Klein, av. p. 90. n. 16. Passer in occipite cristatus, crista plumacea dependente.

Klein, Vorbereit. p. 168. n. 16. *Strausssperling.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 92. n. 15. *Strausssperling.*

Brisson, ornithol. II. p. 174. n. 13. Manakin gris hupé.

Büffon, Vögel, XIII. p. 98. *Coquantototl, oder der kleine gehäubte Vogel in Sperlingsgestalt.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 560. n. 20. Pipra (Grisea) cristata grisea, subtus flavescens, sincipite luteo, tectricibus alarum minoribus flavescentibus, maioribus rubris.

5. Albifrons. *Der weißbuschige Manakin.*

Müller, Natursyst. II. p. 622. n. 5. *Weißbusch.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 183. *der Zartschnabel mit weißem Gesichte;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 560. n. 21. Pipra (Albifrons) crista alba, corpore rubro testaceo, dorso nigro, gutture albo nigro marginato, femoribus caerulescentibus.

Seligmann, Vögel, IX. tab. 34. *der Manakin mit weißem Gesichte.*

β. *Büffon*, Vögel, XIII. p. 100. *der weißstraußigte Manaki.*

Latham, Syn. II. 2. p. 531. n. 18. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 561. n. 21. β.

6. ERYTHROCEPHALA. *Der goldköpfige Manakin.*

Müller, Natursyst. II. p. 622. n. 6. *der Goldkopf.*

Onomat. hist. nat. V. p. 28. *der rothköpfige Dornreich, mit schwarzem Körper, purpurnen Rükken, und kurzem Schwanze.*

Onomat. histor. natur. II. p. 827. *der Chichiltototlvogel.*

Klein, av. p. 94. n. 7. Linaria Mexicana.

Klein, Vorbereit. p. 175. n. 7. *gelber Dickkopf.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 100. *gelber Dickkopf.*

Klein, av. p. 86. n. 13. Parus auro-capillus.

Klein, Vorbereit. p. 161. n. 13. *rothköpfiger Dornreich.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 89. n. 13. *rothköpfiger Dornreich.*

Brisson, ornith. II. p. 169. n. 4. Manakin à tête d'or.

Büffon, Vögel, XIII. p. 82. *der goldköpfigte Manaki;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 556. n. 7. Pipra (Erythrocephala) nigra, vertice armillisque fulvis.

Halle, Vögel, p. 363. n. 354. *die schwarze goldköpfige Meise.*

Samml. zur Phys. und N. G. II. p. 747. *der weißkuppichte Manakin.*

Halle, Vögel, p. 395. n. 401. *der amerikanische schwarze Hänfling mit goldfarbenem Kopfe.*

Seligmann, Vögel, I. tab. 41. *die schwarze Meise mit dem goldfarbenem Kopf.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 203. n. 248. *die schwarze Meise mit rothgelbem Kopf.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 191. n. 10. Parus (Erythrocephalus) niger capite femoribusque fulvis.

Petiv.

Petiv. Gaz. tab. 46. Fig. 7. Avicula nigra, capite e luteo croceo.

Seba, muſ. I. p. 96. tab. 60. Fig. 7. Avicula Mexicana de Chichiltototl.

β. *Der rothköpfige Manakin.* (7)

Halle, Vögel, p. 395. n. 401. *der amerikaniſche ſchwarze Hänfling, mit rothem Kopfe.*

Onomat. hiſt. nat. V. p. 31. Manacus rubro-capillus.

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 100. n. 7. *rother Dickkopf.*

Briſſon, ornithol. II. p. 170. n. 5. Manakin à tête rouge.

Büffon, Vögel, XIII. p. 82. *der rothköpfigte Manaki.*

Latham, Syn. II. 2. p. 523. n. 5. A.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 557. n. 8. Pipra nigra, vertice armillisque rubris.

Salerne, ornith. p. 250. Tangara appellé Manakin.

Jonſton, av. p. 209. Tangarae ſecunda ſpecies Braſilienſibus.

7. Aureola. *Der roth und ſchwarze Manakin.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 623. n. 7. *der Rothkopf.*

Briſſon, ornith. II. p. 170. n. 6. Manakin rouge.

Büffon, Vögel, XIII. p. 76. *der rothe Manaki;* m. e. Fig.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 558. n. 11. Pipra (Aureola) nigra capite pectoreque coccineis, remigibus antrorſum macula alba.

Seligmann, Vögel, VIII. tab. 51. *der rothe und ſchwarze Manakin.*

Samml. zur Phyſ. und N. G. II. p. 747. *der rothe Manakin.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 191. n. 11. Parus (Aureola) niger, capite pectoreque coccineis, remigibus antrorſum macula alba.

(7) Nach *Briſſon* eine eigene Gattung.

β. *Der schwarz und gelbe Manakin.* (*)

Brisson, ornithol. II. p. 171. n. 7. Manakin orangé.

Büffon, Vögel, XIII. p. 80. *der pomeranzenfarbigte Manaki;* m. e. Fig.

Latham, Syn. II. 2. p. 525. n. 9. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 558. n. 11. β. P. nigra, capite collo inferiore pectore abdomine marginibusque alarum aurantiis, remigibus intus macula alba.

Samml. zur Phys und N. G. II. p. 747. *der orangefarbene Manakin.*

8. Leucocephala. *Der weißköpfige Manakin.*

Müller, Natursyst. II. p. 623. n. 8. *der Weißkopf.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 521. *der Weißkopf.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 107. *die weißköpfige Surinamische Pipra.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 557. n. 9. Pipra (Leucocephala) nigra, capite albo.

9. Leucocapilla. *Der weißkappige Manakin.*

Müller, Natursystem, II. p. 623. n. 9. *der Rohrzeisig.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 162. n. 3. *der weißgehäubte Manakin.*

Halle, Vögel, p. 379. n. 377. *der schwarze Sperling, mit weißer Opferhaube; Schleiersperling.*

Onomat. hist. nat. V. p. 28. Manacus albo-capillus.

Klein, av. p. 90. n. 17. Passer toto corpore niger, vitta alba.

Klein, Vorbereit. p. 168. n. 17. *Weißkopf.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 92. n. 16. *Weißkopf*, p. 168. *weißköpfige Meise.*

Brisson, ornithol. II. p. 169. n. 3. Manakin à tête blanche.

Büffon,

(*) Nach *Brisson* und *Büffon* eine eigene Gattung.

Büffon, Vögel, XIII. p. 8. *der weißköpfigte Manaki*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 557. n. 8. Pipra (Leucocapilla) atra, pileo albo.

Seligmann, Vögel, VII. tab. 5. *der weißgekappte Manakin.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 9. Parus (Pipra) ater, capite supra albo.

Seba, II. p. 102. tab. 96. Fig. 5. Avis de Cacatototl toto corpore nigra, cum vitta alba.

10. GUTTURALIS. *Der weißkehlige Manakin.*

Müller, Natursyst. II. p. 623. n. 10. *Weißkehlchen.*

Onomat. hist. nat. V. p. 30. Manacus gutture albo.

Brisson, ornith. II. p. 168. n. 2. Manakin à gorge blanche.

Büffon, Vögel, XIII. p. 89. *der weißkehligte Manaki*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 557. n. 10. Pipra (Gutturalis) nigra, gutture albo.

11. SERENA. *Der weißstirnige Manakin.*

Müller, Natursyst. II. p. 624. n. 11. *der Luftling.*

Onomat. hist. nat. V. p. 27. Manacus alba fronte.

Brisson, ornithol. II. p. 172. n. 9. Manakin à front blanc.

Büffon, Vögel, XIII. p. 91. *der weißstirnigte Manaki*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 556. n. 5. Pipra (Serena) nigra, fronte alba, uropygio cyaneo, ventre fulvo.

12. MANACUS. *Der schwarzkappige Manakin.*

Müller, Natursyst. II. p. 624. n. 12. *der Weißnacken.*

Onomat.

Onomat. hist. nat. V. p. 27. *der Manakin.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 167. n. 5. *schwarzköpfige Grasmücke.*
Brisson, ornithol. II. p. 168. n. 1. *Manakin.*
Büffon, Vögel, XIII. p. 73. *der schwarzkappigte Manaki*; m. e. Fig.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 556. n. 6. Pipra (Manacus) nigra subtus alba, macula cervicis alarumque alba.
Seligmann, Vögel, VII. tab. 50. *der schwarzgekappte Manakin.*
Samml. zur Phys. u. Naturgesch. II. p. 747. *der schwarzgekappte Manakin, oder Nußknacker.*
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 389. n. 2. *der Nußknacker.*

β. *Latham*, Syst. ornithol. II. p. 556. n. 6. β.

13. Minuta. *Der kleine Manakin.*

Müller, Natursyst. II. p. 624. n. 13. *Zwergzeisig.*
Büffon, Vögel, XIII. p. 108. *der kleinste Manakin.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 558. n. 12. Pipra (Minuta) grisea, capite nigro albo punctato, pectore flavescente, lineis transversis nigris.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 189. n. 34. Motacilla (Minuta) grisea, capite nigro, punctis albis sparsis. (9)

17. Striata. *Der Manakin mit gestreiftem Kopfe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 558. n. 13. Pipra (Striata) cinereo-fusca, subtus flavescens, vertice nigro, striis albis, loris remigibusque secundariis apice flavis, alula rectriceque extima apice albis.

18. Nae-

(9) *Pallas* vermuthet, dass dies Synonym, so wie *Mus. Ad. Frid.* 2. p. 34. zu *Yunx Minutissima* p. 423. n. 2. gehöre. S. *nord. Beytr.* III. p. 5.

18. Naevia. *Der gefleckte Manakin.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 71. *der gefleckte Fliegenschnäpper von Cayenne.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 559. n. 14 Pipra (Naevia) fusca, subtus fulva, gula iuguloque nigris, pectore fascia alarum bifida rectricibusque apice albis.

19. Leucotis. *Der weißöhrige Manakin.*

Ist wohl mit *Turdus Auritus* p. 827. n. 94. einerley. S. *Latham*, Syst. ornithol. I. p. 360. n. 123.

20. Atricapilla. *Der schwarzgekrönte Manakin.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 104. *der aschgraue Manaki;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 561. n. 22. Pipra (Atricapilla) cinerea, subtus griseo-alba, tectricibus alarum maioribus, remigibusque nigricantibus, vertice nigro.

21. Papuensis. *Der Orangen-Manakin.*

Büffon, Vögel, XIII. p. 166. *der Orangen-Manaki.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 561. n. 23. Pipra (Papuensis) nigro virescens, subtus albida, pectore macula ovata fulva, rectricibus 2. intermediis brevioribus.

22. Haemorrhoa. *Der Manakin mit rothem After.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 561. n. 24. Pipra (Haemorrhoa) nigricans, subtus alba, crisso macula coccinea.

23. Nigricollis. *Der schwarzkehlige Manakin.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 561. n. 25. Pipra (Nigricollis) nigro-caerulescens subtus alba, gula crissoque nigris.

24. Capensis. *Der capsche Manakin.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 561. n. 26. Pipra (Capensis) obscura subtus fulvo-flavescens.

25. Cinerea. *Der aschgraue Manakin.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 562. n. 27. Pipra (Cinerea) cinerea, abdomine cinereo-albido.

26. Musica. *Der Organist.*

Büffon, Vögel, XII. p. 89. *der Organist*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 562. n. 28. Pipra (Musica) nigricans, corpore subtus uropygioque fulvis, gutture genisque nigris, vertice nuchaque caeruleis, fronte flava.

Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 734. *der Organist.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit *dreyzehen* Gattungen vermehrt. Bey der 1sten Gattung sind *zwey*, bey der 5ten *zwey*, und bey der 12ten gleichfalls *zwey* Varietäten auseinander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. Pipra (Picicitli) cinerea, capite colloque atris, macula candente, oculos ambiente, acumine in pectus usque procedente.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 559. n. 16.

Fernand, nov. Hisp. p. 53. c. CC. Avis Picicitli Tetzcoquensis.

Büffon,

Büffon, Vögel, XIII. p. 97. 98. *der Mexikanische Picititli.*

An vere Pipra?

2. Pipra (Miacatototl) nigra, plumis candentibus interſertis, ventre pallente, alis caudaque inferne cinereis.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 560. n. 19.

Fernand, nov. Hiſp. p. 30. Miacatototl, ſeu avis germinis Maizi.

Büffon, Vögel, XIII. p. 92. *der Vogel, der bey den Braſilianern den Namen Maizi de Miacatototl führt.*

An Pipra?

116. GESCHLECHT. Parus. *Die Meiſe.* (Maiſe.)

Müller, Naturſyſt. II. p. 625. Gen. CXVI.

Leske, Naturgeſchichte, p. 264. Gen. XLVI.

Borowsky, Thierreich, III. p. 177. Gen. LXXI.

Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. p. 194. Gen. XXXVIII.

Bechſtein, Naturgeſch. I. p. 546. Gen. LXXV.

Funke, Naturgeſch. I. p. 272.

Ebert, Naturl. II. p. 146.

Halle, Vögel, p. 354. Gen. IX.

Pennant, arct. Zool. II. p. 395.

Neuer Schaupl. d. Nat. V. p. 584.

Onomat. hiſt. nat. V. p. 176.

Klein, av. p. 84. Gen. IX.

Briſſon, ornithol. I. p. 461. Gen. XLI.

Büffon, Vögel, XVII. p. 8. ſqq.

Batſch, Thiere, I. p. 318. Gen. LXXIX.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 562. Gen. XLV.

Hermann, tab. affin. anim. p. 224.

Donn-

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 390. Gen. LXXXV.

1. Bicolor. *Die amerikanische Haubenmeise.*

Müller, Natursyst. II. p. 625. n. 1. *die zweyfarbige Meise.*

Halle, Vögel, p. 363. n. 352. *die graue Haubenmaise.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 395. n. 241. *die amerikanische Haubenmeise.*

Klein, av. p. 86. n. 12. Parus cristatus pectore rubro.

Klein, Vorbereit. p. 161. n. 12. *rothbrüstige Kobelmeise.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 89. n. 12. *rothbrüstige Kobelmeise.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 179. *die zweyfarbige Meise.*

Brisson, ornith. I. p. 468. n. 9. Mesange huppée de la Caroline.

Büffon, Vögel, XVII. p. 142. *die carolinische Schopfmeise*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 567. n. 13. Parus (Bicolor) capite cristato, antice nigro, corpore cinereo, subtus ex albido rufescente.

Seligmann, Vögel, III. tab. 14. *die gehaubte Meise.*

Naturgesch a. d. best. Schriftst. Vögel, p. 848. *die carolinische Haubenmeise.*

Müller, zool. dan. prodr. p. IX. Parus (Bicolor) capite cristato antice nigro, corpore cinereo, subtus ex albido rufescente.

2. Cristatus. *Die* (gemeine) *Haubenmeise.* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 626. n. 2. *die Haubenmeise.*

Leske,

(10) Brütet nicht selten auch in Eichhörnchen-Bauen (Kobeln) daher der Name *Kobelmeise.* Legt rundliche, weisse, am stumpfen

Leske, Naturgesch. p. 264. n. 1. *die Haubenmeise.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 179. n. 2. *die Haubenmeise.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 548. n. 4. *die Haubenmeise.*

Funke, Naturgesch. I. p. 272. *die Haubenmeise.*

Ebert, Naturl. II. p. 147. *die Haubenmaise.*

Halle, Vögel, p. 358. n. 347. *die Haubenmaise.*

Meyer, Thiere, II. tab. 26. *die Hauben-Meise.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 433. n. 379. *die Haubenmeise.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 400. F. *die Haubenmeise.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 183. *die Haubenmaise.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 138. *Haubenmaise; Kappmaise.*

Klein, av. p. 85. n. 6. Parus cristatus.

Klein, Vorbereit. p. 159. n. 6. *Haubenmaise; Kobel-Schopff-Straus-Haubel-Heidenmeise.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 88. n. 6. *Haubenmeise.*

Klein, Vogeleyer, p. 29. tab. 4. Fig. 11.

Gesner, Vögelb. p. 378. *Kobelmeißlein; Straußmeißlein; Heydenmeißlein;* m. e. schl. Fig.

Brisson, ornith. I. p. 466. n. 8. Mesange hupée.

Büffon, Vögel, XVII. p. 134. *die Schopfmeise;* mit e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 359. *die Haubenmaise.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 567. n. 14. Parus (Cristatus) griseo-rufescens cristatus, collari nigro, ventre albo.

Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 191. *die Haubenmaise.*

Siemßen,

pfen Ende röthlich punctirte Eyer. — Die Haube besteht aus schwarz und weissen Schuppen, die nach dem Wirbel zu immer länger werden, und daselbst einen Schopf bilden.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 142. n. 1. *Haubenmeise; Töppelmeesken.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 443. *die Haubenmeise.*

Fischer, Livl. p. 104. n. 174. *Haubenmeise.*

Pontoppidan, Dännem. p. 175. n. 1. *Topmeise.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 199. n. 243. *die Schopfmeise.*

Storr, Alpenreis. I. p. 80. Parus cristatus.

Zorn, Petinotheol. II. p. 365. *die Schopf-Meisse.*

Angenehme Landlust, p. 223. *die Schopfmeise.*

Naturforsch. XVII. p. 107. n. 221. *die Haubenmeise.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 66. *die Kupp-Meise.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 197. n. 77. *Haubenmeise; Meisenkönig.*

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 409. *die Haubenmeise.*

Onomat. forestal. II. p. 808. *die Kuppmeise; Kupfmeise; Haubelmeise.*

Börner, schles. ökon. Nachr. 781. p. 107. Parus cristatus.

Tänzer, notab. Venator. p. 107. *Kupp-Meisse.*

Anweis. Vögel zu fang. p. 373. *Schopfmeise.*

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. Parus cristatus.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 32. n. 2. Parus cristatus.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 189. n. 1. Parus (Cristatus) capite cristato.

Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 5. Parus cristatus.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 321. Parus cristatus. *Straus-Meislin; Kobelmeise; Heubel-Meise.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat Pol. p. 404. Parus cristatus.

Jonston, av. p. 120. Parus cristatus.

Barrere, Sp. nov. Cl. 3. Gen 24. p. 49. Parus cristatus.

Salerne, ornith. p. 156. Mésange coifftté à bouquet, à perruche; Mésange crêtée, hupée, chaperonnée.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 390. n. 1. *die Haubenmeise.*

3. Maior. *Die Kohlmeise.* (¹)

Müller, Natursyst. II. p. 626. n. 3. *die Kohlmeise.*

Leske, Naturgesch. p. 265. n. 2. *die Kolmeise.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 180. n. 3. *die Kohl-, Brand-, Spiegel-, Finkmeise.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 194. n. 1. Parus (Maior) capite nigro, temporibus albis, nucha lutea; *die Kohlmeise, Pickmeise; Finkmeise.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 547. n. 1. *die Kohlmeise.*

Funke, Naturgesch. I. p. 272. *die Kohlmeise.*

Ebert, Naturl. II. p. 146. *die Kohlmaise.*

Halle, Vögel, p. 354. n. 343. *die große schwarze Maise, mit weißen Schläfen und gelbem Nacken.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II p. 343. n. 380. *die Kohlmeise.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 398. A. *die Kohlmeise.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 185. *die große schwarze Maise.*

(1) *Kohlmeise*, *Kohlenmeise*, wegen ihrer kohlenschwarzen Kopfplatte, oder weil sie in den Mauern einzelner Häuser nahe an den Wäldern, z E. der Kohlenbrenner nistet. — *Spiegelmeise* von der glänzend schwarzen Kopfplatte. — *Finkmeise* von ihrem, dem Finkenschlage nicht ganz unähnlichen Gesange; — *Speckmeise*, *Schinkenmeise*, weil sie des Winters oft in die Häuser kommen, und Löcher in den Speck fressen. — Tödtet Vögel, z. E. Goldammer, graue Ammer, so gar Finken, und frisst ihnen das Gehirn aus. Ja man weiss Beyspiele, dass diese Meisen schlafenden kleinen Kindern die Augen ausgehackt haben. Dass sie den Bienenstöcken nachtheilig sind, hat schon *Aelian* bemerkt. Das Fleisch ist essbar, hat aber einen etwas bittern Geschmack. — Wird etwa 5. bis 6. Jahr alt.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 138. *Kohlmaise.*
Klein, av. p. 94. n. 1. Parus maior
Klein, Vorbereit. p. 158 n. 1. *Kohlmeise; Spiegel-, Brand-, große Meise.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 87 n. 1. *Kohlmeise.*
Klein, Stemmat. av. p. 16. tab. 17 Fig. 8. a. b.
Gesner, Vögelb. p. 376. *große oder Spiegelmeise;* m. e. zieml. gut. Fig.
Brisson, ornith. I. p. 461. n. 1. grosse Mésange ou Charbonniere.
Buffon, Vögel, XVII p. 29. *die große oder Kohlmeise;* m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 359 *die Kohlmaise.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 562. n. 1. Parus (Maior) viridi-olivaceus subtus flavescens, capite nigro, temporibus albis, gula lutea.
Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 192. *die Kohlmaise.*
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 143. n. 3. *die große Kohlmeise.*
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 443. *die Kohlmeise.*
Fischer, Livl. p. 103. n. 172. *große Meise.*
Cetti, Sardin. II. p. 225. *die große Art.*
White, N. G. von Engl. p. 65. n. 2. *Spiegelmeise.*
Pontoppidan, Dännem. p. 175. n. 2. *Musvit.*
Pontoppidan, Norweg. II. p. 155. *Kiöd-Meise; Musvit; Talg-Oxe.*
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *die große Meise.*
Linné, Abhandl. II. p. 306. n. 141. *die Kohlmeise.*
Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 298. *Kohlmeise.*
Naturforsch. XVII. p. 107. n. 122. *die Kohlmeise.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 66. *die Pick oder Großmeise.*
Naumann, Vogelsteller, p. 139. *die Kohlmeise.*
Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 199. n. 242. *die Kohlmeise.*

Zorn,

Zorn, Petinotheol. II. p. 358. *die Kohl-Meisse.*
Angenehme Landluft, p. 219. *die Kohlmeise.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 369. *die Kohlmeise.*
Onomat. forestal. II. p. 803. *Pickmeise; Großmeise.*
Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 107.
Geoffroy, mat. med. VII. p. 59. *die große-oder Kohlmeise.*
Tänzer, notabil. Venator. p. 107. *die Schwartz-Meisse.*
Eberhard, Thiergesch. p. 85. *die große Meise.*
Goeze, Natur, Menschenl. u. Vors. VI. p. 86. *Kohlmeise.*
André u. Bechstein, Spatzierg. I. p. 282. *die Kohlmeise.*
Naturgesch. a. d. best. Schriftst. Vögel, p. 825. *die Kohlmeise.*
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. Parus maior.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 1. Parus maior.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 189. n. 2. Parus (Maior) capite nigro, temporibus albis, nucha lutea.
Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 1. Parus maior.
Möhring, av. gen. p. 45. n. 36. Parus.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 318. Parus Carbonarius, Fringillago. *Kol-Meise; Spiegel-Meise; Brand-Meise, große Meise.*
Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. Parus maior.
Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 403. Parus Carbonarius.
Jonston, av. p. 120. Parus maior.
Journal de physique Aout. 1776. p. 127. Serre-fine; Bargne, etc.
Belon, nat. des ois. p. 376. Premiere éspece de Mésange, Mesange, Nonnette.

Schaefer, element. ornithol. tab. 52.
Faun. Arragon. p. 90. n. 1.
Aristot. hist. anim. L. 8. c. 3. Αιγιθαλος.
Aelian. de nat. anim. L. 1. c. 58. Αιγιθαλοι.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 391. n. 2. *die Kohlmeise.*

β. P. fusco-olivaceus, subtus sordide flavicans, capite nigro, temporibus cinereis, rostro forficato. *
Latham, Syst. ornith. II. p. 563. n. 1. β.
Levin, britt. Birds. I. t. tit. praef. Crofs-billed Titmouse.

γ. *Die kleinere Kohlmeise.* *
Büffon, Vögel, XVII. p. 43. *die kleine Kohlmeise, kleine Speckmeise.*

16. Cyaneus. *Die lasurblaue Meise.*

Brisson, ornith. I. p. 463. n. 3. grosse Mésange bleue.
Büffon, Vögel, XVII. p. 153. *die große blaue Meise;* m. e. Fig.
Pennant, arct. Zool. II. p. 399. C. *die lasurblaue Meise.*
Latham, Syn. Suppl. p. 189. Azure Titmouse.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 563. n. 3. Parus (Cyanus) dilute caeruleus, subtus albus, uropygio et vertice cano-albidis, cervicis albae fascia lata, humeris tectricibusque caudae caeruleis.
Lepechin, Nov. comment. Petrop. XIV. p. 498. tab. 13. Fig. 1. Parus dorso caeruleo, etc.
Jonston, av. pag. 120. Parus indicus.

15. Ignotus. *Die Strömsche Meise.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 398. B. *die Strömsche Meise.*

Büffon,

Büffon, Vögel, XVII. p. 162. *die unbekannte Meise des Ström.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 563. n. 2. Parus (Stroemei) viridi-flavescens, pectore rufo-maculato, abdomine caeruleo, cauda forficata, rectricibus duabus exterioribus extus albis.

4. Americanus. *Die Kriechmeise.* (2)

Müller, Natursyst. II. p. 626. n. 4. *die amerikanische Meise.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 396. n. 243. *die Kriechmeise.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 177. *die amerikanische Finkenmaise.*

Brisson, ornithol. I. p. 452. n. 66. Figuier cendré de la Caroline.

Büffon, Vögel, XVI. p. 124. *der aschgraue Feigenfresser mit dem Halskragen.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 571. n. 28. Parus (Americanus) caerulescens, temporibus pectore dorsoque flavescentibus, hypochondriis purpurascentibus.

Seligmann, Vögel, III. tab. 28. *Finkmeise.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 4. Parus (Americanus) caerulescens, temporibus pectore dorsoque flavescentibus, hypochondriis purpurascentibus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 225. Parus americanus.

(2) *Büffons Figuier de la Caroline*, und *Figuier cendré à collier*, rechnet *Latham* zu *Motacilla Americana*, p. 960. Ueberhaupt werden die Synonymen hier sehr verwechselt. Ob dies auch eine *Meise* seyn mag?

5. CAERULEUS. *Die Blaumeise.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 627. n. 5. *die Blaumeise.*

Leske, Naturgesch. p. 265. n. 3. *die Blaumeise.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 180. n. 4. *die Blau-, Pimpel-, Käsemeise.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 194. n. 2. Parus (Caeruleus) remigibus caerulescentibus: primoribus margine exteriori albis, fronte alba, vertice caeruleo. *Blaumeise, Jungfermeise; Blaumüller.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 548. n. 5. *die Blaumeise.*

Funke, Naturgesch. I. p. 273. *Blaumeise.*

Ebert, Naturl. II. p. 147. *Blaumaise.*

Halle, Vögel, p. 356. n. 345. *die blaue Maise;* Fig. 21.

Meyer, Thiere, I. tab. 33. *Blau-Meise.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 434. n. 381. *Blaumeise, Mehlmeise; Meelmeise*, etc.

Pennant, arct. Zool. II. p. 399 D. *die Blaumeise.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 180. *die blaue Maise.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 138. *Blaumaise; Braubling*, etc.

Klein, av. p. 85. n. 3. Parus caeruleus.

Klein, Vorbereit. p. 158. n. 3. *Blaumeislein, Käsemeischen.*

Klein, verb. Vögelh. p. 87. n. 3. *Blaumeise.*

Klein, Stemmat. av. p. 16. tab. 17. fig. 10. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 29. tab. 4. Fig. 10.

Gesner, Vögelb. p. 376. *Blaumeise; Mehlmeißlein.*

Brisson, ornith. I. p. 462. n. 2. Mésange bleue.

Büffon, Vögel, XVII. p. 75. *die blaue Meise;* m. e. Fig.

Batsch,

(3) Gewicht, nach *Büffon*, drey Drachmen.

Batsch, Thiere, I. p. 359. *die Blaumaise.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 566. n. 12. Parus (Caeruleus) olivaceo-virescens, subtus luteus, remigibus caerulescentibus, primoribus margine exteriore albis, fronte alba, vertice caeruleo.

Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 193. *die Blaumaise.*

Siemssen, meklenb. Vög. p. 144. n. 3. *die Blaumeise.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 444. *die spechtartige Blaumeise.*

Fischer, Liv. p. 103. n. 173. *Blaumeise.*

Cetti, Sardin. II. p. 225. Parus caeruleus.

Pallas, Reis. Ausz. III. p. 475. *Blaumeise.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *die blaue Meise.*

Pontoppidan, Dännem. p. 175. *Blaaemeise.*

Storr, Alpenreise, I. p. 80. Parus caeruleus.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 200. n. 244. *die Blaumeise.*

Naturforsch. XVII. p. 107. n. 223. *die Blaumeise.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 66. n. 3. *Blau- oder Mehl-Meise.*

Naumann, Vogelsteller, p. 139. *Pümpelmeise oder Blaumeise.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 199. n. 79. *Blaumeise.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 361. *die Blau-Meisse.*

Angenehme Landlust, p. 221. *Blaumeise.*

Onomat. forestal. II. p. 806. *Blaumeise; Pimpelmeise.*

Börner, schles. ökonom. Nachr. 1781. p. 107. Parus caeruleus.

Anweis. Vögel zu fang. p. 371. *Blaumeise.*

Wirsing, Vögel, tab. 32. — *Günther*, Nest. u. Ey. tab. 66. *Blaumeise.*

Goeze, Allerl. II. p. 396. n. 16. *Blaumeise.*

Goeze, Natur, Menschenl. u. Vors. VI. p. 101. *Blaumeise.*

André und Bechstein, Spazierg. II. p. 370. *Blaumeise.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 3. Parus caeruleus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 4. Parus (Caeruleus) remigibus caerulescentibus: primoribus margine exteriore albis, fronte alba, vertice caeruleo.

Charleton, onomast. zoic. p. 90. n. 2. Parus minor.

Kramer, Austr. p. 379. n. 3. Parus remigibus caerulescentibus: prima margine exteriore alba; vertice caeruleo; *Blaumeise.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 320. Parus caeruleus. Parus montanus. *Blaw-Meißlin; Meel-Meise; Bin-Meise; Pimpel-Meise.*

Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 18. Parus caeruleus.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 403. Parus caeruleus.

Jonston, av. p. 120. Parus caeruleus.

Belon, hist. nat. des ois. p. 369. Mesange bleue; Marenge.

Salerne, ornith. p. 212. petite Ardelle.

Zinnan. Uov. p. 76. tab. 11. Fig. 68. Parozolino o Fratino.

Faun. Arragon. p. 90.

Hermann, tab. affin. anim. p. 225. Parus caeruleus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 391. n. 3. *die Blaumeise.*

β. P. capite remigibus rectricibusque sordide albis, dorso pallide viridi, abdomine pallide flavo. *

Günther: Naturforsch. I. p. 63. n. 14. *weiße Blau-Maise.*

γ. P.

γ. P. cinereus, dorso flavescente, rostro pedibusque pallidioribus. *

Götz: Naturforsch. XVI. p. 48. n. 2.

17. SAEBYENSIS. *Die Säbysche Meise.* (5)

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 597. not. * 1.

Büffon, Vögel, XVII. p. 84. *die Säbysche Meise;* m. e. Fig.

6. ATRICAPILLUS. *Die schwarzköpfige canadische Meise.*

Müller, Natursyst. II. p. 627. n. 6. *das Schwarzköpfchen.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 397. n. 245. *die canadische Meise.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 178. *die Meise aus Canada.*

Brisson, ornithol. I. p. 464. n. 6. Mesange à tête noire de Canada.

Büffon, Vögel, XVII. p. 67. *die schwarzköpfige kanadensische Meise.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 566. n. 10. Parus (Atricapillus) pileo gulaque nigris, corpore cinereo subtus albo.

Philos. Transact. LXII. p. 407.

7. ATER. *Die Tannenmeise.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 627. n. 7. *die Tannenmeise.*

Leske, Naturgeschichte, p. 265. n. 4. *die Tannenmeise.*

Borows-

(5) Nach *Latham* mit *Parus Cyanus* p. 1007. einerley. Auch *Bechstein* ist der Meinung.

(6) Ich begreife noch nicht, wie *Latham Cetti's Cingallegra* hier anführen kann. Nach *Cetti's* Beschreibung muss dies *Parus Caeruleus* seyn.

Borowsky, Thierreich, III. p. 181. n. 5. *die Tannenmeise; kleine Kohlmeise; Holzmeise; Waldmeise.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 547. n. 2. *die Tannenmeise.*

Funke, Naturgesch. I. p. 273. *die Tannenmeise.*

Ebert, Naturl. II. p. 146. *die Tannenmaise.*

Halle, Vögel, p. 356. n. 344. *die Tannenmaise.*

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere II. p. 434. n. 382. *die Tannenmeise; Hundsmeise; Sperrmeise; Kreuzmeise.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 396. n. 244. *die Tannenmeise.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 177. *die Tannenmaise.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 138. *Tannenmaise.*

Klein, av. p. 85. n. 2. Parus sylvaticus.

Klein, Vorbereit. p. 158. n. 2. *Tannenmeise; Wald-, kleine Kohlmeise.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 87. n. 2. *Tannenmeise; Hundsmeise.*

Klein, stemmat. av. p. 16. tab. 17. fig. 9. a. b. Parus carbonarius.

Gesner, Vögelb. p. 377. *Kohlmeiß;* m. e. schl. Figur.

Brisson, ornithol. I. p. 464. n. 5. Mésange à tête noire.

Büffon, Vögel, XVII. p. 44. *die kleine Kohlmeise;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 359. *die Tannenmaise.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 564. n. 8. Parus (Ater) dorso cinereo, capite nigro, occipite pectoreque albo.

Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 194. *die Tannenmeise.*

Siemssen,

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 145. n. 4. *die kleine Kohlmeise.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 444. *die graue Waldmeise.*

Fischer, Liv. p. 104. n. 175. *Tannenmeise.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *die schwarze Meise.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 362. *die Tann-Meiße.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 201. n. 245. *die Schwarzmeise; Sperrmeise.*

Naturforsch. XVII. p. 108. n. 224. *die Tannenmeise.*

Naumann, Vogelsteller, p. 139. *die Tannenmeise.*

André u. Bechstein, Spazierg. II. p. 276. *Tannenmeise.*

Angenehme Landlust, p. 222. *die Holzmeise.*

Onomatol. forestal. II. p. 307. *Waldmeise; Holzmeise.*

Anweis. Vögel zu fang. p. 372. *Holzmeise.*

Wirsing, Vögel, tab. 59. *Tannenmeise.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 4. Parus ater.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 5. Parus (Ater) capite nigro, dorso cinereo, occipite pectoreque albo.

Charleton, onom. zoic. p 90. n. 1. Parus maior, Carbonarius.

Kramer, Austr. p. 379. n. 4. Parus capite nigro, vertice albo, dorso cinereo pectore albo; *Speermeise; Creuzmeise.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 320. Parus ater; Parus caninus; *Hunds-Meise; kleine Kol-Meise.*

Jonston, av. p. 120. Parus ater.

Barrere, ornith. Cl. 3. Gen. 24. sp. 1. Parus ater, Carbonarius.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 404. Parus Carbonarius minor.

Salerne,

Salerne, ornith. p. 212. petit Charbonnier.
Histoir. Prov. I. p. 516.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 391. n. 4. *die Tannenmeise.*

8. PALUSTRIS. *Die Sumpfmeise.* (7)

Müller, Natursyst. II. p. 627. n. 8. *die Sumpfmeise.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 181. n. 6. *die Sumpf. By-Plattenmeise; Asch-Nonnenmeise.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 548. n. 5. *die Sumpfmeise; Mönchmeise; Speckmeise.*
Halle, Vögel, p. 357. n. 346. *die Nonnenmaise.*
Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere, II. p. 435. n. 388. *die Sumpfmeise; Plattenmeise*, etc.
Pennant, arct. Zool. II. p. 400. E. *die Sumpfmeise.*
Onomat. histor. natur. VI. p. 188. *die Hundsmaise; Sumpfmaise.*
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 139. *Holzmaise; Waldmaise; Plattenmaise*, etc.
Klein, av. p. 85. n. 4. Parus fuscus, cinereus, palustris, atricapillus.
Klein, Vorbereit. p. 159. n. 4. *Münchmeise; Mönchmeise; Meisenkönig; schwarzköpfiger Dornreich; Graumeise; Aschmeise; Murmeise; Kottmeise; Rindmeislein.*

Klein,

(7) Hält sich mehr in Wäldern als in Gärten auf, lebt von kleinen Samenkörnern, greift Bienen, Wespen und Raupen an; sammelt einen Vorrath von Hanfsamen, wenn sie dazu Gelegenheit hat. Lebt gern auf Erlen und Weiden an sumpfigen Orten. Legt 5. bis 7. weisse mit hellbraun, besonders am stumpfen Ende punctirte Eyer. Läfst sich schwer im Bauer halten, und wird oft vor ihrem Tode, wenn man sie ein Jahr gehabt hat, blind.

Klein, verbeff. Vögelhift. p. 88. n. 4. *Münchmeise.*
Klein, Stemmat. av. p. 16. tab. 17. fig. 11. a — c.
Gesner, Vögelb. p. 377. *Murmeise; Murmeiß; Rietmeiß; Reitmeiß; Kolmeiß;* m. e. Fig.
Brisson, ornith. I. p. 465. n. 7. Mesange de marais, ou Nonnette cendrée.
Büffon, Vögel, XVII. p. 57. *die aschgraue Nonnenmeise;* m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 359. *die Plattenmaise.*
Latham, Syn. Suppl. p. 189. Marsh Titmouse.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 565. n. 9. Parus (Palustris) capite nigro, dorso cinereo, temporibus albis.
Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 195. *die Sumpfmeise.*
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 145. n. 5. *die Sumpfmeise.*
Fischer, Zus. zur N. G. von Livl. p. 51. n. 505. *Sumpfmeise; Hundemeise.*
White, N. G. von Engl. p. 65. n. 2. *Sumpfmeise.*
Pontoppidan, Dännem. p. 175. n. 4. *Graameise.*
Storr, Alpenreise, I. p. 80. Parus palustris.
Naturforsch. XXV. p. 19. *Plattmeise.*
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *die Mauermeise.*
Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 201. n. 246. *die Hundsmeise.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 363. *die Platten-Meisse; Nonn-Meisse; Hanf-Meisse.*
Borkhausen, Magazin, I. p. 200. n. 81. *Sumpfmeise.*
Naumann, Vogelsteller, p. 139. *die Plattmeise.*
Angenehme Landlust, p. 222. *Hanfmeise.*
Anweis. Vögel zu fang. p. 372. *Hanfmeise.*
Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 107. Parus palustris.

Onomat.

Onomat. forestal. II. p. 807. *Hanfmeise; Schwarzmeise.*

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 829.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. Parus palustris.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 5. Parus palustris.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 6. Parus (Palustris) capite nigro, temporibus albis, dorso cinereo.

Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 3. Parus palustris.

Brünniche, ornith. bor. p. 73. Parus palustris.

Kramer, Austr. p. 379. n. 5. *Hundsmeise.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 320. Parus fuscus, cinereus, palustris, atricapillus. *Graw-Meißlin; Mur-Meise; Asch-Meise; Kott-Meise; Ried-Meißlein.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 404. Parus fuscus.

Jonston, av. p. 120. Parus palustris.

Zinnan. Uov. p. 77. tab. 12. fig. 68. 1. Parolozino palustre.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 392. n. 5. *die Sumpfmeise.*

β. *Büffon*, Vögel, XVII. p. 64. *Meise von Louisiana.*

Latham, Syn. II. 2. p. 541. n. 8. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 565. n. 9. β.

Borkhausen, Magazin, I. p. 200. 201. (8)

γ. *Latham*,

(8) Die zwey weissen Binden auf den Flügeln, deren bey der Hauptgattung in unsrem System gedacht wird, habe ich so wenig, als die weissen Flecken beym Anfange eines jeden Flügels, deren *Scopoli* erwähnt, an den Exemplaren, die ich gesehen habe, gefunden. *Borkhausen* macht dieselbe Bemerkung, und glaubt, dass hier vielleicht mehrere Arten verwechselt würden, und dass *Gmelins Parus palustris β*, die *Linneische Parus palustris*; — hingegen *Gmel. Parus palustris α*, so wie die *Scopolische* Meise dieses Namens eine andere Art seyn mögen.

γ. *Latham*, Syn. II. 2. p. 542. n. 8. B.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 566. n. 9. *β*.

9. VIRGINIANUS. *Die virginische Meise.*
Müller, Natursyst. II. p. 627. n. 9. *die virginische Meise.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 396. n. 242. *die virginische Meise.*
Klein, av. p. 74. n. 8. Luscinia uropygio luteo.
Klein, Vorbereit. p. 140. n. 8. *Gelbsteiß.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 75. n. 8. *Gelbsteis.*
Brisson, ornithol. I. p. 470. n. 14 Mesange de Virginie.
Büffon, Vögel, XVII. p. 148. *die Meise mit gelben Bürzel;* m. e. Fig.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 567. n. 15. Parus (Virginianus) fusco-olivaceus, subtus griseus, uropygio luteo.
Seligmann, Vögel, III. tab. 16. *die Meise mit gelbem Bürzel.*
Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 849. *Meise mit dem gelben Steiß.*

10. PEREGRINUS. *Die Meise mit rothem Steiß.* (9)
Müller, Natursyst. II. p. 618. n. 10. *die ausländische Meise.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 564. n. 4. Parus (Peregrinus) uropygio coccineo, corpore cinereo, subtus albo.

18. GRISEUS. *Die graue, rothgekrönte Meise.* (10)
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 597. not. * 2.
Büffon,

(9) Ist, nach *Latham*, mit *Parus coccineus*. p. 1015. n. 31. einerley.
(10) Ist, nach *Bechstein*, mit *Motacilla Regulus*, p. 995. n. 48. einerley. *Latham* l. c. scheint sie mit *Fringilla Flammea* p. 915. n. 26. für verwandt zu halten.

Büffon, Vögel, XVII. p. 167. *die graue, rothscheitlichte Meise.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 564. n. 6. Parus (Griseus) griseus vertice coccineo.

Olaffsen, Isl. I. p. 312. c. *Audua Tytlingr?*

Hermann, tab. affin. anim. p. 225. Parus griseus.

19. AFER. *Die schwarzbrüstige afrikanische Meise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 168. *die afrikanische Meise.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 564. n. 7. Parus (Afer) nigricans, genis nucha abdomineque albis, collo subtus, pectoreque nigris.

11. CAUDATUS. *Die Schwanzmeise.* (1)

Müller, Natursyst. II. p. 628. n. 11. *die Schwanzmeise.*

Leske, Naturgesch. p. 265. n. 5. *die langeschwänzte Meise.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 182. n. 7. *die Schwanz- Schnee - Zagelmeise; Pfannenstiel; Weinzapfer.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 194. n. 3. Parus (Caudatus) vertice albo, cauda corpore longiore; *die Schwanzmeise; Moormeise; Backofendrescher.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 549. n. 6. *die Schwanzmeise.*

Funke, Naturgesch. I. p. 372. *die Schwanzmeise.*

Ebert, Naturl. II. p. 147. *Schwanzmaise; Weinzapfer.*

Halle,

(1) Länge bis zum After 2 1/2, bis an das Ende des Schwanzes 6. Zoll; Flügelweite 6 1/2 Zoll. Gewicht 2 1/3 Drachmen. *Aldrovand* kannte den Unterschied zwischen *Parus Caudatus* und *Pendulinus* nicht. S. *Ludwigii* delect. opusc. ad scient. nat. spect. Lips. 1790. I. p. 148.

Halle, Vögel, p. 358. n. 348. *die Schwanzmaise.*
Meyer, Thiere, II. tab. 27 *die Schwanzmeise.*
Gatterer, vom Nutz. u. Schad. der Th. II, p. 435. n. 384. *die Schwanzmeise; Belzmeise; Bergmeise; Pfannenstieglitz*, etc.
Pennant, arct. Zool. II. p. 400. I. *die langgeschwänzte Meise.*
Onomat. hist. nat. VI. p. 181. *die Schwanzmaise.*
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 139. *Schwanzmaise*, etc.
Klein. av. p. 85. n. 7. Parus caudatus.
Klein, Vorbereit. p. 160. n. 7. *langgeschwänzte Meise; Zahlmeise; Pfannenstieglitz.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 88. n. 7, *langgeschwänzte Meise.*
Klein, Stemmat. av. p. 16. tab. 17. fig. 12. a. b.
Klein, Vögeleyer, p. 28. tab. 4. fig. 7.
Gesner, Vögelb. p. 378. *Schwanzmeißlein; Pfannenstilein; Zagelmeiß, Pfannenstieglitz;* m. e. schl. Fig.
Brisson, ornithol. I. p. 469. n. 13. Mesange à longue queue.
Büffon, Vögel, XVII. p. 114. *die langgeschwänzte Meise;* m. e. Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 358. *die Schwanzmaise.*
Latham, Syn. Suppl. p. 190. Long-tailed Titmouse.
Latham, Syst. ornith. II. p. 569. n. 20. Parus (Caudatus) albo roseo nigroque longitudinaliter varius, vertice albo, cauda longiore.
Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 196. *die Schwanzmaise.*
Siemßen, meklenb. Vögel, p. 146. n. 6. *die Schwanzmeise.*
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 445. *die Schwanzmeise.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 14. *die Schwanzmeise.*

Storr, Alpenreise, I. p. 80. Parus caudatus.

Naturforsch. XVII. p. 108. n. 225. *Schwanzmeise.*

Tengmalm: neue schwed. Abhandl. IV. p. 52. *die langgeschwänzte Meise.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. p. 202. n. 247. *die Schwanzmeise.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 324. 366. *die Schwanz-Meisse.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 66. *die Schwanz-Meise.*

Naumann, Vogelsteller, p. 139. *Spiegelmeise; Teufelsbolzen; Pfannenstiel.* (ganz falsch beschrieben.)

Angenehme Landlust, p. 223. *die Schneemeise.*

Anweis. Vögel zu fang. p. 373. *Schneemeise.*

Börner, schles. ökonom. Nachr. 1781. p. 107. Parus caudatus.

Onomat. forestal. II. p. 809. *die Schneemeise; Mehlmeise.*

Naturgesch. aus den besten Schriftst. Vögel, p. 842. *Schwanzmeise.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 201. n. 82. *Schwanzmeise; Pfannenstielchen.*

André und Bechstein, Spazierg. II. p. 394. 399. *Schwanzmeise.*

Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorseh. VI. p. 106. *Schwanzmeise.*

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. Parus caudatus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 6. Parus caudatus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 7. Parus (Caudatus) vertice albo, cauda corpore longiore.

Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 4. Parus caudatus.

Moehring, av. gen. p. 45. n. 37. Orites.

Schwenk-

Schwenkfeld, av. Siles. p. 319. Parus caudatus; Parus monticola. *Schwanz-Meise; Zahlmeise; Berg-Meißlin; Pfannenstieglitz.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Polon. p. 404. Parus caudatus.

Kramer, Austr. p. 379. n. 6. *Belzmeise; Pfannenstiel.*

Jonston, av. p. 121. Parus caudatus.

Belon, hist. nat. des ois. p. 368. Perd sa queue; Mésange à longue queue.

Salerne, ornith. p. 216. Boulard, etc.

Journal de physique. Aout. 1776. p. 129. Meuniere, Materat.

Hermann, tab. affin. anim. p. 224. Parus caudatus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 392. n. 6. *die Schwanzmeise.*

20. CAPENSIS. *Die capsche Meise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 130. *die Halbtrauer*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 570. n. 22. Parus (Capensis) cinereo-griseus, remigibus nigris albo-marginatis, cauda nigra, subtus alba.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 160. tab. 115. *die kleine Meise vom Vorgeb. d. g. Hoffnung.*

Naturgesch. aus den best. Schriftst. Vög. p. 845.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 392. n. 8. *die Capmeise.*

12. BIARMICUS. *Die Bartmeise.* (2)

Müller, Natursyst. II. p. 628. n. 12. *das Bartmännchen.*

 Borowsky,

(2) Es scheint mir noch nicht so ganz ausgemacht, ob *Kramer's Pendulus* hieher gehöre. *Kramer* führt weiter kein Synonym an, als *Mont, Act. bonon.* und dies ist *Parus Pendulinus* Linn.

Borowsky, Thierreich, III. p. 183. n. 8. *das Bartmännchen; Bartmeise.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 195. n. 4. Parus (Biarmicus) vertice cano, cauda corpore longiore, capite barbato; *das Bartmännchen; der Indianische Sperling.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 549. n. 7. *die Bartmeise; Schilfmeise.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 592. *indianische Sperling.*

Ebert, Naturl. II. p. 148. *das Bartmännchen.*

Halle, Vögel, p. 360. n. 349. *die Bartmaise.*

Onomat. histor. natur. VI. p. 178. *die Bartmaise.*

Pennant, arct Zool. II. p. 401. H. *die Bartmeise.*

Klein, av. p. 86. n. 8. Parus barba nigra utrinque ab oculis dependente.

Klein, Vorbereit. p. 160. n. 8. *spitzbärtiger Langschwanz.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 88. n. 8 *spitzbärtiger Langschwanz.*

Brisson, ornith. I. p. 468. n. 12. Mesange barbue ou Moustache.

Büffon, Vögel, XVII. p. 86. *die Bartmeise;* mit 2 Figg. M. u. W.

Latham, Syn. Suppl. p. 190. Bearded Titmouse.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 570. n. 23. Parus (Biarmicus) rufus, vertice cano, cauda corpore longiore, capite barbato, crisso nigro.

Seligmann, Vögel, III. tab. 5. *der kleinste Neuntödter.*

Pallas, Reis. Ausz. I. p. 370. *Rietmeise*, III. p. 475. *Bartmeise.*

Tengmalm: neue schwed. Abhandl. IV. p. 55. Parus biarmicus.

Scopoli, B. m. a. d. N. G. I. p. 198. n. 241. *die Barthmeise.*

Borkhau-

Borkhausen, Magaz. I. p. 203. n. 83. *Bartmeise; Rohrmeise.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 190. n. 8. Parus (Biarmicus) vertice cano, cauda corpore longiore.

Kramer, Austr. p. 373. n. 1. *Rohrspatz; persianischer Spatz; türkischer Spatz?*

Salerne, ornith. p. 217. Parus barbatus, seu passerculus arundinaceus?

Hermann, tab. affin. anim. p. 224. Parus biarmicus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 392. n. 7. *das Bartmännchen.*

21. Alpinus. *Die Alpenmeise.* (3)

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 597. not. * 3.

Büffon, Vögel, XVII. p. 169. *die Alpenmeise.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 569. n. 21. Parus (Alpinus) niger, subtus rufescens, nigro maculatus, linea alba a basi rostri ad cervicem decurrente, ungue postico longissimo.

22. Sinensis. *Die chinesische Meise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 171. *die chinesische Meise.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 570. n. 24. Parus (Sinensis) ferrugineo-fuscus, capite colloque dilutioribus, remigibus caudaque elongata fuscis, nigro marginatis.

23. Malabaricus. *Die malabarische Meise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 172. *die malabarische Meise;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 564. n. 5. Parus (Malabaricus) griseus, gula alis rectricibusque

(3) Nach *Bechstein* vielleicht ein junger *Parus Caudatus.*

duabus intermediis nigris, corpore subtus, uropygio macula alarum basique tectricum lateralium fulvis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 159. *die Meise von der Küste Malabar.*

24. Sibiricus. *Die sibirische Meise.*

Buffon, Vögel, XVII. p. 132. *die sibirische Meise mit dem weißen Gürtel;* m. e. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 371. n. 25. Parus (Sibiricus) griseo-fuscus, subtus albidus, abdomine rufo-griseo, collo inferiore medio nigro, hypochondriis rufescentibus.

β. *Latham*, Syn. II. 2. p. 556. n. 23. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 371. n. 25. β. P. cinereo-fuscus, subtus fronteque albus, collo subtus pectoreque medio nigris, cauda longiore obscura.

25. Knjaesziok. *Der Knjasziok.* (*)

Buffon, Vögel, XVII. p. 174. *der Knjäscok.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 572. n. 30. Parus (*Knjarscik*) albus, subtus macula continua, linea oculari et collari lividis.

26. Hudsonius. *Die Meise von der Hudsonsbay.* (+)

Pennant, arct. Zool. II. p. 397. n. 246. *die Meise von der Hudsonsbay.*

Buffon, Vögel, XVII. p. 176. *die Hudsonsmeise.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 566. n. 11 Parus (Hudsonius) fusco-rubescens, dorso cinereo, iugulo

(*) Das russische Wort bedeutet einen kleinen Fürsten; ein Prinzchen.

(+) Länge 5 5/8. Zoll. Flügelweite 7. Zoll. Gewicht 1/2. Unze. *Penn.*

iugulo atro, fascia suboculari pectoreque albis; hypochondriis rufis.

27. MACROCEPHALUS. *Die großköpfige Meise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 178. *die großköpfige Meise.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 571. n. 26. Parus (Macrocephalus) niger, abdomine albido, pectore subfulvo, fronte maculaque alarum albis.

28. NOVAE SEELANDIAE. *Die neuseeländische Meise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 179. *die Neuseeländische Meise.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 571. n. 27. Parus (Novae Zealandiae) cinereo-ruber, subtus rufo-griseus, superciliis albis, rectricibus duabus intermediis nigris, lateralibus medio macula quadrata alba.

13. PENDULINUS. *Die Beutelmeise* (5)

Müller, Natursyst. II. p. 629. n. 13. *die Beutelmeise.* tab. 21. Fig. 5.

Leske, Naturgesch. p. 265. n. 6. *der Pendulin.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 178. n. 1. *die Beutelmeise; Pendulino, Remitz, Cottonvogel.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 195 n. 5. Parus (Pendulinus) capite subferrugineo, fascia oculari nigra, remigibus rectricibusque fuscis, margine utroque ferrugineo. *Pendulinmeise; Remitz.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 550. n. 8. *die Beutelmeise.*

Funke, Naturgesch. I. p. 273. *die Beutelmeise.*

Ebert, Naturl. II. p. 148. *die Beutelmaise.*

Ccc 5 *Halle*,

(5) Legt 4. oder 5. schneeweisse, fast durchsichtige Eyer. Brütet gewöhnlich zweymal.

Halle, Vögel, p. 361. n. 351. *die Pendulinmeise, Sumpfmaise, litthauische Remitzvogel mit dem Hängeneste; Rohrmaise; Vollhinische Beutelmaise mit dem Schnabel des Fliegenspießer; Grasmükke an Sümpfen;* Fig. 22.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 436. n. 385. *die Beutelmeise; Florentinermeise*, etc.

Onomat. hist. nat. VI. p. 189. *polnische Beutelmaise.*

Klein, av. p. 86. n. 10. Parus lithuanicus nidum suspendens.

Klein, Vorbereit. p. 161. n. 10. *vollhynische Beutelmeise.*

Klein, verb. Vögelh. p. 88. n. 10. *vollhynische Beutelmeise.*

Klein, Stemmat. av. p. 17. tab. 17. fig. 13. a. b.

Brisson, ornith. I. p. 467. n. 11. Mésange de Pologne ou Remiz.

Büffon, Vögel, XVII. p. 95. *der Remiz;* m. e. Fig.

Batsch, Thiere, p. 358. *der Pendulin.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 568. n. 18. Parus (Pendulinus) capite subferrugineo, fascia oculari nigra, remigibus rectricibusque fuscis, margine utroque ferrugineo.

Fischer, Livl. p. 104. n. 176. *Beutelmeise.*

Rytschkov, orenb. Topogr. p. 244. *Remes.*

Strahlenberg, Asien, p. 416. *Remes.*

Pallas, nord. Beytr. III. p. 2. IV. p. 14. *Remesvogel.*

Naturforsch. XVII. p. 109. *volhynische Beutelmeise.*

Allgem. Magaz. II. p. 238. 249. *Remitz;* mit Abbild. des Vogels und Nests.

Hamburg. Magaz. XVIII. p. 228 *litthauische Remitzvogel;* mit Abbildung des Vogels und des Nests. (Titius Abhandl.)

Smellie,

Smellie, Philos. der Naturgesch. II. p. 63. *Pendulin.*

Börner, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 108. Parus pendulinus.

Meidinger, Vorles. I. p. 150. n. 6. *der Pendulin.*

Christ. Friedr. Ludwigii, delect. opusculor. ad scient. nat. spectant. Lips. 1790. p. 147. c. Fig. (Abhandl. von Titius.)

Journal de physique. Aout. 1776. Mesange de marais.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 189. n. 33. Motacilla (Pendulinus) capite ferrugineo, macula nigra oculari, remigibus rectricibusque fuscis, margine utroque ferrugineis.

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 402. Parus nidum suspendens.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 393. n. 9. *die Beutelmeise.*

29. NARBONENSIS. *Die Meise von Languedoc.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 110. *der Pendulin*; m. e. Fig.

Latham, Syst. ornith. II. p. 568. n. 19. Parus (Narboniensis) rufo-griseus, vertice cano, alis caudaque nigricantibus rufo-marginatis, remigibus primoribus margine albis.

Hist. Prov. I. p. 517. Pendulino ou Canari sauvage.

14. CELA. *Die guianische Meise.*

Müller, Natursyst. II. p. 629. n. 14. *die gefleckte Meise.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 183. *die gefleckte Meise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 160. *die schwarze Meise oder Cela des Linné.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 568. n. 16. Parus (Cela) niger, rostro albo, macula alarum basique caudae flavis.

Bankroft, N. G. von Guian. p. 110. *die schwarze Meise.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 191. n. 12. Parus (Cela) niger, rostro albo, macula alarum basique caudae flavis.

30. AMATORIUS. *Die verliebte Meise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 156. *die verliebte Meise.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 568. n. 17. Parus (Amorosus) caeruleo - nigricans, macula alarum longitudinali rufo flavoque dimidiata.

31. COCCINEUS. *Die scharlachrothe Meise.* (6)

Büffon, Vögel, XVII. p. 164. *die ausländische Meise.*

32. INDICUS. *Die indianische Meise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 180. *die indianische Meise.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 572. n. 29. Parus (Indicus) cinereus, subtus albidus, pectore abdomine crissoque ferrugineis, rostro pedibus alis caudaque nigro fuscis.

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit *acht* Gattungen vermehrt. Bey der 8ten Gattung sind *drey* Varietäten auseinander gesetzt.

117. GE-

(6) Nach *Latham* mit *Parus peregrinus*, p. 1010. n. 10. einerley.

117. GESCHLECHT. HIRUNDO. *Die Schwalbe.*

Müller, Naturfyft. II. p. 630. Gen. CXVII.
Leske, Naturgefchichte, p. 266. Gen. XLVII.
Borowsky, Thierreich, III. p. 154. Gen. LXV.
Blumenbach, Handb. d. Naturgefch. p. 196. Gen. XXXIX.
Bechstein, Naturgefch. I. p. 552. Gen. LXXVIII.
Funke, Naturgefch. I. p. 274.
Ebert, Naturl. II. p. 149.
Halle, Vögel, p. 345. Gen. VIII.
Pennant, arct. Zool. II. p. 401.
Neuer Schaupl. d. Nat. VII. p. 792.
Onomat. hift. nat. IV. p. 216.
Klein, av. p. 82 trib. 2.
Briffon, ornithol. I p. 293. Gen. XXX.
Batfch, Thiere, I. p. 318. Gen. LXXXI.
Latham, Syft. ornith. II. p. 572. Gen. XLVI.
Hermann, tab. affin. anim. p. 229.
Donndorff, Handb. d. Thiergefchicht, p. 394. LXXXVI.

1. RUSTICA. *Die Rauchfchwalbe.* (7)

Müller, Naturfyft. II. p. 630. n. 1. *die Rauchfchwalbe.*

Leske,

(7) Die Benennungen diefer und der *dritten* Gattung (Hirundo urbica) werden häufig verwechfelt. Diefe Schwalbe ift es eigentlich nicht, von der behauptet wird, dafs fie fich im Herbft in Sümpfe und Teiche verftecke, fondern die *Uferfchwalbe*; doch verfichern es auch mehrere von der *Rauch* - und *Hausfchwalbe*. Die ganze Sache ift überhaupt noch nicht aufs Reine. Für die Wanderungen der Schwalben giebt es Zeugniffe, die fchlechterdings unverwerflich find. Aber eben fo unwiderfprechliche Thatfache ift es auch, dafs man Schwalben, — nicht einzeln, nicht etwa im Herbfte, fondern mitten im Winter bey 6, 10, und mehreren aus dem Schlamme in den Teichen und andern

Leske, Naturgesch. p. 266. n. 1. *die Rauchschwalbe.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 155. n. 2. *die Rauchschwalbe, Stachelschwalbe.*

Blumenbach, Handb. d N. G. p. 196. n. 1. Hirundo (Domestica) rectricibus, exceptis duabus intermediis, macula alba notatis; *die Rauchschwalbe, Feuerschwalbe, Stadtschwalbe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 553. n. 1. *die Rauchschwalbe; Feuerschwalbe.*

Funke, Naturgesch. I. p. 274. *die Rauchschwalbe.*

Ebert, Naturl. II. p. 150 *die Rauchschwalbe; Bauernschwalbe; Küchenschwalbe.*

Halle, Vögel, p. 349. n. 336. *die Rauchschwalbe.*

Meyer, Thiere, II. tab. 86. *Haußschwalbe.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch d. Th. II. p. 477. n 387. *die Rauchschwalbe; Feuerschwalbe, Küchenschwalbe, Stadtschwalbe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 401. n. 247. *die Rauchschwalbe.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 249. *Fensterschwalbe, Leimschwalbe, Giebelschwalbe, Hausschwalbe.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 139. *Rauchschwalbe*, etc.

Klein, av. p. 82. n. 2. Hirundo domestica.

Klein, Vorbereit. p. 154. n. 2. *Rauch - Küchenschwalbe.*

Klein, verb. Vögelh. p. 84. n. 2. *Rauchschwalbe, Bauern -, Küchen -, Brücheschwalbe.*

Klein, Stemmat. av. p. 15. tab. 17. Fig. 2. a—c.

Klein, Vögeleyer, p. 27. tab. 10. Fig. 2.

Gesner, Vögelb. p. 453. *Hausschwalb; Schwalbe; Schwalb; Schwalm;* m. e. zieml. gut. Fig.

Brisson,

dern Gewässern gefunden hat, die in der Stubenwärme aufgelebt und herumgeflattert sind. Am Ende dieses Geschlechts wird man ein umständliches Verzeichniss mehrerer hieher gehörigen Schriften finden.

Brisson, ornith. I. p. 294. n. 1. Hirondelle de Cheminée.

Batsch, Thiere, I. p. 363. *die Rauchschwalbe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 192. Common Swallow.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 572. n. 1. Hirundo (Rustica) nigro caerulescens, subtus albida, fronte gulaque castaneis, rectricibus lateralibus macula alba notatis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 197. *die Rauchschwalbe.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 148. n. 1. *die Rauchschwalbe, Rookschwälnen.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 446. *Rauchschwalbe; Bauernschwalbe.*

Fischer, Livl. p. 105. n. 177. *gemeine, oder Bauernschwalbe.*

Cetti, Sardin. II. p. 227. *die Rauchschwalbe.*

Wolf, Reis. n. Zeilon, p. 136. *die Schwalbe.*

Forster, Reis. Ed. in 8. I. p. 48. *die gewöhnliche Hausschwalbe.*

White, N. G. von Engl. p. 7. 17. 21. p. 33. n. 3. p. 54. p. 56. p. 58. n. 3. p. 63. n. 8. p. 66. n. 6. p. 101. p. 128. *Rauchschwalbe.*

Fabric. Reis. n. Norw. p. 181. Hirundo rustica.

Pallas, Reise Ausz. II. p. 8. III. p. 185. *Rauchschwalbe; Hausschwalbe.*

Pontoppidan, Dännem. p. 175. n. 1. *Marksvale; Forstuesvale; Feldschwalbe.*

Pontoppidan, Norweg. II. p. 186. *Svale.*

Adanson, Senegall. p. 97. 131. *Schwalben.*

Linné, Abhandl. II. p. 306. n. 142. *die Rauchschwalbe.*

Bartram, Reis. d. Karolina, p. 288. Hirundo cerdo. *Rauchschwalbe.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 204. n. 249. *Hausschwalbe; Stachelschwalbe.*

Natur-

Naturforsch. XVII. p. 109. n. 1. *die Rauchschwalbe.*
Stralsund. Magaz. I. p. 22. *Rauchschwalbe.*
Allgem. Reis. IV. p. 267. *Schwalben.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 399. *die Hauß Schwalbe.*
Meidinger, Vorles. I. p. 150. n. 1. *die Rauchschwalbe.*
Goeze, nützl. Allerl. II. p. 400. *Rauchschwalbe; Stadtschwalbe.*
André u. Bechstein, Spatzierg. I. p. 303. *die Rauchschwalbe.*
Beckmann, Naturhist. p. 56. a. *die Hausschwalbe.*
Eberhard, Thiergesch. p. 78. *gemeine Schwalbe.*
Borkhausen, Magazin, I. p. 192. n. 72. *Rauchschwalbe; Stachelschwalbe; innere Hausschwalbe.*
Geoffroy, mat. med. VII. p. 525. *Hausschwalbe.*
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. Hirundo domestica.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 1. Hirundo domestica.
Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 191. n. 1. Hirundo (Rustica) rectricibus, duabus intermediis exceptis, macula alba notatis.
Charleton, onom. zoic. p. 89. Hirundo.
Kramer, Austr. p. 380 n. 1. Hirundo rectricibus, excepto pari intimo, alba macula notatis. *Hausschwalbe.*
Schwenkfeld, av. Siles. p. 286. Hirundo I. *Haus-Schwalbe; Giebel Schwalbe.*
Möhring, av. gen. p. 46. n. 38. Hirundo.
Sibbald, Scot. illustr. II. 3. p. 21. Hirundo domestica.
Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 283. Hirundo domestica.
Schaeffer, element. ornithol. tab. 40.
Zinnani, Uov. p. 48. tab. 7. Fig. 35. Rondine minore.

Philos.

Philos. Transact. LI. p. 459. LIII. p. 101. LXV. p. 528. 343.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 24. c. 53. L. 18. c. 26. c. 35. Hirundines.

Aelian. de nat. anim. L. 1. c. 52. L. 3. c. 24 25. Χελιδων.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 394. n. 1. *die Rauchschwalbe.*

β. *Die weiße Schwalbe.*

Brisson, ornith. I. p. 294. n. 1. A. Hirondelle blanche.

Latham, Syn. II. 2. p. 563. White Swallow.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 573. n. 1. β.

Will. ornith. p. 155. Hirundo prorsus candida.

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 450. *weiße Schwalben.*

Naturforsch. I. p. 63. n. 10. et 11. *ganz weiße Stachelschwalbe.*

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 116. n. 4.

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 149. n. 1. β. *weiße Rauchschwalbe.*

Ledel: hirundo alba. Eph. nat. cur. Dec. III. an. 1. obs. 54. p. 84.

Wallin, diss. de hirundine alba. Ups. 1733 4.

Rzaczynsky, auct. hist. nat Pol. p. 285. Hirundo candida.

Aelian. de nat. anim. L. 10. c. 34. Χελιδονες λευκαι.

13. Tahitica. *Die tahitische Schwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 573. n. 2. Hirundo (Tahitica) fusco-nigricans, corpore supra caeruleo-nitente, fronte colloque subtus purpureo-fulvis, cauda subforficata nigra.

2. Esculenta. *Die Salangane.* (8)

Müller, Naturfyst. II. p. 631. n. 2. *die chinesische Schwalbe.*

Leske, Naturgesch. p. 266. n. 2. *die chinesische Schwalbe.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 156. n. 3. *die chinesische Schwalbe.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 198. n. 4. Hirundo (Esculenta) rectricibus omnibus macula alba notatis; *die Salangane.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 555. n. 6. *die Indianische Schwalbe.*

Ebert,

(8) Zehen solche Vögel wiegen zusammen etwa 2 1/2 Unze, und 1/2 Drachme. Nisten auf unterschiedenen Höhen von 50. bis 300. Fuss. Der Stoff dieser so berufenen *Tunkinsnester* ähnelt der Hausenblase, ist aber noch nicht weiter bekannt genug. Zur Verfertigung des Nests braucht der Vogel 2 Monathe, dann legt er 2. Eyer, die in 15. bis 16 Tagen ausgebrütet werden. So bald die Jungen flück sind, fängt man an die Nestchen einzusammeln, welches mit grosser Gefahr verbunden ist, und vielen Menschen das Leben kostet. Die Nester werden getrocknet, gereinigt und in Körbe gelegt, an die Chineser verkauft. Der Preiss hängt von ihrer Weisse und Feine ab. Die von der besten Sorte sind sehr rar. 125 Pfund werden von 500. bis zu 1400. Thalern bezahlt. Auf der Insel Java werden ohngefähr etwas über 2500. Pfund solcher Nestchen eingesammelt. Die Insel zieht also, wenn man 125. Pfund nur zu 1000. Thaler rechnet, 20,000. Thaler. Die Nester werden zu einem schleimigen Brey gekocht, des Nachts in Thau gesetzt, und mit Zukker vermengt. Sie werden auch zu Suppen und andern Speisen genommen. Sie müssen aber, wie es heisst, 24. Stunden kochen. — Dieser Vogel bewohnt die Sundaischen und andere Inseln des Indischen Archipelagus bis Neu-Guinea; Java, Sumatra, Coromandel, Tunkin; soll aber in China selbst nicht angetroffen, und nur deswegen die *chinesische Schwalbe* genannt werden, weil die meisten Nester nach China kommen, und daselbst verbraucht oder weiter verkauft werden. Auch die Vögel werden gegessen, sind aber schwer zu bekommen, und werden für sehr erhitzend gehalten.

Ebert, Naturl. II. p. 152. *die chinesische Felsenschwalbe.*

Halle, Vögel, p. 353. n. 341. Hirundo sinensis nido eduli.

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 438. n. 388. *die Indianische Schwalbe.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 238. *die chinesische Felsenschwalbe mit dem eßbaren Neste.*

Klein, av. p. 84. n. 7. Hirundo sinensis nido eduli.

Klein, Vorbereit. p. 157. n. 7. *Sinesische Felsenschwalbe.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 86. n. 10. *Sinesische Felsenschwalbe.*

Brisson, ornith. I. p. 300. n. 14. Hirondelle de rivage de la Cochinchine.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 580. n. 26. Hirundo (Esculenta) nigricans, subtus albida, rectricibus omnibus apice albis.

Valentini, mus. museor. I. p. 468. c. 23.

Museum Wormian. p. 311.

Allgem. Reis. VIII. p. 120. *Saroy Boura* (Nester.)

Allgem. Reis. XI. p. 407. (Nester.)

Mannigfaltigk. II. p. 510. *von indianischen Vogelnestern.*

Bohns Waarenlager, p. 598. (das Nest.)

Halle, Magie, III. p. 570. *die eßbaren Vogelnester.*

Fabri, geographisches Lesebuch, I. p. 70. *von den eßbaren Vogelnestern im Orient.*

Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. II. 3. p. 3. *Beschreibung des eßbaren Vogelnestes.*

Verhandlingen van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Weetenschappen, Th. 3.

Houttyn, Natuurlyke Historie I. Deels. V. Stuk. 607.

Christ. Wang, Schwed. Koch- u. Haushalt. Buch, a. d. schwed. übers. Greifsw. 1772. p. 540.

Beckmann, physſ. ökon. Bibl IV. p. 590.

Philoſ. Transact. XXIII. p. 1396. 36. Hirundo maritima.

Smellie, Philoſoph. der Naturgeſch. II. p. 68.

Meidinger, Vorleſ. I. p. 151. n. 5. *die chineſiſche Schwalbe.*

Goeze, Natur, Menſchl. u. Vorſ. IV. p. 82.

Hennings Geſchichte des Carnatiks, in Beziehung auf das Tanjourſche Gebiet, etc. Th. 2. 1785.

Marsden, Sumatr p. 141. Layong-Layong.

Voy. de Siam. I. p. 278 ſ. — Forreſt. voy. p. 28.

Linné, Syſt. Nat. Edit X. I. p. 191. n. 2. Hirundo (Eſculenta) rectricibus omnibus macula alba notatis.

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 395. n. 2. *die Salangane.*

14. BORBONICA. *Die bourboniſche Schwalbe.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 580. n. 27. Hirundo (Borbonica) fuſco-nigricans, ſubtus griſea fuſco-maculata, cauda integra.

β. *Latham*, Syn. II. 2. p. 581.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 580. n. 27. β. Hirundo fuſco nigricans, ſubtus griſea, maculis longitudinalibus fuſcis, rectricibus 3. exterioribus apice albidis.

Pl. enl. n. 544. f. 2. Hirondelle de Bourbon?

15. FRANCICA. *Die Schwalbe von der Inſel Frankreich.*

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 580. n. 28. Hirundo (Francica) nigricans, ſubtus uropygioque albido.

16. AME-

16. AMERICANA. *Die amerikanische Schwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 581. n. 29. Hirundo (Americana) fusco-nigricans, viridi-nitens, subtus albida, uropygio crissoque rufis.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 581. n. 29. β. Hirundo fusco nigricans subtus albida, gula, uropygio crissoque rufis.

3. URBICA. *Die Hausschwalbe.* (9)

Müller, Natursyst. II. p. 632. n. 3. *die Hausschwalbe.*

Leske, Naturgesch. p. 267. n. 3. *die Hausschwalbe.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 154. n. 1. *die Haus-, Giebel-, Fenster-, Leimschwalbe;* tab. 65.

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 197. n. 2 Hirundo (Agrestis) pedibus hirsutis, rectricibus immaculatis, dorso nigro caerulescente, tota subtus alba. *Die Hausschwalbe; Fensterschwalbe; Mehlschwalbe; Spyrschwalbe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 553. n. 2. *die Hausschwalbe.*

Funke, Naturgesch. I. p. 275. *die Hausschwalbe.*

Ebert, Naturl. II. p. 150. *die Hausschwalbe.*

Halle, Vögel, p. 350. n. 337. *die Fensterschwalbe; Landschwalbe.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 439. n. 389 *die Hausschwalbe; Dorfschwalhe, Spirkschwalbe, Speyerl*, etc.

(9) Die Anekdote, dass mehrere Schwalben dieser Art, wenn sie einen Sperling nicht aus ihrem Neste loswerden können, sich versammeln und ihn einmauern, finde ich schon bey *Conrad. Gesner*, l. c. und in dem Buche vom *P. Bougeant:* Sur le langage des Bêtes, à la Haye, 8. 1739. p. 79. aber ich bezweifle ihre Richtigkeit.

Pennant, arct. Zool. II. p. 402. n. 248. *die Hausschwalbe.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 249. *die Fensterschwalbe; Laimschwalbe.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 140. *Dorfschwalbe*, etc.

Klein, av. p. 82. n. 1. Hirundo domestica.

Klein, Vorbereit. p. 154. n. 1. *Hausschwalbe.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 84. n. 1. *Hausschwalbe.*

Klein, Stemmat. av. p. 15. tab. 17. Fig. 3. a—c.

Gesner, Vögelb. p. 460. *Murspyr, Münsterspyr; Kirchschwalb, Weißspyr.*

Brisson, ornith. I. p. 295. n. 2. petite Hirondelle, ou Martinet à cul blanc.

Batsch, Thiere, I. p. 363. *die Hausschwalbe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 192.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 573. n. 3. Hirundo (Urbica) nigro-caerulescens, subtus alba, rectricibus immaculatis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 198. *die Hausschwalbe.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 1 9. n. 2. *die Kirchenschwalbe.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 450. *die Hausschwalbe.*

Cetti, Sardin. II. p. 229. *die Hausschwalbe.*

Fischer, Livl. p. 105. n. 178. *die Hausschwalbe.*

White, N. G. von Engl. p. 8. *Rauchschwalben.* p. 33. n. 4. p. 58. n. 4. p. 66. n. 6. p. 94. p. 128. n. 4. *Hausschwalbe.*

Pontoppidan, Dännem. p. 175. n. 2. *Byesvale; Skorstensvale.*

Pallas, Reis. Ausz. II. p. 8. *Hausschwalbe.*

Linné, Abhandl. II. p. 306. n. 143. *die Hausschwalbe.*

Scopoli,

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 205. n. 250. *die Spyrschwalbe, Mehlschwalbe.*

Naturforsch. XVII. p. 110. n. 227. *die Hausschwalbe.*

Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 294. *Hausschwalbe.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 400. *die zweyte Hausschwalbe.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 67. *Haus-Schwalbe.*

Erxleben, physik. Bibl. II. p. 198.

Goeze, nützl. Allerl. I. p. 21. II. p. 401. *Mehlschwalbe.*

Borkhausen, Magaz. I. p. 194. n. 73. *Mehlschwalbe; äußere Hausschwalbe; Spyrschwalbe.*

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. Hirundo rustica.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 32. n. 2. Hirundo rustica.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 192. n. 3. Hirundo (Urbica) rectricibus immaculatis, dorso nigrocaerulescente.

Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 1. Hirundo agrestis, rustica n. 4. Hirundo Apos minor.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 288. Hirundo II. Hirundo domestica altera. Hirundo apus minor. *Leimschwalbe; Laubenschwalben; Dachschwalben, Fensterschwalben; Kirchscwalben.*

Kramer, Austr. p. 380. n. 2. *Speyerl.*

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 283. Hirundo agrestis.

Jonston, av. p. 117. Hirundo agrestis.

Faun. Arragon. p. 90.

Zinnan, Uov. p. 48. tab. 7. Fig. 34. Rondone minore.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 295. n. 3. *die Hausschwalbe.*

β. *Pennant*, arct. Zool. II. p. 403. *ein Exemplar mit einem schwarzen Rumpfe.*

Latham, Syn. II. 2. p. 565.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 574. n. 3. β. Hirundo nigricans, subtus alba, remigibus rectricibusque apice albis.

γ. *Die weiße Hausschwalbe.* *

Beseke, Vögel Kurl. p. 84. n. 198.

Naturforsch. I. p. 63. n. 12.

Zorn, Petinotheol. II. p. 52.

Borkhausen, Magazin, I. p. 194. ad n. 73.

17. PANAYANA. *Die Schwalbe von Panay.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 574. n. 4. Hirundo (Panayana) nigro-sericea, subtus alba, fronte gulaque ferrugineo-flavis, gula lunula nigro-marginata.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 43. *die Schwalbe von Antigua.*

18. RUFA. *Die Schwalbe mit braunrothem Bauche.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 574. n. 5. Hirundo (Rufa) nigro-splendens, subtus rufa, fronte albida.

19. CAPENSIS. *Die Capschwalbe.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 574. n. 6. Hirundo (Capensis) nigro-caerulescens subtus flavescens nigricante striata, pileo rufo, rectricibus lateralibus macula alba.

4. RIPARIA. *Die Uferschwalbe.* (10)

Müller, Natursyst. II. p. 632. n. 4. *die Uferschwalbe.*

Leske,

(10) Nach *Zorn* brütet sie gewöhnlich zwey Mal. Sie legt unter allen inländischen Schwalbenarten die kleinsten Eyer.

Leske, Naturgeschichte, p. 267. n. 4. *die Uferschwalbe.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 156. n. 4. *die Ufer-, Sand-, Strand-, Wasserschwalbe.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 197. n. 3. Hirundo (Riparia) cinerea, gula abdomineque albis. *Uferschwalbe; Erdschwalbe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 554. n. 3. *die Uferschwalbe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 60. *Ufer- oder Erdschwalbe.*

Funke, Naturgesch. p. 275. *die Uferschwalbe.*

Ebert, Naturl. II. p. 151. *die Uferschwalbe.*

Halle, Vögel, p. 251. n. 338. *die Uferschwalbe.*

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere II. p. 440. n. 390. *die Uferschwalbe; Wasserschwalbe*, etc.

Pennant, arct. Zool. II. p. 403. n. 249. *die Uferschwalbe.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 244. *die Erdschwalbe.*

Handb. der deutschen Thiergesch. p. 140. *Uferschwalbe.*

Klein, av. p. 83. n. 3. Hirundo riparia.

Klein, Vorbereit. p. 155. n. 3. *Erdschwalbe; Ufer-, Sand-, Rhein, Wasserschwalbe.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 84. n. 3. *Uferschwalbe.*

Klein, Stemmat. av. p. 16. tab. 17. fig. 5. a — c.

Klein, Vögeleyer, p. 27. tab. 10. fig. 4.

Gesner, Vögelb. p. 460. *Rheinvogel oder Rheinschwalbe;* m. e. Fig.

Brisson, ornithol. I. p. 299. n. 12. Hirondelle de rivage.

Batsch, Thiere, I. p. 364. *die Uferschwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 575. n. 10. Hirundo (Riparia) cinerea, gula abdomineque albis.

Bock, N. G von Preuss. IV. p. 450. *Rein-, Strand-, Uferschwalbe.*
Fischer, Liv. p. 105. n. 179. *Strandschwalbe.*
Cetti, Sardin. II. p. 237. *di Uferschwalbe.*
White, N. G. von Engl. p. 33. n. 5. p. 50. n. 5. p. 108. p. 109. p. 128 *die Uferschwalbe.*
Pontoppidan, Dännem. p. 175. n. 3. *Digsvale; Jordsvale, Salbakke.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 401. *die Wasserschwalbe.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 67. *die Uferschwalbe.*
Naturforsch. XVII. p. 112. n. 228. *die Uferschwalbe, Bergschwalbe.*
Stralsund. Magaz. I p. 22. *Strandschwalbe.*
Hannöv. Magaz. 1766. n. 97. p. 1546.
Lichtenberg, Magaz. für das Neueste, etc. II. 1. p. 201. *eine Art Schwalbe mit weißem Striße?*
Goeze, nützl. Allerl. II. p. 401. *Uferschwalbe.*
Beckmann, Naturhist. p. 56. c. *die Erdschwalbe.*
Borkhausen, Magazin, I. p. 194. n. 74. *Uferschwalbe.*
Meidinger, Vorles. I. p. 151. n. 3. *die Uferschwalbe.*
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. Hirundo riparia.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 4. Hirundo riparia.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 192. n. 4. Hirundo (Riparia) cinerea gula abdomineque albis.
Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 2. Hirundo riparia; Drepanis; Falcula.
Kramer, Austr. p. 381. n. 4 *Gestetten-Schwalbe.*
Schwenkfeld, av. Siles. p. 288. Hirundo riparia; Ripariola. *Vfer-Schwalbe; Rein-Schwalbe; Wasser-Schwalme.*
Sibbald, Scot. illustr. p. 27. Hirundo riparia.

Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 283. Hirundo riparia.

Jonston, av. p. 117. Hirundo riparia.

Zinnan. Uov. p. 49. tab. 12. fig. 35. Rondine riparia.

Philos. Transact. LIII. art. 24. p. 101.

History of Scilly by *Heath*. p. 300?

Hermann, tab. affin. anim. p. 194. Hirundo riparia.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 396. n. 4. *die Uferschwalbe.*

20. Rupestris. *Die Felsenschwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 576. n. 11. Hirundo (Rupestris) murina, subtus albida, remigibus caudaque nigricantibus, rectricibus latere interiore macula ovali alba.

Scopoli, Bem. aus der N. G. I. p. 207. n. 253. *die Felsenschwalbe.*

21. Montana. *Die Bergschwalbe.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 576 n. 12. Hirundo (Montana) cinerea subtus rufescens, rectricibus, duabus intermediis extimisque exceptis, latere interiore macula ovata alba.

5. Purpurea. *Die Purpurschwalbe.* (1)

Müller, Natursyst. II. p. 630. n. 5. *die Purpurschwalbe.*

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere, II. p. 440 n. 391. *die Purpurschwalbe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 403. n. 250. *die Purpurschwalbe.*

Onomat.

(1) *Pennant* und *Latham* rechnen auch die *Hirundo Violacea* p. 1026. n. 36. hieher; und letzterer nimmt die *Hirundo Sabis* n. 7. als das Weibchen an.

Onomat. histor. natur. IV. p. 243. *die Purpurschwalbe.*

Brisson, ornithol. I. p. 302. n. 17. Martinet de la Caroline.

Latham, Syst. ornith. II. p. 578. n. 22. Hirundo (Purpurea) violacea, caeruleo-nitens, cauda forficata.

Seligmann, Vögel, III. tab. 2. *die purpurfarbene Schwalbe.*

Schöpf, Reis. durch Nordamer. II. p. 308. *die Martinschwalbe.*

Linné, Abhandl. II. p. 281. n. 23. *die Purpur-Schwalbe.*

Goeze, Natur, Menschenl. und Vors. IV. p. 95. *Purpur-Schwalbe.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 396. n. 5. *die Purpurschwalbe.*

6. Apus. *Die Mauerschwalbe.* (2) (eigentliche Spyrschwalbe.)

Müller, Natursyst. II. p. 633. n. 6. *die Mauerschwalbe.*

Leske, Naturgesch. p. 267. n. 5. *die Mauerschwalbe*, tab. 5. Fig. 9.

Borowe-

(2) *Scopoli* und *Borkhausen* machen *Linné* den Vorwurf, dass er die Beschreibung dieses Vogels von todten Exemplaren genommen, wo es vielleicht geschienen habe, als ob alle vier Zehen vorwärts stünden, welches sich aber nicht so verhalte, vielmehr stünde die vierte Zehe nur mehr seitwärts, so dass sie, wenn die übrigen ausgebreitet wären, mit denselben gleiche Richtung zu haben schiene. — *Latham* ist der Meinung, dass aus den vier Gattungen *Hirundo Apus*, *Melba*, *Cayennensis*, und *Sinensis*, wegen der mancherley besondern Abweichungen wohl ein eigenes Geschlecht gemacht werden könne. *Ex digitis omnibus anticis, naribus ellipticis cum duplicatura in latere interno, mandibula quoque inferiore deflexa posset haec avis cum sequentibus* (die ich eben genannt habe,) *proprium genus constituere.* — Scopoli hat dies schon geäusert, l. c. p. 207.

Borowsky, Thierreich, III. p. 157. n. 5. *die Mauer-, Steinschwalbe.*

Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 198. n. 5. Hirundo (Apus) nigricans, gula alba, digitis omnibus quatuor anticis. *Mauerschwalbe; Steinschwalbe; Thurmschwalbe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 554. n. 4. *die Mauerschwalbe.*

Funke, Naturgesch. I. p. 275. *die Mauerschwalbe.*

Ebert, Naturl. II. p. 151. *die Mauerschwalbe.*

Halle, Vögel, p. 351. n. 339. *die Mauerschwalbe,* Fig. 20.

Meyer, Thiere, II. tab. 85. *Mauerschwalbe.*

Gatterer, vom Nutz. und Schad. der Thiere, II. p. 140. n. 392. *die Mauerschwalbe; Spirschwalbe; Spyrschwalbe, Spürschwalbe; Geyerschwalbe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 404. n. 251. *die Mauerschwalbe.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 236. *die Spir-Schwalbe.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 140. *Mauerschwalbe.*

Klein, av. p. 83. n. 4. Hirundo muraria, saxatilis s. speluncaris.

Klein, Vorbereit. p. 155. n. 4. *Mauerschwalbe.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 85. n. 4. *Mauerschwalbe; Spirschwalbe.*

Gesner, Vögelb. p. 461. *Spyr; Spyrschwalb; Gerschwalb; Geyerschwalb;* m. e. zieml. gut. Fig.

Brisson, ornith. I. p. 301. n. 15. Martinet.

Batsch, Thiere, I. p. 363. *die Mauerschwalbe.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 582. n. 32. Hirundo (Apus) nigricans, gula alba, digitis omnibus quatuor anticis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 85. n. 199. *die Mauerschwalbe.*

Siemßen,

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 151. n. 4. *die Mauerschwalbe; Peerdschwälken; Spierschwälken.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 451. *die Mauerschwalbe.*

Fischer, Liv. p. 105. n. 180. *Mauerschwalbe.*

Cetti, Sardin. II. p. 232. *die Mauerschwalbe.*

White, N. G. von Engl. p. 34. n. 11. p. 43. p. 54. p. 59. n. 15. p. 115. p. 128. *die Thurmschwalbe.*

Pontoppidan, Dännem. p. 175. n. 4. *Steensvale; Kirkesvale.*

Linné, Abhandl. II. p. 307. n. 144. *die Mauerschwalbe.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 205. n. 251. *die Thurmschwalbe.*

Naturforsch. XVII. p. 113. n. 229. *die Mauerschwalbe*, n. 230. *die Kirchenschwalbe?*

Zorn, Petinotheol. II. p. 396. *Stein- oder Mauerschwalbe.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 67. *Thurm- oder Mauerschwalbe.*

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 401. *Thurmschwalbe;* p. 402 *Pier- oder Spyrschwalbe.*

Borkhausen, Magazin, I. p. 195. n. 75. *Mauerschwalbe.*

Stralsund. Magaz. I. p. 22. *die Thurmschwalbe.*

Meidinger, Vorles. I. p. 131. n. 4. *die Mauerschwalbe.*

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 57. Hirundo apus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 3. Hirundo apus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 192. n. 5. Hirundo (Apus) nigricans, gula alba, digitis omnibus quatuor anticis.

Charleton, onom. zoic. p. 90. n. 8. Hirundo apos maior.

Kramer,

Kramer, Austr. p. 380. n. 3. Hirundo tota nigra, gula albicante. *Speyer; große Thurmschwalbe.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 289. Hirundo IV. Hirundo muraria; Apes; Depes. *Mauerschwalbe; Geyer Schwalbe; Spyr Schwalbe.*

Sibbald, Scot. illustr. II. p. 31. Hirundo apus.

Rzaczynsky, hist. nat. Pol. p. 283. Hirundo muraria seu saxatilis.

Faun. Arragon. p. 90.

Zinnan. Uov. p. 47. tab. 7. Fig. 33 Rondone.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 396. n. 6. *Mauerschwalbe.*

22. Sinensis. *Die chinesische Schwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 583. n. 35. Hirundo (Sinensis) fusca, subtus griseo-rufescens, pileo rufo, gula orbitisque albis.

Sonnerat, Reis. n. Ostind. u. Chin. II. p. 155. *die große chinesische Schwalbe.*

7. Subis. *Die canadische Schwalbe.* (3)

Müller, Natursyst. II. p. 633. n. 7. *die canadische Schwalbe.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 247. *die Schwalbe von der Hudsonsbay.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 86. n. 7. *Hudsons Mauerschwalbe.*

Brisson, ornith. I. p. 302. n. 18. Hirondelle de la Baye de Hudson.

Latham, Syst. ornith. II. p. 578. n. 22. H. nigro-caerulescens, ore subtusque cinereo-exalbida.

Seligmann, Vögel, V. tab. 15. *die große amerikanische Schwalbe.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 192. n. 6 Hirundo (Subis) nigro-caerulescens, ore subtusque cinereo-exalbida.

8. Sene-

(3) Nach *Latham* das Weibchen von *Hirundo Purpurea*, n. 5.

8. SENEGALENSIS. *Die senegalische Schwalbe.*

Müller, Natursyst. II. p. 634. n. 8. *die senegalische Schwalbe.*

Brisson, ornithol. I. p. 296. n. 5. Hirondelle du Sénégal.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 574. n. 7. Hirundo (Senegalensis) nigra, caeruleo nitens, subtus uropygioque rufa, remigibus rectricibusque nigris.

23. AMBROSIACA. *Die Ambraschwalbe.*

Halle, Vögel, p. 348. n. 334. *die Ambraschwalbe; holländische Seeschwalbe.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 239. *Ambraschwalbe.*

Klein, av. p. 82. n. 4. Hirundo ambram griseam redolens.

Klein, Vorbereit. p. 153. n. 4. *Amberschwalbe.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 84. n. 5. *Ambraschwalbe.*

Brisson, ornithol. I. p. 300. n. 13. Hirondelle de Rivage de Senegal.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 575. n. 9. Hirundo (Ambrosiaca) griseo-fusca, subtus dilutior, cauda maxime forficata.

Seba mus. I. p. 102. tab. 66. Fig. 4. Hirundo marina indigena.

β. H. cinerascens, subtus cinereo-alba, cauda elongata maxime forficata. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 575. n. 9. β. — Syn. Suppl. p. 193.

24. FASCIATA. *Die weißbäuchige Schwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 575. n. 8. Hirundo (Fasciata) nigra, fascia abdominis, maculaque femorum albis.

9. TAPERA. *Die brasilianische Schwalbe.*

Müller, Natursystem, II. p. 634. n. 9. *die amerikanische Schwalbe.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 248. *die Amerikanische Tapera.*

Klein, av. p. 83. n. 1. Hirundo americana, Tapera dicta.

Klein, Vorbereit. p. 155. n. 1. *die amerikanische Tapera.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 85. n. 5. *Tapera.*

Brisson, ornith. I. p. 298. n. 10. Hirondelle d'Amerique.

Latham, Syst. ornith. II. p. 579. n. 23. Hirundo (Tapera) rectricibus subaequalibus, corpore fusco subtus griseo-fusco, abdomine albo.

Jonston, av. p. 198. Tapera.

25. TORQUATA. *Die Schwalbe mit der braunen Brustbinde.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 579. n. 24. Hirundo (Torquata) fusca, subtus alba, fascia pectorali femoribusque fuscis.

26. LEUCOPTERA. *Die weißflüglige Schwalbe.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 579. n. 25. Hirundo (Leucoptera) cinerea caeruleo-nitens, subtus uropygio alisque nebuloso albis.

β. *Latham*, Syn. II. 2. p. 517. n. 27. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 579. n. 25. β. H. supra fusca subtus alba, fusco-maculata.

10. PELASGIA. *Der Stachelschwanz.* (+)

Müller, Natursystem, II. p. 634. n. 10. *die carolinische Schwalbe.*

Halle,

(+) Bewohnt viele Theile von Nordamerika. Kömmt in Neuyork, und Pensylvanien bisweilen früh, bisweilen spät im May an.

Halle, Vögel, p. 353 n. 341. *die Amerikanische Schwalbe mit gestachelt m Schwanze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 405. n. 252. *der Stachelschwanz*, tab. 18.

Onomat. hist. nat. IV. p. 241. *die amerikanische Schwalbe mit dem spitzen Schwanze.*

Klein, av. p. 84. n. 6. Hirundo cauda vel sexies divisa.

Klein, Vorbereit. p. 156. n. 6. *Schwalbe mit wohl sechsmal getheiltem Schwanze.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 86. n. 9. *Schwalbe mit vielmal getheiltem Schwanze.*

Brisson, ornith. I. p. 298. n. 9. Hirondelle de la Caroline.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 581. n. 30. Hirundo (Pelasgia) fusca gula albida, rectricibus aequalibus apice nudo subulatis.

Seligmann, Vögel, IV. tab. 107. *die amerikanische Schwalbe mit dem stachlichten Schwanze.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 192. n. 7. Hirundo (Pelagica) rectricibus aequalibus, apice subulatis nudis.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 397. n. 7. *der Stachelschwanz.*

β. *Pennant*, arct. Zool. II. p. 405. ad n. 252. unten.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 581. n. 30. β.

γ. *Latham*, Syst. ornithol. II. p. 581. n. 30. γ.

27. ACUTA.

Bauet in Schornsteinen, und macht aus kleinen kurzen Reisern, die sie mit dem Gummi des Pechbaums zusammen klebt, ein merkwürdiges Nest, das an der Spitze offen ist, und die Form des dritten Theils von einem Cirkel hat. Sie legt im Junius 4. bis 5. Eyer, und verlässt das Land im August. Sie hängen oft mit den Füssen fest an der Schornsteinwand, und halten sich mit ihrem scharfen Schwanze.

27. ACUTA. *Die martinikische spitzschwänzige Schwalbe.* (5)

Brisson, ornithol. I. p. 297. n. 8. Hirondelle de la Martinique.

Latham, Syst. ornith. II. p. 581. n. 31. Hirundo (Acuta) nigra subtus fusca, gula grisea, rectricibus apice nudo subulatis.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 581. ad n. 31. H. corpore subtus rubro-fusco.

11. MELBA. *Die Alpenschwalbe.*

Müller, Natursyst. II. p. 634. n. 11. *die spanische Schwalbe.*

Halle, Vögel, p. 352. n. 340. *die größte Gibraltarschwalbe.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 240. *die große Gibraltarschwalbe.*

Klein, av. p. 83. n. 2. Hirundo maxima freti Hudsonis.

Klein, Vorbereit. p. 155. n. 2. *große Gibraltarschwalbe.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 85. n. 6. *Gibraltarschwalbe; barbarische Schwalbe.*

Brisson, ornithol. I. p. 299. n. 11. grande Hirondelle d'Espagne.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 582. n. 33. Hirundo (Melba) griseo-fusca, gula abdomineque albis.

Seligmann, Vögel, II. tab. 53. *die größte Schwalbe.*

Cetti, Sardin. II. p. 232. *die Gibraltarschwalbe.*

White, N. G. von Engl. p. 125. *große weißbäuchigte Gibraltarische Schwalbe.*

Scopoli, Bem. a. d. N. G. I. p. 207. n. 252. *die Alpschwalbe.*

(5) Sollte sie wohl von der vorigen wesentlich verschieden seyn?

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 192. n. 8. Hirundo (Melba) fusca, gula abdomineque albis.

28. CAYENNENSIS. *Die cayennische Schwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 583. n. 34. Hirundo (Cayanensis) violaceo-nigricans, capite nigro, gutture fascia oculari bifida, femoribusque albis.

12. DAURICA. *Die sibirische Schwalbe.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 179. n. 13. *die russische Schwalbe.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 179. n. 14. *die sibirische Bergschwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 576. n. 13. Hirundo (Daurica) caerulea, subtus alba, temporibus uropygioque ferrugineis, rectrice extima, longissima, macula alba intus notata.

Pallas, Reis. Ausz. II. Anh. p. 10. n. 19. Hirundo *alpestris.*

Berlin. Samml. IV. p. 565. *daurische Steinschwalbe;* m. e. Fig.

29. ERYTHROCEPHALA. *Die rothköpfige Schwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 577. n. 14. Hirundo (Erythrocephala) nigricans, supra alba marginata, subtus alba, capite rubro, alis caudaque fuscis.

30. UNALASCHKENSIS. *Die Schwalbe von Unalaschka.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 577. n. 15. Hirundo (Aoonalaschkensis) nigricans, subtus cinerascens, uropygio albido.

31. INDICA. *Die indische Schwalbe.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 577. n. 16. Hirundo (Indica) fusca, pileo rufo, corpore subtus albido,

32. NIGRA.

32. N I G R A. *Die schwarze Schwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 577. n. 17. Hirundo (Nigra) tota nigra, alis longissimis, cauda forficata.

β. Latham, Syst. ornithol. II. p. 577. ad n. 17. H. fascia frontali alba.

33. D O M I N I C E N S I S. *Die Schwalbe von St. Domingo.*

Halle, Vögel, p. 353. n. 342. *die Gesangschwalbe.*
Onomat. hist. nat. IV. p. 237. *die Gesangschwalbe.*
Klein, av. p. 83. n. 5. Hirundo cantu alaudam referens.
Klein, Vorbereit. p. 156. n. 5. *Sangschwalbe.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 86. n. 8. *Sangschwalbe.*
Brisson, ornith. I. p. 295. n. 3. Hirondelle de St. Domingue.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 577. n. 18. Hirundo (Dominicensis) nigro-chalybea, abdomine albo, rectricibus nigricantibus.
Feuillée observat. III. p. 267. Hirundo cantu alaudam referens.

34. P E R U V I A N A. *Die Schwalbe von Peru.*

Brisson, ornithol. I. p. 297. n. 7. grande Hirondelle de Peru.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 577. n. 19. Hirundo (Peruviana) nigra subtus alba, fascia abdominali cinerascente, alis caudaque pallide griseis.
Feuillée, obs. III. p. 269. Autre Hirondelle ou Hirundo maxima Peruviana. Avis praedatoris calcaribus instructa?

35. C I N E R E A. *Die graubäuchige Schwalbe.*

Brisson, ornith. II. p. 297. n. 6. Hirondelle du Peru.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 578. n. 20. Hirundo (Cinerea) nigra nitens, subtus cinerea, rectricibus margine griseo-flavescentibus.

Feuillé, obs. III. p. 269. Hirondelle, ou Hirundo minima Peruviana cauda bicorni?

36. VIOLACEA. *Die violette Schwalbe.*

Ist nach *Pennant*, und *Latham* mit *Hirundo Purpurea*, p. 1020. n. 5. einerley.

37. CHALYBEA. *Die stahlglänzende Schwalbe.*

Brisson, ornithol. II. p. 296. n. 4. Hirondelle de Cayenne.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 578. n. 21. Hirundo (Chalybea) nigro-chalybea, subtus fusco grisea, rectricibus nigris.

* * *

Thomasii diss. de hibernaculis hirundinum. Lips. 1658. 1671. 1702.

Bresl. Nat. u. Kunstgesch. VII. Vers. p. 321. VIII. p. 457. XIX. p. 283. XXVIII. p. 409. Von der Wiederkunft der Störche und Schwalben.

Neu hamburg. Magaz. XVIII. St. p. 195. Von dem Winteraufenthalt der Schwalben.

Hamburg. Magaz. IV. p. 406. desgl.

Koburg. Magaz. I. p. 45. desgl.

Neues brem. Magaz. I. p. 412. desgl. V. p. 151.

Oekonom. phys. Ausz. VI. p. 116. IX. p. 140. desgl.

Hannöv. Magaz. 1766. p. 1201. — 1767. p. 79. 315. 1021. 1437. — 1769. p. 167. desgl.

Comment. Lips. Vol. XIII. p. 667. desgl.

Titius: Wittenb. Wochenbl. 1771. p. 78. desgl. XXIII. p. 453.

Leche: diss. de commoratione hybernali et peregrinationibus Hirundinum. Aboae 1764.

Vogel,

Vogel, neue medicin. Bibl. VI. B. 4. St. p. 296.
Büffon, Naturgeschichte der Vögel, I. Einleitung, p. XXII. sqq.
Stralsund. Magaz. I. p. 20. desgl. p. 145.
Sperling, diss. de Hirundine. Wittenb. 1635. 4.
Heunius de hirundinum usu et efficacia in medicina Gryphisw. 1652.
Praetorius, von des Storches und der Schwalben Winterquartier. Frcf. 1678. 8.
White de hirundine domestica. Phil. Transact. LXIV. p. 196.
White de hirundine rustica, Apo et riparia. ib. LXV. p. 258.
Ledel de hirundine alba. — Eph. nat. cur. Dec. III. an. 1. obs. 54. p. 84.
Wallin, diss. de hirundine alba. Ups. 1733. 4.
Oeuvres de *Regnard*, Tom. I. p. 121. (von erstarrten Schwalben.)
Barrington, miscellan. p. 225. (vom Winterschlaf der Schwalben in Sümpfen.)
Praetorius Winterflucht der nordischen Sommervögel. Lpzg. 1678. 8.
Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 446. vom Winteraufenthalt der Schwalben.
Klein, Abhandl. der Danziger Gesellsch. I. p. 474.
Klein, av. p. 195. — Vorbereit. p. 357. — Verb. Vögelhist. p. 208.
Olaus M. de gent. septentr. XIX. p. 20.
Rzaczynsky, hist. nat. Polon. p. 284.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 87.
Borkhausen, Magaz. I. p. 193.
Smellie, Philos. der Naturgesch. II. p. 235.
Beckmann, phys. Bibl. I. p. 187. V. p. 203.
Pallas, Reis. Ausz. II. p. 8.
Fischer, N. G. von Livl. p. 106.
Samml. zur Phys. u. N. G. II. p. 613.

Deutsche Zeit. 1784. p. 24. — *Goeze*, nützl. Allerl. II. p. 244. List einer Schwalbe.

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 57. ob die Rauchschwalben die Kühe stechen? — I. p. 452. verspätete Schwalben.

Onomat. hist. nat. IV. p. 218.

Zorn, Petinotheol. I. p. 432. 435. 442. 451. II. p. 159.

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.	Edit. XIII.
p. 345. n. 12. Hirundo Pratincola.	p. 695. n. 1. Glareola Austriaca.

Das Geschlecht ist mit 25. Gattungen vermehrt. Da aber die 12te Gattung der XII. Edit. anderswohin versetzt, und deren Stelle durch eine neue ersetzt worden; so beträgt die Anzahl der neu hinzugekommenen Gattungen überhaupt 26 — Bey der 1sten Gattung sind *zwey*, bey der 3ten *zwey*, bey der 10ten *drey* Varietäten aus einander gesetzt.

118. GESCHLECHT. CAPRIMULGUS. *Die Nachtschwalbe.* (Tagschläfer; Ziegenmelker.)

Müller, Natursyst. II. p. 636. Gen. CXVIII.

Leske, Naturgeschichte, p 267. Gen. XLVIII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 151. Gen. LXIV.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 198. Gen. XL.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 551. Gen. LXXVII.

Pennant, arct. Zool. II. p. 406.

Onomat. hist. nat. II. p. 607.

Klein,

Klein, av. p. 81. trib. 1.
Brisson, ornithol. I. p. 289. Gen. XXIX.
Batsch, Thiere, I. p. 318. Gen. LXXXII.
Latham, Syst. ornith. II. p. 583. Gen. XLVII.
Hermann, tab. affin. anim. p. 229.
Donndorff, Handb. d. Thiergeschichte, p. 397. Gen. LXXXVII.

1. EUROPAEUS. *Die europäische Nachtschwalbe.* (6)

Müller, Natursyst. II. p. 636. n. 1. *die europäische Nachtschwalbe;* tab. 21. Fig 7.
Leske, Naturgesch. p. 268. n. 1. *die europäische Nachtschwalbe.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 152. n. 1. *der Nachtrabe; Tagschläfer;* tab. 64.
Blumenbach, Handb. d. N. G. p. 198. n. 1. Caprimulgus (Europaeus) narium tubulis obsoletis. *Nachtschwalbe, Ziegenmelker; Ziegensauger; Hexe; Nachtrabe.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 571. *die europäische Nachtschwalbe.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 665. *Nachtrabe.*
Funke, Naturgesch. I. p. 330. *die Nachtschwalbe.*
Ebert, Naturl. II. p. 153. *Ziegenmelker; bärtige Schwalbe.*
Halle, Vögel, p. 345. n. 330. *die große Nachtschwalbe.*
Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 441. n. 394. *die Nachtschwalbe.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 408. A. *der europäische Ziegenmelker.*
Neuer Schaupl. d. Nat. X. p. 216. *Ziegenmelker.*

(6) Die Sage, dass der Vogel die Ziegen ausmelke, hat sich von *Aristoteles* Zeiten bis hieher fortgepflanzt. Auch *Aelian* giebt sie, nach seiner gewöhnlichen Art, für Wahrheit aus.

Onomat. hist. nat. II. p. 607. *Tagschläfer.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 148. *Hexe.*

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 141. *Nachtschwalbe*, etc.

Klein, av. p. 81. n. 1. Hirundo caprimulgus.

Klein, Vorbereit. p. 152. n. 1. *großbärtige Schwalbe; Hexe; Milchauger, Ziegensauger; Kindermelker; Tagschläfer; Nachtschade; Nachtvogel; Pfaffe.*

Klein, verb. Vögelh. p. 83. n. 1. *Hexe.*

Klein, Stemmat. av. p. 15. tab. 17. Fig. 1. α—γ.

Gesner, Vögelb. p. 49. Caprimulgus.

Brisson, ornithol. I. p. 289. n. 1. Tette-chevre; Crapaud-volant.

Büffon, pl. enl. p. 193. Crapaud-volant.

Batsch, Thiere, I. p. 365. *Geismelker.*

Latham, Syn. Suppl. p. 194. European Goatsucker.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 584. n. 5. Caprimulgus (Europaeus) niger, cinereo fusco ferrugineo et albo varius, subtus albo-rufescens, fasciis fuscis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 85. n. 200. *die europäische Nachtschwalbe.*

Siemßen, meklenb. Vögel, p. 153. n. 1. *die europäische Nachtschwalbe; Dagschlap.*

Bock, N. G. von Preuss. IV. p. 452. *Nachtschwalbe, Nachtschatten.*

Fischer, Livl. p. 108. n. 181. *Nachtschwalbe.*

Cetti, Sardin. II. p. 238. *die Nachtschwalbe; Ziegenmelker.*

White, N. G. von Engl. p. 84. n. 18. p. 38. p. 60. n. 19. *Ziegenmelker.*

Pallas, Reise Ausz. I. p. 370. *Nachtschwalbe.*

Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *Nachtschwalbe.*

Pontop-

Pontoppidan, Dännem. p. 175. n. 1. *Natravn; Natskade; Astenbakke.*

Linné, Abhandl. II. p. 283. n. 37. p. 307. n. 145. *europäische Nachtschwalbe.*

Linné, Reis. durch Westgothland, p. 34. (das Nest.)

Naturforsch. XVII. p. 114. n. 231. XXI. p. 199. *Nachtschatten; Ziegenmelker.*

Schwed. Abhandl. XXXVIII. p. 297. *Nachtschwalbe.*

Lange, Briefe zur Naturgesch. p. 40. *Tagschläfer.*

Scopoli, Bem. aus der N. G. p. 209. n. 254. *gemeine Geismelker.*

Lichtenberg, Magaz. I. 3. p. 59. *Nachtschwalbe;* tab. 3. Fig. 4. (der Fuss.)

Lichtenberg u. Voigt, Magaz. V. 2. p. 17. *Ziegenmelker.*

Schneider, zool. Abhandl. p. 144. *die Nachtschwalbe.*

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 402. III. p. 295. *Ziegenmelker.*

Naumann, Vogelsteller, p. 154. *der Tagschläfer.*

André u. Bechstein, Spatzierg. I. p. 342. *der Tagschläfer.*

Mannigfaltigk. III. p. 11. *Ziegensauger.*

Eberhard, Thiergesch. p. 78. *Ziegensauger.*

Beckmann, Naturhist. p. 56. *Nachtschwalbe.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 715. *Nachtrabe.*

Meidinger, Vorles. I. p. 151. *Nachtschwalbe.*

Borkhausen, Magaz. p. 196. n. 76. *Nachtschwalbe.*

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 57. Caprimulgus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 32. n. 5. Caprimulgus.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 193. n. 1. Caprimulgus (Europaeus) narium tubulis obsoletis.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Ed. XII. I. p. 346. n. 1. Caprimulgus (Europaeus) narium tubulis obsoletis.

Charleton, onom. zoic. p. 71. n. 8. Caprimulgus.

Möhring, av. gen. p. 46. n. 38 Hirundo.

Kramer, Austr. p. 381 n. 5. Hirundo cauda integra, ore setis ciliato. *Muckenstecher; Nachtrabl.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 232. Caprimulgus. Fur nocturnus. Connilus nocturnus. *Nachtschade; Tageschläffer; Nacht-Räblin; Nachtvogel; Pfaff.*

Rzaczynsky, auct. hist. nat. Pol. p. 369. Caprimulgus.

Schaefer, element. ornithol. tab. 23.

Gerin. ornithol. I. p. 91. tab. 99

Faun. Arragon. p. 91. — Hist. Selb. p. 62. 94.

Hist. Prov. I. p. 338. Chathuant.

Zinnan, Uov. p. 94. tab. 15. Fig. 84. Covaterra.

Hermann, tab. affin. anim. p. 176. 229.

Plin. hist nat. L. 10. c. 40. Caprimulgi.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 39. n. 213. Αιγοθηλας.

Aelian. de nat. anim. L. 3. c. 39. L. 16. c. 22. Αιγοθηλας.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 398. n. 1. *die europäische Nachtschwalbe.*

3. VIRGINIANUS. *Die langfittige Nachtschwalbe.*

Klein, av. p. 81. ad n. 1. Whip Poor Will.

Klein, Vorbereit. p. 152. Whip Poor Will.

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 83. Whippoorwill.

Brisson, ornith. I. p. 291. Tette chevre de Virginie.

Pennant, arct. Zool. II. p. 407. n. 254. *der langfittige Ziegenmelker;* tab. 18. ob. Fig.

Latham, Syn. Suppl. p. 194. Virginia Goatsucker.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 585. n. 6 Caprimulgus (Virginianus) fusco-nigricante rufescente

cine-

cinereoque varius, subtus albidus fasciis nigricantibus, gula lunula alba.

Seligmann, Vögel, III. tab. 21. *der Whip-Poor-Will, oder kleine Geismelker.*

Seligmann, Vögel, IV. tab. 112. *der Whip-Poor-Will, oder der kleine amerikanische Geismelker.*

Carver, Reis. d. Nordamer. p. 385. *die Nachtschwalbe.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 193. n. 1. β. Caprimulgus minor americanus.

Gerin. ornithol. I. p. 92. tab. 100.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 398. *der langsittige Ziegenmelker.*

4. CAROLINENSIS. *Die kurzsittige Nachtschwalbe.*

Halle, Vögel, p. 347. n. 331. *die karolinische Nachtschwalbe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 406. n. 253. *der kurzsittige Ziegenmelker.*

Onomat. hist. nat. II. p. 608. *der Tagschläfer von Carolina.*

Klein, av. p. 81. ad n. 1. Caprimulgus Carolinensis Catesbeji.

Klein, Vorbereit. p. 152. *der karolinische Ziegensauger.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 83. *die carolinische Nachtschwalbe.*

Brisson, ornithol. I. p. 290. n. 2. Tette-chèvre de la Caroline.

Latham, Syst. ornith. II. p. 584. n. 4. Caprimulgus (Carolinensis) griseo nigricanteque undulatus, subtus griseo-rufescens, lineolis nigricantibus, rectricibus tribus exterioribus latere interiore albis.

Seligmann, Vögel, I. tab. 16. *der carolinische Nachtrab oder Geismelker.*

5. CRI-

5. Griseus. *Die graue Nachtschwalbe.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 584. n. 3. Caprimulgus (Griseus) griseus alis nigricantibus griseofasciatis, rectricibus fasciis fuscis.

6. Jamaicensis. *Die Nachtschwalbe von Jamaica.*

Halle, Vögel, p. 347. n. 333. *die flachköpfige Nachtschwalbe.*

Klein, av. p. 82. n. 3. Hirundo caprimulgi species, *Guiraquerell.*

Klein, Vorbereit. p. 153. n. 3. *eine Abart von unserm Ziegenmelker aus Jamaika.*

Klein, verbess. Vögelhistor. p. 84. n. 4. *zweyter Brasilianer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 584. n. 2. Caprimulgus (Jamaicensis) ferrugineus, nigro-striatus, alis albo variegatis, remigibus fuscis maculis albis, rectricibus fasciis nigris.

7. Grandis. *Die große Nachtschwalbe.*

Brisson, ornith. I. p. 293. n. 7. Grand-Tette-chèvre tacheté du Bresil.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 583. n. 1. Caprimulgus (Grandis) nigricante albo flavescenteque variegatus, subtus albo nigroque varius, area oculorum flavescente, pedibus albis.

Jonston, av. p. 191. Ibijau species magnitudine Noctuae.

8. Albicollis. *Die weißkehlige Nachtschwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 585. n. 7. Caprimulgus (Albicollis) rufo fuscus, albo nigricanteque varius, subtus fuscus nigricanteque transversim lineatus, gula macula triangulari alba.

9. Rufus. *Die rothbraune Nachtschwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 586. n. 9. Caprimulgus (Rufus) rufus nigro-varius, tectricibus alarum corporeque subtus fasciis nigricantibus, remigibus ruso-nigroque, rectricibus nigro fasciatis.

10. Gujanensis. *Die guianische Nachtschwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 586. n. 8. Caprimulgus (Guianensis) fulvus, maculis difformibus, striisque rufis notatus, sub gula lunula alba.

11. Brasilianus. *Die brasilianische Nachtschwalbe.*

Halle, Vögel, p. 348. n. 335. *die Amerikanische Nachtschwalbe.*

Onomat. hist. nat. II. p. 609. *der Ibijau; brasilische Tagschläffer.*

Klein, Vorbereit. p. 84. n. 3. *Brasilianer; Ibijau.*

Brisson, ornithol. I. p. 292. n. 6. Tette-chèvre tacheté du Brésil.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 586. n. 10. Caprimulgus (Brasilianus) nigricans, flavescente varius, punctulis albis, subtus albo nigroque varius, area oculorum flavescente-alba.

Möhring, av. gen. p. 83. n. 110. Nycticorax.

Jonston, av. p. 191 *Ibijau* Brasiliensibus, *Noitibo* Lusitanis.

12. Semitorquatus. *Die Nachtschwalbe mit weißem Halsbande.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 586. n. 11. Caprimulgus (Semitorquatus) nigricans, rufo griseoque maculatus, collo inferiore lunula alba.

13. Ca-

13. Cayennensis. *Die cayennische Nachtschwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 587. n. 12. Caprimulgus (Cayanus) rufo griseoque varius, nigro undulato-lineatus, gula fasciaque alarum alba, temporibus rufis, striis 5. nigris.

14. Acutus. *Die spitzschwänzige Nachtschwalbe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 195. Sharp-tailed Goatsucker.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 587. n. 13. Caprimulgus (Acutus) nigricante fasciatus, supra griseus subtus rufus, capite colloque rufo-fuscis, rectricibus apice subulatis.

2. Americanus. *Die amerikanische Nachtschwalbe.*

Müller, Natursyst. II. p. 638. n. 2. *der Geismelker;* tab. 26. Fig. 4.

Borowsky, Thierreich, III. p. 153. n. 2. *der amerikanische Tagschläfer.*

Gatterer, vom Nutz. u. Sch. d. Th. II. p. 442. n. 395. *die amerikanische Nachtschwalbe.*

Halle, Vögel, p. 347. n. 332. *die Nachtschwalbe mit 2. Röhren auf der Nase.*

Klein, av. p. 81. n. 2. Hirundo Jamaicensis, naribus conspicilia mentientibus.

Klein, Vorbereit. p. 153. n. 2. *Brillennase.*

Klein, verb. Vögelh. p. 83. n. 2. *Brillennase.*

Brisson, ornith. I. p. 291. n. 4. Tette-chèvre de la Jamaique.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 587. n. 14. Caprimulgus (Americanus) toto corpore griseo nigro et xerampelino variegatus, naribus cylindraceis.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 193. n. 2. Caprimulgus (Americanus) narium tubulis eminentibus.

Möhring, av. gen. p. 47. n. 40. Caprimulgus.

Barrere,

Barrere, Franc. equinox. p. 147. Strix ſylvatica maior, pulla. Noctua minor, ex pallido et fuſco varia.

15. TORQUATUS. *Die Nachtſchwalbe mit goldenem Halsbande.*

Latham, Syſt. ornith. II. p. 587. n. 15. Caprimulgus (Torquatus) cinereo-fuſcus, maculis obſcure flavis et albicantibus varius, torque aureo, rectricibus binis intermediis longioribus.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieſes Geſchlechts.*

Edit. XII.	*Edit. XIII.*
p. 346. n. 1. β. Capr. min. americ.	p. 1028. n. 3. Caprimulgus Virginianus.

Das Geſchlecht iſt mit *dreyzehen* Gattungen vermehrt.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Die aſiatiſche Nachtſchwalbe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 195. n. 16. Bombay Goatſucker.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 588. n. 16. Caprimulgus (Aſiaticus) cineraſcens, nigro ferrugineoque nebuloſus, pectore faſciis cinereis, ſtriga verticali nigricante, maxillari maculaque gulae pallidis.

2. *Die indianiſche Nachtſchwalbe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 196. n. 17. Indian Goatſucker.

Latham, Syſt. ornith. II. p. 588. n. 17. Caprimulgus (Indicus) cineraſcens, nigro transverſim

lineatus, genis pectore alisque ferrugineo-maculatis, rectricibus caerulescentibus nigro-fasciatis, extima ferrugineo nigroque varia.

3. *Die gehäubte Neuholländische Nachtschwalbe.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 588. n. 18. Caprimulgus (Novae Hollandiae) fusco nigro albidoque nebulosus, subtus albidus, collo pectoreque fasciis obscuris, crista frontali erecta setacea.

Phillips, bot. Bay, tab. p. 270. Crested Goatsucker.

White, Reis. nach Neu-Süd-Wallis, p. 129. *der gehäubte Ziegenmelker.*

Meyer, zool. Entdeck. p. 58. n. 1. Caprimulgus (Cristatus) cinereo fuscus, subtus pallidus, remigibus caudaque fasciis pallidis numerosis, vibrissis utrinque erecto-cristatis.

Wiederhohlung der neu hinzugekommenen Gattungen.

In dem Geschlecht		Vultur.	8.	Gattungen.
— —	—	Falco.	84.	—
— —	—	Strix.	32.	—
— —	—	Lanius.	28.	—
— —	—	Psittacus.	94.	—
— —	—	Ramphastos.	8.	—
— —	—	Buceros.	8.	—
— —	—	Buphaga.	—	—
— —	—	Crotophaga.	1.	—
— —	—	Glaucopis.	1.	—
— —	—	Corvus.	26.	—
— —	—	Coracias.	11.	—
— —	—	Oriolus.	32.	—
— —	—	Gracula.	4.	—
— —	—	Paradisea.	6.	—
— —	—	Trogon.	4.	—
— —	—	Bucco.	16.	—
— —	—	Cuculus.	26.	—
— —	—	Yunx.	1.	—
— —	—	Picus.	32.	—
— —	—	Sitta.	5.	—
— —	—	Todus.	14.	—
— —	—	Alcedo.	26.	—
— —	—	Merops.	14.	—
— —	—	Upupa.	5.	—
— —	—	Certhia.	29.	—
— —	—	Trochilus.	33.	—
— —	—	Anas.	79.	—
			627.	Gattungen.

Von umſtehender Seite				627.	Gattungen.
In	dem	Geſchlecht	Mergus.	2.	—
—	—	—	Alca.	7.	—
—	—	—	Aptenodytes.	9.	—
—	—	—	Procellaria.	17.	—
—	—	—	Diomedea.	3.	—
—	—	—	Pelecanus.	24.	—
—	—	—	Plotus.	2.	—
—	—	—	Phaëton.	2.	—
—	—	—	Colymbus.	17.	—
—	—	—	Larus.	9.	—
—	—	—	Sterna.	19.	—
—	—	—	Rynchops	—	—
—	—	—	Phoenicopterus.	1.	—
—	—	—	Platalea.	—	—
—	—	—	Palamedea.	—	—
—	—	—	Mycteria.	—	—
—	—	—	Cancroma.	—	—
—	—	—	Scopus.	1.	—
—	—	—	Ardea.	59.	—
—	—	—	Tantalus.	14.	—
—	—	—	Corrira.	1.	—
—	—	—	Scolopax.	29.	—
—	—	—	Tringa.	18.	—
—	—	—	Charadrius.	20.	—
—	—	—	Recurviroſtra.	1.	—
—	—	—	Haematopus.	—	—
—	—	—	Glareola.	1.	—
—	—	—	Fulica.	18.	—
—	—	—	Vaginalis.	1.	—
—	—	—	Parra.	10.	—
—	—	—	Rallus.	21.	—
—	—	—	Pſophia.	1.	—
—	—	—	Otis.	5.	—
				939.	Gattungen.

Von

Von umſtehender Seite.				939.	Gattungen.
In	dem	Geſchlecht	Struthio.	5.	—
—	—	—	Didus.	2.	—
—	—	—	Pavo.	1.	—
—	—	—	Meleagris.	—	—
—	—	—	Penelope.	4.	—
—	—	—	Crax.	—	—
—	—	—	Phaſianus.	4.	—
—	—	—	Numida.	2.	—
—	—	—	Tetrao.	46.	—
—	—	—	Columba.	42.	—
—	—	—	Alauda.	23.	—
—	—	—	Sturnus.	12.	—
—	—	—	Turdus.	98.	—
—	—	—	Ampelis.	4.	—
—	—	—	Colius.	3.	—
—	—	—	Loxia.	46.	—
—	—	—	Emberiza.	50.	—
—	—	—	Tanagra.	25.	—
—	—	—	Fringilla.	71.	—
—	—	—	Phytotoma.	1.	—
—	—	—	Muſcicapa.	72.	—
—	—	—	Motacilla.	125.	—
—	—	—	Pipra.	13.	—
—	—	—	Parus.	8.	—
—	—	—	Hirundo.	26.	—
—	—	—	Caprimulgus.	13.	—
				1630.	Gattungen.

VERZEICHNISS
AUSLÄNDISCHER SYNONYMEN.

41. *Geſchlecht.* ***Vultur.***

1. Gryphus.
Condor, ſpaniſch.
Cuntur, in Peru.
Gryp, holländ.
Ouyrard-Ovaſſon, bey den Maragnonen.
Roc; Ruch, bey den oriental. Völkern.

3. Papa.
Moine, franzöſ.
Monk, holländ.
Cosquauthli; Cozaquauthli, in Mexico.

5. Aura.
Menſchen-eeter, holländ.
Kreng-Raue, bey den Engländ. in Jamaica.
Gallinache, *Marchand*, bey den franzöſ. Reiſebeſchreib.
Turkey Buzard, bey d. europ. Engländern.
Zamuro, auf d. Küſten des ſüdl. Amerika.
Suguntu, in Peru.
Tzopilotl, in Mexico.
Kiankia, *Ouroua*, in Guiana.
Urubu, in Braſilien.

7. Percnopterus.
Råchaene, arab.
Safran-bacha, bey den Türken in Syrien.
Chapon de Pharaon, oder *de Mahomet*, bey den Franzoſen in Aegypten.
Boleta, in Spanien?

12. Cinereus.
Harecatching Vulture, engl.
Sep Popielaty, poln.

42. *Geſchlecht.* ***Falco.***

1. Serpentarius.
Slangea-Vreeter, am Cap.

34. Harpyia.
Ytzquauthli, in Mexico.
Urutaurana, in Braſilien.
Orenoko-Eagle, engl.
Calquin, in Chili.

38. Barbatus.
Jelloo, bey den Mongolen.
β. *Sach*, an den ſamamiſiſchen Alpen.

39. Albicilla.
Fiſke-Orn, norweg.

Piſtoina,

Pistoina, krainisch.
Hafs-Orn; Fisk-ljusen, schwedisch.
Elo, bey den Tungusen?
Maitaslisja, lettisch.
Bielogwost, russisch.
Nektoralik; Terterfoak; Esaruktorsoak; Tingmiarlurksoak, grönländ.

2. Melanaetos.
Ehrglis, lettisch.
Kokkas, ehstnisch.
Orzel mnieyszy, poln.

3. Leucocephalus.
Wapow-Estequan-Mickesue, an d. Hudsonsb.

4. Ossifragus.
Ossifraga, lat.
Orfraye, Bris-os, franz.
Aquilastro, italien.
Sea-Eagle; Osprey, engl.
Gaase-Örn, dänisch.
Skaft, schles.
Quetrantabuessos, Chebalos, span.
Orzel-tomignat; Orzel-morski, poln.
Tepnyms, russisch.
Soudaqua, bey den Huronen.
Peres, hebr.

5. Chrysaetos.
Grand-aigle; Aigle royal; Aigle noble; Aigle doré, französ.
Golden Eagle, engl.
Arent, holländ.
Landörn, dänisch.
Örn, schwed.
Karagush, russ.
Przedny, poln.

12. Milvus.
Milan, französ.
Ecouffe; Ecouffle; Huan, alt französ.
Milvio; Nibbio; Poyana, ital.
Milano, span.
Wowe; Wou, holländ.
Kite; Glead, engl.
Kania, poln.
Glada, schwed.
Wannags, lettisch.
Kannakul, ehstn.
Glente, dänisch.
Aturulia, sardin.

62. Ater.
Mäuseahr, deutsch.
Küken-Dieff, holländ.
Black-Gled, engl.

25. Furcatus.
Snake Hawre, in Carolina.

26. Haliaetus.
Fisktius, schwed.
Skopnia, polnisch.

71. Pondicerianus.
Oiseau brame, französ.
Bramary-Kite, engl.

Tehil, in Hindoſtan.
Kueronden, tamuliſch.

15. Buteo.
Poana, ital.
Buzzard, engl.
Goiran, in Frankr.
Quidvogel, ſchwed.
Kaine, krainiſch.
Skiör-Vänge, norweg.
Oerne-Falk, däniſch.
Alferraz, in Arragonien.
Aſtoreddu, in Sardin.

28. Apivorus.
Slaghök, ſchwediſch.
Muſe-Höeg; Muſe-Vaage, däniſch.
Spend-Hoeg; Morads-Höeg, norweg.

29. Aeruginoſus.
Bozzagro, italien.
Moor-Buzzard, engl.
Tapaju; Falcu-tapaju, in Sardin.
Höenſe-Höeg; Dverg Glente, däniſch.
Hoenſe-Tyv, norweg.

80. Javanicus.
Lang, in Java.

7. Ruſticolus.
Millekulartok, in Grönland?

30. Palumbarius.
Accipiter, latein.
Autour, franzöſ.
Gooſe-hawk, engl.
Aſtore, italien.
Sletfalk; Graa-Falk; Hvid-Falk; Bla-Fugl, Guulbeck, däniſch.
Due-Falk; Stor-Höeg, norweg.
Gaſtrzabwielki; Jaſtrzab golebiow, poln.
Komishark-papanaſew, an d. Hudſonsb.
Bauge, das Männchen; *Jurra*, das Weibchen; } in China.

13. Gentilis.
Falcone, ital.
Faucon, franzöſ.
Örn, ſchwed.
Höenſe-Höeg, däniſch.
Slaetfalk, bey den däniſchen Falkonierern.
Blaaefugl, mit bläulicher Wachshaut. *Guulbek*, mit gelbgrüner Wachshaut. } nach Brünn.
Halkon, ſpaniſch.
Sokol, poln.

ζ. Ater.
Tlotli, in Mexico.
Nebbi, in Braſil.

98. Me-

98 Melanoleucos.
Kaloe Koeroelgoya, ceylonisch.

27. Gyrfalco.
Bialozor, poln.
Kretzel, moskow.
Gyrfalkon, *Gerfalcon*, engl.
Wannags, lettisch.
Kul, ehstn.
Habicht, in Livland.

16. Tinnunculus.
Cercerelle, *Quercerelle*, *Ecrecelle*, alt französ.
Mezy, zu Sologne.
Rabaillet, zu Chalons.
Ratier, in Provence.
Pitrion, in Touraine.
Pitri, zu Saumur.
Preneur des Mulots, in Beauce.
Canibello, Tittinculo, Tintarello, *Garinello*, italienisch.
Cernicalo, *Jernicalo*, spanisch.
Kestrel, *Kestril*, engl.
Pustolka, poln.
Stanchel, *Stannel*, *Stonegall*, in Schottl.
Postoka, Splinza, Skoltsch, krainisch.
Kirke-Falk; *Spurv-Hoeg*, dänisch.
Kyrko-Falk, schwed.
Tilibriecu, *Tilibriu*, in Sardin.
Acertello, *Fottivento*, (nach Zinnan.)
Gheppia, (nach Cetti.)

31. Nisus.
Mouchet, *Emouchet*, französisch.
Spar-hawk; *Sparrow-hawk*, engl.
Croguler, poln.
Spacshoek, schwed.
Sparviero, das Weibchen. } italien.
Mostardo, Terzuolo, das Männchen. } italien.
Spadderi, in Sardin.
Spurre-Hog, dänisch.
Wehja wannags, lettisch.
Wihna-kul. ehstn.
Σπιζιας, griech.

21. Columbarius.
Smal Bird Hawk; *Becafisch* } an der Hudſ.

23. Vespertinus.
Kobez, in Ingrien.
Kober, um Astrachan.
Derbnitschok, russisch.

14. Subbuteo.
Hobreau, französ.
Hobby, engl.
Laerke-Falk, *Blaafalk*, dänisch.
Masshu, schwed.

Krogulek, poln.

118. Aesalon.

Loyette, alt franzöſ.

Passetier; Preneur des Passes, ou de Passerets, in einigen franzöſ. Provinzen.

Smerlo, Smeriglio, ital.

Merlin, engl.

Jack, ſchottl.

Orzemlik, poln.

Αισαλον, griech.

43. *Geſchlecht. Strix.*

1. Bubo.

Bubo, latein.

Grand-Duc, franzöſ.

Barbaian, an einig. Ort. in Frankr.

Great-horn-owl; Eagle owl, engl.

Duc, Dugo, ital.

Buho, ſpan.

Mocho, portugieſ.

Chassetou, Savoyard.

Petive, in Provence.

Puhacz, Sowalezna, poln.

Uf, ſchwed.

Schuifuit, holländ.

Steenugle, däniſch.

Bergugle; Roper, Kat-Ugl-Hane, norweg.

Sova, krainiſch.

Uſpis, lettiſch.

Jänneſehüüp, ehſtn.

Βυας, griech.

Janſchuph, hebr.

Lün; Ulün, ruſſiſch.

Ackia, Ackyk, tatariſch.

Zagan Schubo; Zagan Gorochun, kalmückiſch.

13. Virginiana.

Natowokey Omiſſew, an der Hudſousbay.

Looloo, auf den Freundſchaftsinſeln.

14. Zeylonenſis.

Raia Allia, in Zeylon.

3. Aſio.

Siutitok, Tunnudliorbik, in Grönland?

4. Otus.

Aſio, Otus, latein.

Hibou; moyen Duc, franzöſiſch.

Chat-huant cornu, an einigen Orten Frankr.

Choue; Cornerote, in Bourgogne.

Ducquet, in Gaſcogne.

Chat huant de Bruyeres, in Sologne.

Chouant, in Anjou und Bretagne.

Cloudet, an einigen andern Orten.

Horn-Owl, engl.

Guſo; Barbagianni, ital.

Mochuelo, ſpaniſch.

Horn-Ugla, ſchwed.

Horn-Ugle, däniſch.

Puſzczyk, poln.
Cluk-nocny; Sowa urſata, polniſch?
Mala-Sova, krainiſch.
Amisk-oho, an der Hudſonsbay.

17. Brachyotos.
Mouſe-Hawk, bey den Engl. an d. Hudſonsb.
Thotoſe cauſew, bey den Eingebohrnen daſelbſt.
Woodcoock-Owl, an einigen Orten in Engl.

20. Indica.
Bakkamaena, auf Zeylan.

22. Carniolica.
Wald-Aüffl, im Oeſterreichiſchen.
Giu, in Bologna.
Tſhuk, krainiſch.

5. Scops.
Houette, Chouette, franzöſiſch.
Little-Horn Owl, engl.
Alocharello, Zivetta, Chirino, italien.
Boom-Wiltge, holländ.
Sowka, poln.

6. Nyctaea.
Harfäng, ſchwed.
Gysfugl; Lemäns-Grüs; Gys-ugl, norwegiſch.
Jäggeloſko, lappiſch.
Opik; Opirkſoak, grönl.

26. Cinerea.
Omiſſew-Athinetou, an der Hudſonsbay.

7. Aluco.
Hulotte, franzöſ.
Choue, in Burgund.
Trembleur, in Champagne. (nach Salerne)
Alocho, ital.
Coruſa, portugieſ.
Xura; Kura, katalon.
Howlet, engl.
Lelok; Sowka; Puſzzik, poln.
Nachtugle, däniſch.
Har-Ugglan, ſchwed.
Putwiſta; Puhze, lettiſch.
Surisprakul, ehſtn.

8. Flammea.
Chouette des Egliſes, voilée, blanche, Effraye, Fréſaye, franzöſ.
Freſaye, in Orleans.
Preſaie, in Poitou.
Breſague, in Gaſcogne.
White-Owl, engl.
Kerkugle; Ransugle, holländiſch.
Krakugle, däniſch.
Tuidara, in Braſilien.
Strea, Iſtria, in Sardinien.
Ulu, auf Hindoſtan.
Bum, perſiſch.

9. Stridula.
Chat-huant, französ.
Leech-Owl; Jog-Owl; Schreech-Owl, engl.
Har-Uggla, schwed.
Nat-Ugle, dänisch.
Cabeca, in Katalonien.
Massusu, arabisch?
Bane, syrisch?

11. Funerea.
Cabeticuch; Cabaducutch, an der Hudsonsbay.

12. Passerina.
Katugle, dänisch.
Cucumiau, in Sardinien.
Shipomas-pish, an der Hudsonsbay.

44. *Geschlecht, Lanius.*

12. Excubitor.
Montagasse; Arneat, in Savoyen.
Pouchari; Bouchari, in Bourgogne.
Butcher-bird; Adder-bird, engl.
Gaza; Sperviera; Falconello; Orsto; Castrica; Verla; Stragazzina; Ragazzuia, ital.
Buferlotto, in Bologna.
Tornskade, Harpax, dänisch.
Klavert, norwegisch.
Warfogel, schwedisch.
Velch; Skrakoper, krainisch.
d'Zierzba; Strokos; Wiekszy, poln.
Wapau Whisky John, White Whisky John, an der Hudsf.

31. Leverianus.
Vale Savane, in Cayenne.

7. Nengeta.
Guiraru Nhengeta, in Brasilien.

8. Curvirostris.
Vanga, in Madagascar.

12. *Collurio.*
Pie escrayere; Pie-ancrouelle, französ.

15. Pitangua.
Cuiriri, in Brasilien.
Bemtere, portugies.

17. Rufus.
Schet-Be, in Madagascar.

18. Barbarus.
Gonolek, bey den Negern am Senegal.

22. Madagascariensis.
Calic-Calic, das Männchen, *Bruia*, das Weibchen, in Madagascar.

28. Leucorhynchos.
L'angraien, in Madagasc.

38. Viri-

38 Viridis.

Tcha-chert, in Madagaſcar.

39. Leucocephalus.

Tcha-chert-be, in Madagaſcar.

25. Infauſtus.

Lappſkata; Olyksfogel, ſchwed.

Röd-tiuxa, jemt.

45. *Geſchlecht. Pſittacus.*

Pſittacus, latein.

Ψιττακη, griechiſch.

Παπαγας, neugriech.

Aras, deutſch,
Ara, lat.
Maccav, engl.
→ die groſsen, mit ſehr langem Schwanze.

Kakadu, deutſch,
Cacatua, latein.
Cockatoo, engl.
→ die groſsen, mit kurzem Schwanze und weiſſem Leibe.

Lory, deutſch.
Lorius, latein.
Lori, engl.
→ dergleichen mit rother Farbe.

Sittich, Sittig, deutſch.
Perroquet, franzöſ.
Poppinjay, Poppingay, engl.
Parrot, engl.
Papagalo, ital.
Papagio, ſpan.
→ die buntfarbigen Papageyen.

Parkit, deutſch,
Perruche, franzöſ.
Perroqueet, engl.
→ die kleinen mit langem Schwanze.

Pſittacula, latein.
Petite perruche franzöſ.
Parrakeet engl.
→ die kleinen mit kurzem Schwanze.

Pappanſek, illyriſch.

Popuga, poln.

Dadi, türkiſch.

Tuzzenu, alt mexican. (nach de Laet.)

Papagaut, alt franzöſ.

1. Macao.

Ara, in Braſil.

2. Aracanga.

Aracanga, in Braſilien.

3. Ararauna.

Ararauna, in Braſil.

6. Severus.

6. Severus.
Maracana, in Brasil.

15. Pertinax.
Tui-aputejuba, in Brasil.

32. Aestivus.
Ajuru-curau, in Brasil.

42. Collarius.
Xaxabes, in Jamaica.

46. Geschlecht. Ramphastos.

9. Pavonius.
Xochitenacatl, in Mexico.

2. Piperivorus.
Koulik, in Cayenne.

10. Torquatus.
Cochitenacatl, in Mexico.

7. Malabaricus.
Cherry deanisch, in Bengalen.

3. Rhinoceros.
Engang, in Sumatra.

4. Nasutus.
Tock, in Senegall.
Tullack, *Dymludy*, in Arabien.

50. Geschlecht. Corvus.

1. Corax.
Corvus, latein.
Κοραξ, griechisch.
Cuorvo, spanisch.
Corvo, italien.
Raven, engl.
Corbeau, französ.
Corbin, alt französ.
Escorbeau, in Guienne.
Corbillats, *Corbillards*, die Jungen.
Korp, schwed.
Krak, poln.
Ravn, dänisch.
Korp, norweg.
Rauf, holländisch.
Oreb, hebr.
Gerabib, arab.
Calak, pers.
Woron, russisch.
Pullugak; *Kernektok*, grönländ.
Velch-Oru, krainisch.
Krauklis, ehstnisch.
Kaar, lettisch.
Hawram, illyrisch.
Kakekew, auf Hudsonsb.
Entoas, auf den Sandwich-Inseln.
Koenai, am Natkasund.

3. Corone.
Corneille, französ.
Greille; *Greillat*, alt französ.
Grolle, in Touraine.
Agrolle, in Bourbon.
Canole, in Sologne.
Crouas, in Auvergne.
Croace, in Piemont.

Cornice;

Cornice; Cornacchia; Cornacchio; Gracchio; Corvo ordinario, ital.
Corneia, spanisch.
Crow, engl.
Wraka, illyrisch.
Graula; Busaroca; Cucula, catalon.
Κορωνη, griech.
Κουρουνα, Κομβα, neugriech.
Kurka, chald.
Oru, krainisch.
Turlak, burät.
Blaa-Rage, dänisch.
Maldivian Crow, in Louisiana?
Hahaseu, an d. Hudsonsb.
Kaenne, am Natkasund.

4. Frugilegus.
Frayonne, um Paris.
Graye, alt franzöſ.
Grolle, nach Belon.
Rook, engl.
Roka. schwed. oeland.
Koore Krey; Roek, holländisch.
Gawron, poln.
Σπερμολογος, griech.
Karok, in Pommern.

5. Cornix.
Corneille mantelée, französisch.
Malacchia, *munacchio*, italien.
Royston-Crow; Sea-Crow; Hooded-Crow, engl.
Kroka, schwed.
Krag, dänisch.
Kraaka, norweg.
Urona, polnisch.
Worona, russisch.
Wahrna; Dserves, lettisch.
Warres, Non, ehstn.
Krai; Aaiskrai, niedersächsisch.
Uzana, krainisch.
Bonte Kraey, holländ.
Κορωνη σποδοειδης, neugriech.
Corroga-barza, in Sardinien.

22. Dauricus.
Corneille du Senegal, französisch.
White-breasted Crow, engl.
Alactu, bey den Mongolen.

24. Jamaicensis.
Chattering Crow; Cacao Walk, engl.
Gabbeling Crow, bey den Engl. in Jamaica.

6. Monedula.
Monedula, latein.
Chouette; Chouchette, französ.

Chicas;

Chicas; Chocas; Choucas; Chacotte; Cornillon, in einigen französ. Provinzen.
Jack-Daw, engl.
Ciagula; Tattula; Pola; Monacchia, ital.
Graio; Graia, spanisch.
Beena, im Graubündtschen.
Choue, Caue, Cauette, Cauvette, in Savoyen.
Tschauka, türkisch.
Graake, in der Schweitz.
Ka, Kaw, holländisch.
Kawka; Kawa, illyrisch.
Zegzolka, poln.
Gaeg; Hannekin, im Niederländischen.
Kaja, schwed.
Allicke, dänisch.
Kaa; Kaie; Ravn-Kaate, norweg.
Galka, russisch.
Tun, burät.
Kohsa; Kowahrna, lett.
Ack, ehstnisch.
Anapha, hebr.

7. Glandarius.

Jeay, französ.
Geai; Gai; Jayon; Gayon; Jaques; Jacuta; Geta; Gautereau; Vautrot, in verschied. französ. Provinzen.
Jay; Ja Ja, engl.
Ghiandaja; Gaza verla; Berta; Bertina; Barttino, italien.
Gayo, Cayo, spanisch.
Gaity, Gralla, in Catalon.
Girau; Richau, in Brabant.
Soyka, poln.
Skow-Skade, dänisch.
Kornskrika; Noëtskrika; Aellonskrika, schwed.
Sillawahrus, *Wahrna*, lettisch.
Paskrat, ehstn.
Schoia, krainisch.
Ronscha, russisch.
Μαλακοκρανεως, griech. nach Belon.
Καρακαζα, neugriech.
Piga, in Sardin.

10. Caryocatactes.

Casse-noix, französ.
Nut-cracker, engl.
Merle Alpadie, ital.
Nodde-krige, dänisch.
Not-kraake; Noddeskriger, norweg.
Nottckraka; Notwcka, schwedisch.
Garga, türkisch.
Klesk; Grabulusk, poln.
Kostobryz; Kedrowka, russisch.
Ongolo, tungusisch.

Pähkla-

Bähklatraat, ehstnisch.
Nootekraaker, holländ.

13. Pica.
Pica, latein.
Pie, französ.
Jaquette; Dame; Agasse; Agace; Ajace; Ouasse, an verschied. französ. Orten, und zu verschied. Zeiten.
Gazza; Ragazza; Aregazza; Gazzuola; Gaza dominicana; Gazzara; Pica; Putta, italien.
Grassa, in Catalonien.
Pega; Picata; Pigazza, spanisch.
Pye; Piot; Magpye. Piapet, engl.
Skata, schwed.
Skade; Huus-Skade, dänisch.
Skior; Skiaere; Skate; Tunfugl, norweg.
Skiurra, upländ.
Skära, gothländ.
Häster, in Livl.
Aexter, in Flandern.
Schaggata, lettisch.
Harrakas, ehstn.
Ketsakas, in der livl. Wiek.
Strakavel; Krizstela, illyrisch.
Stroka, poln.
Praka, krainisch.
Soroka, russisch.
Sascharei, burät.
Saschnga, tungus.
Oue-ta-kee-aske, an d. Hudsonsbay.
She-pecum-memewuck, in einigen Gegenden der Hudsonsb.
Κιϛα; Κιττα; Ποικιλις, griech.
Αιγαϛρα, neugriech.

15. Brachyurus.
γ. Bengalensis.
Breve, französ.
Madras-Jay, engl.
Ponnunky-pitta; Ponnandutty, in Indien.

16. Canadensis.
Whiskijohn, Whiskijack, an d. Hudsonsbay.

19. Eremita.
Sonneur, französ.
Wood-Crow from Switzerland, engl.
Corvo Spilato, italien.
Kruk-lesney; Nocay, polnisch.

51. Geschlecht. Coracias.

1. Garrula.
Rollier; Rollier d'Europe, französ.
Roller, engl.

Ellekrage, dänisch.
Blaa-kraake, norweg.
Allekräka, schonisch.
Spansk-kräka, schwed.
Bläkräka, smoländ.
Kraska, poln.
Shagarag, in der Barbarey?

52. *Geschlecht. Oriolus.*

1. Galbula.
Avis icterus, *Galgulus*, latein.
Loriot, französ.
Lorion; *Lourion*; *Louriou*; *Auriou*; *Lauriol*; *Oriol*; *Orio*, alt französ.
Oriot; *Piloriot*; *Bilorot*; *compere Loriot*; *Lausot*; *Merle-jaune*; *Merle doré*; *Cortpandu*, in verschied. französ. Provinz.
Lutronne, bey Abeville?
Oriolo; *Regalbulo*; *Gualbedro*; *Galbero*; *Reigalbero*; *Garbella*; *Regeyo*, *Melziozallo*, *Brusola*; *Rigogalo*, ital.
Oropendola; *Oroyendola*, spanisch.
Witwal; *Gulden Trush*; *Oriole*, engl.
Wilga, *Wywielga*, poln.
Jwolga, russisch.
Wahlod, lettisch.
Canarin Salvatico, in Sardin.
Papagaletto, zu Sassari.

4. Icterus.
Troupiale, französ.
Yellow and black Pie; *Bonana bird from Jamaica*, engl.
Guira-Tangeima, in Brasilien.
Yapou, in Guiana.

52. *Geschlecht. Gracula.*

2. Calva.
Gouling, französ.
Iting, *Tabaduru*, auf den Philipp. Inseln.

6. Saularis.
Dial; *Dyal*, in Bengalen.

7. Quiscula.
Pie de la Jamaique, französ.
Purple Jackdaw, engl.
Tordo, span.
Tequixquiacatzanatl, in Mexico.

54. *Geschlecht. Paradisea.*

Manucodiata, in versch. Sprachen.
Oiseau de Paradis, französisch.
Bird of Paradise, engl.

Passaros

Passaros de Sol, portugiesisch.
Bourong-aru, in Neuguinea.
Boeres, in Indien.

55. *Geschlecht. Trogon.*

2. Curucui.
Couroucou à ventre jaune französ.
Red-bellied Curucui, engl.
Curucui, in Brasilien.
Tzinitzcan, in Mexico.

7. Fasciatus.
Pilliehorra, in Zeilan.
Rantvan-kondea, cingalesisch.

57. *Geschlecht. Cuculus.*

1. Canorus.
Cuculus, latein.
Coucou, französ.
Cocou; Coquu, Cocu; Coux, an verschied. Orten Frankr.
Coudiou, in der Provence.
Coucouat, die Jungen in Sologne.
Dinde sauvage, in einig. Gegenden von Bourgogne.
Cuculo; Cucco, Cuco, Cucho, ital.
Cuclillo, span.
Cuckow, engl.
Kukulka; Kukawka; Gzegzolka, poln.
Zezula, russisch.
Koekkoek, holländ.
Giög, Kukert, Kuk, dän.
Kuk-Manelen, cimbr.
Gouk, norweg.
Dsegguse, lettisch.
Käggi, ehstn.
Cucu, in Sardin.
Kukauza, krainisch.
Giök, schwed.
Geeka, lappisch.
Kockok; Kockunt, flamand.
Ziez gale, illyrisch.
Κοκκυξ, griech.
Κακολιξ, Κακακοζ, verdorb. Griech.
Kaath; Schalac; Schaschaph; Banchem; Eachem, hebr.

27. Tahitius.
Ara Wereroa, auf den Freundsch. Inseln.

31. Ridibundus.
Quapactototl, in Mexico.

32. Guira.
Guira Acangatara, in Brasil.

40. Pyrrhocephalus.
Malkoha, cingalesisch.

21. Cornutus.
Atingacu-camacu, in Brasilien.

58. Geschlecht. Yunx.

1. Torquilla.
Torcal, französ.
Wryneck, engl.
Torcallo, Torcicollo, Collotorto; Verticella, ital.
Draaihals, holländ.
Gióktyta, schwed.
Vendehals, Dreyhals, dänisch.
Saogouk, norweg.
Säd-Gjök, småland.
Wäänkal, ehstnisch.
Tshudesch, krainisch.
Kretogtow, poln.
Ιυγξ, griech.

59. Geschlecht. Picus.

1. Martius.
Pic-noir, französ.
Great-black Woodpecker, engl.
Pigoccio-nero, italien.
Kraajspecht, holländ.
Hackespett, dänisch.
Sort-Spaet; Sort-Hakke-Spaet; Sort-Trae-Kloppe; Trae-Pikke; Lie-Hast, norweg.
Trillkräka; Spillkräka, schwed.
Toile, gotländ.
Tscherna, Schouna, krain.
Kärrik; Pu-Kornstaga, ehstn.
Dzieciol, poln.

2. Principalis.
Grand pic-noir à bec blanc, französ.
White-billed Woodpecker, engl.
Carpenteros, spanisch.
Corta-pao, portugies.
Quatotomomi, in Mexico.

4. Lineatus.
Ipecu, in Brasil.

9. Auratus.
Pic aux ailes dorées, französ.
Gold-winged Woodpecker, engl.
Ou-thee-quan-nor-ow, an der Hudsonsbay.
Hittot; Pint, bey den Schwed. in Amerik.

40. Miniatus.
Toekan, malaiisch.

12. Viridis.
Pic-verd, französ.
Woodspite; Rainfowl; Highoe; Hewhole; Green Woodpecker, engl.
Pigoccio verde, ital.
Wedknarr; Grönspit; Gröngjoling, schwed.
Grönspett, dänisch.
Zhiaina, lappisch.
Deteu; Detela, krain.
Meltsas, ehstn.
Zolna, poln.

13. Ben-

13. Bengalensis. β
Kerella, auf Zeilan.

17. Maior.
Epeiche ou pic varié, französ.
Great spotted Woodpecker, engl.
Cul-rosso, ital.
Gröllenrenna, schwed.
Hakke-Spaet; Trae-Spaet; Trae-Klak, dän.
Cobilar, krainisch.
Dsennis, lettisch.
Rähn, ehstn.
Toccadorza, in Sardin.

18. Medius.
Pic-varié, französ.
Middle spotted Woodpecker, engl.
Flag-Spaet, Flack-Spärre, dänisch.
Kraakspinte, norweg.
Zuhku, lettisch.
Räudrösa, ehstn.

19. Minor.
Petit Epeiche, französ.
Piannet, in Engl.
Pipra, in Ital.
Lille Trae-Pikke, norwegisch.

59. Geschlecht. Sitta.

1. Europaea.
Sitterelle; Torchepot, französ.
Percepot; Chaussepot, in der Normandie.
Grimpard; Grimpant, in der Picardie.
Macon; Pic-macon, in Lothringen.
Cendrille; Dos-bleu; Pic-bleu; Tape-bois; Beque-bois cendré; Casse-noix, in Issoudun.
Planot, in Dauphiné.
Nuthatch; Nutjobber, engl.
Pico; Picchio, ital.
Nätwäcka; Natpacka, schwed.
Spaet-Meysse, dänisch.
Nat-Vakke; Egde; Eremit, norweg.
Chlaen, in der Schweitz.
Picotella, in Catalon.
Agascakan, in der Türkey.
Dzieciot modrawy, poln.
Barleß, krainisch.
Klener, in Oesterreich.
Raporino, in Ravenne.
Maloidjetel; Sliepuschka; Butschock; Polsyk, in Russl. (nach Gmelin.)
Kököbyka, jakutisch.
Okudong, bey den arinzischen Tataren.
Oetjälged, bey den Ostiaken am Käss.
Schondokon, tungus.

γ. Carolinenſis.
Unmisku - Apethayhiſh, an der Hudſonsbay?

8. Sinenſis.
Kou-kay-konn, in China.

60. Geſchlecht. Todus.

1. Viridis.
Perroquet de terre, auf St. Domingo.

11. Paradiſeus.
Wallubora, zeylaniſch.
Waygehoë, *Wardioë*, auf den Papus-Inſeln.

61. Geſchlecht. Alcedo.

1. Criſtata.
Tohorkey; Hito, in Amboina.
Vintſi, auf den Philippinen.

3. Iſpida.
Martin-pecheur, franzöſ.
Kingsfiſher, engl.
Piombino, ital.
Ysvogel, holländ.
Puzzone di ſantu Martinu, in Boſa.
Zimorodek, poln.
Ju-loang, in China.

7. Alcyon.
Kiskeman; Kiskemaraſue, in Indien.

26. Cayennenſis.
Taparara, in Guiana.

28. Tuta.
Erooro, in Otaheite.

9. Capenſis.
Tye-tzoy, in China.

15. Galbula.
Venetore, bey den Eingebohrnen in Guiana.
Colibri des grands bois, bey den Creolen.
Jacamaciri, in Braſil.

63. Geſchlecht. Merops.

1. Apiaſter.
Guépier, franzöſ.
Bee-eater, engl.
Graulo; Ghiovaro; Lugo dell' Api, ital.
Byeneeter, holländ.
Varuar, arab.
Schtſchura; Schtſchurka, an der Wolga.
Shaeghagho, um Yemen.
Maragau, bey den Campidaneſen.
Pardal de ſan jura, zu Algher.
Piana, Apiolo, an verſchied. Orten in Sardin.

β. Aegyptius.
Chaddaejr, arab.

2. Congener.
Formique, in Spanien.

3. Superciliosſus.
Patirich Tirich, in Madagaſcar.

18. No-

18. Novae Seelandiae.
Kogo; Poe-Vogel, in Neu-Seeland.

64. Geschlecht. Upupa.

1. Epops.
Hupe; Puput, französ.
Upupa, latein.
Hoop; Hoopoe, engl.
Upuba, italien.
Harfugl, schwed.
Herfugl, dänisch.
Aerfugl, norweg.
Smerda Kaura; Smerduch, krainisch.
Badda Dseggufe; Puppukis, lettisch.
Sittane rääſtas; Pähkla öhk, ehstn.
Pupusa, in Sardin.
Dudek, poln.
Duchiphath, hebr.

65. Geschlecht. Certhia.

1. Familiaris.
Grimpereau, französ.
Creeper, engl.
Picchio, Piccolo, ital.
Krypare, schwed.
Trae-Pikker; Lichesten, dänisch.
Bartniczek, polnisch.

27. Pacifica.
Huhu, auf O-Waihi.

28. Obscura.
Akaiearua, auf O-Waihi?

29. Coccinea.
Eee-eve, auf den Sandwich-Inseln.
Hevro-taire, auf Atui.

34. Sannio.
Neghobarra, auf Königin Charlotten Sund.

38. Cardinalis.
Kuyameta, auf der Insel Tanna.

39. Caruncul ata.
Fulehajuh, auf den Freundsch. Inseln?

2. Muraria.
Grimpereau de muraille, französ.
Echelette, zu Clairmont.
Ternier, zu Auvergne.
Pitschal, in Savoyen.
Pitschard, das. und bey Neuchatel, in der Schweitz.
Wallcreeper; Spider catcher, engl.
Pico, Pichio, ital.
Dzieciat murowy, poln.
Paxaco araneco, in Arragon.

25. Latenia.
Angala-Dian, auf Madagascar.

66. Geschlecht. Trochilus.
Oiseau-mouche, französ.
Humming-bird, engl.

Guianumbi, in Brasil.
Aratica; Arataratagua-cu, das.
Pegafrol, potugies.
Tomineios, in Spanien.
Quinti; Quinde, in Peru.
Huitzitzil; Hoitzitzil, in Mexico.
Ouirissia, das. nach Nieremb.
Vicicilin, in Gomara.
Guachichil, in Neuspanien.

25. Cyanurus.
Tayauquitototl, in Neuspanien.

12. Colubris.
Ourissia; Guaracyaba; Guaraeygaba; Huitzitzil; Vicililin, bey verschiedenen americ. Nationen.

67. *Geschlecht. Anas.*

1. Cygnus.
Cygne, französ.
Swan; Elk, engl.
Cino; Cigno, ital.
Cisne, span.
Svane, dänisch.
Svane, norweg.
Oelbs; Elbs, in der Schweitz.
Gulbis, lettisch.
Lük, ehstn.
Labec, poln.
Labod, krainisch.
Κυκνος, griech.

54. Hyperborea.
Oie de neige, französ.
Snow Goose, engl.
Bjeloi gus, russisch.
Trung-Chaß, jakutisch.
Ungula-Choteng, bey den obdonischen Ostiaken.

4. Tadorna.
Tadorne, französ.
Sheldrake; Bourrough Duck, engl.
Jugås, schwed.
Grav-Gaas; Brand-Gaas; Grav-Drage, dänisch.
Ring-Gaas; Urgaas; Fager-Gaas, Röd-Baelle, norweg.
Avekong, in Island.
Hav-Simmer, auf den Feroë-Inseln.
It-alla-kaß, bey den Baschkiren.

5. Spectabilis.
Canard à tête grise, französisch.
Grey-headed Duck; King-Duck, engl.
Soë-Orre; Hav-Orre, norweg.
Siorakitsok, grönländ.

Kingalik, das Männchen. } grönländ.
Kaiortok, } das Weibchen. } grönländ.
Arnauiartuk, } das Weibchen. } grönländ.

6. Fusca.
Double Macreuse; grande Macreuse, französ.
Great black Duck, engl.
Svart-Orre; Svart-And; Sorte, norweg.
Svaerta, schwed.
Glowienka, poln.

62. Nilotica.
Bah, arabisch.

8. Marila.
Polsk-Edelmand, dänisch.

9. Anser.
Jars, das Männch. } französ.
Oie, das Weibch. } französ.
Oison, die Jungen, } französ.
Goose, engl.
Grey-lag-goose, engl.
Ocha, das Männch. } italien.
Papera, die Jungen, } italien.
Ganso, span.
Gaas, dänisch.
Gaas, norweg.
Klinger-Gaas; Graa-Gaas, die wilde. ibid.
Guneniki, in Kamtschatka.
Vilgiär, in Island.
Meschasohß, lettisch.
Laggel, ehstn.
Laggias, ehstn. die kleinere Art.
Ges, die zahme Gans, } polnisch.
Dzika Ges, die wilde, } polnisch.
Tlalacotl, in Mexico.

67. Ruficollis.
Tschagwoi, bey den Ostiaken.
Tschagu, samojedisch.
Morskaja Kasarka, russ.
Tschakwoi Aßjuch, lappisch.
Sunksur, bey den Kalmücken.

46. Casarca.
Krasnye Utki; Karagatki, an der Wolga.

15. Mollissima.
Oie à duvet, französ.
Eiderduck; Cuthbert-Duck, engl.
Eddergaas; Ederfugl, dänisch.
Aerfugl, norweg.
Eider, Ad; Ada; Gudunge, schwed.
St. Cuthberts-Ente, auf einig. Schott. Inseln.
Aedar-Fugl; Aedur-Fugl, in Island.
Edder-Aedder-Aeder-Aer-Aee-Fugl, in ver-

ſchiedenen nördlichen Gegenden.
Aee-Aeſteig, im Drontheimſch.
Aera, in Bohuslehn.
Colca, ſchottiſch?
Aaeboer, auf Bornholm.
Mittek, grönl.
Arnaulik, das Männchen, *Arnauiak; Siorartok*, das Weibchen. *Arnauliſak*, ein Junges. } grönl.
Eiderblicke; Aerblick, auf Feröe.

16. Moſchata.
Muſcovi-Duck; Cairo-Duck; Guinea-Duck; Indian-Duck, engl.
Canard Franc, bey den Franzoſen in Guiana.
Turcka Kaczka, poln.
Apeca Apoa; Ipeca-guacu, in Braſilien.

19. Clypeata.
Souchet, franzöſ.
Shoveler, engl.
Krop-And; Stock-And; Leffel-And, däniſch.
Taſchenmaul, in der Schweitz.
Schaufl-Ente, im Oeſterreichiſchen.

20. Strepera.
Chipeau, franzöſ.
Godwall; Gray, engl.
Roep-Eend, holländ.
Knarand, däniſch.

23. Clangula.
Garrot, franzöſ.
Golden-Eye, engl.
Quattr' Ochi, ital.
Hwin-And; Blanke-Kniv, däniſch.
Bruuns-Kop, däniſch.
Ring-Oie, norweg.
Knipa, Dopping, ſchwed.
Kertlutokpiarſuk, grönländiſch.

26. Glaucion.
Morillon, franzöſ.
Spoon bill'd Duck, engl.
Krekkop; Dykker, däniſch.
Brunnacke, ſchwed.
Capo-roſſo, bey den Venetianern.
Ulluagolik, grönländ.

96. Glocitans.
Moklok; Mokloſchka, Klektunja, an der Lena.

27. Penelope.
Canard ſiffleur, franzöſ.
Wheber; Whiſtling; Widgeon, engl.
Brunn-Nakke; Blas-And; Graes-And; Stiert-And, däniſch.

Wriand,

Wriand, schwed.
Piula, in Catalonien.

28. Acuta.
Canard à longue queue, französ.
Cracker; Sea-Pheasant; Pin-tail, engl.
Vinter-And, *dänisch*.
Ala, schwed.
Schilochwostka, russisch.
Tzitzihoa, in Mexico.

29. Hyemalis.

30. Glacialis.
Canard à longue queue d'Islande, französ.
Canard à longue queue de terre neuve, französ.
Canard de Miclon, franz.
Long-tailed Duck, engl.
Swallow-tailed Sheldrake, engl.
Gadisse; Klaeshan; Ungle; Dykene; Angletaske; Troeforer, dänisch.
Hav-Old; Hav-Aeller, Ha-Alla; Ha-Old; Havelda, norweg.
Haavella, isländ.
Aglek, grönländ.

31. Ferina.
Millouin, französ.
Pochard; Poker; Great red-headed Wigeon, engl.
Brun-Nakke, dänisch.
Röd-Nakke; Kiärnds-And, norweg.
Raudawa; Raudewith, lettisch.

32. Querquedula.
Sarcelle, französ.
Garganey, engl.
Kernell, bey Strasburg.
Krek-And; Saur-And, norweg.
Cercelle; Cercerelle; Alebrande; Garsotte; Halebran, in verschied. Provinzen Frankr.
Oert, isländ.
Prischke, lettisch.
Cyranka, poln.

33. Crecca.
Petite Sarcelle, französ.
Teal, engl.
Schyf Taling, holländ.
Krik-And, dänisch.
Atteling-And, cimbr.
Hefte-Lort-And; Krek-Aender; Saur-Aender, norweg.
Arta, schwed.
Kraecka, westbothn.
Cyranta, poln.
Pepatzka, in Mexico?
Aradone, in Sardin.
Crabedu, bey den Algheresen.
Kothantl; Pfeiffantl, im Oesterreichischen.

34. Cir-

34. Circia.
Sarcelle d'Eté, franzöſ.
Summer-Teal, engl.
Prihkſchke, lettiſch.

35. Hiſtrionica.
Canard à collier de terre neuve, franzöſiſch.
Stone-Duck; Harlequin-Duck; Duſky and ſpotted Duck, engl.
Jan Pottagie Eend, holländiſch.
Grav-And; Straun-And, isländ.
Tornauiarſuk, grönländ.

113. Domeſtica.

40. Boſchas.
Anas, latein.
Canard, franzöſ.
Duck, engl.
Anatre, *Anitra*, ital.
Anade, ſpan.
Aden, portugieſ.
Blaa-Hals; *Blaa-Nakke*; *Blaakoll*; *Graes-And*; *Stock-And*, norweg.
Anka, ſchwed.
Kaczka, poln.
Ratza, krainiſch.
Stock-Ente, im Oeſterreichiſchen.
Bebe, indian.
Kaertlutok; *Kongmutajok*, grönländ.
Metzcanauhtli, in Mexico.
Νῆττα, griech.
Kenar, arab.

43. Sponſa.
Canard d'Eté, franzöſ.
Summer Duck, engl.
Yztactzonyayauhqui, in Mexico.

118. Rufina.
Schmakowaja Utka, ruſſ.

120. Arabica.
Scar-chir, arab.

121. Alexandrina.
Sau-Sarai, arab.

45. Fuligula.
Petit morillon, franzöſ.
Tufted-Duck, engl.
Capo-negro, in Venedig.
Toppertje, holländ.
Trold-And, norweg.
Wigga, ſchwed.

68. Geſchlecht. Mergus.

1. Merganſer.
Harle, franzöſ.
Gooſander; *Dun Diver*; *Sparling-Fowl*, engl.
Garganey; *Ganner*, italieniſch.
Skalle-ſlugger, däniſch.
Fiſk-And; *Mort-And*; norweg.

Skrakt,

Skrake, das Männch. } schwed.
Skräkan, das Weibch. } schwed.
Wrakfogel, smoländ.
Gaura; Gaigula, lettisch.
Skiör; And; Gul Önd; Geir-Fugl, isländ.
Krukmorski, poln.
Paikpiarsuk; Pararsuk, grönländ.

3. Serrator.
Top-And; Shraekke, dän.
Vatus-Önd, isländ.
Pajk; Nyaliksak, grönl.

5. Albellus.
Piette, französ.
Smew, engl.
Hvid-Side, dänisch.
Topp-Önd, isländ.
Monachetto, in Toscana.

69. Geschlecht. Alca.

4. Arctica.
Macareux, französ.
Puffin; Pope; Coulterneh; Mullet; Guldenhead; Bottlenose; Helegug, engl.
Pappegaaiduiken, holländisch.
Lunde; Soë-Papegöy, norweg.
Lund-Taeller, norweg. die Jungen.

Praest, isländ.
Killengak, grönländ.

3. Impennis.
Grand Pingouin, franz.
Great-Auk, engl.
Angle-Mager; Penquin; Brillefugl; Fiärt, norwegisch.
Geirfugl; Goifugl, isländisch.
Isarokitsok, grönländ.

2. Pica.
Petit Pingouin, französ.
Black-billed Auk, engl.
Spidsnaebbet Alk, norwegisch.
Akpa, grönländ.
Vuthamaria Calicatczu, an den Küsten von Candia.

1. Torda.
Pingouin, französ.
Auk, Murre; Razor-bill, engl.
Klub-Alk; Klympe; norwegisch.
Tord; Tordmule; schwedisch.
Klumbenefia, isländ.
Scaut, schott.

9. Psittacula.
Inypilahelap, bey den Koräten.
Chuichanctschkun, bey den Itälmenen.

Heka-

Hekatſchitſchir, bey den Kurilen.

10. Cirrhata.

Mytſchagatka, am Bolſchajareka.

Igilma, in Ochozk, und am penſhiniſchen Meerbuſen.

Kytſchuguigalli, bey den Koräten.

Tſchelaata, am Kamtſchatkafluſſe.

Etubirga, bey den Kurilen.

5. Alle.

Petit guillemot, franzöſ.

Little Auk, engl.

Soe-Konge; *Jacob*; *Soren-Jacob*; *Peer-Drikker*; *Perdykker*; *Perſuper*; *Boefiaer*; *Borrefiaer*; *Hys-Thomas*, norweg.

Rotteke, holländ.

Halkion; *Havdirdell*, isländiſch.

Fulkop, auf den Feröe-Inſeln.

Akpalliarſuk; *Akpalliarſungoak*; *Kaerrak*; *Ijarſoakale*, grönländ.

70. *Geſchlecht. Procellaria.*

1. Pelagica.

Petrel, franzöſ.

Storm-finch, engl.

Soren-Peder; *St. Peders-Fugl*; *Veſtervinds-Are*; *Sondenvinds-Fugl*, *Uveyrs-Fugl*; norweg.

Stormwaders-Fogel, ſchwed.

Strunkvit, auf den Feröe Inſeln.

3. Glacialis.

Fulmar; *Petrel Puffin gris blanc*, franzöſ.

Haffhert; *Seahorſe*, engl.

Skraap; *Liere*; *Skrabe*, norweg.

Kakordlungnak, grönl.

72. *Geſchlecht. Pelecanus.*

1. Onocrotalus.

Pelican, franzöſ.

Pelecan, engl.

Grotto, *Agrotto*, ital.

Wattadragaren, ſchwed.

Livane; *Libane*, in Brabant.

Kruk-wodny, poln.

Baba, ruſſiſch.

Kik; *Hakik*, hebr.

Chatta, chald.

Ahdjirbu, arab.

2. Aquilus.

Tailleur, franzöſ.

Man of war bird, engl.

Rabihorcado, ſpan.

Raboforcado, portugieſiſch.

3. Carbo.

3. Carbo.
Cormoran, französ.
Cormoran, engl.
Crot Pescherot, in Burgund.
Skarv; *Strand-Ravn*, norweg.
Skrie-Skarv, norweg. *(Müll.)*
Bettlaar; *Hviidlaaring*; *Blik-Skarv*, norw. isl. *(Brünn.)*
Hopling; *Student*, auf Feroe. *(Brünn.)*
Hafs-Tjader, schwed.
Okaitsok, grönländ.
Okaitsoak, *Kidlingaejouk*, grönl. ein Junges.

4. Graculus.
Shag, engl.
Aalekrage, dänisch.
Skarv, *Fiskeren*, norweg.
Sma; *Skarfur*, isländ.
Chracholec, poln.

5. Bassanus.
Fou de Bassan, französ.
Soland Goose, engl.
Hav-Sule; *Tosse-fugl*; *Jan van Gent*, norweg.
Sula, isländ.
Kuksuk, grönländ.?

75. *Geschlecht. Colymbus.*

1. Grylle.
Petit guillemot noir, französ.
Kajaver; *Cajor*; *Groenland-Dove*; *Sea-turtle*; *Black-guillemot*, engl.
Teiste, norweg.
Silde-Perris, norweg. ein Junges.
Teista, schwed.
Zhiaelkes, lappisch.
Serbak; *Sarpak*; grönl.

2. Troile.
Guillemot, französ.
Guillemot, *Toolish Guillemot*; *Sea-Hen*, engl.
Aalge; dänisch.
Lomvie; *Lomgivie*, *Langvine*; *Lumbe*, norweg.
Doppan, lappisch.
Tuglok, grönländ.

3. Septentrionalis.
Plongeon à gorge rouge, französ.
Red-throaded Loon, engl.
Loom, dänisch.
Loom, *Lumme*, norweg.
Gakkor; *Gakatte*, lappisch.
Liomen, auf Feröe.

4. Arcticus.
Plongeon à gorge noire, französ.
Speckled Loon; *Black throaded Diver*, engl.
Hymber, *Imber*; *Ember*, norweg.

Kakkar-

Kakkardaja, ehstn.
Lom, schwed.

5. Glacialis.
Grand plongeon tacheté; *Imbrim*; französ.
Greatest speckled Diver; *Northern Diver*, engl.
Hav-Hymber; norweg.
Vas Hymber, *Halsbaandet Lom*; *Brusen*; *Hymbrine?* isländ.
Tudlik; grönländ.

6. Immer.
Grand-plongeon, französ.
Embergoose; *Imber*, engl.
Hav-Immer; *Lom Imber*; *Ember-Gaas*; *Ommer*; *Morte ferie*, norwegisch.
Esarokitsok, grönländ.

7. Cristatus.
Grebe, *Grebe huppé*, französ.
Crestet Grebe; *Nasse*, engl.
Jurar, ital.
Sperga, venet.
Foet, *Füüt*, holländ.
Topped-Havskiaerre; *Halskraved Dykker*; *Top Skero*, norweg.
Sef-Ond, isländ.

8. Auritus.
Petit Grebe huppé, französisch.
Eared Dobchick; *Eared Grebe*, engl.
Söe-Höne, dänisch.
Söe-Horre; *Sav-Orre*, norweg.
Flaue-Flit, isländ.

19. Cornutus.
Sekeep, an der Hudsonsb.
Water-Witch, in Neu-york.

76. *Geschlecht.* *Larus.*

1. Rissa.
Lille-Soloet, dänisch.
Ritsa, norweg.
Skegla, *Ritar*, isländ.
Tattarak, grönländ.

2. Tridactylus.
Krykie, norweg.
Skierro, isländ.?
Tattarok, grönländ.?
Kihris, lettisch.
Kowit; *Kallakul*, ehstn.
Ribitw; *Trzonek*; poln.

14. Eburneus.
Mouette blanche, französ.
Ivory Gull, engl.
Nayauarsuk, grönländ.

3. Canus.
Graa-Nakke, dänisch.
Hvidmaase, norweg.
Mäse; *Fiskmäse*, schwedisch.
Straule, lappisch.
Gaßke, finnm.

Trzonek mnieyſry, poln.
Karſaak, grönländ.

6. Marinus.
Goeland noir, franzöſ.
Black-backed Gull, engl.
Svart-Bag; Blaamaage, däniſch.
Hav-Maaſe, norweg.
Hafstrut; Svættrut, ſchwed.
Gairo, lappiſch.
Nayardluk; Nayardlurkſoak, grönländ.

7. Fuſcus.
Goeland à manteau gris-brun, franzöſ.
Herring Gull, engl.
Sild-Maage, däniſch.
Gullfötting; Egmor, norweg.
Mäs, ſchwed.
Veyda-Bialla, isländ.
Soe-Unge; Skurre; Granafur, isl. ein Junges.

8. Glaucus.
Goeland cendré, franzöſ.
Glaucous Gull, engl.
Perlemaage, däniſch.
Dalvek, lappiſch.
Naya; Nayavek; Nayainak; Pukteralik, grönländiſch.

9. Ridibundus.
Mouette rieuſe à pattes rouges, franzöſ.
Black-headed Gull; Brown-headed Gull; Petit black Cap, or Sea Crow, engl.
Kurlik, ehſtn.

10. Paraſiticus.
Labbé à longue queue, franzöſ.
Arctic Bird; arctic Gull, engl.
Struuntjager; Tyo-jo; Jo-Tyv; Kive; Maaſe-Fat; Maaſe-Skid; Truen; Levar-Jo; Spotte-Jo; Jo-Bonde; Tiufva; Kiufva, norwegiſch.
Kioe, isländ.
Skajite; Haſkel, lappiſch.
Eſungak; Iſingak; Meriarſairſok, grönländ.

77. *Geſchlecht. Sterna.*

2. Hirundo.
Grande hirondelle de mer, franzöſ.
Sea-Swallow; Great Tern, common Tern; Spurre; Skrage, engl.
Zeezwalluw, holländ.
Taerne; Krop-Kirre, däniſch.
Haetting-Taerne; Sand-Taerne; Tende-Löber; Tenne; Tende; Sandtal, norweg.

Tarna, schwed.
Zhierrek, lappisch.
Therne; *Kriia*, isländ.
Makauka, krainisch.
Mackerell Gull, in Neu-engl.
Imerkoteilak, grönländ.

3. Nigra.
Gachet, französ.
Glitter; *Sort-Kirre*, dänisch.
Söe-Svale; *Sort-Tärne*, norweg.

78. *Geschlecht. Rynchops.*

1. Nigra.
Bec-en-ciseau, französ.
Sea-Crow; *Cutwater*, engl.
Taya, indian.
Coddel Kauka; *Suenmoodra Cavky*, malabar.

79. *Geschlecht. Phoenicopterus.*

1. Ruber.
Becharu, *Flamant*, französisch.
Fenicottero, ital.
Feamenoo, span.
Mangone, in Sardin.
Gentarubia, zu Oristano.

80. *Geschlecht. Platalea.*

1. Leucordia.
Spatule, französ.
Pale; *Pallette*; *Poche*; *Cueiller*; *Truble*, an verschied. Ort. Frankr.
Spoon-bill, engl.
Beccaroveglia, ital.
Lepelgans; *Schoffelaar*, holländ.
Schuffel, dänisch.
Skovl, *Neb*; *Bred-Neb*, norweg.
Calpetra; *Kolpiza*, ruß.

81. *Geschlecht. Palamedea.*

1. Cornuta.
Camouole, in Cayenne.
Anhima, in Brasil.
Horned Screamer, engl.

2. Cristata.
Crested Screamer, engl.
Cariama, in Brasil.

82. *Geschlecht. Mycteria.*

1. Americana.
Touyouyou, in Cayenne.
Jabiru-guacu, in Brasil.

84. *Geschlecht. Ardea.*

4. Grus.
Grue, französ.
Crane, engl.
Gru, *Grua*, ital.
Grulla, *Gruz*, span.
Erua, portugies.
Kraanvogel, holländ.
Krye, in der Schweitz.
Trane, dänisch.

Zoraw,

Zoraw, poln.
Trana, schwed.
Gerzah, illyrisch.
Gabilan, catalon.
Dserwe, lettisch.
Kung, ehstn.
Scheriau, krainisch.
Γερανος, griech.
Hagur, hebr.

11. Gigantea.
Ak-Turna, bey den Baschkiren.
Keugolok, bey den sibir. Tataren.
Sterchy, russisch.

7. Ciconia.
Cicogne blanche, französ.
White Stork, engl.
Ovevaar, holländ.
Stork, dänisch.
Starks; Dsese; Swehtelis; Swehtsputus; Schiguris, lettisch.
Tonekung, ehstn.
Bocian, poln.
Sterchi, russ.
Legled, türkisch.
Bel-arje, in der Barbarey.
Chasidah, hebr.
Zakid, arab.

8. Nigra.
Cicogne noire; Cicogne brune, französ.
Black-Stork, engl.
Den Sorte Stork, dänisch.
Sziast, poln.

9. Nycticorax.
Bihoreau, französ.
Night-Heron, engl.
Stepowron, poln.

12. *b* Cinerea.
Heron, französ.
Common Heron, engl.
Airone; Aerone, ital.
Fiske-Heyer; Skid-Heyre; Skred-Heyre, dän.
Heine, norweg.
Hæger, schwed.
Guorga, lappisch.
Garnis; Gahrnis, lettisch.
Czapla, poln.
Balakel, türkisch.
Schalach, hebr.
Barguch, arab.

21. Stellaris.
Butor, französ.
Bittern, engl.
Trombatto; Tarabuso, italien.
Galerand, in Bretagne.
Butoor; Roerdomp, holländisch.
Hortyhel, in Bayern.
Gazola, portugies.
Rordrum, dänisch.
Dumpis, lettisch.
Merrehüüp, ehstn.

Bak; Bunk, poln.
Gelve, türkiſch.
Corvu ambidaſtru, in Sardinien.
Gangia, bey den Algheresen.
Buik, ruſſiſch.

85. Geſchlecht. Tantalus.

1. Loculator.
Grand Courlis d'Amerique, franzöſ.
Wood-Pelikan, engl.
Maſarino, portugieſ.
Nimmerſatt, holländ.
Tacab Miſe, perſiſch.
Curicaca, in Braſil.

2. Falcinellus.
Courlis verd, franzöſ.
Scythe bill'd Heron, engl.
Ror-Drum, däniſch.

86. Geſchlecht. Scolopax.

3. Arquata.
Corlis, *Courlis*, franzöſiſch.
Common Curlew, engl.
Torquato; Arcaſe; Charlot, ital.
Hanikens, holländ.
Gruy, in der Schweitz.
Schrye, in Friesl.
Wallop, in Oſtfriesl.
Caroli, milaneſiſch.
Heel-Spove; Regn-Spaaer, däniſch.
Lang-Neeh; Spue, norwegiſch.
Guſgaſtak, lappiſch.
Grytan, poln.

4. Phaeopus.
Corlieu; petit Courlis, franzöſ.
Whimbrel; Blaſſer, engl.
Tarangalo, ital.
Girardello, milaneſ.
Mellem-Spoue, däniſch.
Gaaſſpou; Smaa-Spue; Spove, norweg.
Spoe, isländ.
Grytan maly, poln.

6. Ruſticola.
Becaſſe, franzöſ.
Wood-Cock, engl.
Accegia; Beccagia, ital.
Holz-Sneppe, däniſch.
Rutte; *Blom-Rokke*, norwegiſch.
Schneffa, krainiſch.
Pardwa; Stomka, poln.
Kikkuts, lettiſch.
Poello-Tilder, ehſtn.
Pudda di matta, in Sardinien.
Cabone de murdego, im Campidaneſiſchen.
Pudda de mudeja, auſserhalb Campidano.

7. Gallinago.
Becaſſine, franzöſ.
Snipe, engl.

Pizzar-

Pizzardella, italien.
Steen-Sneppe; Dobbelt-Sneppe; Hoſſe-Giög, däniſch.
Trolldrukke, Mackergouk; Myre-Heſt; Myre-Bock; Myr-Sneppe; Myr-Snipe, norweg.
Mall-Snaeppa, ſchwed.
Perkohnkaſſe; Perkohnuaſis; Kikkukahſa, lettiſch.
Metskits; ehſtn.
Koſitza, krainiſch.
Bekas, *Baranek*, poln.
Koza Baranek, poln.
Beccarin Reale, im Toſcaniſchen.
Beccacino, in Sardin.
Myr-Skitt, isländ.
Mekaſtak, lappiſch.
Siguktok, grönländ.
Jelue, türkiſch.

8. Gallinula.
Petite becaſſine, franzöſ.
Gid; Jackſnipe; Judcock, engl.
Half-Schnepf, holländ.
Ror-Sneppe, däniſch.
Pokerl, krainiſch.
Kulyk, poln.

10. Glottis.
Barge varike, franzöſ.
Greenſhank, engl.
Hoſt-Fugl, norweg.
Tſchoket, krainiſch.
Leverſina, neapolit.
Pluiero, bologneſ.
Girardel, milaneſ.

11. Calidris.
Chevalier aux pieds rouges, franzöſ.
Redſhank; Poolſnipe, engl.
Laxe Tite; *Lax Titing*, norweg.
Kurlyk czerwonemi nogami, poln.

12. Totanus.
Corlieu, franzöſ.
Spotted Snipe; ſpotted Redſhank, engl.
Rodbeen, däniſch.
Quikketield; Squaptield; Strand-Kield; Stilk; Skrig-Kield; Soelſkin-Stöd, norweg.
Stelkur, isländ.
Buvadak, lappiſch.

87. *Geſchlecht. Tringa.*

1. Pugnax.
Combattant; Paon de mer, franzöſ.
Ruff, *Reeve*, engl.
Kemperken, holländ.
Staal-Sneppe; Bruuskop-Sneppe, däniſch.
Brus-Kop; Bruus-Hane, norweg.

Brushane, schwed.
Kolmnierzyk; Ptak-bitny, poln.

2. Vanellus.
Vanneau, französ.
Lapwing; Bastard Plover, engl.
Pavoncella, ital.
Dix-huit; Papechieu, an verschied. Ort. Frankr.
Vibe, dänisch.
Kybits, norweg.
Kehwahla, lettisch.
Kiwit; Sehmalis; Semale Kiwitis, ehstn.
Tschibes, russ.
Czayka, poln.
Lepera d'arzola, in Campidano.
Gavi-Gavi, bey den Sassaresen.

4. Interpres.
Coulon-chaud, französ.
Turnstone; Sea Dotterel, engl.
Veydetite, dänisch.
Kutte-Rutte, norweg.

5. Striata.
Chevalier rayé, französ.
Striated Sandpiper, engl.
Fiöre; Strand-Elg; Fiär Plister, norwegisch?
Sarbursuk; Sarguarsuk, Sirksariarsungoak, grönländisch.

8. Lobata.
Smaellebot; Nordvest-Fugl; Lita, Fisk-Lita, norweg.
Bieggush, lappisch.
Nelloumirsortok; Nelloumirsortungoak, grönl.

13. Ocrophus.
Becasseau; Cul-blanc, französ.
Green Sandpiper, engl.
Horse-Giög, dänisch.
Skodde-Fugl; Jord-Geed; Maekker-Goux; Ros-Gouge, norweg.
Culbianco, Gambettola; Giarola, Pivinello; italien.
Pstry Kulyk, poln.

β. Littorea.
Chevalier varié, französ.
Shore Sandpiper, engl.
Strand-Bekkasin; Skodefole; Plougeller; Klov-Mand; Taage-Hest, dänisch.
Laekiadudra, isländisch?
Knibgas, ehstn.

14. Hypoleucos.
Guignette, französ.
Common Sandpiper, engl.
Lille Myrstikkel; Lille Becassin; Myr-eller; Strand-Sneppe, norwegisch.

Virlen,

Virlen, bornholm.
Jäntilder; *Sopatil*, ehstnisch.

88. Geschlecht. *Charadrius*.

1. Hiaticula.

Pluvier à collier, franz.
Sea-lark, engl.
Jaticula, ital.
Praeste-Krave; *Sand-Vrister*, dänisch.
Strand-Piper; *Strand-Elg*; *Sand-Rönne*; *Sand-Muling*; *Sand-Sneppe*, norweg.
Strand-Pipare, schwed.
Trulls, holländ.
Grylle, scan.
Sandloe, isländ.
Pago, lappisch.
Urineglia de riu, bey den Algheresen.
Ziriolu, bey den Oristanesen.
Tukagvajok, grönländ.
Matuitui, in Brasil.

5. Morinellus.

Guignard, franzöſ.
Dotterel, engl.
Pomerants-Fugl; *Citron-fugl*, dänisch.
Pehrloe; *Bold Tiäd*; *mindre Akerloe*, norwegisch.
Lauhol; *Laf-Uhl*, lappisch.

6. Apricarius.

Pluvier doré à gorge noire, franzöſ.
Spotted Plover, *Alwargrim Plover*, engl.
Hieilo, dänisch.
Heyloe; *Brokfugl*; *Myreloe*; *Akerla*, norwegisch.
Ackerhoen, schwed.
Hjeile, cimbr.
Altwargrim, oeländ.
Myrpitta, smoländ.
Lo, isländ.
Bizhiutzh; *Huet*; *Huit*; *Hutti*; *Huttich*, lappisch.
Kajorrovek; *Kajordlek*, grönländ.
Hawks-Eya, bey den Engl. an der Hudsonsbay.

89. Geschlecht. *Recurvirostra*.

1. Avocetta.

Avocette, franzöſ.
Scooping Avocetta, engl.
Beccastorta, ital.
Klyde; *Lau-Fugl*; *Förkeert Regn Spove*, dänisch.
Filippa, im Oristanesischen.

90. *Geschlecht. Haematopus.*

1. Ostralegus.
Huitrier, französ.
Scapie, engl.
Oistercatcher, engl.
Strand-Skade, dänisch.
Kield; Strand-Skur; Ronekalv; Sagan; Tiaadur; Glib; Tield, norweg.
Strand-Skjura, öländ.
Marspitt, gothländ.
Tiälderem, isländ.
Sagan, lappisch.

91. *Geschlecht. Fulica.*

4. Chloropus.
Poule d'eau, französ.
Common Water-Hen; More-Hen, engl.
Porzanone, ital.
Vandhöne, dänisch.
Pudda da'ba, in Sardin.
Giaddina d'eva, in Sassari.
Puglietta, zu Algher.

2. Atra.
Foulque, Morelle, französisch.
Coot, engl.
Fulaga, Polon, ital.
Blis-Höne; Blas-And; Vard-Höne; Rör-Höne; Bondelöber, dänisch.
Bläs-klacka, schwed.
Meer-Coot, holländ.
Lyska, poln.
Puliga, in Sardin.
Flusteres, in Carolina. (Laws.)

92. *Geschlecht. Parra.*

3. Jacana.
Yohualquachitli, in Mexico.

11. Brasiliensis.
Aguapecaca, in Brasil.

93. *Geschlecht. Rallus.*

1. Crex.
Rale de genet; Roi des cailles, französ.
Rail; Daker-hen, engl.
Re di quaglia, ital.
Kwartel Koning, holländ.
Skov-Snarre, dänisch.
Akerrixe; Ager-Hone, norweg.
Kornknarren, schwed.
Corn-Crek, schottl.
Rostz, krainisch.
Keczan-Derkacz, poln.

2. Aquaticus.
Rale d'eau, französ.
Water-rail; Bilcock; Brook-ouzel, engl.
Galla Mareza, span.
Water-Rall, holländ.
Vagtel Konge, dänisch.

Strand-

Strand-Snarre; Strand-Rixe; Vand-Rixe; Vand-Höne; Vand-Vachtel, norweg.
Jord-Koene, feroens.
Puddighina de Malta, in Sardin.

3. Porzana.
Marouette; petit rale d'eau, franzöſ.
Girardin; ſpotted Gallinule, engl.

12. Crepitans.
Meadow Clapper, in Neuyork.

95. Geſchlecht. *Otis.*

1. Tarda.
Outarde, franzöſ.
Buſtard, engl.
Oſtarde; Houtarde; Bistarde, alt franzöſ.
Starda, ital.
Trapp, ſchwed.
Sigha, lettiſch.
Tuzok, ungariſch.
Guſtarde, ſchottiſch.
Drop; Trop, poln.
Droſa, illyr.
Οτις; Ωτις; Ουτις, griech.
Alhabari, hebr.

3. Tetrax.
Petite Outarde; Cane petiere, franzöſ.
Field-Duck; little Bustard, engl.
Gallina pratajuola, Faſarella, ital.
Pudda campina, in Sardinien.
Giaddinu di campu, zu Saſſari.
Pittara; Pidraſcia, zu Oriſtano.

96. Geſchlecht. *Struthio.*

1. Camelus.
Autruche, franzöſ.
Oſtrich; Oſtridge, engl.
Struzza, ital.
Vagel-Struis, holländ.
Aveſtruſz, ſpan.
Ema; Ema di Gei, portugieſiſch.
Jacuah, hebr.
Namitha, chald.
Neahma; Thär ed Sjammel, arab.

2. Caſuarius.
Caſoar, franzöſ.
Caſuel, Gaſuel, alt franzöſiſch.
Caſſawar; Caſſowary, engl.
Kaſuaris, holländ.
Eme; Emeu, in Indien.

3. Rhea.
Nhanda-Guacu, in Braſilien.

Thouyouyou, in Guiana.
Yardu; Yandu; Andu, in Indien.
Sallian, auf d. Inf. Maragnan.
Suri, in Chili.

97. *Geſchlecht. Didus.*

1. Ineptus.
Dronte, franzöſ.
Hooded Dodo, engl.
Dod-aars; Walghvogel, holländ.

98. *Geſchlecht. Pavo.*

1. Criſtatus.
Paon, franzöſ.
Peacock, engl.
Pavone, ital.
Pavon, ſpan.
Päfogel, ſchwed.
Paauw, holländ.
Pau, krainiſch.
Paw, poln.
Tuchiim, hebr.
Cavaz, chald.
Tauza, ſyriſch.

99. *Geſchlecht. Meleagris.*

1. Gallopavo.
Dindon; Coq d'Inde, franzöſ.
Turkey, engl.
Gallo d'India, ital.
Pavon de las Indias, ſpan.
Indiot; Gall d'Indi, in Catalonien.
Indiyk, poln.
Ondettutaques, bey den Wilden in Canada.
Arynanuſſu, am Miſſiſippi, und in Braſilien.
Huexototl, das Männch. } in Mexico.
Cihuatotolin, das Weibch. } in Mexico.

100. *Geſchlecht. Crax.*

1. Alector.
Hocco de la Guiane, franzöſiſch.
Creſted Curaſſow; Peacock Pheaſant of Guiana, engl.
Ano, in Afrika.
Mitu-poranga, in Weſtindien.
Tepetototl, in Mexico.
Quirizai, in Jamaica.

101. *Geſchlecht. Phaſianus.*

1. Gallus.
Coq; Poule, franzöſ.
Cock, engl.
Gallo, ital.
Gallo, ſpan.
Gol, Gog, alt franzöſ.
Gau; Geau, ſavoyard.
Haan, Hoen, holländ.
Hane, däniſch.
Hoens; Tupt, ſchwed.

Petel; Kokusch, krain.
Kokosz, poln.
Achau, in Chili.
Sikvi; Sakvia, hebr.

3. Colchicus.
Faisan, Faisante; Faisanne; Faise; Faisanteaux; Faisanneaux; Faiseau, französ.
Phasianus, latein.
Pheasant, engl.
Fagiano, ital.
Faisan, span.
Fazant, holländ.
Fazyan; Bazant, poln.
Surglum; Suglum, türkisch.
Thi-Khi, chines.
Thisionis, rabbin.
Madsharskoy; Petuschok, am Kumafluss.

102. Geschlecht. Numida.

1. Meleagris.
Peintade, französ.
Guinea-Hen; Pintado, engl.
Gallina di Numidia, ital.
Quetele, in Congo.
Acangues, in Madagascar.

103. Geschlecht. Tetrao.

1. Urogallus.
Coq de bruyere, französisch.
Coq de Limoges; Coq de bois; Faisan bruyant, in einigen französischen Provinzen.
Cock of the Wood; Mountain, engl.
Gallo cedrone, ital.
Norsk-Kalkan, dänisch.
Tiur; Tödder; Teer, norweg.
Kjäder, schwed.
Devi Pitele, krainisch.
Meddens, Medmis, lettisch.
Metsis, ehstn.
Möttus, im Pernauischen.
Tetrez, slavon.
Stolzo, bey den Graubündern.
Ziufzhia, lappisch.
Dukiphat, hebr.

7. Phasianellus.
Long-tailed Grous; Sharp-tailedGrous, engl.
Au-Kuskow, an der Hudsonsbay.

2. Tetrix.
Petit Tétras, Coq de bruyere à queue fourchue, französ.
Black Cock; Black Game; Black Grous, engl.
Sforzello, ital.
Urhane, dänisch.

Aarfugl;

Aarfugl; Aerefugl; Orhane; Orhöne, norweg.
Orne, schwed.
Birkhaan, holländ.
Orrar, lappisch.
Rubbens; Tetteris; Tettera mahte, lettisch.
Tedder, ehstn.
Dziki Kur; Czietzew, poln.

4. Lagopus.
Gelinote blanche; Lagopede, französ.
Francoline blanche; Arbenne; Poule de neige, an verschiedenen Orten Frankr.
White Game; Ptarmigan, engl.
Daina; Gallina bianca, ital.
Rype; Field-Skov-Lie-Snee-Rype; Hareford, norweg.
Snöripa, schwed.
Cheruna, Rieusak; Giron, lappisch.
Riupa, isländ.
Rebalino, bey den Graubünd.
So; Tuddokanna, ehstn.
Akeiksek; Kauio, grönl.

9. Bonasia.
Gelinote, französ.
Hazel Grous, engl.
Hierpe; Hiärpe, schwedisch.
Podlesk, krainisch.
Laukuirbe; Kurrata, lettisch.
Pöldpii, ehstn.
Jarzabek, poln.
Jabantan, türk.

11. Alchata.
Ganga, französ.
Perdrix de Damas, ou de Syrie, französ.
Partridge of Damascus; little pin-tailed Grous, engl.
Ganga, span.
Cata, Kata, türk.
Kitaviah, in der Barbarey.

12. Rufus.
Bartavelle, Perdrix de Grèce, französ.
Greek Partridge; Great red Partridge, engl.
Starna montana, ital.
Acker-hoena, schwed.
Cottorna, krainisch.
Cabugi, Cubugi, arab.

13. Perdix.
Perdrix grise, französ.
Common Partridge, engl.
Perdice, ital.
Perdez, span.
Agerhöne, dänisch.
Raphöne, norweg.

Rapp-hoena, ſchwed.
Laukuirbe, *Kurrata*, lettiſch.
Pöldpii, ehſtn.
Jerebitza, krainiſch.
Kuro-patwa, poln.
Kore, hebr.

36. Perlatus.
Tche-cou, in China.

20. Coturnix.
Caille, franzöſ.
Quail, engl.
Quaglia, ital.
Cuaderviz; *Quaderviz*, ſpan.
Vagtel, däniſch.
Wachtel, ſchwed.
Kwakkel; *Kwartel*, holländiſch.
Perpelitza, krainiſch.
Greeſa; *Paipola*, lettiſch.
Putspaſſarat, ehſtn.
Przepiorka, poln.
Quakkel, flandr.
Circuri, im Campidaneſiſchen.
Trespodres, im Capo di Sopra.
Ὀρτυξ, griech.
Shelav, hebr.
Katta, arab.
Moregzog, perſ.

104. *Geſchlecht. Columba.*

1. Oenas.

2. Domeſtica.
Pigeon, franzöſ.
Dove, engl.
Colombo, ital.
Paloma, ſpan.
Doffer, holländ.
Dufwa, ſchwed.
Golob, krainiſch.
Meſcha Balloſchi, lettiſch.
Metstuike, ehſtn.
Gahlah, poln.
Jon, *Jonah*, hebr.
Kaphtar, perſ.
Aetøkeha, arab.
Jugargen, türk.

δ. Hiſpanica.
Pigeon-romain, franzöſ.
Runt-Pigeon, engl.
Tronfo, *Aſturnellato*, italien.

ε. Daſypus.
Pigeon-pattu, franzöſ.
Rough footed Dove, engl.
Colombo co' piedi pennati, italien.
Ruigpooten, holländ.

19. Palumbus.
Pigeon-ramier, franzöſ.
Ring-Pigeon; *Ring-Dove*, engl.
Columbo torquato; *Columbo fqvoro*; *Colombaccio*, ital.
Paloma torcatz, ſpan.

Manſeau,

Manseau, brabant.
Ring-duif, holländ.
Krieff-Dove, flandr.
Ringel-Due, dänisch.
Ring-Dufwa, schwed.
Siutut, oeländ.
Skude, bornholm.
Cushat, im nördl. Theil von Engl.
Palombe, zu Perigord.
Mausard, in der Picardie.
Grzywacz, poln.
Griunik, krainisch.

32. Turtur.
Tourterelle, französ.
Turtle, *Turtle Dove*, engl.
Tortora, *Tortorella*, ital.
Tortola, span.
Tortel-duif, holländ.
Turtur-Dufwa, schwed.
Trakawke, poln.
Τρυγιον, griech.
Tor, hebr.
Tetaru, pers.

34. Passerina.
Petite tourterelle de S. Domingue, ou de Martinique, französ.
Ground Dove; *Ground Pigeon*, engl.
Least Barbados Turtle, engl.
Mosch-Duifge, holländ.
Cocotli; *Cocotzin*, in Mexico.
Picuipinima, in Brasil.

35. Minuta.
Tlapalcocotli, in Mexico.

105. *Geschlecht.* *Alauda.*

1. Arvensis.
Alouette, französ.
Louette, *Alavette*; *Layette*, in Guienne.
Mauviette, zu Paris.
Field-lark; *Sky-lark*, engl.
Lodola, *Lodola campestre non capellata*, ital.
Lurlen, bey Bale.
Sang-larke, dänisch.
Lärka, schwed.
Cugniada, span.
Ziluhri, lettisch.
Lerke, ehstn.
Lauditza, krainisch.
Skowronek, poln.
Skrzwan, illyr.
Uanseta, in Catalon.
Shaworonek, russisch.
Butschumur, tungus.
Alaud, celtisch.
Calandra, zu Sassari.
Pispanti, bey den Campidanesen.
Kunbar; *Kombara*, arab.

2. Pratensis.
Farlouse, französ.
Titlark, engl.

Spipola,

Spipola, *Calandrino*; *Scorzzetta*, ital.
Rulisar, *Zekkuli*, lettisch.

3. Arborea.
Cujelier; *Alouette de bois*, französ.
Cochelivier; *Cochelirieu*; *Pienu*; *Fluteux*; *Alouette fluteuse*; *Lutheux*; *Turlut*; *Turlitoir*; *Musette*; *Trelus cotrelus*, an verschiedenen Orten Frankreichs.
Pirouat, in einigen Gegenden von Bourgogne.
Coutrioux, in Saintonge.
Alouette calandre, in Nantes.
Tottovilla, ital.
Skow-larke; *Heede-larke*; *Lyng-larke*, dänisch.
Zippa, krainisch.
Dzierlatka, poln.
Accucadita, in Sardin.
Mattolina, toskanisch?

4. Campestris.
Spipolette, französ.
Meadow Lark, engl.
Mark lerke, dänisch.
Zdzoto, poln.
Kurbukon, tungus.

β. Spinoletta.
Pispoletta, in Sardin.
Piuli, hin und wieder in Sardinien.

Quina, italien.
Mala zippa, krainisch.

6. Cristata.
Cochevis, französ.
Crested-Lark, engl.
Lodola capellata, ital.
Toplarke; *Veylaerke*, dänisch.
Alouette duppée, in Sologne.
Verdange, in Perigord.
Zihrulis ar Zekkuli, lett.
Dzierlatka czubata, poln.

9. Calandra.
Grosse alouette; *Calandre*, französ.
Calandre Lark, engl.
Calandra; *Chalandria*, ital. span.
Coulassade, in der Provence.
Alouette de Bruyere, um Orleans.
Corydalos, in Venedig.

10. Alpestris.
Hausse col-noir; *Alouette de Virginie*, französ.
Shore Lark, engl.
Bisnoi-Shavronek, russ.
Chi-chup-pi-sue, an d. Hudsonsbay.

106. Geschlecht. Sturnus.

1. Vulgaris.
Etourneau, französ.

Estour-

Estournal, perigord.
Tournel, in Guienne.
Stare, Sterling, engl.
Storno, ital.
Estorino, span.
Sturino, portugies.
Stornell, catalon.
Spreuve, in Flandern.
Staer, dänisch.
Star, norweg.
Stare, schwed.
Starl, krainisch.
Szpak; Spatzek; Sspacziek; Sharzek, poln.
Skworez, russisch.
Buchoschir, burät.
Φαρ, Φαρος, griech.
Sarsir, Zezir, hebr.
Alzarazir, arabisch.

5. Cinclus.
Merle d'eau, französ.
Water-Ouzel, engl.
Merla acquajuola, ital.
Fosse-Fald; Fosse-Kald; Quärn-Kald; Strom-Stär; Bakke-Fugl; Elve-Konge, norweg.
Watnstare, schwed.
Povodni Koß, krain.
Mirlu de riu, in Sardin.

107. *Geschlecht. Turdus.*

1. Viscivorus.
Draine, französ.
Caserre; Jocasse; Jocade; Grive de brou; Grive provençale; Gillonière; Trie; Trage; Truie; Treiche; Traine; Tritrac, in verschied. Provinzen Frankreichs.
Missel-bird, Shrite; Missel Thrush, engl.
Tordo; Tordo viscado; Tordella, ital.
Penyellwyn, alt britt.
Hautgrive, in Lothringen.
Verquette, in Bugey.
Dobbelt Kramsfugl, dänisch.
Biörk-Trast, schwed.
Mattschinsch; Matsnings, lettisch.
Räästs; Zobbose-Rääst, ehstn.
Turdu suerinu, in Sardinien.
Geratauk, türkisch.

2. Pilaris.
Litorne, Tourdelle, französisch.
Fieldfare, Feldefare, engl.
Cha-Cha; Cla-Cla; Fia-Fia; Tia-Tia; Cancoine; Serre-montagnarde, in verschied. französ. Provinzen.
Gardena; Tordo mezzano, ital.
Tordo; Zorzol, span.

Graat-

Graae - Troſt; Field-Troſt; Norden-Vinds-Pipe, norweg.
Kramsfogel, ſchwed.
Simmeren, auf Bornholm.
Snöſkata, uppländ.
Reckholter; Wechholter, in der Schweitz.
Mellsſtrards, lettiſch.
Halrääf, ehſtn.
Caſed y ddryccia, alt brittiſch.
Brinauka, krainiſch.
Gluch - jemiolucha; Drozd-Srzedni; Kwiczot, poln.
Kwicziela, illyr.
Drosd, ruſſ.
Smortitu, in Sardin.

3. Iliacus.

Mauvis, franzöſ.
Grive-montagnarde; Grivette; Roſelle; Grive-champenoiſe; Grive des Ardennoiſes; Grive de vendage; Tris; Siffleur, an verſchied. Ort. Frankreichs.
Boute-quelon, Calandrote, um Montbard.
Redwing; Swinepipe; Wind-Thruſh, engl.
Tordo ſaſſello, ital.
Malvis, ſpan.
Tort-alaroity, catalon.

Can; Quan, in Brie.
Klera, ſmoländ.
Kladra, oſtrogoth.
Tall-Traſt, weſtmann.
Nat-Vaxr, norweg.
Veigezizatzh, lappiſch.
Drozd-mniyſſy, poln.
Giraweckz, illyr.

4. Muſicus.

Grive, franzöſ.
Toudre; petit Touard; Oiſeau Dunetto; Siſelle; Vendangette; Grivette; Mauviette, in verſchied. franzöſ. Provinzen.
Tordo mezzano, ital.
Zorzal, ſpan.
Throſtle; Song-thruſh, engl.
Droſsig; Droſch, krainiſch.
Lauloräaſtas, ehſtn.
Drozd, poln.
Ceiliog brou fraith, in Wallis.

22. Merula.

Merle, franzöſ.
Black-bird, Amzell, engl.
Merla, ital.
Mierla, ſpan.
Melroa, portugieſ.
Lyſter, holländ.
Sälſort, däniſch.

Sort - Troſt; Sol - Sort, norweg.
Traſt; Kohl - Traſt, ſchwed.
Yr aderyndu; Ceiliog mwyatch, alt brittiſch.
Koſs, krainiſch.
Kos, poln.
Muſträäſt, ehſtn.
Tſcheravi - Droſt, ruſſ.
Felveck; Eelweck, türkiſch.

23. Torquatus.
Merle à collier, *Merle à plastron blanc*, franzöſ.
Merle terrier; Buiſſonnier, in einigen Gegenden Frankreichs.
Merle gris, *Merle d' Espagne*, *Merle de Savoye*, *Torcal noir*, um Orleans.
Ring - Ouzel, engl.
Ring - Droſſel, däniſch.
Ring - Troſt, norweg.
Gielavaelgo, lappiſch.

108. Geſchlecht. Ampelis.

1. Garrulus.
Jaſeur de Boheme, franz.
Bohemian Chatterer; Prib chatterer; Waxen chatterer, engl.
Beccofriſone; Galleto del boſco; Vcello del mondo novo, ital.
Siden - Svands, norweg.
Sidenſwanz, ſchwed.
Snetuppa, uppländ.
Skitteren, auf Chriſtianoe.
Brkoſtaw, böhmiſch.
Sihdeaſt, lettiſch.
Jedwabnicka, poln.

3. Carnifex.
Coyoltototl, in Mexico.
Arara; Apira, in der goriponniſchen Sprache in Guiana.
Ouette, bey den Creolen.

109. Geſchlecht. Loxia.

1. Curviroſtra.
Bec - croiſé, franzöſ.
Croßbill; Sheld - apple, engl.
Korsfugl, norweg.
Korsnaef; Kiaegelrifare, ſchwed.
Gryllfingroes, alt britt.
Krzywonos, poln.
Selenoi - Kleſt, ruſſ.

12. Leucoptera.
Aſitchu Achaſchich, an der Hudſonsbay.

2. Coccothrauſtes.
Gros - bec, franzöſ.
Pinçon royal, in Maine.

Groſſe-

Grosse-tête, in der Picardie.
Malousse; Amalousse gate; Pinçon maillé; Ebourgeonneux, in Sologne.
Casseragnon; Casse-noix; Cassenoyaux, in Champagne.
Gros-pinçon; Pinçon d'Espagne, in Saintonge.
Durbec, in Perigord.
Geai de bataille; Cochepierre, in einigen Ort. Frankreichs.
Grosbeak; Hawfinch, engl.
Frosone; Frisone; Grisone; Franquet del né; Franquet montano, ital.
Pinça mec; Pinça rogné, in Catalon.
Stenkneck, schwed.
Swirpis, lettisch.
Gylfinbratf, alt britt.
Dleschk, krainisch.
Picu-grossu, in Sardin.
Re d'alipinti, bey den Sassaresen.

3. Enucleator.

Dur-bec, französ.
Pine-Grosbeak; Greatest Bulfinch, engl.
Kirsebaer-Fugl, dän.
Norsk-Papegoy; Nödde-Knekker; Kierne-Bider; den guulhaerdede Dom-Oxe, norweg.
Tallbit; Swänsk-Papoja, schwed.
Natt-waka, westboth.
Ptakrayski, poln.
Wuscanithow, an der Hudsonsbay.

4. Pyrrhula.

Bouvreuil, französ.
Bouvreux, Bourgeonnier; Bouvrer; Bouvier, in Unter-Normandie.
Boeuf; Pinçon maille, in Sologne.
Choppard; Grosse tête noir, in Picardie.
Pive, in Provence.
Pivane, in Berry.
Pion; Pione, in Lothringen.
Pivoine, in Paris.
Pinçon d'Auvergne, in Saintogne.
Pinçon rouge; Siffleur; Fluteur; Groulard; Prêtre; Perroquet de France; Ecossonneux; Ebourgeonneux; Rossignol moner; Civiene; Tapon, in verschied. französ. Provinzen.
Gimpl, krainisch.
Dompape, dänisch.

Domherre; Blod-Finke, norweg.
Domherre, schwed.
Bulfinch, engl.
Cifolotto; Monachino, italien.
Pilart, in Brabant.
Franquelle-invernengk, in den Alpen.
Smilges; Shwapulis, lettisch.
Popek, poln.
Blask, illyr.

16. Malacca.
Mungul, in Indien.

27. Chloris.
Verdier, französ.
Bruyon; Bruant; Verdun; Verdier; Verdereule; Verdere, in verschied. französ. Provinzen.
Greenfinch, engl.
Verdone, ital.
Verdelham, portugies.
Svenske, dänisch.
Swenska, schwed.
Verderol, catalon.
Schwonez, böhm.
Grindling, krainisch.
Dzwoniek; Konopka, polnisch.
Zeglolka, illyr.

77. Asiatica.
Lap-tzoy, in China.

110. *Geschlecht. Emberiza.*

1. Nivalis.
Ortolan de neige, französisch.
Snow Bunting, engl.
Sneekok; Vinter-Fugl, dänisch.
Snee-Fugl; Fiälfler; Sneespurre; Snee-Titing; Soelskrigger, norwegisch.
Snöfparf, schwed.
Alaipy, lappl.
Illwärsfogel, in Dalekarlien.
Hardvärsfogel, uppländisch.
Sino-Tyllingur; Soelskrikia; Tytlings-Blike, isländ.
Pulma; Pulmuinen; Lumipulmonen; Lumispulmonen, finnisch.
Sioelaerka, in Schonen.
Lumenpoinia, bey Abo.
Kopanaursak; Kopanungarsuk; Amauligakaudit, grönländ.
Sniegula; Snieznieczka, poln.
Podoroshink, russisch.
Mopathecusisch, an der Hudsonbay.

2. Hyemalis.
Ortolan Jacobin, französ.

Snow

Snow Bird; Black Bunting, engl.
Chuck-bird, bey den Amerikanern.
Snovogel, schwed.

3. Miliaria.
Proyer, französ.
Chic-perdrix, in Provence.
Tchi-pardrix, zu Montelimar.
Teitei, in Brie.
Tride-Prele, zu Lyon.
Verdiere des Prés, zu Lothringen.
Bunting, engl.
Strilozzo, ital.
Korn-Laerke, dänisch.
Knötter, norweg.
Predicatore, in Piemont.
Macottu; Orgiale, in Sardin.

4. Hortulana.
Ortolan, französ.
Hortolan, *Jardinier*, an verschied. Orten Frankr.
Benaris; Benarrie, in Languedoc.
Ortolan, engl.
Ortolano, ital.
Tordino, ital. (nach Salern.)
Ogrodniczek, poln.

5. Citrinella.
Bruant, französ.
Verdelat, in der Provence.
Verdat, in Sologne.
Verdale, in Languedoc.
Verdoie, in Poitou.
Verdange, in Perigord.
Binery, um Orleans.
Bardeant, in Guienne.
Verdier; Chic-jaune; Vertmontant; Verdier buissonnier; Verdin; Verdon; Rousette, in verschied. französ. Provinzen.
Yellow-hammer; Yellow Bunting, engl.
Zivolo, *Zigolo*, ital.
Jasine, in Brabant.
Serrant, in Maine.
Gulspurv, *Gulvesling*, dänisch.
Skur, norweg.
Sternardt, krainisch.
Stehrsts, lettisch.
Trznadel, poln.
Strnad, illyr.
Offänka, russ.
Altachan, burät.

11. Cia.
Bruant fou; Bruant des près, französ.
Foolish Bunting, engl.
Cirlo matto, ital.
Chic-farnous, in Prov.
Pieux des Rochers, in Mantua.

Geel-Göſchen, in Pommern.
Gluſzek, poln.

111. Geſchlecht. Tanagra.

1. Jacapa.
Bec d'argent, franzöſ.
Red-breaſted Blackbird, engl.
Jacapu, in Braſil.

2. Braſilia.
Tye-piranga, in Braſil.
Chiltototl, in Mexico.

4. Jacarina.
Jacarini, in Braſil.

5. Violacea.
Teitei, *Guiranhemgeta*; *Guraundi*; *Gurauthe engera*, in Braſil.

15. Braſilienſis.
Turquin, franzöſ.
Guira-genoia, in Braſil.

33. Leucocephala.
Quatotztli, in Braſil.

35. Amboinenſis.
Calatti, in Amboina.

36. Canora.
Xiuhtototl, in Mexico.

112. Geſchlecht. Fringilla.

1. Lapponica.
Grand montain; *Pinçon de montagne*, franzöſ.
Lappland Finch, engl.
Rouſſolan, in Dauphiné?
Tecurmaſhiſh, an der Hudſonsbay.
Narkſarmiutak, grönl.

3. Caelebs.
Pinçon, franzöſ.
Pinſon commun; *Pinçard*; *Pinchard*; *Pinchon*; *Glaumet*; *Hut*; *Pichot*; *Guignot*; *Riche-prieur*, in verſchied. franzöſ. Provinzen.
Chaffinch, engl.
Fringuello, ital.
Bog-Finke; *Bo-Finke*, däniſch.
Finke; *Bofink*, ſchwed.
Penkewa, böhm.
Snow-fleck; *Shoul-fall*, ſchott.
Pinça, catalon.
Schinkowitz, krainiſch.
Schubbe, lettiſch.
Metskask, ehſtn.
Zieba, poln.
Pinkawa; *Pienkawa*, illyriſch.

4. Montifringilla.
Pinçon d'Ardenne, franzöſiſch.
Tioguet, in einigen Gegenden von Burgund.
Quinçon de montagne, in Savoyen.
Ardennet, in Sologne.

Pichot montain; Pichot de mer; Ebourgeonneau; Pinson d'Artois, in Orleans.
Ruses innocentes, nach Fontin.
Bramble; Brambling; Bramlefinch; Bierfinch; Montainfinch, engl.
Fringuello montanino, italien.
Quaker; Bogfinkens Hoer-Unge; Akerlan, dän.
Norrquint, schwed.
Pinosch, krainisch.

7. Carduelis.

Chardonneret, französ.
Cardaline, in der Provence.
Cardelino, in Perigord.
Cardina; Chardonneret; Chardonneau; Chardrier, in Guienne.
Cadoreu, in der Picardie.
Golfinch; Thistlefinch, engl.
Cardello; Cardellino; Calderugio, ital.
Sirguerito; Siele colore; Forte pintacilgo, span.
Cardina, catalon.
Distelvink; Putter, holländisch.
Ziglis; Kammulis, lettisch.
Tiglits, ehstn.
Guas a Sierri Pancurÿn, wall.
Sczygiel, poln.
Steglik, illyr.

16. Citrinella.

Citril Finch, engl.
Verzellino, um Rom.
Luguarinera, Beagana; Raverin, an einig. Ort. Italiens.
Gaffaru, catalon.
Vidarino, im Bolognesischen.
Lequilla, zu Neapel.
Scarino, in Genua.
Citrinella, im Tridentinischen.
Citril, in Wien.
Sare, türkisch.

17. Serinus.

Serin, französ.
Serin; Scarzerin, in Ital.
Canari de Montanya, catalonisch.
Schwederle, in der Schweitz.
Grilitsch, krainisch.

23. Canaria.

Serin des Canaries, französisch.
Canary-Bird; Canary-Finch, engl.
Passera di Canaria, ital.
Kanarek; Kanary, poln.

25. Spinus.
Tarin, franzöſ.
Lucre, in der Provence.
Terin; Tirin, an verſchied. Orten Frankr.
Siskin; Aberdivine, engl.
Lucarino, ital.
Siſchen, friesl.
Sisgen; Siſiken, däniſch.
Siska; Gronſiska, ſchwed.
Zieſchen, livländ.
Zitskens; Kiwulis, lettiſch.
Paolind, ehſtn.
Saisl, krainiſch.
y Ddreiniog, wall.
Cyz, poln.
Cziſz, illyr.
Tſchiſchk, ruſſiſch.
Utlugan, türkiſch.

28. Canabina.
Grande linotte de vignes, franzöſ.
Greater red-headed Linnet; Greater Redpoll, engl.
Paſſerell vermell, catalon.
Torrn-Irriſk; Sidſe-Rönnicke, däniſch.
Hämpling, ſchwed.
Himpulinda, *Hacotidinen*, finniſch.
Sommerhämpling, finniſch.
Kanepu-Putrini, lettiſch.
Wäſtrik; Linna Waſtrik, ehſtn.
Makolagwa, poln.
Konoplänka, ruſſ.

29. Linaria.
Sizerin, franzöſ.
Leſſer Redpole; Leſſer red headed Linnet, engl.
Stone Redpole, um London.
Moiriſk; Graa-Siſken, däniſch.
Graeſiſka, ſchwed.
Siſſerönnike, lappiſch.
Dadſi, lettiſch.
Waſtrick, ehſtn.
Tſchetſchotka, ruſſiſch.
Urachon Trogoi, burätiſch.
Orpingmiutak; Anarak; v. diminutive *Anarangoak; Nennamak*, grönländiſch.

70. Angolenſis.
Tobaque, Negral, das Männch. } nach Edw.
Benguelinha, das Weibch. } nach Edw.

30. Petronia.
Soulcie, franzöſ.
Ring-Sparrow, engl.
Paſſera alpeſtre, ital.
Paſſerell dorat, catalon.

36. Domeſtica.
Moineau franc, franzöſ.
Paſſeron,

Passeron, in der Provence.
Passiere, in Saintonge.
Passerat, in Guienne.
Parat, in Languedoc.
Pierrot; *Moinet*, in der Picardie.
Pierrot, zu Paris.
Paisse; *Paissorelle*, in Nantes.
Grospillery; *Guilleri*, in der Normandie.
House Sparrow, engl.
Passera domestica, ital.
Pardat, span.
Mosch, holländ.
Graa-Spurv, dänisch.
Huus-Spurv; *Huus-Kald*, norweg.
Grabetz, krainisch.
Swirlulis; *Swihpuris*, lettisch.
Warblane, ehstn.
Alderyng to, alt britt.
Curculeus, zu Campidano.
Furfuragiu, am obern Cap.
Biddiso, zu Sassari.
Wrobel domowy, poln.
Worabin, russisch.
Ziphur, hebr.
Azbar, arab.

37. Montana.

Friquet; *Moineau de montagne*, französ.
Tchouet, in Guienne.
Passeron de muraille, in Provence.
Paersiere folle, in Saintonge.
Paisse de Saule, in Anjou.
Saulet, in Nantes.
Petrat, *Petra*, in Orleans.
Pardal royner, catalon.
Mountain Sparrow, engl.
Passera montanino, ital.
Skov-Spurre, dänisch.
Orkiaer, norweg.
Tolfân y mynydd, alt britt.
Wrobel gorny, poln.

39. Crispa.

Pinson frisé, französ.
Frizzled Finch, engl.
Beco de prata, portugies.

106. Indica.

Collheirinho, portugies.

113. Geschlecht. Muscicapa.

14. Olivacea.

Whip-Torn-Kelly, in Jamaica.

80. Atra.

Phoeby bird; *Bee-eater*, in Neuyork.

81. Noveboracensis.

Small green hanging Bird, in Neuyork.

114. *Geschlecht. Motacilla.*

1. Luscinia.
 Rossignol, französ.
 Nightingale, engl.
 Russignuolo, *Ussignuolo*, italien.
 Ruissenot, span.
 Nachtegael, holländ.
 Nattergal, dänisch.
 Naecktergahl, schwed.
 Slausz, krainisch.
 Lagsdigalla, lettisch.
 Oepitk, ehstn.
 Slowik-Wiekszy, poln.
 Slawick, illyr.
 Passarilante, bey den Iglesiensern.
 Tachmas, hebr.
 Ranun, arab.

3. Modularis.
 Traine-buisson; Mouchet; Fauvette d'hiver, franz.
 Passeron, zu Marseille.
 Gratte-paille, in Brie.
 Burette, in Berry.
 Burette, *Brunette*, in der Normandie.
 Passe-Paisse buissonniere, in Anjou.
 Passe-sourde, in Perigord.
 Tisit, in Lorraine.
 Grasset; Chic d'auvasse, in der Provence.
 Passere matto, in Boulogne.
 Fauvette des haies; Passe-buse; Rossignol d'hiver, in den nördlichen französ. Provinzen.
 Hedge-Sparrow; Hedge-Warbler, engl.
 Passera Salvatica, ital.
 Graa-Irrisk, dänisch.
 Järnsparf, schwed.

6. Curruca.
 Fauvette, französ.
 Fauvette babillarde, französisch.
 Babbing Warbler, engl.
 Beccafico canapino, ital.
 Graes-Smutte, dänisch.
 Kruka, schwed.
 Lagsdigallakalpas, lettisch.
 Potamida, auf der Insel Creta.
 Cannevarola, im Bolognesischen.
 Piegzia, poln.
 Pienige, illyr.

8. Salicaria.
 Fauvette des roseaux; französ.
 Sedge-Bird, engl.
 Wyderle; Zepste, in der Schweitz.
 Wierzbowniozka, poln.

10. Ficedula.
 Beccafigue, französ.
 Beccafico, ital.

Cypriat;

Cyprias; *Uccelli di Cypro*, ital.
Vinette, in Bourgogne.
Beccafigua; *Papafigo*, catalon.
Figogadka, poln.

11. Alba.

Lavandiere, französ.
Walcerono, in der Provence.
Enguane-pastre; bey Montpellier.
Peringleo, in Guienne.
Batajasse, in Saintonge.
Battiquouë, in Gascogne.
Semeur, in der Picardie.
Bergeronette; *Vachette*, in Nantes.
Hoche-queue, in Lothringen.
Crosse-queue; *Branle-queue*, in Bourgogne.
Damette, in Bougey.
White Wagtail, engl.
Cutrettola del petto nero, ital.
Coda tremola; *Eutretola*, ital.
Codinzinzola; *Bouarina*, zu Rom.
Cutrettola, in Toscana.
Bellarina, in der Lombardey.
Aveloa, portugies.
Quick Stertz, flandr.
Vipstiert; *Havre-Fugl*; *Steen-Pikker*; *Rendesteens-Snager*, dänisch.
Erle; *Lin-Erle*; *Elle-Kongens-Datter*, norwegisch.
Mari-Erla, isländ.
Aerla; *Suedes-aerla*, schwed.
Woaestraekia, ostbothnisch.
Zeemala; *Zeelawa*, lettisch.
Hännelinne, ehstn.
Pliska Pastariza, krainisch.
Pliszka; *Trzesiogonek biaty*, poln.

15. Oenanthe.

Cul-blanc; *Vitrec*; *Motteux*, französ.
Traine-charrue; *Garde-charrue*; *Tournemotte*, in Sologne.
Trotte chemin, bey Romorentin.
Artile; *Arquille*; *Moterelle*, in Beauce.
Wheat-ear; *Fallow-Smith*; *White Tail*, engl.
Culo-bianco, ital.
Steen-dolp; *Steensquette*; *Steen-Gylp*, dänisch.
Steens-

Steensquetta; Steensgwaetta, schwed.
St.inde-Pill, isländ.
Bella, krainisch.
Fornarola; Petragnola, in den apenninischen Gebirg.
Kyssektak; Kussektak, grönländ.

17. Rubicola.

Traquet, französ.
Piglia-moche, um Bologne.
Tracas, in Bourgogne.
Tourtrae, zu Semur.
Martelot, um Languedoc.
Semetro, um Metz.
Stone-Smich; Stone-chatter; Moor-Titling, engl. (Raj. u. Will.)
Mortetter; Black-berry-eater; Blac-cap, engl. (Charleton.)
Barada, ital.

18. Atricapilla.

Fauvette à tête noire, französ.
Testo-russo, das Weibch. in der Provence.
Black cap, engl.
Capinero; Capinera, Caponegro, ital.
Dlask, in Böhmen.

Hav-Skade; Spikke, Brun-Skalle, das Weibch. } dänisch.
Filomela, in Sardin.
Figoiadka, poln.

33. Caprata.

Maria capra, auf der Insel Luçon.

34. Phoenicurus.

Rossignol de muraille, französ.
Redstaart, engl.
Codirosso; Corossolo; Reverzal, ital.
Culrosso, boulogn.
Wüstling, in Schlesien.
Blod-Fugl; Blod-stiert; Röd-stiert, dänisch.
Roedstjert, schwed.
Erizkins, lettisch.
Czerwony-agonok, polnisch.

35. Erithacus.

Rouge-queue; Rouge-queue à collier, französ.
Red-tail; Grey Red start, engl.
Ohrmannisch, lettisch.
Czerwonorzytek, poln.

45. Rubecula.

Rouge-gorge, französ.
Bosote,

Bosote, in Bourgogne.
Rubiette, in Anjou.
Rubienne, in Maine.
Beree, in der Normandie.
Ruche, in Sologne und Poitou.
Frilleuſe; *Roupie*, in der Picardie.
Red-breaſt; *Robin Red-breaſt*; *Ruddok*, engl.
Peti-roſſo, ital.
Pettuſſo; *Pechietto*, italieniſch.
Thomas Gierdel, in Engl. (Penn.)
Petiroxo, portugieſ.
Pita-rotti, catalon.
Rotborſtje, holländ.
Smarnza; *Taſchitza*; *Taſchtza*, krainiſch.
Rod-Hals; *Röd-Kielke*; *Röd-Fiuke*; *Tommi-Liden*, däniſch.
Peter-Ronſmad, norwegiſch.
Rotgel, ſchwed.
Gil, polniſch.
Czir-wenka; *Zer-wenka*, illyriſch.
Conſigliere, bey den Alghereſen.
Occhio di bue, zu Oriſtano.
Frater Gavino, zu Saſſari.
} nach Cetti.

46. Troglodytes.

Roitelet, *Troglodyte*, franzöſ.
Roi bedelet, in der Provence.
Roi bouti, in Saintonge.
Roi bery, in Sologne.
Quion-Quion, in Poitou.
Arrrpit, in Guienne.
Rebetre, in der Normandie.
Berichon; *Roi bertaud*, in Anjou.
Ratillon; *Ratereau*; *Petit rat*, um Orleans.
Tourre-buiſſon; *Roi de froidure*, in Bourgogne.
Wren, engl.
Reattino, ital.
Scricciolo, zu Toſcana?
Re di Siepe; *Re di Macchia*, zu Rom?
Perchia chagria, in Sicilien?
Thomas i Giaerdet; *Nelle-Konge*; *Tomme-Liden*; *Gierd-Smutte*; däniſch.
Petermannsmad; *Muſe-Broder*, norweg.
Streſch; *Stoerſchek*, krainiſch.

Strzyzyk;

Strzyzyk; Watowe-oczko; Krol Myszy; Pokrzywka, poln.
Bilbil, türkiſch.

48. Regulus.

Roitelet; Roitelet hupé, franzöſ.
Golden-creſted-Wren; Copped-Wren, engl.
Fior-Rancio; Occhio-bovino, ital.
Capo d'ore, zu Verona.
Boarino della Stella, zu Geneve.
Papazzino, zu Bologne.
Koniinsken, flandr.
Sivigio, alt breton.
Fugle-Konge, däniſch.
Zeplihts, lettiſch.
Tühahne, ehſtn.
Kralitſch, krainiſch.
Krolik-czubaty, polniſch.
Seroé, in der Türkey.

49. Trochilus.

Pouillot; Chantre; Chanteur, franzöſ.
Reatin, boulon.
Fiſi, in der Provence.
Fenerotet, in Bourgogne.
Tuit, in Lorraine.
Frelot, Frelotte; Fouillet; Toute-vive, in Sologne.
Vetti-vetto; Totitolo, in Orleans.
Fretillet, in Champagne.
Yellow Wren; green Wren, engl.
Xiuxerra, catalon.
Krolik nieczubati, polniſch.

116. *Geſchlecht. Parus.*

1. Criſtatus.

Méſange huppée, franzöſiſch.
Creſted Titmouſe, engl.
Top-Meiſe, däniſch.
Tofs-Muſſa, ſchwed.
Meshatt, in Uppland.
Sikora czubata, polniſch.

3. Maior.

Groſſe-méſange; Charbonniere, franzöſ.
Bezenge, Serrurier, in Provence.
Meſſingle; Merſengle, in Picardie.
Anderelle; Anderolle, Anderzelle, in Sologne.
Patron des Marechaux, daſ.
Cendrille, in Poitou.
Croque-abeille, in Bourbonne.
Serre-fine; Bargue; Crevechaſſis, Larderiche;
Moineau

Moineau de bois; *Meſange brulée*, an verſchiedenen Orten Frankreichs.
Great Titmouſe; *Ox-eye*, engl.
Spernuzzola, ital.
Pariſola domeſtica, italieniſch.
Paruſſola, in der Lombardey.
Cincinpotola, in Toſcana.
Teſta - nera, in Piemont.
Majenze, in Savoyen.
Tſchirnabo, in der Gegend der Alpen.
Tintilaum, portugieſ.
Poligola, in Bologna.
Meſe, in Brabant.
Een - Maes; *Coelmaes*, holländ.
Musvit, däniſch.
Talg-Oxe; *Kiöd-Meiſe*, norweg.
Snitza, krainiſch.
Sihle, lettiſch.
Sikorna, *Czarna wietka*, poln.
Ala, in der Türkey.

5. Caeruleus.

Meſange bleue, franzöſ.
Paruſſolin; *Roſpedino*; *Fratino*, in Bologne.
Petite cendrille bleue, in Berry.
Petite ardelle; *Arderolle bleue*, in Sologne.
Serre fine à tête blanche, in Provence.
Blue Titmouſe, engl.
Parozolina, ital.
Milchemo, ſpan.
Chamoris; *Alionire*; *Milheiro*, in Spanien und Portug.
Blaameiſe, däniſch.
Blamees, ſchwed.
Sihle; *Sneedſe*, lettiſch.
Blava Snitza; *Blaumanditz*, krainiſch.
Sikora modra; *Bargiel*, poln.

6. Atricapillus.

Kiß-Kiß-Keſchiſch, an der Hudſonsb.

7. Ater.

Petite charbonniere, franzöſiſch.
Colemouſe, engl.
Sikora czarna; *Mnieyſſa*, poln.

8. Paluſtris.

Meſange de marais; *Nonnette cendrée*, franzöſiſch.
Marſh Titmouſe, engl.

Parou-

Paronzino, ital.
Craa-Meiſe; *Lille-Muſvit*, däniſch.
Tete; *Hamp-Meis*, norwegiſch.
Entita; *Tomlinge*, ſchwediſch.
Aeſchmeiſsle; *Kaatmeiſsle*, in der Schweitz.
Sikora-popielata, polniſch.

11. Caudatus.

Meſange à longue queue, franzöſ.
Perd ſa queue, in Orleans.
Queue de poilon, in Saintogne.
Demoiſelle, in Verdun.
Fourreau; *Gueule de four*, in Sologne.
Moiniet, *Moignet*, zu Montbard.
Dame; *Meuniere*; *Materat*; *Monſtre*, hin und wieder in Frankreich.
Long-tailed Titmouſe, engl.
Pulzonzino, ital.
Winteptker, in Cöln.
Lappmeſen, ſchwed.
Gaugarza, krainiſch.
Sikora zdtugim ogonem, poln.

12. Biarmicus.

Mouſtacle, franzöſ.
Bearded Titmouſe, engl.
Paroſolino barbato delle paludi, ſpan.
Uſſatſch, in Aſtrachan.

26. Hudſonius.

Peche-ke-ke-ſchiſch, an der Hudſonsb.

13. Pendulinus.

Meſange de Pologne, franzöſ.
Penduline Titmouſe, engliſch.
Pendulino, in Bologne.
Remez; *Remis*; *Remiz*; *Remezawyptak*; *Remicz*; *Remitſch*; *Remiſch*; *Romiſch*, in Polen.

29. Narbonenſis.

Dabuſſaire, in Languedoc.

117. *Geſchlecht. Hirundo.*

1. Ruſtica.

Hirondelle de cheminée, franzöſ.
Houſe-Swallow; *Chimney-Swallow*, engl.
Rondine; *Rondine minore*; *Rondinella*, *Rondola*, ital.

Forſu-

Forstu - Svale; *Mark-Svale*, dänisch.
Lade - Svale, norwegisch.
Ladu - Swala, schwedisch.
Laustaza, krainisch.
Besdeliga, lettisch.
Päsokenne, ehstn.
Rzecholka, poln.

2. Esculenta.
Salangane, französ.
Esculent Swallow, englisch.
Chim, im Orient.
Lawid, in Java.
Berondaya; *Waled*, bey den Bergjavanern.
Layong - Layong, in Sumatra.

Die Nester heissen
Nidi esculenti, *Nidi halcyonum*, *Nidi edules*, } latein.
Nids des Alcyons, französisch.
Vogelnestjes, holländ.
Saroi - bura, chines.
Jenwa - Joniku, japan.
Sussu, javan.
Saron - baerong, malayisch.

3. Urbica.
Hirondelle de muraille; *Martinet à cul blanc*; *Petit martinet*, französisch.
Martin; *Martlet*; *Martinet*, engl.
Conca de moru, in Sardinien.
Balestruccio, in Toscana?
Bye - Svale; *Tag - Skiägs - Svale*; *Hvid - Svale*; *Rive*; *Skornsteens - Svale*, dänisch.
Huus - Svale, norweg.
Hus - Swala, schwed.
Turts, ehstn.
Huda - urnik, krainisch.
Jaskotzka, poln.

4. Riparia.
Hirondelle de Rivage, französ.
Sand - martin; *Shore - bird*, engl.
Rondine riparia; *Drepane*, ital.
Dig - Svale; *Jord - Svale*; *Blint - Svale*; *Sol - Bakke*, dänisch.
Sand - Rönne; *Strand - Svale*; *Dig - Sulu*; *Sand - Sulu*, norweg.
Strand - Swala; *Back - Swala*, schwed.
Grzebielucha, poln.

6. Apus.
Martinet, französ.

Black Martin; *Swift*, engl.
Rondone, ital.
Barbarottu, *Vargia*, in Sardin.
Martinet-grand; *Hirondelle-grande*; *Martelet*; *Moutardier*, an verschied. Orten Frankreichs.
Steen-Swalm, holländisch.
Steen-Kirke-Söe-Muur-Swale, dänisch.
Ring-Svale; *Svart-Sulu*; *Field-Sulu*, norwegisch.
Ring-Swala, schwedisch.
Tschurkste, lettisch.
Jurz, poln.
Jerzyk, polnisch?

118. Geschlecht. Caprimulgus.

1. Europaeus.

Engoulevert; *Tette-chevre*; *Crapaud-volant*, französ.
Dorr-Hawk; *Night-Jarr*; *Night-Hawk*; *Fern Owl*; *Churn-Owl*; *Goatsucker*, engl.
Cavaterra; *Tetta vache*; *Calcabotto*; *Caprimulgo*, ital.
Passa-litorta, in Sardin.
Aftenbakke; *Natravn*; *Nat Skade*, dänisch.
Gedemalker, norweg.
Nattskräfva; *Nattskärra*, schwed.
Quältknarren, smoländ.
Kozodoy, poln.

Register

Register
nach den Seitenzahlen.

II. bedeutet den zweyten Theil. Die mit *Cursivschrift* gedruckten Wörter beziehn sich auf das Verzeichniss der ausländischen Synonymen, und die dabey stehende *erste* Zahl zeigt das *Geschlecht*, die *zweyte* die *Gattung* an.

A.
Aaehoer 67. 15
Aalekrage 72. 4
Aalge 75. 1
Aalscholwer 880
Aarfugl. 103. 2
Aasgeyer 6. 9. 11. 13
Aaskrähe 350
Aaskrae 50. 5
Aasrabe 337
ABC Kybitz 1091
Abendfalk 122
Aberdevine 112. 25
Ablicke 50. 6
Abou Douch'n 21
Abou Hannes 1008
Abussaej. II. 618
Acalchitli 410
Acamacu 561
Acangues 102. 1
Acanthus II. 519
Acatechili II. 521
Acatechichictli II. 521
Accegia 86. 6
Achalalactli 519
Accipitres 1. 109
Accucadita 105. 3
Acertello 42. 16
Achau 101. 1
Acitli 885
Ack 50. 6
Ackerdrossel II. 283
Ackerhoen 88. 6
Ack r - Hoena 103. 12
Ackerkrähe 348
Ackerlerche II. 207
Ackerloe 88. 5
Ackermännchen II. 636
Ackertrappe II. 2
Ackervogel 1093
Acoho II. 57
Acototloquichitl II. 315
Acredula II. 220
Ad 67. 15
Ada 67. 15
Adder - bird 44. 12
Adebar 958
Aden 67. 40
Adjum 907
Adler 18 ff. 25 ff.
Adlereule 119. 144
Adlergeyer 12. 24
Adventsvogel 882
Aederfugle 738
Ae - Aesteing 67. 15
Aedon II. 596
Αηδων II. 610
Aegerste 374
Aegerster - Specht 532
Aegerst - Specht 534
Aegithus II. 528
Aehbähr 958
Aehrenträger II. 28
Aecrone 84. 12

Aelke 355
Aellonſkrika 50. 7
Aelſter 374. 381. 538
Aelſterſpecht 533
Aemmerling II. 413
Aentrich 783
Aera 67. 15
Aerblick 67. 15
Aerefugl 103. 2
Aerfugl 738
Aerla 114. 11
Aerone 84. 12
Aeſalo 86. 126
Aeſchmeiſsle 116. 8
Aethiops II. 501
Aethyia 880
Aexter 50. 13
Aftenbakke II. 811
Afterfalke 189
Aftergoldflügel 518
Afternachtigall II. 663
Agace 50. 13
Agami 974. 1154
Agaſſe 50. 13
Agelaſter 374
Ager-Hön 1140
Ager Höne 103. 13
Agerluſter 374
Aghiron 963
Agrolle 50. 3
Agrotto 72. 1
Ahdjirbu 847
Ahr 77
Ajace 50. 13
Ajaja 940
Ajaſcakan 59. 1
Αιγιθαλος II. 758
Aigle 19 ff.
Αιγοθηλας II. 812
Aigrette 973
Aiſt 959. 964
Ajuru catinga 248
Ajuru-curau 282
Akaiearua 65. 28
Akeikſek 103. 4
Akerla 88. 6
Akerlan 112. 4
Aker-Rixe 1140
Akkaviak 949
Akoko II. 57
Akpa 69. 2
Akpalliarſuk 69. 5
Akpalliarſungoak 69. 5
Ak. Turna 84. 11
Ala 67. 28—116. 3
Alactu 354
Alaipy 110. 1
Alap 48
Alapi II. 294
Alario II. 494
Alaſter 374
Alaud 105. 1
Alauda II. 206 ff.
Alaudae congener II. 407
Alaverte 105. 1
Albatroſs 836. 840 ff.
Albatrus 840
Albicilla 22. II. 538
Alca 814 ff.
Alcatraz 860
Alcedo 563 ff.
Alchata II. 106
Alcyon II. 315
Alderyng to 112. 36
Alebrande 67. 32
Alector II. 37. 40. 46. 78
Alelſter 374
Aleſter 374
Alexanderspapagey 241
Alferraz 42. 15
Algarte 374
Alhabari 95. 1
Alionire 116. 5
Alk 814. 819
Alk 69. 4 ff.
Alle 823

Allekräka 51. 1
Allicke 356
Alocharello 43. 5
Alocho 43. 7
Alouette-de-mer 1067. 1076 ff.
Alouette II. 208 ff.
Alpengrasmücke II. 632
Alpenkrähe 384
Alpenlerche II. 232
Alpenmeise II. 775
Alpenschwalbe II. 803
Alpenstrandläufer 1066
Alpkachel 384
Altachan 110. 5
Altekeba 104. 1
Aluco 160
Alwargrim 1093
Alzarazir 106. 1
Amaduvad II. 495
Amalousse 109. 2
Amauligakaudil 110. 1
Amaxl II. 304
Amazon 282
Amazone II. 433
Amazonenammer II. 433
Amazonenpapagey 280. 285. 289
Ambraschwalbe II. 800
Ameisendrossel II. 297
Ameisenfresser II. 294 f.
Ameisen-Nachtigall II. 293 f.
Ameisenvogel II. 294 ff.
Amerikaner II. 123. 369
Amethystkolibri 685
Amethystsmaragd 680
Amisk-obo 43. 4
Ammer 407. 426. II. 390. ff. 405. 413
Ammering II. 415
Ammerling II. 408
Ampelis II. 323
Amsel 413. 423. 437. 1093. II. 233. 242. 257. 274. 281. ff. 291. 301. 451
Amselmerle II. 302
Amselmeve 930
Amzell 107. 22
Anaca 303
Anapba 50. 6
Anarak 112. 29
Anarangoak 112. 29
Anas 694. 784. II. 7
And 67. 19 ff. — 68. 1 ff.
Anderelle 116. 3
Anderolle 116. 3
Andezelle 116. 3
Andu 96. 3
Angala-Dian 651
Angeltasche 765
Angeltaske 765
Angle-Mager 69. 3
Anhima 942
Anhinga 864
Ani 333. 613
Ano 100. 1
Anser 718. 828
Anseres 694
Anter 783
Anthos II. 223
Antigore 956
Antrach 783
Apeca-Apoa 67. 16
Apiaster 594 ff.
Apiolo 63. 1
Apira 108. 3
Aptenodytes 825
Apus II. 798
Apute-Juba 245
Aquila 31 ff.
Aquilastro 42. 4
Aquilus 850
Araber II. 5
Arent 42. 5
Aracanga 225
Aracari 315
Arada II. 293
Aradone 67. 33

Arapapa 946
Arara 108. 3
Aras 222
Arataratagnacu 66
Aratica 66
Ara-Wereroa 57. 27
Arbenne 103. 4
Arcase 86. 3
Ardea 948 ff.
Ardeae affinis 603
Ardelle II. 762
Ardennel 112. 4
Ardeola 978
Aregazza 50. 13
Arguille 115. 15
Argusfasan II. 72
Arimanon 258
Arnauiak 67. 15
Arnauiartak 67. 5
Arnaulik 67. 15
Arneat 44. 12
Arpschnarp 1139
Arquata 1019
Arrepit 114. 46
Arrian 16
Arschfuss 883
Arta 67. 33
Artile 114. 15
Artsche II. 525
Arynanussu 99. 1
Aschenente 717
Aschlerche II. 228
Aschmeise II. 766
Asilus II. 727
Asilvogel II. 725
Asio 146
Aster 374
Astkrähe 351
Astore 42. 30
Astoreddu 42. 15
Astralaginas II. 490
Astrild II. 366
Asturnellato 104. 1 δ.
Atitchou Achaschich 109. 12
Atototl 639
Atricapilla II. 661
Attagen 851. II. 99
Attelingant 773
Atthis 440
Attinguacu camacu 493
Aturulia 42. 12
Atzel 374. 435. ff. II. 468
Atzeldohle 436 ff.
Audna-Tytlingr II. 530
Auen-Nachtigall II. 110
Auerbirkhuhn II. 93
Auercalze II. 90
Auerhahn II. 84. 88. 102. 107
Auk 69. 1
Au-Kuskow 103. 7
Aura 6
Aureola II. 15
Aurfugl II. 90
Auricoma 674
Auriol 405
Auriou 52. 1
Aurivittis II. 490
Aurorapapagey 289
Auroraparkit 268
Austerfresser 1109
Austermann 1109
Austerndieb 1109
Austernfischer 1108
Austersammler 1109
Austerschnepse 1110
Autour 42. 30
Autruche II. 12
Au-Vogel II. 610
Avarou 945
Avekong 67. 4
Aveloa 114. 11
Averano II. 332
Avestruß 96. 1
Avicula II 745
Avicula nivalis II. 402
Avocette 1105

Avo-

Avosette 1023. 1105
Avosettschnepfe 1106
Avozette 1106
Awerhan II. 85
Ayaya 941
Ayoquantotl 423
Azbar 112. 36
Azeldohle 435 ff.
Azulam II. 368
Azulinha II. 539

B.

Baarkhohn II. 90
Baba 846
Bachamsel II. 244
Bachkönig II. 727
Bachsprehe II. 244
Bachstelze II. 268. 575. 605. ff. 634 ff. 636. 732
Bachvogel II. 244
Backöfchen II. 727
Backofendrescher II. 770
Back-Swala 117. 4
Badda Dsegguse 63. 1
Baglafecht II. 384
Bah 67. 62
Bahamafink II. 499. 558
Bak 84. 21
Bakkamaena 43. 20
Bäkke-Fugl 106. 5
Balaban 103
Balbul 795
Balbusard 56
Balbuzard 56
Balestruccio 117. 3
Balicassio 370
Ballarina 114. 11
Baltimore 419
Bambea II. 295
Banana II. 540
Bananist II. 613
Banchem 57. 1
Banjahbu II. 268
Bantanhühner II. 53
Barada 114. 17
Baranek 86. 6
Barbaien 43. 1
Barbagcanni 43. 4
Barbareztaube II. 150
Barbarottu 117. 6
Barbates 735
Barbu 459
Bardeant 110. 5
Baretino 50. 7
Bargach 84. 12
Barge 1023. ff. 1036. ff. 1042. 1108
Bargiel 116. 5
Bargne II. 757
Barker 1040
Barlakzel 84. 12
Barless 54. 5
Barliata 735
Bartadler 20
Bartavelle II. 111
Bartdohle 337
Bartemmerling II. 431
Bartfalk 20
Bartgeyer 15. 20
Bartmännchen II. 773
Bartmeise II. 773
Bartniczek 65. 1
Bartparkit 251
Bartvogel 335. 458 ff.
Bassaner 860
Bassanus 860
Bastardadler 12
Bastardauerhahn II. 92
Bastardbaltimore 420
Bastardberghuhn II. 108
Bastardbirkhuhn II. 92
Bastardbussard 68
Bastardeisvogel 555 ff.
Bastardentenhuhn II. 59
Bastardfasan II 70
Bastardhänfling II. 528
Bastardkranich 943

Baſtardlachtaube II. 196
Baſtardlerche II. 213
Baſtardnachtigall II. 623. 625
Baſtardſperling II. 553
Baſtardſtieglitz II. 493
Baſtardwaldhuhn II. 92
Baſtardwaſſerhuhn 163 ff.
Baſtardzeiſig II. 520
Batagaſſe 114. 11
Batt 768
Battiquoüe 114. 11
Bauernammer II. 417
Bauergans 723
Bauernſchwalbe II. 782
Bauertaube II. 143
Bauge 42. 38
Baumente 792
Baum Endtle 734
Baumeule 154. 161
Baumfalk 123
Baumfink II. 509
Baumgans 733
Baumganſs 733
Baumhäckel 617. 652
Baumhackl 535
Baumhackerl 537
Baumhacker 452. 502. ff. 510. 527. ff. 533. 536. 541. 549. ff 592. II. 677
Baumhatzel 361
Baumhecker 548
Baumheckel 618
Baumkleber 617
Baumklette 617. 631. 646. 660. 663
Baumkletterer 548. 642
Baumkletterlein 618
Baumläufer 616. ff. II. 370
Baumläuferlein 617. 628
Baumlerche II. 215. 226. 233
Baumnachtigall II. 614
Baumpelikan 1002
Baumpicker 546
Baumreiter 617
Baumrutſcher 617
Baumſchnepfe 609
Baumſchwalbe II. 577
Baumſpecht 536
Baumſperling II. 370. 536. 553
Baumſteiger 617
Bazant 101. 3
Beagana 112. 7
Bebe 67. 40
Bebeſchwanz II. 638
Beccagia 86. 6
Beccaroveylia 80. 1
Becus 86. 6
Becaſſe 1027
Becaſſeau 1069
Becaſſine 1031. 1036. 1041
Beccacino 86. 7
Beccafico 114. 10
Beccafico canapino 114. 6
Beccafige II. 630
Beccafigua 114. 10
Beccarin reale 86. 7
Beccaſtorta 89. 1
Beccofriſone 108. 1
Bec-croiſé II. 339
Bec-en oiſeau 933
Becfigue II. 630
Becharu 347
Beco de prata 112. 39
Becquefigue II. 631
Bee-eater 596 ff.
Bee eater 113. 80
Beemerziemer II. 259
Beena 50. 60
Beerold 405
Beginen 1050
Behemle II. 259. 324
Beinbrecher 30
Beinbrecheradler 31
Bekaſſine 1032
Bekkaſine 1074
Bel-arje 84. 4

Belch

Belch 1126
Belchinen 1126
Bella 115. 15
Belzmeise II. 773
Bemtere 44. 15
Benaris 110. 4
Bengali II. 496. 539
Benguelinba 112. 70
Bennarie 110. 4
Bentaveo 205
Beque noir cendré 59. 1
Beren 136. II. 715
Bergadler 10
Bergammer II. 404. 439
Bergamsel 217. II. 308. 320
Bergdohle 383
Bergdol 384
Bergelster 189
Bergeinsiedler 387
Bergente 709. 717. 770
Bergeremit 387
Bergerette II. 733
Bergeronette II. 641. ff. 677. 732
Bergeule 182
Bergfalke 12. 96. 109. 110
Bergfasan II. 54
Bergfink II. 475. 482. 509
Berggans 727
Berghänfling II. 532
Berghu 139
Berghuhn 1036. II. 83. 107. 110
Bergkrähe 385
Berglerche II. 231
Bergmeise II. 771
Bergnachtigall II. 483
Bergrebhuhn II. 118
Bergreiher 968
Bergschneppe 1026
Bergschwalbe II. 794. ff. 804
Bergspatz II. 556
Bergsperling II. 509. 553
Bergstaar II. 246
Bergtaube II. 139. 146. 165
Bergtrostel II. 259
Bergtul 384
Bergugle 43. 1
Berguhu 141
Bergzeisig II. 529. 739
Berichon 114. 46
Berichot II. 719
Beringsgans 715
Berkuti 38
Bernakelgans 730. 733
Bernicla 730
Bernikel 734
Berolst 403
Berongdayä 117. 2
Berta 50. 7
Bertina 50. 7
Besdeliga 117. 1
Bettlaar 72. 3
Beutelgans 845
Beutelmeise II. 777
Bezenge 116. 3
Bhu 139
Bialozor 42. 37
Biberente 805
Bibertaucher 804
Biddiso 112. 36
Biekelchen 772
Biekilchen 774
Bielogwost 42. 39
Bjeloc gus 67. 45
Bienenfalk 68
Bienenfänger 595
Bienenfrass 595
Bienenfresser 593
Bienenschnappe II. 700
Bienenschwalbe 597
Bienenspecht 596
Bienenverrätherkukuk 588
Bienenvogel 595
Bienenwolf 595
Bieresel 503

Bierhold 503
Bierholf 403
Bierole 403
Bierkelchen 774
Bihoreau 966
Bilbil 114. 46
Bilcock 93. 2
Bilorot 52. 1
Bimbele II. 613
Binery 110. 5
Binmeiſe II. 762
Binſennachtigall II. 618
Biörk-Traſt 107. 1
Birckilgen 774
Birgamſel II. 320
Birkfalke 109
Birkheher 390
Birkhuhn II. 88. 95. 100
Biſamente 739
Biſchoff II. 468
Biſet II. 146
Bisnoi-ſbawronek 105. 10
Biſſourdet II. 724
Biſtarda II. 4
Bitter II. 259
Bittern 984
Bizbiutzb 88. 6
Blakolls-Oend 787
Blaaefugl 42. 13
Blaa Hals 67. 40
Blaakoll 67. 40
Blaakraake 51. 1
Blaamage 906
Blaamager 910
Blaameiſe 116. 5
Blaa-Nakke 67. 40
Blaa-Rage 50. 2
Blabrach 991
Blaffer 86. 4
Black Cack 103. 2
Black-Game 103. 2
Black Grous 103. 2
Black-bird II. 302
Blakberry-eater 114. 17
Black-cap 114. 17
Bläkräka 51. 1
Blamees 116. 5
Blankeknio 755
Blas-And 91. 2
Bläſenörk 1128
Blaſer 101
Blask 109. 4
Bläsſchen 1125
Bläſſenente 777
Bläſſengans 715
Blaſsgieker 1125
Blaſsente 786. 1125
Bläſsgen 1127
Blaſshuhn 1125
Bläsklaka 91. 2
Blaſsl 1127
Bläſsling 1125
Blauamſel II. 312
Blauammer II. 448
Blauauge 336. 357
Blaubäckchen 116
Blaubeerſchnepfe 1021
Blaudroſſel II. 313
Blauente 787
Blauflügel 640
Blaufuſs 57. 59. 60. 73. 96. 1021
Blaugürtel II. 330
Blauhals 296
Blauhänfling II. 427
Blaukehlchen II. 698. 702
Blaukehlein II. 313. 702. 705
Blau-Kehle II. 704
Blaukopf 225. 232. 243. 271. 275. 635. 778. II. 177
Blaukrähe 390
Blauling II. 297
Blaumanditz 116. 5
Blaumeiſe II. 760
Blaumerle II. 313
Blaumüller II. 760

Blau-

Blaurack 391
Blaurock 391
Blauſchnabel II. 361
Blauſchwanz 663. II. 672
Blauſpecht 544
Blautaube II. 140
Blauziemer II. 253
Blauvogel II. 705. 708 f.
Blaw-Meiſslin II. 762
Blawvogel II. 313
Blawzimmer II. 313
Bleikehlchen II. 615
Bleſs 1126
Bleſſing 1127
Bleyfalke 104. f. 136
Bleykehlchen II. 702
Bleykehlein II. 615
Blik-Skarv 72. 3
Blind-Svale 117. 4
Blinzer II. 659
Blishöne 1126
Blochtaube II. 140. 172
Blocktaube II. 140
Blod-Finke 109. 4
Blodfugl II. 693
Blodſtiert 114. 34
Blodſtert II. 693
Blomrokke 1027
Blongior 998
Blumenkönig 644
Blumenprinz 645
Blumenſchwänzel 561
Blumenſpecht 660 ff.
Blumente 786
Blutfink II. 350
Bluthänfling II. 524. 529
Blutkopf 460
Blutpapagey 232
Blutrothkehlchen II. 665
Blutſchnabel II. 366
Blutſchwanz 416
Boarina II. 632
Boarino della ſtella 114. 48
Boarula II. 732
Boat-bill 947
Bob-Lincoln II. 435
Bocian 84. 4
Boefiaer 69. 5
Boemerlein II. 259
Boeres 54
Boeuf 109. 4
Boeuf de Dieu II. 719
Bo-Finke 112. 3
Bogendroſſel II. 298
Bog-Finke 112. 3
Bog-Finkens Hoer-Unge 112. 4
Böhmer II. 324
Böhmlein II. 325
Bohnengans 729
Bölchinen 1126
Bold Tiät 88. 1
Boleta 45. 7
Bollenbeiſſer II. 346
Bollenpick II. 344
Bollihes II. 52
Bombycilla II. 326
Bonana 423
Bonaſia II. 102
Bondelöber 91. 2
Bonjour-Commendeur II. 429
Bondrée 69
Boom-Spaarling II. 554
Boom-Uiltze 43. 5
Bootfink II. 478
Boro-Nagoſſum 751
Boſchas 773. 785
Boſote 114. 45
Bottervogel 803
Bottlekoſe 69. 4
Bouarina 114. 11
Bouchari 44. 12
Boulard II. 773
Boulboul 221
Bourgeonnier 109. 4
Bouron-aru 54
Bourrough-Duck 67. 4

Boute-

Boute-quelon 107. 1
Bouveret II. 369. 370
Bouveron II. 393
Bouvier 109. 4
Bouvrer 109. 4
Bouvreuil II. 351. 362. 383. 387. 389. 391. 544
Bouvreux 109. 4
Bozzagro 42. 29
Braakvogel 1093
Brachamsel 1078
Bracher 595. 1003
Brachhenne 1094
Brachhuhn 1017. 1085
Brachlerche II. 207. 212. 214. 215. 219
Brachschnepfe 1017
Brachvogel 1001. ff. 1015. 1017. 1056. 1084. 1090. II. 249
Brakvogel II. 251
Bramanendrossel II. 278
Bramanen Eisvogel II. 278
Bramary-Kite 42. 71
Bramble 112. 4
Brambling 112. 4
Bramlefinch 112. 4
Brandente 760. 768. 794
Brandeule 167
Brandfalk 67
Brandfink II. 522
Brandgans 67. 4
Brandgans 708
Brandgeyer 67. 71
Brandmeise II. 756
Branta 730
Brantangel 925. 929
Brasilianer II. 37
Brassler II. 407
Braubling II. 760
Braule-queue 114. 11
Braunellchen II. 615. 630
Braunelle II. 615
Braunellein II. 615. 631
Braunellerl II. 617
Braunflügel 680
Braunhänlein 1077
Braunhänfling II. 525
Braunkehlchen II. 655. 658
Braunkopf 295. 407. 549. 912
Braushahn 1050
Braut 791
Bred Neb 80. 1
Breggush 87. 8
Breinvogl II. 235
Breitfuss 864
Breitschnabel 746. 757
Breitschnabler 746
Breitschnabelkopf 746
Breitschwanz II. 153
Brennhahn II. 89
Brenta 733
Brentgans 732
Brenthus 732
Bresague 43. 8
Breve 381
Brieftaube II. 158
Briefträger II. 158
Brillefugl 69. 3
Brillendrossel II. 301
Brillenente 755. 756
Brilleneule 181
Brillenmotacille II. 659
Brillennase II. 816
Brilltaube II. 163
Brinatka 107. 2
Bris-os 42. 4
Brkostaw 108. 1
Brokfugle 1095
Bromhan II. 89
Brook-Ouzel 93. 2
Bröseexter 361
Bruant II. 413 ff.
Bruchdrossel II. 314
Brücheschwalbe II. 782
Bruchschnepfe 1031

Bruchweidendrossel II. 283
Bruder Berholst 403
Bruia 44. 22
Brunnvogel 693
Brunette 114. 3
Brunnakke 67. 27. 31. — 761. 768
Brunn-Skalle 114. 18
Brüsen 85. 5
Bruskop 87. 1
Brusola 52. 1
Brustling II. 525
Brustwenzel II. 702. 705
Bruuns Kopper 1052
Bruus-Hane 1052
Bruyant II. 735
Bubil II. 299
Bubo 139
Bucco 457
Buceros 323
Buchfink II. 477
Buchfinkens Hurkind II. 484
Buchoschir 106. 1
Büffelkopfsente 752
Buferlotto 44. 12
Bubo 43. 1
Buhu 139
Buik 985
Buisonnier 107. 22
Bülau 403
Bulfinch II. 351
Büloh 403
Bülow 403
Buin 438
Bunk 84. 21
Bunkkopf 710
Buntdrossel II. 259
Buntflügel 882
Bunting 403 ff.
Buntschwänzel 121
Buntspecht 508. 530. 533. 535. 538 ff.
Buntwenzel 632
Bu-onk 998
Buphaga 331
Burette 114. 3
Burgemeister 908. 909.
Busard 54
Busaroca 50. 3
Buschadler 18
Buschelster 189
Buscheule 161. 165. 170
Buschhahn II. 50
Buschhuhn II. 39 f.
Buschlerche II. 213. 215. 223
Buschsänger II. 617
Buschschnepfe 1026
Buse 64
Busaar 2
Bussard 63
Busshart 7. 63. f. 66. f. 123
Busshardfalk 64
Bustard II. 7
Busthart 65
Butcher-bird 44. 12
Buteo 63. 70
Butoor 84. 12
Butor 984 ff.
Butschock 59. 1
Butschumur 105. 1
Buttelnase 166
Buttervogel II. 375
Buvadak 86. 12
Buzard 7
Buzzard 42. 15
Βυας 42. 1
Byeneeter 63. 1
Byesvale II. 790
Bymeise II. 766
Byrold 403

C.

Caapwachtel 384
Cabaducutch 43. 11
Cabeca 43. 9
Caheticuch 43. 11
Cabizoni 770

Cabone

Cabone de murdego 86. 6
Cabugi 103. 12
Cabure 151
Cacadu 260
Cacalotl 341
Cacao-Walke 50. 24
Cacatolotl II. 521. 744
Cadoreu 112. 7
Caelebs II. 477
Caeruleo II. 313
Cage 702
Cahuitahü 705
Caica 297
Caille II. 125 ff.
Calak 50. 2
Calandra II. 230. 407
Calandrino 105. 2
Calandrote 107. 3
Calao 324. 326 f.
Calatti II. 462
Calcabotto 118. 1
Calderugio 112. 7
Calecutifch Huhn II. 33
Calendula II. 719
Calfat Ammer II. 447
Calicatczu 69. 2
Calic-Calce 208
Calidris 1039. 1071. 1075. 1077
Callaeus 335
Calliope II. 674
Calpetra 80. 1
Calquin 42. 34
Camelus II. 11
Can 107. 3
Canace II. 95
Canale 50. 3
Canard 711. ff. 783. ff. II. 8
Canard 67. 16 ff.
Canaria II. 514
Canarienfink II. 513
Canarienbaftard II. 540
Canarienfperling II. 511
Canarienvogel II. 511
Canarien-Zeisle II. 515
Canarin-Salvatico 52. 1
Cancoine 107. 2
Cancroma 914
Canibello 42. 16
Canishühnchen II. 53
Canne-petiere II. 8
Cannevarola II. 622
Cantor II. 318
Canutsvogel 1074
Caparoch 174
Capella coeleftis 1031
Capercally II. 90
Capercalze II. 90
Capinero II. 664
Capmeife II. 773
Capo d'ore 114. 48
Capo negro 67. 45. — 114. 18
Capo-roffo 67. 26
Capricalca II. 87
Caprimulgus II. 808 ff.
Caprotherus 914
Capfa-Fink II. 509
Capfa Sperling II. 509
Capfchwalbe II. 792
Capfperling II. 494
Capfturmvogel 838
Caracara 54
Carbo 713. 852
Carbonarius II. 765
Cardeline 112. 7
Cardellino II. 490
Cardello 112. 7
Cardina 112. 7
Cardinal II. 354. f. 360. 390. 450 ff. 463. 465. 662
Cardinalbaumläufer 624
Cardinälchen II. 444. 662
Cardinalente 540
Cardinalfpecht 540
Cardinalvogel II. 354 f.
Carduelis II. 476. 487. 519

Carfunkel 688
Cariama 942 ff.
Caripira 851
Carlsvogel II. 702
Carminhänfling II. 529
Carnifex II. 329
Caroli 86. 3
Caroliner 917
Carolinerlerche II. 232
Carouge 422
Carpenteros 59. 3
Carririni 18
Caryocatactes 18
Casarka 778
Cased-y-ddryccin 107. 2
Casoar 96. 2
Casparus 1144
Casper 1140
Cassowar 96. 2
Casse-noix 767. — 109. 2
Cassenoyaux 109. 2
Casseraignon 109. 2
Cassike 414 ff.
Cassique 416 ff.
Cassowary 96. 2
Castagneux 890
Castor 804
Castrica 44. 12
Casuar II. 15
Casuarius II. 15
Casuaris II. 15
Casuel II. 16
Cata 103. 12
Catarractes 828. 875. 915
Catharina 294
Catotol II. 521
Caudec II. 573
Caue 50. 6
Cauette 50. 6
Cavaz 98. 1
Caxcaxtototl II. 246
Cayo 50. 6
Cedrin II. 503
Cehoilotl II. 176
Ceiliog brou fraith 107. 4
Ceiliog mwyarch 107. 22
Cela II. 16. 779
Cenchramus 1123. II. 31
Cendrille 59. 1. — 116. 3
Centcontlatolli II. 271. 272
Cepphus 881. 915
Cercelle 67. 32
Cercerelle 42. 16. — 67. 32
Cerisin II. 503
Cernicalo 42. 16
Certhia 617. ff. 620
Chacamel II. 39
Cha-çha 1107. 2
Chachalacametl II. 39
Chacotte 50. 6
Chadara 733
Chaddaejir 63. 1
Chaffinch II. 478
Chafty II. 727
Chalandra 105. 9
Chalandria 105. 9
Chalois 140
Chamoris 116. 5
Chantre II. 726
Chapon de Pharaon 45. 5
Charadrius 1067. 1083 ff. 1096
Charah 184
Charbonniere II. 756. 766
Chardonneret II. 487
Chardonneau 112. 7
Chardrier 112. 7
Charlot 86. 3
Charniergans 861
Chartologoi-Nagossum 751
Chasidah 84. 7
Chassarka 728
Chassetou 43. 1
Chata 72. 1
Chatering 50. 24
Chat-huant 137. 165. 168. 172. 812

Chatte.

Chatterer 108. 1
Chaumi II. 300
Chauſſe-pot 59. 1
Chebulos 42. 4
Cheela 155
χελιδων II. 785
Chelanopex 710
χελανοπηξ 710
Cherik II. 680
Cheriway 26
Cherry-deaniſch 46. 7
Chruna 103. 4
Chevalier 1056
Chic II. 439
Chic d'auvaſſe 114. 3
Chicus 50. 6
Chichictli 177
Chichiltototl Tepuzcullulac II. 450
Chichiltototl-Vogel II. 744
Chi-chup-pi-ſae 105. 10
Chic jaune 110. 5
Chic-perdrix 110. 3
Chim 116. 2
Chineſerente 791
Chineſerſchwalbe ſ. Salangane
Chin-Tchien-Khi II. 28
Chipeau 750
Chirino 43. 5
Chirurgien 1134
Chlän 546
Chlorion II. 375
Chloris II. 371. 446. 666
Chocas 50. 6
Chongorgalu 704
Choppard 109. 4
Choroi 772
Chouant 43. 4
Choucari 371
Choucas 356
Choudet 43. 4
Chouchette 50. 6
Choue 43. 4. 7
Chouette 170. 176. ff. 43. 8 f.
Chougt 359
Chout 359
Chracho lec 72. 4
Chriſtöffelchen II. 660
Chryſaetos 33
Chryſomitris II. 490
Chuatotolin 99. 1
Chuck-bird 110. 2
Chuc-nocny 43. 4
Chue 50. 6
Chuichanitſchkun 69. 9
Churge II. 8
Churn-Owl 118. 1
Cia II. 430
Ciagula 50. 6
Cicogne 345. 959
Ciconia 950. 958
Cifoletta 109. 4
Cigni II. 503
Cigno 67. 1
Cincinpotala 116. 3
Cinclus 1058. 169. II. 243. 640
Cineraria II. 629
Cini II. 503
Cinit II. 503
Cino 67. 1
Circia 774
Circuri 103. 20
Ciris II. 431
Ciſerre 107. 1
Cisne 409
Citril 112. 16
Citrinella II. 412. 501
Citrincha II. 519
Citrinlein II. 501
Citronenfink II. 501
Citronvogel 415. 1090
Civiere 109. 4
Cla-cla 107. 2
Cladorinchus II. 724
Clanga 42

Cleri-

Clericus 340
Clignot II. 659
Cnipologus II. 640
Cnupio 107. 1
Cobilar 59. 17
Coccothrauftes II. 337. 354. 361. 382. 387. 391
Cochelirieu 105. 3
Cochelivier 105. 3
Cochepierne 109. 2
Cochevis II. 225
Cochicat 316
Cochitenacatl 46. 10
Cochlearius 946
Cocho 294
Cock 101. 1
Coco 1012
Cocoi 974
Cocotli 104. 34
Cocotzin 104. 34
Cocou 57. 1
Cocu 57. 1
Codatremula II. 640
Coddel Kauka 78. 1
Codinzinzola 114. 11
Codirosso 114. 34
Coelipeta II. 210
Coelmaes 116. 3
Cojover 872
Colca 67. 15
Colcuicuiltic II. 125
Colemouse 116. 7
Colenicui II. 125
Colgrave 337
Colherado 941
Colibri 645. f. 648. f. 660 f. 721
Colibri des grands bois 61. 15
Colibrit f. Calibri
Colibritchen 656. 664 ff.
Colin II. 125. 128
Coliou 334 ff.
Colius 633. 651. II. 334
Collheirinho 112. 106
Collotorto 58. 1
Collurio 193
Colma II. 295
Colnud 371
Colombade II. 664
Colubris 676
Columba II. 139 ff.
Columbae affinis 490
Columbarius 120
Colymbus 868 ff.
Combattant 1051
Commendeur 412 f.
Cónca de moru 117. 3
Condor 2
Condoro 2
Conquendle II. 434
Consigliere 114. 45
Contra II. 240
Cook-of-the Wood 103. 1
Coot 91. 2
Copped-Wreen 114. 48
Coq II. 47
Coq d'Inde II. 33
Coq de Bruyeres II. 85
Coq de bois 103. 1
Coq de Limoges 103. 1
Coq de roche II. 739
Coquillade II. 226
Coquu 57. 1
Coracias 386 f. 390. 409. 420
Corax 340
Coraya II. 293
Corbeau 348
Corbin 50. 2
Cormoran 858
Cornacchia 50. 3
Corneia 50. 3
Corneille 344
Conerote 43. 4
Cornice 50. 3
Cornillon 50. 6

Cornix 346. 349. f. 394. 410. 436. 538
Corn-crek 93. 1
Corone 340
Corossolo 114. 34
Corrira 1014
Corroya-barza 50. 5
Corta-pao 59. 2
Corusa 43. 7
Corvo 50. 2
Corvu ambidastru 84. 21
Corvus 336. ff. 440. II. 121
Corydalos 105. 9
Coscoroba 705
Cosquauthli 5
Costototl 411
Cotinga 187. ff. II. 328 f. 330
Cotta 1129
Cottonvogel II. 777
Cottorna II. 110
Coturnix 381
Coucou 467 ff.
Coucouat 57. 1
Coudiou 57. 1
Coulacissi 302
Coulassade 105. 9
Coulavan 407
Coulon 1057
Coulon-chaud 87. 4
Coureur 1014
Courier 1014
Courlew 115 ff.
Courly 1002. ff. 1015. ff. 1098
Courlis 86. 3
Couroucou 453
Coutrioux 105. 3
Coux 57. 1
Covaterra II. 812
Cowaldrossel II. 322
Crabedu 67. 34
Crabier 977 ff.
Cracker 67. 28
Cracra 84. 4
Crapaud-volant II. 810
Cravant 735
Crax II. 39. 41
Crecca 771
Creeper 618 ff.
Cresserelle 111
Crested-Lurk 105. 6
Creutzmeise II. 765
Creutz Tale 359
Creutzvogel II. 340
Creveckassis 116. 3
Crex 992. 1040. 1138
Cristatella 436
Croace 50. 3
Croguler 42. 31
Croque abeille 116. 3
Crossenobel II. 156
Croß-bill 109. 1
Crosse-queue 114. 11
Crotophaga 329. 332
Crot Pescherot 72. 3
Crouas 50. 3
Crow 50. 3 ff.
Cruciata II. 341
Crucifera II. 341
Cuadervic 103. 20
Cubugi 103. 12
Cucco 57. 1
Cuchillo 57. 1
Cucho 57. 1
Cuckow 57. 1
Cuco 57. 1
Cucu 57. 1
Cucula 50. 3
Cuculo 57. 1
Cuculo affinis 488
Cuculus 315. 464. ff. 517
Cucumiau 43. 12
Cugniada 105. 1
Cujelier II 216
Cuilliere 946
Cujovit II. 38
Cuiriri 205

Cuit

Cuit 396
Culbianco 87. 13
Cul-blanc 1069. II. 651 ff.
Culicilega II. 640
Culo-bianco II. 654
Cul-rosso 59. 17. — 114. 34
Cuntur 2
Cuorvo 50. 2
Cupido II. 100
Curasoe II. 41
Curassauer 681
Curasso II. 40. 43
Curculeus 112. 36
Cureu II. 281
Curiaca 1002
Curicaca 85. 1
Curiertaube II. 158
Curlew 86. 3
Curquichu 18
Cursorius 1083
Curuca 664. II. 616. 620
Curucui 453
Curvirostra II. 338
Curwillet 1092
Curwy 52
Cusbat 104. 19
Cuthberts-Ente 738
Cutrettola 114. 11
Cutrettola del petto nero 114. 11
Cutwater 78. 1
Cyanopus 96
Cybindus 109
Cygne 67. 1
Cygnus 694
Cynchramus II. 407
Cyprias 114. 10
Cyranca 67. 32
Cyranta 67. 33
Cyz 112. 25
Czapla 84. 12
Czarna wietka 116. 3
Czayka 87. 1
Czerwonyrzytek 114. 34
Czerwony-ogonok 114. 34
Czcetzew 103. 2
Cziesz 112. 25
Czir-wenka 114. 45

D.

Dabussaire 116. 29
Dachike 355
Dadi 45
Dadst 112. 29
Daffer 104. 1
Dagschlap II. 80
Daina 103. 4
Daker-Hen 93. 1
Dalvek 76. 8
Damascener-Rebhuhn II. 118
Dame 50. 13. — 116. 11
Damette 114. 11
Damier 838
Danbick II. 504
Dannenfink II. 484
Dasypus II. 148
Dattelsperling II. 509
Daube II. 143
Daunenspecht 528
Daw II. 281
y Ddreiniog 112. 25
Dea 588
Deffyt 1122
Demoiselle 423. — 116. 11
Dendrofalke 123
Derbnitschok 42. 23
Detela 59. 12
Deteu 59. 12
Deurvogel 945
Devi-Bitele 103. 1
Dhul 355
Diabolus 1129
Diademkranich 749
Dianenamsel II. 308
Dickfuss 1097
Dickkopf 751. 754. II. 744 f.

Dickſchnabel II. 337. ff. 343. 368. 372. 386. 389. 391. 503
Didus II. 19
Dieſtelfink 426. II. 394. 427. 444. 465. 475. 486 ff. 495 ff.
Dieſtelvogel II. 483. 489
Dig-Sulu 117. 4
Digſvale II. 794
Dikaja Pikaliza 1087
Dilaſkarfs 853
Dinde ſauvage 57. 1
Dindon II. 31. 37
Diomedea 839. 840 ff.
Diſtelvink 112. 7
Dittchen 1094
Dittertaube II. 151
Diuka II. 521
Dix-buit 87. 1
Dlaſk 114. 18
Dleſcbk 109. 2
Dobbelſchnepfe 1031
Dobbelt-Kramsfugl 107. 1
Dod-aarſ 97. 1
Dodo 97. 1
Doel 355
Dohle 333. 355. 433 f. 438 f.
Dohmpfaff II. 351
Dohnpaap II. 351
Dolken 1079
Dolmetſcher 1057
Domherr II. 350. 363. 387
Domberre 109. 4
Domicella 270
Dominikeule 176
Dominikfalk 130
Dominikanerdroſſel II. 318
Dominikanerente 779
Dominikanerkardinal II. 357
Dominikanerkernbeiſser II. 358
Dominikanerwittwe II. 441
Domino II. 364
Dom-Oxe 109. 3
Dompape 109. 4
Dompfaffe II. 347. 349. 37[illegible]
Domſchnepfe 1004
Doole 357
Doppan 75. 2
Doppelſchnepfe 1017. 1030. 1042
Doppelſporn II. 26. 120
Dopping 67. 25
Dorfſchwalbe II. 789
Dorfſperling II. 549
Dorling II. 606
Dorndrechsler 194
Dorndreher 193. II. 690
Dornflügel 1100
Dorngreuel 194. II. 690
Dornheher 194
Dornkönig II. 717
Dornreich 194. II. 622. 689. 744. 766
Dornträher 196
Dorntreter 194
Dorpfink II. 478
Dorr-Hawk 118. 1
Dos bleu 59. 1
Dotterel 1057
Doucker 889
Dove II. 140 ff.
Draaibals 58. 1
Drachwa II. 3
Draine 107. 1
Drake 783
Dreckkrämer 609
Dreckvogel 6
Drehhals 496
Drehvogel 497
Drepanis II. 794
Dreyhals 494
Dreyzee 542
Droſa 95. 1
Drongo 183
Dronte II. 19
Drop 95. 1

Drosch 107. 4
Droschel II. 263
Drossel 203. 407. 408. 413. 416. 423. 435. 439. II. 242. 248. ff. 329. 579. 683
Drossig 107. 4
Drosd 107. 2
Drozd 107. 4
Drozd-mniyssy 107. 3
Drozd srzedny 107. 2
Δρυοκολαπτης 504
Dsegguse 57. 1
Dsennis 59. 17
Dservis 50. 5
Dserwe 84. 4
Dsnerdk II. 108
Dsese 84. 7
Dubbellerche II. 233
Duc 43. 1 ff.
Düchelein 887
Duchentlein 887
Duchiphath 64. 1
Duck 140. 712. ff. 766
Duckchen 889
Ducker 889
Ducquet 43. 4
Dudak II. 3
Dudek 64. 1
Dudu II. 19
Dufwa 104. 1
Dugo 43. 1
Dukiphat 103. 1
Dullerche II. 215
Dummherr II. 350
Dumpis 84. 21
Dun-Diver 68. 1
Dunlin 1036
Dünnbein 1099
Duppelschnepfe 1031
Duratschok II. 359
Dur bec II. 348. — 109. 2
Durstel II. 263
Dütchen 1056
Düte 1094
Dyal 53. 6
Dyker 757
Dykere 765
Dykker 884
Dymludj 329
Dzieciot 59. 1
Dzieciot-modrawy 59 1
Dziećlot-murowy 65. 2
Dzieki Kur 103. 2
Dzierlatka II. 226
Dzierlatka czubata 105. 6
Dzwoniek 109. 27

E.

Eachem 57. 1
Eardove II. 194
Eatoas 50. 2
Ebelvogel II. 19
Ebeher 958
Ebiger 958
Ebourgeonneux II. 352. — 109. 2. 4. — 112. 4
Echasse 1099
Echelette 65. 2
Ecossonneux 109. 4
Ecousse 42. 12
Ecrecelle 42. 16
Edder 738
Edeldame 230
Edelfalke 79
Ederfugl 67. 15
Edolio 471
Eee-eve 65. 29
Eelweck 107. 22
Een-Maes 116. 3
Effraye 43. 8
Egde 546
Egerste 374
Egester 374
Eggenschär 1139
Egmor 76. 7
Egretta 974
Ehrglis 42. 2

Eichelheher 360
Eichelkrähe 361
Eichelrabe 361
Eichvogel 77
Eider 377
Eiderblicke 67. 15
Eiderduck 67. 15
Eidergans 736
Eiderente 738
Eidervogel 737
Einſiedler 387. II. 20. 712
Einſiedler-Droſſel II. 311
Eisammer II. 404
Eisente 766. 809
Eiskiebitz 1065
Eismöwe 834
Eisſtrandläufer 1064
Eisſturmvogel 835. 837
Eisente 755. 761. 766
Eisvogel 369
Eisvogel 569
Elaeathorax II. 431
Elatototl II. 706
Elb 697
Elbs 67. 1
Elbſch 696
Elg 87. 3
Elk 67. 1
Elle-Kongens Datter 114. 11
Elle-Krage 392
Elo 42. 39
Elſter 189. 317. 373. f. 417. 439. II. 242
Elſteralk 818
Elſterentchen 809
Elſterrabe 531. 533
Elſterſtaar II. 241
Elſtertoukan 318
Elve-Kald II. 244
Elve-Konge 106. 5
Ema 96. 1
Embar 75. 4
Ember 882
Embergans 882
Emberiza II. 390. 398. ff. 475
Embritz II. 413
Emerillon 127 f.
Eme II. 15
Emeu II. 15
Emmeritze II. 406
Emmering II. 413
Emmerling II. 400. 412
Emmerlingsvogel II. 419
Emoucbet 42. 31
Endrach 740
Engang 46. 3
Englerche II. 213
Engoulevert 118. 1
Engouane-paſtre 114. 11
Ente 694. ff. 708. 711. ff. 736. 738. 782. 785. 802
Entenadler 42. 57
Entengeyer 71
Entenrothkehlchen 779
Entenſtöſser 43. 57
Enter 783
Entita 116. 8
Entrich 783
Entvogel 783
Enucleator II. 346
Epeicbe 59. 17
Epervier 107
Epiſcopus II. 468
Epops 608
Εποψ 612
Epouvantail 930
Eques II. 162
Erdbull 984
Erdfink II. 540
Erdgans 709
Erdgeyer 11
Erdgürtelmeve
Erdſchwalbe II. 793
Eremit 387
Eremita 386. II. 311
Eremitrabe 387

Erithacus II. 698. 714
Erizchen II. 693
Erizkins 114. 34
Erle II. 638
Erlenfink II. 516
Erooro 61. 28
Erpel 783
Erua 84. 4
Erythra 1123
Erythrocyanos 223
Erythroxantos 225
Erztaucher 892
Eſarokiſtok 75. 6
Eſaruktorſoak 42. 39
Eſclave 50. 2
Eſcorbeau 50. 2
Eſelſchreyer 845
Eſquimeauxbrachvogel 1016
Eſquimeauxſchnepfe 1016
Eſtorino 106. 1
Eſtournat 106. 1
Eſtourneau II. 239
Eſüngak 76. 10
Ete 289
Etourneau II. 237
Etubirga 69. 10
Eule 138 ff.
Eutretola 114. 11
Eveque II. 468
Excubitor 189
Eyder-Gans 736
Eyſengartt 568. 570
Eys-Endte 811
Eyſsvogel 570
Eyvogel 919

F.

Fächerſchwanz II. 362
Fädemlein II. 502
Fagerfis II. 726
Fager-Gaas 67. 4
Fagergans 709
Fagergiäs 710
Fagiano 101. 3
Faiſan 1155. II. 36. — 103. 1
Faiſanne 101. 3
Faiſante 101. 3
Faiſanneau 101. 3
Faiſanteau 101. 3
Faiſe 101. 3
Faiſeau 101. 3
Falcata 1004
Falcinellus 631. 639. 644. 650. 662. 665. 674. 1003. II. 742
Falco 17
Falcone 42. 13
Falconello 44. 12
Falconellus 127
Falcula II. 794
Falk 42. 30. ff. 17. 30 ff.
Falkeneule 173. 174
Falkenſperling II. 616
Falkmöve 905
Falkonirer-Schmierlein 128
Falſope II. 213
Fallow Smith 114. 15
Farlouſanne II. 217
Farlouſe II. 212
Farluzzanne II. 217
Farzer 1154
Faſan II. 27. 36. ff. 45. ff. 65. 66. 100
Faſanenbaſtard II. 70
Faſanenente 762
Faſanenvogel II. 67
Faſanenputer II. 71
Faſarella 95. 3
Faſtenſchlier 1017. 1094
Faucon 73 ff.
Fauvette II. 615. 619. 623. 625. ff. 662
Fauvette d'hiver 114. 3
Fauvette des haies 114. 3
Fauvette des roſeaux 114. 8
Fauvette à tete noire 114. 18
Fazant 101. 3

Fazyan 101. 3
Federfaſan II. 84
Federfuſs 682
Federkappe 791
Fedoa 1036. 1039
Feigeneſſer II. 268. 631. 665 ff.
Feigenfreſſer II. 612. ff. 680. ff. 709. ff. 728. 759
Feigenvogel II. 613 ff.
Felddieb II. 536. 548
Feldengel II. 106
Feldflüchter II. 143. 146
Feldhuhn II. 111. 113
Feldkrähe 345. 348
Feldläufer 1093
Feldlerche II. 207. 214. 218
Feldmäher 1018
Feldnachtigall II. 619
Feldpfau 1053
Feldſpatz II. 554
Feldſperling II. 509. 553
Feldtaube II. 139. 146
Feldwächter 1139
Feliceps 143
Felſenhahn II. 739
Felſenhuhn II. 100
Felſenlerche II. 632
Felſenrebhuhn II. 119
Felſenſchwalbe II. 787. 795
Felſentaube II. 146. 175
Felveck 107. 22
Fenicottero 79. 1
Felstaube II. 146
Fenerotet 114. 49
Fenſterſchwalbe II. 782. 789
Fern-Owl 118. 1
Feroë-Kriechente 766
Feſtvogel 291
Fettammer II. 408. 467
Fettgans 817. 825 ff.
Fettling II. 669
Feuchtarſch 853
Feuerfink II. 498
Feuerrabe 348. 385
Feuerſchwalbe II. 782
Fia-Fia 107. 1
Fiälſter 110. 1
Fjäreplit 1072
Fiärt 69. 3
Ficedula II. 576. 605. ff. 631. 713
Fichtenammer II. 425
Fichtendickſchnabel II. 346
Fichtenfink II. 556
Fichtenhacker II. 343. 346
Fichtenſänger 640
Fieldfare 107. 2
Field-Duck 95. 3
Field-Lark II. 214
Field-Rype 103. 4
Field-Troſt 107. 2
Fier-Pliſter 87. 3
Fierre-Mous 1072
Figogatka 114. 10. 18
Figuier II. 268. 612. ff. 647. 665. ff. 670. ff. 677. ff. 709. f. 728. ff. 759
Filippa 89. 1
Filomele 114. 18
Finet II. 530
Fingah 183
Fink 426. 437. II. 359. 372. 383. 390. 423. 441. 444. 454. 458. 465. 474. ff. 539. 560
Finkenbeiſser 193
Finkenfalke 116
Finkenhabicht 116
Finkenpapagey 277
Finkenſperber 116
Finkenwürgvogel 198
Finkmeiſe II. 755. 759
Fiöre 87. 3
Fior-Rancio 114. 48
Fiſchaar 57. 60. 72
Fiſchadler 22. f. 29. 31. 43. 56

Fischahr 57. 319
Fischer 315. 901. 923. 926
Fischerfalk 59. 114
Fischfresser 316
Fischermeve 898. 905
Fischgeyer 22. 67. 72
Fischjäger 907
Fischmeise 923
Fischerlein 927
Fischhabicht 56. 58
Fischmeve 901. 900. 923. 927
Fischtreiber 806
Fischreiger 971
Fischreiher 970
Fischhäher 971
Fischweihe 60
Fisi 114. 49
Fisk-Aender 804
Fiske-Gjoe 58
Fiske-Heyer 84. 12
Fiske-Oernen 24
Fiskeren 856
Fisk-Litta 87. 8
Fisk ljusen 42. 9
Fisk-Mäse 76. 3
Fisktius 42. 26
Fist II. 642
Fisterlein 1073
Fitert II. 711
Fitis II. 725
Flabellifera II. 362
Flachsfink II. 525. 528. 529
Flagspette 535
Fläk-Spärre 59. 18
Flamant 934
Flambant 934
Flamenco 79. 1
Flamengo II. 391
Flaminger 934
Flamingo 934
Flammenreiger 935
Flammenreiher 935
Flammenvogel 934
Flaue-Flit 75. 8
Fleischervogel II. 330
Fleckkehlein II. 696
Fliegenente 712. 748
Fliegenfänger 560 II. 455. ff. 564. ff. 594. 659. 688. 710. 732
Fliegenkolibri 692
Fliegenschnäpper 411. 560. 636. II. 564. ff. 575. 631. 647. 653. 656. 665. 749
Fliegenstecher 203. II. 455. 567. 572. 578. 615. 657. 709. 731
Fliegenvogel 664. ff. 678. ff. 685. 687. 690. II. 577. 657
Florentinermeise II. 778
Florus II. 733
Flöytetyten 1079
Flüelerche II. 639
Flügelfleck II. 669
Flugtaube II. 143
Flussadler 56
Flussteufelchen 1129
Flusterers 91. 2
Fluteur 109. 4
Fluteux 105. 3
Flycatcher II. 580 ff.
Focke 965
Foet 75. 7
Forkeert-Regn-Spove 89. 1
Formicivorus II. 297
Formique 63. 2
Fornarola 114. 15
Forstue Svale II. 783
Forte pintacilgo 112. 7
Forzana 93. 2
Fosse-Fald 106. 5
Fosse-Kald 106. 5
Fottivento 42. 16
Fou 861
Fou de Bassan 72. 5
Foudi-jala II. 614

Foudis II. 356
Fouillet 114. 49
Foulque 1128
Fourreau 116. 11
Francolin II. 99. 109
Francoline blanche 103. 4
Franquelle iwernengk 109. 4
Franquet 109. 2
Franzente 772
Franziskaner II. 396
Frater Gavino 114. 45
Fratino 116. 5
Fratzenvogel 322
Fräulein von Numidien 951
Fregatta 835
Fregatte 850
Fregatvogel 851
Frelot 114. 49
Fremdling 81. 841
Fremdlingsfalke 81
Fresaye 43. 8
Fresfeke 795
Fretillet 114. 49
Fringilla 426. 437. II. 327. 374. 390. 427. 434. 444. 454. 465. 474. ff. 633
Fringillae affinis II. 330
Fringuillago II. 757
Fringuello 112. 3
Friquet II. 536
Frisone 109. 2
Froschgeyer 69
Froschgeyerl 70
Frosone 109. 2
Frühlingsbachstelze II. 645
Frühlingspapagey 313
Frühlingsstieherling II. 644
Fuchseule 148
Fuchsgans 708
Fugle-Konge II. 722
Fuit 114. 49
Fulaga 91. 2
Fulebajub 65. 39
Fulica 1115. f. 1136
Fullo II. 326
Fulmar 834
Fünffleck II. 330
Funingo II. 179
Funingo maitsu II. 179
Furfuragiu 112. 36
Fürstenschnepfe 1031
Fuselier 502
Füüt 75. 7

G.

Gaalammer II. 413
Gaas 721
Gaaseörn 32
Gaussiou 86. 4
Gabelgeyer 49
Gabelschwanz 835. II. 456. 567
Gabilan 84. 4
Gachet 925
Gacke 355
Gaddevieruſch 1072
Gadelbuſch 764
Gadiſſe 765
Gadrille II. 715
Gaffaru 112. 16
Gänseaar 113
Gänseadler 24. 31. 42
Gänsehabicht 76
Gänsehirt 609
Gänsesägetaucher 802
Gaey 50. 6
Gagl 734
Gabrnis 84. 12
Guigula 68
Gairo 76. 6
Gaiske 76. 3
Gaity 50. 7
Gakatte 75. 3
Gakkor 75. 3
Galander II. 230
Galbero 52. 1
Galbula 402. 590

Galerand 84. 21
Galerita II. 326
Galleto del bosco 108. 1
Galgenregel 31
Galgenvogel 337
Galgulus 390. 399
Galka 50. 6
Galla-Mareza 93. 2
Gallina II. 43. ff. 48. ff. 80. 105
Gallina pratajula 95. 3
Gallina di Numidia 103. 1
Gallina bianca 103. 4
Gallinae II. 1 ff.
Gallinacbe 41. 5
Gallinago 1030
Gallinazo 7
Gallinula 1037. 1070. 1118. 1123. 1145
Gallo 101. 1
Gallocedrone 103. 1
Gallo d'India 98. 1
Gallopavo II. 30. 42
Gallus II. 44. 46. ff. 80. 740
Galskregl 392
Gambetta 1056
Gambettola 87. 13
Gambettstrandvogel 1056
Gambiakernbeisser II. 382
Gamsengeyer 24
Ganga II. 106
Ganner 803
Gannet 860
Gans 703. 718. 711. 780. 827. 871. 995
Ganss 725
Ganso 67. 9
Garatauk 107. 1
Garbella 50. 2
Garbenkrähe 391
Gardena 107. 2
Garde-cbarrue 114. 10
Garga 50. 10
Garganey 67. 32. — 68. 1
Gargoas 886
Gargia 84. 21
Garinello 42. 16
Garnis 84. 12
Garrot 754
Garrula 390
Garrulus 392. II. 323
Garsotte 67. 32
Gartenammer II. 408
Gartenfink II. 477
Gartengrasmücke II. 625
Gartenlerche II. 213
Gartenröthling II. 697. 700
Gartenrothschwänzlein II. 693. 699
Gartenschwarzkehlchen II. 696
Gärtner II. 435
Garza 969
Garzetta 973
Gase-Oern 42. 4
Gasuel 96. 2
Gattair 795
Gau 101. 1
Gauckler 950
Gaugazza 116. 11
Gaul 734
Gaulammer II. 415.
Gaura 68. 1
Gautereau 50. 7
Gavia 907. 1079. 1084. 1088. 1094
Gavi-gavi 87. 1
Gavotte II. 438
Gawron 50. 2
Gay 50. 7
Gayo 50. 6
Gaza 44. 12
Gaza verla 50. 7
Gazola 84. 21
Gazza 50. 13
Gazzara 50. 13
Gazzuola 50. 13

Geai de bataille 109. 1
Geau 101. 1
Geay 361. 383
Gebirgſperling II. 554
Gebürggans 727
Gebüſchfalke 189
Gedemalker 118. 1
Geeka 57. 1
Geelbeinlein 1123
Geelfüſsel 1123
Geelgerſt II. 413
Gegler II. 482
Geier ſ. Geyer
Geirfugl 68. 1.—69. 4
Geiskopfsſchnepfe 1045
Geismelker II. 810
Geiſt 385
Geisvogel 1017. 1053
Gelbbein 1025
Gelbbeinlein 1123
Gelbbruſt 1122. II. 623
Gelbbrüſtchen II. 268. 657
Gelbbrüſtel 642
Gelbbuſch II. 742
Gelbfink II. 515
Gelbflügel 424. II. 666
Gelbgans II. 412
Gelbhals II. 424. 636
Gelbkehlchen II. 268. 634. 657
Gelbkopf 425. 977. II. 371. 379. 643. 678. 729
Gelbling II. 413. 433
Gelbnaſe 1046
Gelbſchnabel 23. 44. 106. 564. 089. 523
Gelbſchopf II. 742
Gelbſchupps 793. II. 742
Gelbſchwanz II. 675. 731
Gelbſchwarzkehlein II. 661
Gelbſpecht 513
Gelbſteiſs 423 II. 769
Gelbvogel 401. 415
Gelinote II. 94. 98. ff. 104
Gelinote blanche 103. 4
Gelsregel 391
Gelve 84. 21
Gemſenadler 23
Gentarubia 79. 1
Gentelmann 861
Gerabib 50. 2
Γεϱανος 355
Gereuthlerche II. 215. 218. 222
Gerfalke 100
Gerfault 101
Gerſchwalbe II. 797
Gerſtammer II. 405
Gerſtendieb II. 536. 548
Gerſtenfink II. 365
Gerſtenfreſſer II. 365
Gerſthammer II. 407
Gerſtling II. 407
Gerſtvogel II. 407
Gertraudsvogel 217
Gerzab 84. 4
Ges 67. 9
Geſangdroſſel II. 263. 269. 313
Geſanggrasmücke II. 615
Geſangkolibri 637. 639. 646
Geſanglerche II. 208
Geſangſchwalbe II. 805
Geſangſperling II. 419
Geſtettenſchlager II. 657
Geſtettenſchwalbe II. 794
Geta 50. 7
Gewittervogel 1017. 1021
Geyer 1. ff. 55. 59. 104
Geyeradler II. 12. 18
Geyereule 173 f.
Geyerfalke 13. 95. 99
Geyerkönig 4
Geyerle 104
Geyerpapagey 295
Geyerſchwalbe II. 797
Gheppio 42. 16
Ghiandaia 50. 6

Gbiovaro 63. 1
Giaddina d'eva 91. 4
Giaddina di campa 95. 3
Giarola 87. 13. II. 215
Gibitz 1053
Gibraltarſchwalbe II. 803
Gickerlein II. 219
Giebelſchwalbe II. 782. 789
Gieker II. 350
Gielavaelgo 107. 23
Gierd - Smutte 114. 46
Gierfalk 99
Giertruds - fugl 218
Gil 114. 45
Gilberſchen II. 413
Gilbling II. 413
Gilghero II. 521
Gillit II. 594
Gilloniere 107. 1
Giloch 1017
Gimpel II. 350. 362. 369. 370. 389. 391. 393
Gimpereau 548
Gimpl 109. 4
Gingi - Droſſel II. 322
Gintel II. 533
Giög - Kukert 57. 1
Giök 57. 1
Gjöktita 58. 1
Girandello 86. 4
Girardel 86. 10
Girau 50. 7
Girardin 93. 3
Giraweckz 107. 3
Girlitz II. 502
Giron 103. 4
Girrmeve 928
Giu 43. 22
Gixerlein II. 259
Glada 42. 12
Glandarius 360
Glanzdroſſel II. 281
Glareola 1039. f. 1051. 1068. 1071. 1077. 1111. ff. 1123. 1144
Glariana II. 220
Glattkehle II. 121
Glaucion 757
Glaucius 758
Glaucopis 28. 335
Glaumet 112. 3
Glead 42. 12
Glente 42. 12
Glib 90. 1
Glitter 926
Glockenſpieler II. 294
Glöckner II. 294
Glottis 1037. 1124
Glowienka 67. 6
Gluch - jemiolucha 107. 2
Gluckente 759
Glücksvogel 219
Gluglu II. 148
Gluth 1097
Glutt 1037. 1124
Glutthahn 1124
Γναφαλος II. 327
Gnauts 884
Gneyſer II. 156
Goatſucker II. 810 ff.
Gobe - mouche 560. ff. II. 455. 564. ff. 577. 581. ff.
Gobryvogel II. 364
Godwall 67. 20
Gog 101. 1
Gogl 734
Goifugl 69. 3
Goiland 905
Goiran 42. 15
Goiſar 1017. 1018
Goiſſer 1004
Gol 101. 1
Golab 104. 1
Goldadler 31. 33. 38
Goldammer II. 371. 403. 412. 424. 475

Gold-

Goldammering II. 415
Goldämmerchen II. 722
Goldamſel 403. II. 287
Goldäuglein 754
Golden - creſted Wren 114. 48
Golden - Eye 67. 23
Golddroſſel 403. 418. 430. II. 282
Goldfaſan II. 72
Goldfink II. 350. 485. 488. 489. 515
Goldflügel 516. II. 666
Goldfuſs 116. 119
Goldgeyer 15. 20
Goldhahn II. 73
Goldhähnchen II. 720
Goldhänlein II. 721
Goldhannel II. 723
Goldhendlein II. 721
Goldkehle 450. 676. 595
Goldkopf II. 379. 683. 744
Goldkrähe 391
Goldkrone II. 670
Goldmeiſe II. 457
Goldmerle 403. II. 457
Goldpapagey 256
Goldrabe 337
Goldregenpfeifer 1094
Goldſpecht 516
Goldvogel 590
Goldvögelein II. 722
Golkrabe 337
Golob 104. 1
Gomphön II. 52
Gonambuch - Ammer II. 447
Gonolock 205
Gooſander 68. 1
Gooſe 67. 9
Gorfou 829
Gorge - bleue II. 703 f.
Gorge - rouge II. 715
Gornajä - Owſjänka II. 556
Gorſe II. 413
Görtan 526
Goshawk 77
Gottesvogel 468
Göttin 588
Gouk 57. 1
Gouſtarde 95. 1
Gowry II. 365
Graab el Sahara 385
Graae - Troſt 107. 2
Graa - Gaas 67. 9
Graairiſk II. 616
Graa - Irriſk 114. 3
Graake 50. 6
Graa - Meiſe II. 767
Graa - Nakke 76. 3
Graa - Spurv 112. 36
Graaſiſken II. 530
Grabeule 161
Grabetz 112. 36
Grabuluſk 50. 10
Graccbio 50. 3
Gracula 433. 439. II. 468
Graculus 384. 855. 861
Graeſiſka 112. 29
Graes - Smutte 114. 6
Graio 50. 6
Gräker II. 482
Gralla 50. 7
Grallae 934 ff.
Granafur 76. 7
Granatvogel II. 496
Grandoule II. 107
Graſel II. 531
Graſemücke II. 621. ſ. Grasmücke
Graſemunke II. 621
Graſemüſche II. 622
Grasfink II. 542
Grashuhu 1144
Grashüpfer II. 222
Grasläufer 1139
Gräslein II. 529. 531

Grasmücke 411. II. 285. 566. 575. 578. 612. 615. 619. 620. ff. 625. 632. 647. 651. 661. 664. 687. 708. 725. f. 748. 778
Grasmügg II. 621
Grasrätscher 1139
Grassa 50. 13
Grasschnepfe 1031
Grasset 114. 3
Gräsmutte II. 621
Grasspatz II. 662
Grasspecht 521. 535
Grasvogel II. 542
Gratte-paille 114. 3
Grauammer II. 405
Grauentchen 772
Graufink II. 515. 535
Grauhänfling II. 525
Graukehlchen II. 669
Graukehlein II. 699
Graukopf 111. 527. II. 673
Graula 50. 3
Grauling II. 648
Graulo 61. 1
Graumeise II. 766
Graumeve 901. 905
Grauspecht 497. 544. ff. 756
Grav-Drage 67. 4
Grav-Gaas 67. 4
Graw-Entlein 772
Graw-Eule 162
Graw-Meißlin II. 768
Gray 67. 20
Graye 50. 4
Grebe 884 ff.
Greenfinch II. 373
Greenshank 1037
Greesa 103. 20
Greif 2. 9. 10
Greiff 2. 21
Greifgeyer 2. 21
Greillat 50. 3
Greille 50. 3
Greinerlin II. 220
Greis 824
Grenadier 505. II. 390
Grenadin II. 497
Greac 883
Griegelelster 189
Griel 1097
Grieltrappe II. 6
Grienvögelein II. 219
Griesshennl 1085
Gri Gri 128
Grilitsch 112. 17
Grillenlerche II. 235
Grillvogel 1084 1091. 1094
Grillenlerche II. 734
Grimmer 20. 49
Grimpant 59. 1
Grimparel 59. 1
Grimpereau 626 ff. 640 ff. 646
Grindling 109. 27
Grinson II. 480
Grinzling II. 374
Grisette II. 227
Grisin II 648
Grisone 109. 2
Grißla 75. 1
Griunik 104. 19
Grive 1060 II. 250. ff. 256. 270. 298
Grive de brou 107. 1
Grive provençale 107. 1
Grive montamarde 107. 3
Grive des Ardennoises 107. 3
Grive de vendage 107. 3
Grive champenoise 107. 3
Grivette 107. 3. 4
Grolle 50. 3 f.
Gronsiska 112. 16
Grönspett 523. 527
Grönspik 59. 12
Grönqjoling 59. 12
Gröönling II. 373

Gröönſchwanz II. 373
Gros-beak II. 344 ff.
Gros-bec II. 344 ff.
Grospillerie 112. 36
Gros-pinçon 109. 2
Gröſsel 1139
Groſs-Ente 786
Groſſe-tête 109. 2
Groſſe-tete noire 109. 4
Groſsfalk 95
Groſskopf 321
Groſsmeiſe II. 756
Groſsherzog 139
Groſsmaul 457
Groſsſchnäblerfalk 123
Groſsſchnäblerpapagey 277
Groſsziemer II. 253
Gros-Yeux II. 7
Grotto 72. 1
Groulard 109. 4. II. 661
Grous II. 90. 94. 99. ff. 106
Gru 84. 4
Grua 84. 4
Grue 951
Grulla 84. 4
Grün, das vergoldete 682
Grünbein 1037. 168
Grünfink II. 371. 445. 458. 503. 558
Grünfuſs 1117
Grünfüſsel 1068
Grünitz II. 338
Grünkehlchen 639
Grünkrähe 391
Grünling II. 292. 368. 371. 469. 510
Grünlingsblauſpecht 554
Grünrücken II. 182
Grünſchling II. 414
Grünſchnabel 993
Grünſchnäbler 1097
Grünſchwanz II. 372
Grünſpecht 521. ff. 617
Grünſperling 555. 558
Grünvogel II. 370
Grünzling II. 374. 408
Grüper 617
Grus 949. 959
Gruy 86. 3
Gruz 84. 4
Grygallus II. 93
Gry-gry 128
Grylle 871
Grylle 88. 1
Gryllenrenna 59. 17
Gryllfingroes 109. 1
Gryllivora II. 284. 319
Grylltaucher 871
Gryphus 2
Grytan 86. 3
Grzebielucha 117. 4
Grzywacz 104. 19
Guacbicbil 66
Guacu-guacu 900
Guainumbi 670. 672. f. 681 ff.
Gualbedro 52. 1
Guan II. 37
Guara 1010
Guaracyaba 66. 12
Guarocygaba 66. 12
Guarabe 239
Guarauna 1015
Guas à Sierri Paneuryn 112. 7
Guava-Fliegenfänger II. 587
Guckaug 466
Guckerlein II. 218
Guckgu 466
Guckguck 466
Guckufer 466
Gudunge 67. 15
Guépier 598
Guereira II. 331
Gueule de four 116. 11
Gufo 43. 4
Gugauh 466
Gugelfahraus 403. 405

Gugel-

Gugelfihaus 405
Güger II. 351
Gugug 466
Guianumbi 66
Guiſſo-Balito II. 395
Guignard 1090
Guignette 1073
Guillemot 870 ff.
Guillerie 112. 36
Guinea-Hen 103. 1
Guira II. 701
Guira-Acangatara 57. 32
Guiraba 239
Guiraberaba II. 702
Guiracoereba 651
Guiraguacuberaba II. 702
Guiraienoia II. 465
Guira-Guianumbi 321
Guiranheemgatu II 420
Guiraru-Nhengeta 44. 7
Guirapanpa II. 332 f.
Guira-Tangeima 409
Guiranhemgeta II. 457
Guiraperea II. 467
Guiratinga 974
Guira-tirica II. 357
Guirnegat II. 420
Guit-guit 631. ff. 636. 650
Gukker 466
Gulaundente 729
Gulbis 67. 1
Guldenbead 69. 4
Gulfötting 76. 7
Gulin 53. 2
Gull 849
Gulo 845
Gulſpink II. 645
Gulſpurv 110. 5
Gulvesling 110. 5
Gumbert II. 52
Gümpel II. 350
Guorga 971
Guraundi II. 457
Gurgelhahn II. 84
Gurſe II. 413
Guſgaſtak 1019
Güsvogel 1021
Güthvogel 1017
Gutmerle 403
Guulbek 42. 13
Gvignot 112. 3
Gybitz 1055
Gyfitz 1053. 1055. 1079
Gylſinbratf 109. 1
Gympel II. 350
Gyntel II. 533
Gyratrix II. 155
Gyrfalco 99. 101
Gyrfalk 99
Gyrtan-maly 86
Gysfugl 43. 6
Gywitt 1055
Gzegzolka 57. 1

H.

Haalla 67. 30
Haan 101. 1
Haarbull 1035
Haarſchnepfe 1034. 1073
Haavella 765
Habereau 124
Haberlämmchen 1031
Habeſch II. 559
Habich 77
Habicht 40. 55. 61. 76. 104. 115. 116. 129. 130
Habichtseule 172 ff.
Hacht 77
Hackeſpett 503
Hacotidinen 112. 28
Haddae 48
Hädjal II. 116
Haeger 84. 12
Haematopus 1108
Haf-Meve 898. 908
Hafs-Orn 42. 39
Hafs-Tjäder 72. 3
Hafstrut 76. 6
Haf Sula 861

Hag-Amſel II. 320
Hagedaſh 1014
Hagelgans 706. 1126
Hagent 786
Häger 361
Hagur 84. 4
Habaſeu 50. 2
Hahle II. 350
Hahn 46
— indianiſcher II. 41
Hahnentaube II. 184
Haidenpfeifer 1093
Hakik 70. 1
Hakkardaja 75. 4
Hakke-Spaet 59. 1
Halbe Mond II. 233
Halbente 756. 868. ff. 877. 880
Halbhuhn II. 57
Halbmeve 928
Halbmondfink II. 510
Halbſchnabel 528
Halbſchnepfe 1034
Halbtrauer II. 773
Halcon 42. 13
Halcyon 570
Halebrand 67. 32
Half-Schnepf 86. 8
Haliaetus 56
Halkion 69. 5
Halrääſ 107. 2
Halsbaandet-Lom 75. 5
Halsbinde 667. II. 229
Halsdreher 497
Halskrauſentaube II. 153
Halskraved-Dykker 75. 7
Halsvogel 391
Halswinder 496
Halvkroppert II. 160
Hämmerling II. 415
Hämpfling II. 527
Hamp-Meis 116. 8
Hane II. 48
Hänefferl II. 527
Hanffinke II. 527
Hänfling II. 371. 373. 426. 439. 522. ff. 528. 534. f. 613. 744 ff.
Hanfmeiſe II. 767
Hangneſtkernbeiſser II. 385
Hangvogel 301
Hanik 766
Hanikens 85. 3
Hannaquaw II. 65
Hannekin 50. 6
Hännelinne 114. 11
Hardvärsfogel 110. 1
Ha-Old 67. 30
Hare-fod 103. 4
Harekenblatt 1031
Harfäng 43. 6
Harfugl 63. 1
Harle 802
Harlekin 280. 775
Harlekinsgrasmücke II. 678
Harlekinſpecht 536
Harpax 44. 12
Harpunirer 538
Harpunreiber 1002
Harpyia 18
Harrakas 50. 13
Hartſchnabel II. 347
Har-Ugglan 43. 7 f.
Haſelhuhn 1036. 1045. II. 88. 95. 98. f. 103. 109
Haſelwildpret II. 103
Haſenaar 31
Haſenadler 26. 31
Haſenfuſs II. 96
Haſengeyer 13 f.
Haſenſtöſser 14
Haſkel 76. 10
Häſter 374
Hatſchen 783
Hatzler 361
Hätzler 361
Hauaar 49
Haubellerche II. 225
Haubelmeiſe II. 753

Hauben-

Haubenadler 25
Haubenalk 821
Haubenblutfink II. 354
Haubendrossel II. 324
Haubeneisvogel 576
Haubenente 791. f. 795
Haubenfalk 97
Haubenfink II. 354
Haubengeyer 25
Haubenheher 364
Haubenhuhn II. 49
Haubenkernbeisser II. 359
Haubenkolibri 661. 687. 690 ff.
Haubenkönig II. 720
Haubenkormoran 857
Haubenlerche II. 223. 226
Haubenmeise II. 752
Haubenmerle 436. II. 470
Haubenpapageytaucher 821
Haubenspecht 505. 507 ff.
Haubensteissfuss 883
Haubentaube II. 150
Haubentaucher 883
Haubenzeisig II. 741
Haugelerke II. 223
Hausammer II. 433
Hausämmerling II. 432
Hausdieb II. 548
Hauselster 735
Hausente 782
Hauseule 178
Hausgans 725
Haushahn II. 46
Hauskade II. 663
Hauskrähe 344
Hausröthele II. 693. 713
Hausrötelein II. 693
Hausröthling II. 692
Hausrothschwänzlein II. 692
Hausrothschwänzchen II. 697
Hausrothschweiffl II. 697
Hausschmätzer II. 600
Hausspar II. 548
Hausspatz II. 550
Haussperling II. 547
Hausschwalbe II. 782. 789
Haustaube II. 143
Hausteufel 1050
Haurgrive 107. 1
Hav-Aare 713
Hav-Aelder 765
Havdirdell 69. 5
Havelda 67. 30
Havelerke II. 223
Havellaea 765
Havgasse 880
Hav-Hest 70. 3
Hav-Hymber 75. 5
Hav-Immer 75. 6
Hav-Maase 76. 6
Hav-Old 67. 30
Hav-Orre 67. 5
Havre-Fugl 114. 11
Hav-Simmer 67. 4
Hav-Skade 114. 18
Hav-Skiärn 884
Hav-Skiärre 75. 7
Hav-Sula 861
Hawfinch 109. 2
Hawk 43. 4 ff.
Hawks-Eye 88. 6
Hawram 50. 2
Hayduk II. 666
Hazel-Grous 103. 9
Heatototl 802
Heckenammer II. 432
Heckenschmatzer II. 620. 689
Heckenspringer II. 689
Heckenvogel II. 689
Heckenwenzel II. 619
Heckenwittwe II. 619
Heckschnärre II. 639. 39
Hedge-Sparrow 114. 3
Hedge-Warbler 114. 3
Heedelerke II. 216
Heelkroppert II. 160
Heelspove 1019
Heerdschnepfe 1031

Heergans 970
Heerholz 361
Heerſchnepfe 1030
Heervogel 609
Hegre 971
Heher 334. 360. 374. 383. 409
Heidedroſſel II. 259
Heidehuhn 1050
Heidelhahn II. 89
Heidenelſter 391
Heidlerche II. 208. 213. 215. 222. 225. 226
Heidenmeiſe II. 753
Heideziemer II. 259
Heiduckenadler 18
Heiloe 1093
Heilomer 1092
Heire 84. 12
Heiſter 374
Heiſterſchnepfe 1110
Hekatſchitſchir 69. 9
Helegug 69. 4
Helias 991
Helkregel 391
Helmtaube II. 156
Helmvogel 328
Helſing 731
Hemperling II. 526
Henſling II. 527 f.
Hennotter 958
Herbſtente 779
Herbſtpapagey 293
Herfugl 611
Heringsmeve 908
Herold 361
Heron 950. 967. ff. 970 ff.
Herrenſchnepfe 1031
Herrenvogel 360
Heſſe 374
Heteropus 8
Hetz 376
Hetzle 360
Hetzler 361
Heubellerche II. 225
Heubelmeiſe II. 754
Heumäher 595
Heuſchreckenvogel II. 283
Heuvogel 595
Hevro-taire 63. 29
Hewbole 59. 12
Hexe II. 809
Heydelerche II. 225. ſ. Heidelerche
Heydemeiſslein II. 753
Heyer 360
Heyle 1093
Heyloe 88. 6
Hiärpe 103. 9
Hiaticula 1084
Hibou 43. 4
Hjeile 88. 6
Hieilo 88. 6
Hierengrill 617
Hierpe 103. 9
Higboe 59. 12
Himantopodi 1100
Himantopus 1081
Himbrinen 879
Himmelgeiſs 1019. 1031
Himmellerche II. 207. 213
Himmelsziege 1030
Himpulinda 112. 28
Hinnularia 44
Hippolais II. 623
Hippomanucodiata 443
Hirngrill II. 502
Hirn-Grillerl II. 503
Hirondelle 922. ff. II. 783 ff.
Hirſchfink II. 347
Hirſchvogel II. 372. 374
Hirundo 880. 921. II. 781. 812
Hiro 61. 1
Hittor 59. 9
Hoactli 975
Hoactzin II. 66
Hoamy II. 298
Hoazin II. 66

Hobby

Hobby 125
Hobreau 42. 14
Hocco II. 40
Hoche-queue 114. 11
Hochschwanz II. 275
Hoeg 42. 28 ff.
Hoen 101. 1
Hoens 101. 1
Hoffsperling II. 549
Hoftaube II. 143
Hohlente 754
Hohlkrähe 501 ff.
Hohlschnabel II. 140
Hohlschnäbler 316. 319
Hohtaube II. 140
Hohu 975
Hoilotl II. 175
Hoitlallotl II. 65
Hoitzitzel 66
Hoitzillin 646
Hoitzin II. 66
Hokko II. 40
Hoko II. 39
Hol-Taube II. 142
Holzeule 162
Holzhacker 545
Holzhackerspecht 505
Holzhäher 360
Holzheher 360
Holzhuhn 502. II. 98. 102
Holz-Krae 394
Holzkrähe 391. 502
Holzkrahe 302
Holzlerche II. 208. 213. 215
Holzmeise 764. 766
Holzmuschel II. 555
Holzschnepfe 1026. 1077
Holzschreyer 361. 368
Holzsneppe 86. 6
Holztaube II. 139. 172
Honigadler 10
Honigbussard 69
Honigkukkuk 487
Honigsauger 556. 660. ff. 681
Honigweiser 488
Honigzeiger 487
Honney-Guide 488
Höns II. 48
Hookoo 621
Hoop 64. 1
Hoopoe 611
Hopling 72. 3
Horbel 1125
Hordeola II. 407
Hörnereule 143
Horneule 139 ff.
Hornohreule 143
Hornschnabel 1131
Hornträger 943
Hornvogel 323
Horrevogel 361
Horsegiag 1032. 1069
Hortulana II. 408
Hortulanus II. 402. 431
Host-Fugl 86. 8
Hortyhel 984
Hottentot II. 730
Hottentottenkernbeisser II. 380
Hottentottenkrähe 337
Hottentottenrabe 337
Houbara II. 9
Houette 43. 5
Houtarde 95. 1
Howlet 43. 7
Hoystiert II. 154
Hozitzanatl 380
Hrafn Oend 793
Hraukur 857
Hrossa-Gökr 1032
Hrota 734
Huan 44. 12
Hubara II. 9
Huda-urnik 117. 3
Hudjaesa II. 142
Hudsonsbayfalke 93. 94. 107
Huet 88. 6
Huexototl 99. 1
Huhn II. 46

Hühnerartige Vögel II. 1
Hühneraar 9. 51
Hühneralk 821
Hühnerdieb 49. 129
Hühnerfalk 66
Hühnergeyer 40. 49. 66. 71
Hühnerhabicht 66. 76. 105
Hühnerſchwanz II. 153
Hühnerweihe 9. 53. 66. 71
Huhu 161
Hubu 65. 27
Huhuy 139
Huid-Maaſe 76. 3
Huit 88. 6
Huitrier 1109
Huitzitzil 66
Hulote 161
Humming-bird 683
Hundsmeiſe II. 764
Hüner ſ. Hühner
Hupe 64. 1
Huru 40
Hus-Swala 117. 3
Hutſche 374
Hutmerle II. 471
Huttanager II. 471
Hutti 88. 6
Huttich 88. 6
Hüting II. 600. 693
Huus-Kald II. 549
Huus-Spurv 112. 36
Huus-Svale 117. 3
Huw 140
Hvidlaaring 853. 856
Hvidſide 68. 5
Hvid-Svale 117. 3
Hviidlaaring 72. 3
Hvinand 755
Hvin-Ander 755
Hvit 112. 3
Hydrocorax 323. 326
Hyeiler 1095
Hyldelerke II. 223
Hymber 879
Hypolais II. 616. 623
Hys-Thomas 69. 5

I.

Iabantan 103. 9
Iabiru 944
Iabiru-guacu 945
Iacacinthli 1119
Iacamaciri 591
Iacamar 589
Iacana 1133 ff.
Iacapa II. 450
Iacapani 411
Iacarini II. 456
Iacauquitototl 496
Iack 42. 118
Iäck 361
Iaco 265
Iacob 69. 5
Iacobin II. 385
Iacobiner II. 363. 365
Iacobinerin 690
Iacobinerortolan II. 405
Iacu II. 38
Iacuab 96. 1
Iaculator 538
Iacupema II. 37
Iacurutu 143
Iacuta 50. 7
Iadreka 1041
Iägervogel 327
Iagdfalk 81
Iäggeloſko 45. 6
Iaguacati-guacu 578
Iaguilma 250
Ia-Ia 50. 7
Iaik-Ohreule 153
Iakdaw 556
Iakobinertaube II. 150
Iaku II. 38
Ialouſietaube II. 197
Iamac 424
Ian van Gent 72. 5
Iänneſebüüp 43. 1
Ian Pottagie Eend 67. 33

Ian-

Ianſchupb 43. 1
Iàntilder 87. 13
Iapu 417
Iaques 50. 7
Iaquins-Ente 779
Iardinier II. 408
Iärn-Sparf 114. 3
Iars 67. 9
Iarzabek 103. 9
Iaſeur II. 324
Iaſine 110. 5
Iaskotzka 117. 3
Iaſtrzabgolebiow 42. 30
Iaſtrzabwielki 42. 30
Iaticula 88. 1
Iay 361
Iayon 50. 7
Ibijau II. 815
Ibis 1004. ff. 1007
Icawetz II. 484
Icterus 401. 408 ff.
Iean le blanc 44
Iedwabnicka 108. 1
Ielloo 42. 38
Ielve 86. 6
Iendaya 238
Ienwa-Ioniku 117. 2
Ierebitza 103. 13
Iernicalo 42. 16
Ierpe 103
Ierzyk 117. 6
Igilma 823
Igylma 823
Ijarſoakale 69. 5
Ικτινος 52
Illas II. 259
Illwärsfogel 110. 1
Imbenfraſs 596
Imbenwolf 596
Imber 882
Imbrifoetus 505. 506
Imerkoteilak 77. 2
Immenfraſs 595
Immenwolf 595
Immer 882
Immertaucher 882
Imperiale II. 493
Incendiaria II. 326
Indianer 957. II. 150
Indigo-Ammer II. 426
Indigo-Vogel II. 427
Indiyk 99. 1
Inſeparable 299
Interpres 1057
Inypilabelap 69. 9
Io-Bonde 76. 10
Iocade 107. 1
Iocaſſe 107. 1
Iochen II. 717
Iochualcuachili 1134
Io-Fugl 914
Iog-Owl 43. 8
Ioli 670
Ion 104. 1
Iona 104. 1
Iord-Geed 87. 8
Iord-Koene 93. 2
Iord-Svale II. 794
Iota 7
Iote 7
Io-Tyv 914
Ipatka 816
Ipeca-guacu 67. 16
Ipecu 508
Iprump 983
Ir II. 536
Iriſk II. 530
Irſker II. 531
Iſarokitſok 69. 3
Iſingak 76. 10
Isländer 116
Isländerente 764
Ispida 557. 564. ff. 597
Iſſerling II. 615
Iunco II. 315
Iungfer 270. 950
Iungfernmeiſe II. 760
Iunovogel II. 22

Iupitersfink II. 488
Iupujuba 416
Iurar 75. 7
Iurra 42. 3
Iurz 117. 6
Iütvogel 1018. II. 410
Iuwelenkolibri 680
Iwolga 52. 7
Ixlin II. 646
Iynx 497

K.

Ka 50. 6
Kaa 356
Kaatb 57. 1
Kaapwachtel 381
Kaar 50. 2
Kaarnbicker II. 344
Kaatmeiſſe 116. 8
Kaburre 152
Kaczka 67. 40
Kaenne 50. 2
Käfer-Endtle 888
Käferentchen 889
Kaggi 57. 1
Kaerrak 69. 5
Kaertlutok 67. 40
Kagolka 761
Kahlbacken 435
Kahlfuſs 143
Kahlhals 4. 371
Kahlkopf 6. 371. 944
Kaja 50. 6
Kaine 42. 15
Kajordlek 88. 6
Kajorrovek 88. 6
Kaiortok 67. 5
Kaiſerfink II. 563
Kaiſervogel 951
Kajuhrvogel 872
Kakakew 50. 2
Kakatoo 261
Kakatoeha 262
Kakatoes 262
Kakatu 260. ff. 263
Kakelik II. 124
Kakopit Tſioi 644
Kakordluk 70. 3
Kakordlungnak 70. 6
Kakordluvek 70. 3
Kakugtanak 70. 3
Kalanderlerche II. 230
Kalekut II. 30
Kalekuter II. 30
Kalkun II. 31
Kallakul 76. 2
Kaloe-Koeroelgoya 42. 13
Kalotchenfalk 129
Kalotte II. 155
Kalv 1110
Kameelſtrauſs II. 11
Kameelvogel II. 11
Kamichy 943
Kammadler 18
Kammlerche II. 224
Kammreiher 970
Kampfhahn 1050
Kanarek 112. 23
Kanarienbaſtard II. 540
Kanarienvogel II. 502. 511 ff.
Kanarienzeischen II. 502
Kanary 112. 23
Kanepu putnini 112. 28
Kania 42. 12
Kaninchen-Eule 160
Kannakul 42. 12
Kanutsvogel 1074
Kanutsſtrandvogel 1074
Kapbtar 104. 1
Kappennonne II. 151
Kappentaube II. 151
Kappentaucher 801
Kappenmeiſe II. 753
Kap-Racke 390
Kapſperling II. 494
Karagatky 67. 46
Karaguſb 42. 5
Karakara 54. 1155
Karakka 46

Kardi-

Kardinal II. 358. s. Cardinal
Kardinälchen II. 444
Kardinalfink II. 354
Karechel 348
Karminente 793
Karminhänfling II. 525. 529
Karminpelikan 935. 940
Karnellen 772
Karok 348
Kärrik 59. 1
Karsaak 76. 3
Kasarka 728
Kasarken 730
Käsemeise II. 760
Kasuar II. 15
Kasuaris 96. 2
Katondieb 559
Katta 103. 20
Katreka II. 64
Katugle 43. 13
Kat-Ugl-Hane 43. 1
Katzeneule 148
Katzenvogel II. 594
Kauio 103. 4
Kaularsch II. 52
Kautkegef 899
Kautz 156. ff. 170. 177
Käutzchen 146. 178
Käutzlein 148. 169. 178
Kautzeule 165
Kaw 50. 6
Kawa 50. 6
Kawka 50. 6
Kaye 356
Kayke 355
Kedrowka 50. 10
Keeask 917
Kegelschnabel 334
Kegelschnäbler 334
Kehwabla 87. 1
Keichreiher 956
Keilhaken 1010. 1017. 1022. s. Keulhaken
Keilschwanz 590. II. 334
Kekuschka 769
Keczan Derkacz 93. 1
Keltreu 1133
Kemperken 87. 1
Kenar 67. 40
Κενχρᾶμος II. 408
Keptuschka 1061
Kerella 59. 13
Kereu II. 281
Kerkugle 43. 8
Kernektok 50. 2
Kernel 770 f.
Kersenriese 402
Κερθιος 620
Kernbeisser II. 337. ff. 343. 383. 391. f. 445. 453
Kernfresser II. 346
Kertlutokpiarsuk 67. 23
Kestrel 111
Keugolok 84. 11
Keulhaken 1094. s. Keilhaken
Keylhaken 1094
Kjüder 103. 1
Kiankia 41. 5
Kiärnds-And 67. 31
Kibgeyer 13
Kibiz 1053
Κιχλαι II. 256
Kidlingaejouk 72. 3
Kiebith 1053
Kiebitz 1043. 1059. ff. 1080. 1135
Kieder 168
Kiesiz 1052
Kield 90. 1
Kielrabe 337
Kield 1110
Kierne-Bider 109. 3
Kievitz 1053
Κιγκλος II. 254. 654
Kibris 76. 2
Kik 70. 1
Kikkukabsa 86. 7
Kikkuts 86. 6

Kildir 1088
Killengak 69. 4
Kindermelker II. 810
Kingolik 67. 5
Kingsfisher 63. 1
Kink 430
Kinki-Manou II. 585
Kioe 914
Kiöd-Meise II. 756
Kioegelrifare 109. 1
Kiolo 1152
Kioven 914
Kirchenfalke 110
Kircheule 164. 170
Kirchschwalb II. 790. 798
Kirkesvale II. 798
Kirreule 168
Kirrmeve 928
Kirschdieb 402
Kirschdrossel 403
Kirschfink II. 343. 354. 382
Kirschhold 402
Kirschknäpper II. 343
Kirschlefke II. 343
Kirschschneller II. 343
Kirschvogel 402
Kirsebärfugl II. 345
Kirve 914
Kiskeman 61. 7
Kiskemarasue 67. 7
Kiß-Kiß-Keschisch 116. 6
Kitawiah II. 107
Kite 42. 12
Κιττα 377
Kittivake 897
Kiufva 76. 10
Kive 914
Kiwit 87. 1
Kiwitz 1070. 1100
Kiwulis 112. 25
Klaas 355
Klaber 545
Kladra 107. 3
Klaesban 67. 28
Klage 173
Klagefrau 173
Klangente 754
Klapperente 755
Klapperralle 1145
Klashan 765
Klashanik 766
Klatschtaube II. 163
Klauber 547
Klausrapp 387
Klavert 44. 12
Kleberblauspecht 545
Kleiber 545
Kleinent 772
Kleinspecht 617
Kleinziemer II. 261
Klektunja 67. 96
Klener 545. 547
Klepper II. 343
Klera 107. 3
Klesk 50. 10
Klette 641. 662. s. Falcinellus
Kletter II. 488
Kletterspecht 626
Klettervogel 617
Klinger 754
Klinger-Gaas 67. 9
Klippenhahn II. 739
Klippenvogel 900
Klosterfräulein II. 637
Klosterwenzel II. 661
Klov-Mand 87. 13
Klub-Alk 819
Klumbenefiu 69. 1
Kluthuhn II. 52
Klyde 1106
Klympe 69. 1
Knäckente 769
Knappeule 149. 161
Knarand 750
Knarreule 168
Knarrhuhn 1154. II. 78
Knecht 1139
Kneifer 802. 806

Kni-

Kniäſcok II. 776
Kniäſziok II. 776
Knibgas 87. 13
Knipa 67. 23
Knipper II. 406. 431
Knokkel-Skade II. 156
Knorrhuhn II. 78
Knötter 110. 3
Knurre II. 505
Knutge-Gef 899
Koato—o—oo 581
Kobelente 754. 793
Kobellerche II. 224
Kobelregerlein 1084. 1112
Kobeltaucher 883
Kober 42. 23
Kobetz 122
Kockok 57. 1
Kockunt 57. 1
Koekkoek 57. 1
Koenai 50. 2
Kogo 63. 18
Kohlamſel II. 302
Köhler II. 461
Kohleule 165
Kohlfalk 85
Kohlmeiſe II. 755
Kohltaube II. 172
Kohltröſt 107. 22
Kohlvögelchen II. 656
Kohſa 50. 6
Kokkas 42. 2
Κοκκυξ 57. 1
Koko 1012
Kököbyka 59. 1
Kokoſz 101. 1
Kokuſch 101. 1
Kolbentaucher 803
Koleniegi II. 125
Kolibri 660
Kolibridiane 690
Kolibriſpecht 645. 650. 663. 670 ff.
Kolin II. 125
Kolkrabe 337
Kolkraue 337
Köllje 354
Kolmnieszik 87. 1
Kolpiza 80. 1
Koltaube II. 142
Kombara II. 209
Komisbark-papanaſew 42. 30
Kommandeur 413
Kongmutajon 67. 40
Könickerl II. 718
König II. 725
Königlein II. 720
Königsammer II. 442
König der Vögel II. 721
Königsdroſſel II. 297
Königsente 715
Königsfiſcher 565. 567
Königsgans 711
Königsheber 444. 447
Königsparadiesvogel 446
Königsplattſchnabel 559
Königsvogel 446. 849
Königsweihe 49
Koniinsken 114. 48
Konopka 109. 27
Konoplenka 112. 28
Kontra II. 242
Koore-Krey 50. 4
Kopanauarſuk 110. 1
Kopanungarſuk 110. 1
Köppel 91
Koppenriegerlein 1084. 1112
Kopp-Riegerle 1112
Κοραξ 50. 2
Kore 103. 13
Korkorre 934
Kormoran 852
Kornknarren 93. 1
Korn-Luerke 110. 3
Kornlerche II. 207
Kornſkrika 50. 7
Kornſperling II. 548
Kornvogel II. 413

Korn-

Kornwerfer II. 548
Korp 50. 2
Korſchun 52
Kors-Fugl 109. 1
Korsnaef 109. 1
Κορυδαλος II. 210
Κορυδος II. 210
Kos 107. 22
Koſitza 86. 7
Koſs 107. 22
Koſtobryz 50. 10
Kothhahn 609
Kothantl 67. 33
Kothahn 622
Kothlerche II. 219
Kothmönch II. 225.
Kottler 545
Kottmeiſe II. 766
Κοττυφος II. 304
Koza-Baranek 86. 7
Kou kay-konn 59. 8
Koulik 314
Kourier 1014
Kowabrna 50. 6
Kowit 76. 2
Koyolkos II. 126
Kozodoy 118. 1
Kraaiſpecht 59. 1
Kraako 352
Kraakſpinte 59. 18
Kraanvogel 84. 4
Krabbenfreſſer 977. 982
Kräe 344
Krag 50. 2
Krage 352
Kragenente 775
Kragenhuhn II. 101
Kragenkolibri 686. 690
Kragenpapagey 243
Krähe 342. f. 350. 373. 380. f. 392. 410
Krähendohle 304. 385
Krähenpelikan 855
Krähenſpecht 502
Krährabe 344
Kraecka 67. 33
Krai 50. 5
Kralitſch 114. 48
Krakugle 43. 8
Krametsfugl II. 254
Krammetsvogel II. 249. ff. 252
Kramsfugl 107. 2
Krammsvogel II. 252
Krammtvogel II. 252
Kran 350
Kranabeter II. 255
Kranabetsvogel II. 255
Kranch 952
Kranich 943. f. 949. 951. f. 956. f. 979
Kranig 951
Kranugli 173
Kranveitl 348
Kranwetsvogel II. 255
Krappenfreſſer II. 346
Kraska 51. 1
Krasnye-Uſki 67. 46
Krauklis 50. 2
Krauſelſter 189
Krausfink II. 560
Kraushahn II. 51
Kräutervogel II. 467
Krauthänfling II. 525. 519
Krautvögelchen II. 219. 656
Krautvogl II. 235
Krebsfreſſer 946
Kreiſelſchnäbler II. 157
Krekkop 67. 26
Kremer 1106
Kreng Rave 41. 5
Krepper II. 159
Kretogtow 58. 1
Kretzel 42. 37
Kreuzdohle 359
Kreuzelſter 809
Kreuzmeiſe II 764
Kreuzſchnabel II. 338
Kreuzvogel II. 339

Krick

Krick 259. 277. 281. ff.
Krickelster 189
Kriechelster 391
Kriechente 770. ff. 774. f. 778 f.
Kriechentlein 791
Kriechhuhn II. 53 ff.
Kriechmeise II. 759
Kriecke 774
Krieff-Dove 104. 19
Kriegente 770
Kriegsammer II. 240
Kriegsschiff 842
Kriegsschiffsvogel 841
Kriegstanager II. 465
Kriia 923
Krikand 771. 773
Krikente 772
Krikke 770
Krinis II. 341
Krinitz II. 341
Kritschäne 1127
Kritschele 1127
Krizstela 50. 13
Krogulek 42. 14
Kroka 50. 5
Krokke 899
Krolik czubaty 114. 48
Krolik nieczubati 114. 49
Krol Myszy 114. 46
Kronadler 18
Kronenadler 18. 25
Kronenfalk 19
Kronengeyer 19
Kronenseidenschwanz II. 333
Kronentaube II. 169
Kronenvogel II. 169
Kronschnepfe 1017
Kronvogel 488
Krop-Due II. 160
Kropfgans s. Pelikan
Kropfpelikan 845. 1002
Kropftaube II. 159
Kropfkirne 923
Kröpper II. 159
Krössler 1052. 1139
Krückelster 189. 198
Kruckelster 189
Krückente 772
Krückentlein 772
Krugelhahn II. 84
Kruk 50. 2
Kruka 114. 6
Krukko 757
Kruk-lesney 50. 19
Kruk-modny 72. 1
Krukmorsky 67. 1
Krullhahn II. 51
Krumbschnabel II. 339
Krummschnabel 187. 1017. 1106. II. 338
Krummschnabel-Ente 781. 1006
Krünitz II. 338
Krüper II. 53
Kruphahn II. 53. f.
Krüppel 1137
Krüützschnabel II. 339
Krye 952
Krykkie 899
Krykie 76. 2
Krypare 65. 1
Krzywonos 109. 1
Kübitz 1053
Küchenschwalbe II. 782
Kuckuck 315. 464. ff. 517
Kuckucksamme II. 620
Kuckucksköster 609
Kueronden 42. 71
Kugelelster 391
Kugelfihaus 305
Kuh-Aub II. 72
Kuhfink II. 506
Kuhnhahn II. 31
Kuhscheisse II. 732
Kuhstelze II. 644. f. 732
Kujavier II. 587
Kuk 57. 1
Kukauza 466 — 57. 1

Kukaw

Kukawka 57. 1
Kükendieff 42. 62
Kukepluck 175
Kukert 57. 1
Kukkuk ſ. Kuckuck
Kukkuks - Manden 57. 1
Kukſuk 72. 5
Kukulka 57. 1
Kul 42. 27
Kulik 86. 7
Kulkrabe 337
Kummulis 112. 7
Kunbar II. 209
Kunthur 3
Kuntur 2
Kupfmeiſe II. 754
Kuppmeiſe II. 754
Kura 43. 7
Kuraſſauer 681. II. 40
Kuraſſovogel II. 41
Kurbukon 105. 4
Kurg 84. 4
Kurka 50. 3
Kurki 951
Kurlik 76. 9
Kurlik czerwonemi nogami 86. 11
Kuro Patwa 103. 13
Kurrata 103. 13
Kurre II. 89
Kurruku 452
Kurzſchwanz 27. 36. 381. 647. 650
Kuſko II. 44
Kuſkovogel II. 41
Kuſſektak 114. 11
Küſtenjäger 1070
Kutgegeef 899
Kutberthsente 737
Kuttengeyer 4
Kutte - Rutte 87. 4
Kuttvogel II. 372
Kuyameta 65. 38
Kwakkel 103. 20
Kwartel 103. 20
Kwartel Koning 93. 1
Kwicziela 102. 2
Kwiczod 107. 2
Kybitz 1052. 1079. 1087. 1101
Kyſſektak 114. 15
Kytſchuguigalli 69. 10

L.

Labee 67. 1
Lackſchnabel II. 366
Lachfalke 102
Lachgans 716
Lachkukuk 478
Lachmöve 907. 911. 913
Lachtaube II. 194
Lachweyhe 111
Lade - Svale 117. 1
Ladu - Swala 117. 1
Laeniadudra 87. 13
Laf - Ubl 88. 1
Laggel 67. 9
Laggias 67. 9
Lagopede 103. 4
Lagopus II. 83. 89. 92. 94. 95. 704
Lagsdigalla 114. 1
Lagsdiogalla kalpas 114. 6
Lämmergeyer 20
Lämmerhierd II. 645
Lanarius 103
Landadler 33
Landörn 32
Landralle 1149
Landzeiger 838
Lanette 102. 104
Lang 73
Langbein 1099
Langevige 876
Langfuſs 1099
Langhals 650. 761. 864
Langivie 875
Langgraien 44. 28
Lang - Neeb 86. 3

Langschnabel 472. 627. 805. II. 675. 691
Langschwanz 54. 647. 664. 766. II. 335. 774
Langvine 75. 2
Lang-Zunge 498
Lanier 102
Lanio 103. 191
Lanius 182
Lappmeesen 116. 11
Lappskata 44. 25
Lap-tzoy 109. 77
Lapving 87. 1
Larderiche 116. 3
Lark II. 211 ff.
Lärka 105. 1
Lärmente 750
Larus 839. 895. ff. 927
Lasur-Vogel II. 559
Laubfinke II. 485
Laubhahn II. 89
Laubvögelchen II. 725. 736
Lauditza 105
Läufer II. 725
Lauferfalk 69
Laufugl 1106
Laufvogel 1014
Lauhol 88. 5
Lauknirbe 103. 9. 13
Lauloräästas 107. 4
Lauriol 52. 1
Lausot 52. 1
Laustaza 117. 1
Lautedrossel II. 294
Lavandiere II. 637
Lawit 117. 2
Lax-Tite 86. 11
Lax-Titing 86. 11
Layette 105. 1
Layong-Layong II. 788
Leech-Owl 43. 9
Leewaark II. 208
Leffler 739
Legled 84. 4
Lemans-Griis 43. 6
Leicheneule 178
Leichenhühnchen 178
Leichvogel
Leimschwalbe II. 782. 789
Leimvogel II. 222
Leiner 750
Leinfink II. 525. 528
Lelok 43. 7
Lepelgans 746. 757. — 88. 1
Lepelente 757
Lepelschnute 746. 757
Lepera d'arzola 87. 1
Lepler 939
Lepturus 866
Lepus 885
Lequilla 112. 16
Lerche II. 206 ff.
Lerchenammer II. 399
Lerchenart II. 233
Lerchenfalk 114. 116. 123
Lerchenfink II. 476
Lerchengeyer 105
Lerchenhuhn 1141
Lerchenhabicht 113
Lerchenheuschrecke II. 235. 734
Lerchenkäutzchen 178
Lerchenschnepfe 1016
Lerchensperber 112
Lerchenstösser 116
Lerke 105. 1
Leske II. 346
Leucordia 938
Leucotis II. 495
Levar-Io 76. 10
Leversina 86. 10
Libane 72. 1
Liebesten 65. 1
Liebig II. 350
Lie-Hast 59. 1
Lie-Rype 103. 4
Ljesnoi Worabei II. 557
Lignarius 505

Lille-

Lille-Solvet 76. 1
Lille-trae-Pikke 58. 19
Limosa 1015. ff. 1037. 1041
Linaria II. 375. 439. 525. 529. 744
Lin-Erle 114. 11
Linota II. 528
Linotte II. 439. 525. 537 ff.
Liom 877
Lita 87. 8
Litorne II. 253
Livane 72. 1
Lo 88. 6
Lochgans 708
Lochtaube II. 146
Loculator 1001
Locust-bird II. 284
Locustelle II. 235. 734
Lodola 105. 1 ff.
Löffelente 745. 749. 757
Löffelgans 846. 938 ff.
Löffelreiher 937
Löffelschnabel 946
Löffler 938 ff.
Lohfink II. 350
Lohong II. 5
Lom 877
Lomben 874
Lom-Imber 75. 5
Lomme 875. 878
Lomvie 75. 1
Lomgivie 875
Lomvisvie 875
Looloo 43. 13
Loom 874. 877
Lootensbaumläufer 651
Lootensvogel 651
Lorch 883
Lori 234 ff.
Lorion 52. 1
Loriot 406 f.
Lorrind 984
Lorry 269
Lory 234. ff. 272
Lory-Noira 269
Louette II. 329
Lounam 889
Lourion 52. 1
Louwa 853
Lowerke II. 212
Loxia II. 337. ff.
Loyca II. 246
Loyelte II. 42. 118
Lucarino 112. 25
Lucre 112. 25
Luderkrähe 501
Luderrabe 6
Luftling II. 747
Luftschiffer 116
Luftvogel 445
Luguarinera 112. 7
Lük 67. 1
Lum 875. 877
Lumb 878
Lumbe 878
Lumenpoinca 110. 1
Lumer 874
Lumipulmönen 110. 1
Lumme 874. 878
Lün 43. 1
Lun 79
Lund 816.—69. 4
Lunde 815
Lund-Talle 816
Lüning II. 547
Lupo dell' Api 63. 1
Lürle II. 225
Lurlen 105. 1
Luscinia 642. II. 566. 575. 578. 581. 605. ff. 647. 679. 687. 694. 708
Lusciniola II. 619
Lutea II. 432
Luteola II. 519
Lutbeux 105. 3
Lutronne 52. 1
Λυκος 358
Lyng-Lærke 105. 3

Lyſka 91. 2
Lyſklikker II. 346
Lyſslicker 1076
Lyſter II. 302

M.

Maaſur 910
Maar 910
Maaſe-Fot 76. 10
Maaſe-Skit 76. 10
Macao 222. 225
Macao-Krähe 389
Macareux 816
Machallerſchnepp 1029
Mackerell 77. 2
Mackukava 1154
Macon 59. 1
Macottu 110. 3
Macreuſe 712 ff.
Macroule 1128
Macucagua 1155. II. 137
Madenfreſſer 332
Madsbarskoy 101. 3
Maeſekke II. 153
Maehnentaube II. 163.
Maekergouk 86. 7. — 87. 8.
Mähnenpapagey 822
Mäs 76. 3
Mäſe 76. 3
Mäuſeaar 42. 53. 65
Mäuſefalke 56. 64. 69
Mäuſegeyer 65
Mäuſegeyerl 70
Mäuſehabicht 65. 69. 114
Mäuſewächter 65. 69
Mäuſer 65
Magnanima II. 617
Magoua II. 136
Magpie 375
Maguari 962
Maja II. 360. 546
Majan II. 360
Majenze 116. 3
Mainate 434
Maipuri 297
Maisdieb 438
Maiſe II. 351 ff.
Maitaslisja 42. 93
Maizi de Miacototl II. 742. 751
Manaſtak 86. 7
Makauka 77. 2
Makawuanna 285
Makolagwa 112. 28
Makoſch 1144
Makreuſer-Enten 713
Malacchia 50. 5
Malaroſloi-Filin 154
Mala-Sova 43. 4
Mala-Zippa 105. 4
Malkala-Kourla II. 587
Malkoba 57. 40
Mallemugge 834
Mallemucke 834
Mall-Snaeppa 86. 7
Maloidjetel 59. 1
Malouſſe 109. 2
Maltheſerammer II. 420
Maltheſergeyer 8 f.
Malvis 107. 3
Manacus II. 739
Manaki II. 707
Manakin II. 330. 707. 739. 744 f.
Manchot 827
Mancipium II. 463
Mandelkrähe 390
Mandelkran 394
Mango 673
Mangone 79. 1
Man of-war-bird 72. 2
Manſeau 104. 19
Mansfeni 60
Mantelhuhn II. 102
Mantelmeve 906
Manucodiata 442 ff. 603. 613
Mapatbecuſiſcb 110. 1
Maracana 229. 267
Maracaxao II. 493

Maragau 63. 1
Marail II. 38
Maraye II. 38
Marchand 41. 5
Marcolph 360
Mareca 744
Marenge II. 762
Margiäs 734
Maria-capra 114. 33
Marin-Erle II. 638
Mariposá II. 387. 444
Maritjemaat 324
Marklerke II. 219
Markolphus 301. 368
Markſvale II. 783
Markward 361. 368
Marouette 1145
Mar-Skitt 87. 7
Marſpitt 90. 1
Martelot 114. 17
Martin 104. 448
Martinet II. 790
Martingans 723
Martin-pecheur 565
Μαρτις 907
Martlet 117. 3
Märzente 786 f.
Maſarino 85. 1
Maſchente 786
Maſkarin 267
Maſkentaube II. 163
Maſsbu 42. 14
Maſsbubu 43. 9
Materet II. 773
Matkern 1123
Matkneltzell 1123
Matkuillis 1068
Mattolina II. 214. 217
Mattſchinſch 107. 1
Matsnings 107. 1
Matuitui 1085
Maubeche 1077
Mauchler 1002
Mauerfalke 114
Mauerklette 626
Mauerklettervogel 626
Mauerläufer 626
Mauermeiſe II. 767
Mauernachtigall II. 692. 697
Mauerſchwalbe II. 697
Mauerſpecht 626
Mausadler 102
Mauſard 104. 19
Mauseule 161
Mauskopf II. 662
Mausſittig 255
Mauviette 105. 1. 4
Mauvis II. 259
Mayſpecht 545
Mayvogel 925. 930
Mayvögelein 930
Mazurek II. 537
Meadow-Clapper 93. 12
Mebe 927
Meddens 103. 1
Medmis 103. 1
Meelmeiſe II. 760
Meeradler 31. 57. 59. f. 850
Meeramſel II. 308
Meer-Cout 91. 2
Meerdrehhals 887
Meerelſter 1109
Meerganſs 845
Meerle II. 302
Meerlerche 1076
Meerhaaſe 885
Meerhuhn 1037. 1115
Meerheher 391. 395
Meermeben 904
Meerpapagey 822
Meerpygmäe 827
Meerrachen 805. 883
Meerrind 984
Meerſchwalbe 597. 917 ff.
Meerſchwalm 913
Meerſchwarzblättchen II. 577
Meerſpatz II. 437
Meerſtieglitz II. 402

Meerteufel 1128
Meerzeisig II. 529
Meerzeislein II. 531
Meerzeisel II. 531
Mesike II. 153
Mehlhänfling II. 524
Mehlmeise 760. 772
Mehlrabe 350
Mehlschwalbe II. 789
Meise 545. 643. II. 461. 469. 629. 634. f. 646. 728. 744. 746. 751 f.
Meisekönig II. 717
Meisenkönig II. 754. 766
Meisenköniglein II. 724
Meisenzeisig II. 740
Melanaëtos 26
Melanope II. 731
Melba II. 493. 803
Μελεαγρίδαι II. 81
Meleagris II. 29. 77
Melker 168
Mellemspove 1022
Mellisuga 660. ff. 677. 680. 687
Mellsstrasds 101. 2
Melodist II. 270
Melroa 107. 22
Melziozallo 52. 1
Menscheneeter 41. 5
Menschenfresser 6
Merch 803. 883
Merel II. 302
Merganser 802
Mergulus 888
Mergus 801. ff. 804. 818. 877. 880
Meriarseirsok 76. 10
Merillus 126
Merl II. 702
Merla 107. 22
Merla acquajuola 106. 5
Merlaer II. 302
Merle 216. f. 380. f. 435. 448. II. 244. 266. f. 268. 275. ff. 301. 312. 426. 449. f. 579
Merle jaune 52. 1
— *doré* 52. 1
— *d'eau* 106. 5
— *à collier* 107. 23
— *à plastron* 107. 23
— *terrier* 107. 23
— *blanc* 107. 23
— *d'Espagne* 107. 23
— *de Savoye* 107. 23
— *gris* 107. 23
Merlin 126. 127
Merops 593. 627
Merrebüüp 84. 21
Mersengle 116. 3
Merula 369. 413. II. 245. 284. 301. 451 f.
Merzente 786. 790
Mesange 640. II. 629. 634. 674. 752 f.
Mescha Balluschi 104. 1
Meschasobß 67. 9
Mese 110. 3
Meshatt 116. 2
Mesingle 116. 3
Metsis 103. 1
Metskask 112. 3
Metskits 86. 7
Metstuike 104. 1
Metzcanaubtli 67. 40
Meuniere II. 773
Meuschagatka 823
Meusekönig II. 718
Meusevogel II. 531
Meve 832. 895. ff. 921
Mevenbüttel 913
Mevendücker 809
Mevenschnabel 874
Mevenschnäbler 875
Meventaube II. 153
Meventaucher 809
Meyspecht 548
Meyvogel 925

Mezy 42. 16
Miacatototl II. 742. 751
Microphoenix II. 326
Mierla 107. 22
Miethhuhn 1142
Mignatur-Eule 153
Milan 49 f.
Milchemo 116. 5
Milchſauger II. 810
Milheiro 116. 5
Millekulartok 42. 7
Miliaria II. 405. 410. 528
Millouin 767
Millwürger 194
Milvio 42. 12
Milvus 48. 71
Mimus II. 271
Minirer-Eule 160
Miniſter II. 427
Mino 435
Minor 434
Mirlein 127
Mirlu de riu 106. 5
Miſſel-bird 107. 1
Miſſiſippi-Tanager II. 454
Miſteldroſſel II. 249. 263
Miſtelfink II. 250
Miſtelziemer II. 250
Miſtfink II. 482
Miſtler II. 249. 268
Mitilene II. 438
Mitſchagatka 823
Mittek 67. 15
Mittelente 762. 767
Mitteleule 172
Mittelfalk 99
Mittelkrähe 345
Mittellerche II. 226
Mittelſpecht 534
Mitu II. 41
Mituporanga II. 40 f.
Mitwaldlein II. 725
Mocha 43. 1
Mockvogel 414
Mocliuelo 43. 4
Moderente 712. 717
Mogilnik 46
Mohntaube II. 149
Mohr II. 557
Mohren 803
Mohrenhuhn II. 55
Mohrenkernbeiſser II. 380
Mohrenkopf 421
Mohrenköpfchen II. 671
Mohrenkropftaube II. 162
Mohrenmütze 801
Mohrenvogel 801
Mohrenwachtel II. 134
Mohrenwaſſerhuhn 1129
Moignet 116. 11
Moine 41. 2
Moineau 485. 494. II. 371.
379. 427. 485. 509. 535. ff.
540. 542. 550. ff. 617
Moinet 112. 36
Moiniet 116. 11
Moktok 67. 96
Mokloſchia 67. 97
Molliceps 1033
Molopita II. 291
Momot 321
Monacha 742. II. 281
Monacchia 50. 6
Monachetto 68. 5
Monachino II. 352
Monachus 45
Monathstaube II. 143. 147. 149
Mönch 4. II. 661. 669. 702
Mönchente 742
Mönchmeiſe II. 766
Mönchsgeyer 4
Mönchsſchwan II. 19
Mönchstaube II. 151
Mond, der halbe II. 233
Mondtaube II. 147
Monedula 355. 385. 361
Monk 41. 2
Mönnik 1050

Monstre 116. 11
Montagasse 44. 12
Montain II. 485
Montan II. 485
Montifringilla II. 482
Montifringillae congener II. 476
Mook 487
Moorente 796
Moorhahn II. 98
Moorhuhn II. 89
Moormeise II. 770
Moor-titling 114. 17
Moosämmerling II. 435
Mooshahn II. 89
Mooskuh 998
Moosochse 984
Moosreiher 984
Moosriegel 984
Moosschnepse 1031 f.
Moosweiher 44. 57
Moosweyhe 57. 71
Moqueur II. 271 ff.
Morasthuhn II. 96
Morastlerche II. 218
Mordoré-Ammer II. 446
Moregzag 103. 20
More-Hen 91. 4
Morelle 91. 2
Morente 717. 748. 796
Morfex 853
Morgenländer 396
Morillon 757. ff. 796
Morinell 1089
Morinelle 1058
Morio II. 55. 315
Mornell 1081
Mornellchen 1090
Mornellgybitz 1090
Mornellstrandläufer 1057
Morphno congener 43
Morphnos 43
Morskaja-Kasarka 67. 67
Mort-Aender 804
Morte-ferie 75. 6
Mortetter 114. 17
Moscardo 42. 31
Mosch 112. 36
Mosch-Duifge 104. 34
Moschita II. 664
Moschusente 740
Mosendtle 748
Mossemmerling II. 436
Mosskuh 984
Mossreigel 984
Motacilla II. 605. ff. 640
Motacille II. 605 ff.
Moterelle 114. 15
Moteux II. 652
Motmot II. 64
Motthünlein 1068
Möttus 103. 1
Mouchet 42. 31. — 114. 3
Mouette 899. ff. 920
Mountain 103. 1
Moustache II. 774
Moutardier 117. 6
Möventaube II. 153
Möwe 895
Möwchentaube II. 152
Mübesslin 930
Muckendtle 748
Mückenfänger II. 570 ff.
Mückenstecher II. 642. 812
Mückente 748
Mugente 748
Mülane 52
Müllerchen II. 628
Muller 69. 4
Munacchia 50. 5
Münchlin II. 663
Münchmeise II. 767
Mungul 109. 16
Münsterspyr II. 789
Mur-Endtle 748
Murentlein 772
Mur-Han II. 98
Mur-Meise II. 766
Murre 824

Murſpecht 626
Murſpyr II. 790
Muſabroder II. 722
Muſcatus 677
Muſchelkönig 805
Muſcicapa II. 564. ff. 617
Muſe-Broder 114. 46
Muſette 105. 3
Muſkatringeltaube II. 180
Muſkattaube II. 180
Muſträäſt 107. 22
Musvit II. 756
Mutu II. 41 f.
Muur-Swale 117. 6
Myčteria 944
Myrebute 1033
Myre-Heſt 86. 7
Myr eller 87. 13
Myreloe 1093
Myre-Skite 1032
Myre-Snipe 1033
Myrle 127. 128
Myrpitta 88. 6
Myr Sneppe 1032
Myr-Snipe 86. 7
Myrſtikkel 1074
Mytſebagatka 69. 10

N.

Naahmah II 12
Nabelkraye 358
Nachtgael 114. 1
Nacht-Eule 160. 162. 164. 169. 172
Nachtfink II. 504
Nachtigall II. 270. 354. 585. 605. 612. 646
Nachtigallsknecht II. 621
Nachtkopf 1134
Nachtphilomele II. 611
Nachtrabe 387. 965. 980. II. 809
Nachtrabl II. 812
Nachträblin II. 812
Nachtram 966
Nachtrapp 162
Nachtreiher 665. 980
Nachtſänger II. 620
Nachtſchade II. 810
Nachtſchatten II. 811
Nachtſchläger II. 611
Nachtſchnabel 348
Nachtſchwalbe II. 808 ff.
Nachtugle 43. 7
Nachtvogel II. 810
Nadelſchwanz 761
Naektergahl 114. 1
Namitha 96. 1
Napaul II. 36
Napol II. 36
Narkſarmiueak 112. 1
Nashornvogel 323. 327
Naßle 75. 7
Naſutus 313
Natowokey-Omiſſew 43. 13
Natravn II. 811
Natſkade II. 811
Nattergal 114. 1
Natterhals 494
Natterwindel 497
Natterzwang 496
Nattſkärra 118. 1
Nattſkräfva 118. 1
Nat Ugle 43. 9
Nat-Vake 107. 2
Nat-Vakke 59. 1
Nattwaka 109. 1
Natwacke 546
Naya 76. 8
Nayainak 76. 8
Nayardluk 76. 6
Nayardlurkſoak 76. 6
Nayavek 76. 8
Nayauarſuk 76. 14
Naywieksky 107. 1
Nazarvogel II. 21
Neabma 96. 1
Nebbi 42. 13
Nebelkrähe 350

Neem-

Neemka 734
Negerfink II 501
Negermerle II. 462
Negertanager II. 462
Ngbobarra 65. 34
Ngral 112. 70
Niktoralik 42. 39
Nelicourvi II. 385
Nelle-konge 114. 46
Nelloumirsortok 87. 8
Nelloumirsoi tungoak 87. 8
Nengeta 186
Nennamak 112. 29
Nesselfink II. 657
Nesselkönig II. 717
Nettelkonning II. 717
Neuengländer II. 124
Neunmörder 189
Neuntödter 103. 184. ff. 194.
II. 330
Neuvogel II. 400
Nhanda-guacu 96. 3
Nhanduapoa 945
Nibbio 42. 12
Nickschnepfe 1025
Nicombar II. 184
Nicowitz II. 484
Night-Hawk 118. 1
Night-Jarr 118. 1
Nightingale II. 607
Nikabitz II. 483
Nikawitz II. 482
Nil-Ente 715
Nilreiher 1006. 1008
Nimmersatt 845. 1001
Nisus 116
Nissertokoon 25
Nisserwerk 21
Niveroile II. 508
Nocay 50. 19
Nochototl 638
Nochtototl 637
Noctua 158. 163. 172
Nödde-Knekker 109. 3
Nodde-Krige 50. 10
Nodde-Skriger 50. 10
Noddy 919
Noetskrika 50. 7
Noira 269
Noitibo II. 815
Non 50. 5
Nonne 809. II. 291
Nonnendrossel II. 291
Nonnenentchen 809
Nonnengans 733
Nonnenkernbeisser II. 378
Nonnenmeise II. 766
Nonnentaube II. 151
Nonnette II. 257
Nootekraaker 50. 10
Nootka 215
Nordgans 727. 731
Nordmöve 834
Nordvogel 914
Nordwestvogel 1063
Norks 806
Norrquint 112. 4
Norsk-Kalkan 103. 1
Norsk-Papegoy 109. 3
Nortonsundfink II. 543
Noschita II. 664
Nosselfinke II. 599. 657
Not-Kraake 50. 10
Nottekraka 50. 10
Notpacka 59. 1
Notweka 50. 10
Nucifraga 367
Numenius 1001. ff. 1018. 1042
Numida II. 17
Nussbeisser 360. 367. II. 346
Nussbicker II. 344
Nussbrecher 367
Nussbreischer 360
Nusshäger II. 344
Nusshacker 345. 367
Nusshäher 360
Nussheher 360. 366
Nussheher 368

Nuſsknacker 361. 367. II. 748
Nuſskrähe 368
Nuſskretſcher 367
Nuſspicker 367
Nuthatch 546 ff.
Nutjabber 59. 1
Nutkracker 368
Nyalikſak 68. 3
Nyctea 156
Nycticorax 965. II. 815
Nyraca 794

O.

Occhio bovino 114. 48
Occhio di Bue II. 661. — 114. 45
Ocba 67. 9
Ochra 1070
Ochropus 1124
Ochſenäuglein II. 721
Ochſen Englein II. 723
Ochſenhacker 331
Ocnus 984
Ococolin 412. II. 331
Ocotzinitzcan 410
Ocrophus 1069
Oedicnemus ſ. Charadrius
Oelb 697
Oelbs 67. 1
Oelong-oelong 48
Oenanthe II. 652
Oenas II. 139
Oepitk 114. 1
Oern 42. 5
Oerne-Falk 42. 15
Oert 771
Oetjälged 59. 1
Offänka 110. 5
Ogrodniczek 110. 4
Ohnſchwanz II. 17
Ohnvogel 845
Ohrenkolibri 679
Ohrentaucher 886
Ohrenturteltaube II. 194
Ohreule 139
Ohrhahn II. 84
Ohrkönig 148
Ohrkutz 150
Ohrmanniſch 114. 35
Ohrtaube II. 194
Oie 703
Οιναvθη II. 654
Oiſeau-brame 42. 71
Oiſeau Dunette 107. 4
Oiſeau-mouche 664 ff.
Oiſeau-royal 949
Okaitſok 72. 3
Okokolin II. 721. 331
Okudong 51. 1
Olivendroſſel II. 266
Olivenwaſſerhuhn 1116
Olor 701
Olores 701
Olyksfogel 44. 25
Ombrette 947
Omiſſew-Atbinetou 43. 26
Ommer 75. 6
Ondettutaques 99. 1
Ongalo 50. 10
Onocrotalus 844
Ooſtvogel 1084
Opernkranich 950
Opik 43. 6
Opirkſoak 43. 6
Orangen Manakin II. 749
Orangenſpecht 515
Oreb 50. 2
Oreſto 44. 12
Orfraye 42. 4
Organiſt II. 750
Orgiale 110. 3
Orhan II. 85
Orböne 103. 2
Orne 103. 2
Orrar 103. 2
Orio 52. 1
Oriolo 52. 1 ff.
Oriolus 401

Oriot 52. 1
Orites II. 772
Orix II. 390
Orkanmöwchen 832
Or-Kautz 150
Orkiaer 112. 37
Oropendola 52. 1
Oroyendola 52. 1
Orozd 107. 1
Orpheus II. 272
Orpingmiutak 112. 29
Ortolan II. 197. 400. 408. 428. 430. 434. 436. 438
Ortolano II. 410
Ortolanenpivote II. 649
Ortulan II. 410
Ορτυγες II. 133
Ortygometra 1141
Oru 50. 3
Oryx II. 390
Oryzivora II. 361. 433
Orzel-mnieyszy 42. 2
Orzel-morsky 42. 4
Orzel-tomignat 42. 4
Orzemlik 42. 118
Osprey 42. 4
Ossifragus 30
Ostarde 93. 1
Ostralegus 1109
Ostrich 96. 1
Ostridge 96. 1
Otis II. 1
Ottervogel 190. 199
Otterwindel 497
Otus 147 ff.
Ouasse 50. 13
Oueta-kee-aske 50. 13
Ouette 108. 3
Ouerissia 66
Ouroua 41. 5
Outarde II. 3
Ou-the-quan-nor-ow 59. 9
Ouyarard-Ouasson 41. 1
Ouzel II. 244
Ovevaar 84. 7
Owl 43. 1 ff.

P.

Paauw 98. 1
Pabst II. 358
Pabstvogel II. 440
Pacapao II. 328
Padda II. 361
Päfogel 98. 1
Paerssiere folle 112. 37
Pagati II. 78
Pageluhn II. 22
Pago 88. 1
Pagodendrossel II. 278
Päbkla ölk 64. 1
Pabklatraat 50. 10
Paik 68. 3
Paikpiarsuk 68. 1
Paille-en-cul 867 ff.
Paipala 103. 20
Paisse 112. 36
Paisse buissonniere 114. 3
Paisse de bois II. 485
Paisse de Saule 112. 37
Paisserelle 112. 36
Palamedea 942
Pale 80. 1
Palikour II. 297
Pallette 339.—80. 1
Palmendrossel II. 291
Palmenpapagey 258
Palmiste II. 291
Paloma 104. 1.—19
Palumbarius 76
Palombe 104. 19
Palumbus II. 172
Panicivora II. 362
Paolino 112. 25
Paon II. 22
Paon de mer 1051
Paon d'Inde II. 33
Papa 4
Papafigo 114. 10
Papagaletto 52. 1

Papagaut 45
Papagey 221. ff. 391. 392. II. 347
Papageyammer II. 439
Papageyfink II. 486
Papageykernbeifser II. 341
Papageytaube II. 176
Papageytaucher 814
Papagello 45
Papagio 45
Papaverina II. 578
Papazzino 114. 48
Pape II. 444
Papechieu 87. 2
Papera 67. 9
Paperl 308
Papilionvogel 631
Pappaufek 45
Pappegaaiduiken 69. 4
Pappuga 45
Papusfettgans 826
Papuspenguin 826
Paradiesammer II. 439
Paradieseisvogel 589
Paradiesfink II. 462
Paradiesheher 560. 588
Paradies Iacamar 589
Paradieskolibri 661
Paradiesmeife II. 462
Paradiesmerle II. 462
Paradiespapagey 249. 288
Paradiesracker 430
Paradiesfperling II. 360
Paradiestanager II. 462
Paradiesvogel 430. 442. ff. 568
Paradiesvogelkönig 446
Paradieswiedehopf 613
Paradifea 442
Paragua 274
Parakeet 246
Pararfuk 68. 1
Parat 112. 36
Pardal de San Jura 63. 1
Pardal royner 112. 37
Pardalus 1019
Pardat 112. 36
Pardel 1053. 1094
Pardelvogel 1094
Parder 1078
Pardwaftomka 86. 6
Pareola II. 740
Pariffola 116. 3
Parisvogel II. 347
Parkini 301
Parkit 245
Paronzino 116. 8. 11
Parofolino 116. 12
Parozolino II. 762. 768
Parra 1131. II. 721
Parraka II. 65
Parrot 45
Partridge II. 112 ff.
Paruckentaube II. 151
Parus 634. 671. 723. 751. ff. 757
Paruffola 116. 3
Paruffolin 116. 3
Parykdue II. 151
Pafian II. 67
Paskrat 50. 7
Pafokenne 117. 1
Paffalitorta 118. 1
Paffarilante 114. 1
Paffaros del Sol 54
Paffe-bufe II. 615
Paffe-vert II. 460
Paffe-Sourde 114. 3
Paffer II. 312. 363. ff. 375. 402. 440. ff. 450. f. 494. 536. f. 626. 718. 741
Paffera falvatica 114. 3
Pafferat 112. 36
Paffere-matto 114. 3
Pafferell vermell 112. 28
Pafferell dorat 112. 30
Pafferculus II. 538. 558. 617
Pafferes II. 139
Pafferinette II. 623

Paffe-

Pafferon 112. 36. 37.—114. 3
Paffetier 42. 118
Paffiere 112. 36
Paftetentaube II. 143
Patirich Tirich 63. 3
Patron des Marechaux 116. 3
Pau II. 22
Pauwis II. 40 ff.
Pauxi II. 44
Pavedette II. 158
Pavo 949. II. 21
Pavon 98. 1
Pavoncella 87. 2
Pavon de las Indias 98. 1
Pavone 98. 1
Paw II. 22
Pawlun II. 22
Pawuone 250
Paxaco-araneco 65. 2
Peacock 98. 1
Pechietto 114. 45
Pecuffifch 42. 21
St. Peders Fugl 70. 1
Peer-Drikker 69. 5
Peerdfchwälken II. 798
Pega 50. 13
Pegafrol 66
Pehrloe 88. 5
Peintade 102. 1
Πελαργος 962
Pelecanus 843 ff.
Πελεκανος 848
Πελεκανες 940
Pelican 746. 843. ff. 939. f. 1002
Pendolino 116. 11. 12
Pendulin II. 777
Pendulinmeife II. 778
Pendulino II. 777
Pendulinus II. 777
Penelope 759. 768. II. 36
Penguin 817. 825. ff. 840 ff.
Penkewa 112. 3
Penyellwyn 107. 1
Pennants Avofette 1107
Penquin 63. 3
Peparzka 67. 33
Pequen 160
Percepot 59. 1
Perchia chagria 114. 46
Percuffor II. 163
Perdez 103. 13
Perdezornados 963
Perdice 103. 13
Περδικες II. 116
Perdix II. 113 ff.
Perdrix 1155. II. 106. 113 ff. 1112. 107
Perd fa queue II. 773
Perdykker 69. 5
Pere-noir II. 504
Peres 42. 4
Peringleo 114. 11
Περιςεραι 145
Perkohnkaffe 86. 7
Perkohnuoffis 86. 7
Perlberghuhn II. 119
Perlemaage 910
Perlente 164
Perlhuhn II. 77
Perlin II. 78
Perlrebhuhn II. 119
Perlreiher 988
Pernice II. 111
Pernife 110
Perpelitza 103. 20
Perroquet 45
Perroquet de terre 60. 1
Perroquet de France 109. 4
Perfuper 69. 5
Peruche 232 ff.
Perükentaube II. 151
Peruquetl 308
Peftilenzvogel II. 599
Petel 101. 1
Peter-Ronsmad 114. 45
Petersmannsmad 114. 46
St. Petersvogel 832

Peteſchenfliegenfänger II. 598
Petit-rat 114. 46
Petive 43. 1
Petra 112. 37
Petragnola 114. 15
Petrat 112. 37
Petrel 832
Petronella II. 627
Pettiroſſo II. 715
Pettuſſo 114. 45
Petuſchok 101. 3
Pfäffchen II. 350. 625
Pfaffe 340. 1125. II. 810
Pfannenſtiel II. 770
Pfannenſtielein II. 771
Pfannenſtieglitz II. 771
Pfau II. 21 ff.
Pfauenfaſan II. 27. 41. 77
Pfauenpfefferfraſs 314
Pfauenreiher 948
Pfauentaube II. 153
Pfefferfraſs 313
Pfefferfreſſer 314
Pfeffervogel 314. II. 324
Pfeifammer II. 431
Pfeifdroſſel II. 259. 299
Pfeif-Endtlein 761
Pfeifente 759. 795
Pfeifer 431. 1072
Pfeiffantl 67. 33
Pfeiflerche II. 222
Pfeilſchwanz 761. 812
Pfingſtvogel 402
Pfiſterlein 1073
Pflanzenmäher II. 563
Pflanzenſäger II. 563
Pfulſchnepfe 1031. 1036. 1037 1040. 1041. 1044
Phaeopus 1021
Phaëton 828. 867
Phalacorax 844. 933
Phalaris 1127
Phalarope 1063
Phalaropus 1049 ff.
Pharaohuhn II. 79
Phaſan II. 67. 102
Phaſanenpfau II. 27
Phaſcades 772
Phaſianellus II. 88
Phaſianus II. 45. 170
Phau II. 22
Pheaſant 101. 3
Philomachus 1052
Philomele II. 606
Phöbusfliegenfänger II. 595
Phoeby-bird 113. 80
Phoenicopterus 934
Phoenicurus II. 692. 700
Φοινικουρος II. 695
Phytotoma II. 563
Piana 63. 1
Pianet 50. 13. — 59. 19
Piauhau II. 571
Pibilerke II. 216
Pic 502. ff. 560. 627
Pica 367. 374. 408. 538. 827. 1110 f.
Picae 222 ff.
Picata 50. 13
Picaveret II. 533
Picchio 59. 1. — 65. 1. 2
Pichot 112. 3
Pickmeiſe II. 755
Picicitli II. 742. 750
Pico 59. 1. — 65. 2
Picotella 59. 1
Pic-bleu 59. 1
Pic-noir 502
Pic-verd 523
Pictarne 77. 2
Picu-groſſu 109. 2
Picuipinima II. 198
Picus 405. 497. 500. ff. 547. ff. 592. 627. II. 271
Pidraſcia 95. 3
Pie 375. 439
Pie-encrouell: 44. 12
Pie-eſcrayere 44. 12

Pie-grieche 184. f. 437 f.
Piegzia 114. 6
Pienige 114. 6
Pienkawa 112. 3
Pienken II. 484
Pienu 105. 3
Pieplerche II. 222
Pierrot 112. 36
Pierſchwalbe II. 798
Piette 68. 5
Piga 50. 7
Pigazza 50. 13
Pigeon II. 140 ff.
Piglia-mocbe 114. 17
Pigoccio 59. 1 ff.
Pilard 109. 4
Pillieborra 55. 7
Pillu 1012
Piloriot 52. 1
Pimpelmeiſe II. 760
Pinca 109. 2. 112. 3
Pincard 112. 3
Pinchard 112. 3
Pinçon II. 346. 387. 394. 422. 475. ff. 506. ff. 560
Pingoin 817 ff.
Pinkawa 112. 3
Pinoſch 112. 4
Pinquin II. 10
Pinſel 919
Pinſon ſ. Pinçon
Pint 59. 9
Pintaden 838
Pintadó II. 79
Pin-tail 67. 28
Piombino 61. 3
Pione 109. 4
Piot 50. 13
Pipe II. 31
Piphuhn II. 33
Pipiri 201
Pipit II. 702. 707. 709
Pipit-bleu II. 706. 709
Pipit-verd II. 707
Pip-Lerche II. 223
Pipoletta 105. 4
Pipra II. 739.—59. 19
Pique-boeuf 332
Pirol 401 f.
Pirold 403
Pirouat 105. 3
Piſangdohle 436
Piſangazeldohle 436
Piſangdroſſel 421
Piſangfink II. 539
Piſangpirol 422
Piſangvogel 421
Piſcator 114
Piſchik 1087
Piſpanti 105. 1
Pitangua 204
Pitarotti 114. 45
Pitchou II. 633
Pithyornus II. 425
Pitirozo 114. 25
Pitiu 521
Pitri 42. 16
Pitrion 42. 16
Pitſchal 65. 2
Pitſchard 65. 2
Pitſchou II. 633
Pittara 95. 3
Piula 67. 27
Piuli 105. 4
Pive 109. 4
Pivinello 87. 13
Pivoine 109. 4
Pivote II. 649
Pizzardella 86. 6
Plancus 845. 855
Planga 42
Planot 59. 1
Plapperer 435
Platalea 937
Platea 937
Plattenmeiſe II. 766
Plattſchnabel 555. ff. II. 578
Plauderer 266. 435

Plauderrackervogel 391
Plautus 815. 824. 827. 836. 841. 872. 901. 910. 913
Pliſka-paſtariza 114. 11
Pliszka 114. 11
Plongeon 877
Plotus 864. 1106
Plougeller 87. 13
Plover 1086
Pluiero 86. 10
Plümagenente 791
Plumente 715. 791
Pluvialis 1038. 1083. 1094
Pluvier 1088 ff.
Poana 42. 15
Pocbe 80. 1
Poeliceps 870 ff.
Podleſk 10. 3. 9
Podobe II. 316
Podoroshink 110. 1
Poello-Tilder 86. 6
Poe-Vogel 83. 18
Pokerl 86. 8
Pokrzywka 114. 46
Pola 50. 6
Polarente 815. 820. 878
Polarhalbente 878
Polarmeve 913
Polartaucher 878
Pöldpii 103. 9. 13
Poligola 116. 3
Poliopus 1122
Polmeve 913
Polsk-Edelmand 87. 8
Polſyk 59. 1
Polyglotta II. 272
Polyglottus II. 270
Polytunus 660 ff.
Pomeranzvogel 1090
Pompadour II. 328
Pompadurtaube II. 171
Ponnandutty 50. 13
Ponnunky-pitta 50. 13
Poopoo 581
Popek 109. 4
Popinjay 45
Porphyrio 1115. ff. 1119
Port-Iackſon-Droſſel II. 320
Porzana 1144 f.
Porzane 91. 4
Porzanone 1118
Poſſenreiſſer 1089 f.
Poſtoka 42. 16
Poſtoina 42. 39
Poſttaube II. 158
Potamida 114. 6
Pouacre 997
Poucbari 44 12
Pouillot II. 725. 726. 728
Poul II. 724
Poule d'eau 1117
Poule d'Inde II. 33
Poule de neige 103. 4
Poule Sultane 1120 ff. 1141
Povodni Koß 106. 5
Poyana 42. 12
Praka 344
Praeſt 69. 4
Praeſtekratte 1085
Praeſtekrave 88. 1
Pratincola 1111
Predicatore 110. 3
Prediger 318
Preneur des Mulots 42. 16
Preneur des Paſſes 42. 118
Preſaire 43. 8
Prib 108. 1
Prieſtergürtel II. 233
Pribkſcbke 67. 33
Prip II. 327
Procellaria 830
Promerops 608. ff. 612 ff.
Protonotar II. 668
Proyer II. 406
Prunelle II. 615
Prunellerl II. 617
Prunell-Grasmücke II. 615
Przedney 42. 5

Prze-

Przepiorka 103. 20
Ψαρ II. 239
Ψαρος II. 239
Psittacula 822
Psittacus 222
Psophia 1154
Pstry-Kulyk 87. 13
Ptak-bitny 87. 1
Ptakraysky 109. 3
Ptarmigan II. 96
Pterophoenicus 413
Ptynx 865
Pudda campana 95. 3
Pudda d'aba 91. 4
Pudda de matta 86. 6
Pudda de mudeja 86. 6
Puddighina de matta 92. 2
Pudelschnepfe 1035. 1042
Puder II. 30
Puffin 815. 839
Puffinmöwe 834
Puffinvogel 839
Puffinus 830. 839
Puglietta 91. 4
Puhacz 43. 1
Puhi 139
Puhlschnepfe 1043
Puhuy 139
Puhze 43. 7
Pu-Kornstaja 59. 1
Pukteralik 76. 8
Puliga 91. 2
Pullugak 50. 2
Pulmu 110. 1
Pulmuinen 110. 1
Pulross 1078. 1094
Pulzonzino 116. 11
Pulvier 1094
Pumilio II. 53
Pümpelmeise II. 761
Punsch Eule 162
Pupin 839
Puppukis 64. 1
Pupusa 64. 1
Puput 64. 1
Purpurazeldohle 438
Purpurdohle 438
Purpurdrossel 412. 437
Purpurfink II. 544
Purpurhänfling II. 539
Purpurhuhn 1119
Purpurkehle II. 463
Purpurklette 639
Purpurklepper II. 391
Purpurköpfchen 637. 751
Purpurreiher 968. 992. 1010
Purpurschwalbe II. 795
Purpurvogel 639. 1120
Purrhöns II. 51
Purzeltaube II. 151
Pustolka 42. 16
Puszcyk 43. 4
Puszczk 43. 7
Putchen II. 31
Puter II. 30
Puterhahn II. 30
Puthe II. 31
Putspassarat 103. 20
Putta 50. 13
Putter 112. 7
Putwista 43. 7
Puzzone di Sante Martinu 61. 3
Pye 50. 13
Pygargus 105
Pygmaeus 857
Pylsteert 762
Pyrol 403
Pyrrhocorax 383. 561
Pyrrhula II. 337. 349

Q

Quachilton 1119
Quackel II. 131
Quackente 754
Quäcker II. 482
Quäckfink II. 482
Quackreiher 965
Quaderviz 103. 20
Quaglia II. 133

Quail 103. 20
Quakel II. 129
Quakkel 103. 20
Qvalea II. 130
Quällknarren 118. 1
Quan II. 37
Quan 107. 3
Quapachtototl 478
Quaquila II. 130
Quärn-Kald 106. 5
Quatotomomi 506
Quatoztli II. 466
Quattr' Ocbi 67. 23
Quauhtzonecolin II. 128
Quecker II. 483
Queckſterz II. 637
Queckſtaart II. 638
Quellje 767
Quercerelle 42. 16
Quereiva 332
Querquedula 769. 773. 778. 797
Querula II. 531
Quetele 102. 1
Quethu 829
Quetrantabueſſos 42. 4
Quetſch II. 351
Quetſchfinke II. 485
Queue de Poitou 116. 11
Quicaſtiert II. 653
Quidvogel 42. 15
Quiin-Ander 755
Quijubatui 239
Quikketield 86. 11
Quina 105. 4
Quinçon de montagne 112. 4
Quinde 66
Quinſon II. 480
Quintli 66
Quion-quion 114. 46
Quirizui 100. 1
Quiſcula 438. II. 130
Quiſquila II. 130
Quitmaaſe 910
Quittenhänfling II. 533

R.

Raab 340
Raabe 391
Raaf 50. 2
Raage 349. 356
Rääſt 107. 1
Raatgaas 334
Rab 337
Rabaillet 42. 16
Rabalino 103. 4
Rabe 222. 307. 326. 336. 6. 344. 351. 391. 396. 1125
Rabenkrähe 340
Räbhuhn II. 113
Räbhun II. 112
Rabiborcado 72. 2
Raboforcado 72. 3
Racbaeme 41. 5
Rachamah 12
Rache 390
Rackelhaner II. 93
Racker 391
Rackervogel 391
Rädbeener 1040
Radgans 734
Ragazza 50. 13
Ragazzvia 44. 12
Rähn 59. 17
Raia Allia 43. 14
Rail 93. 1
Rainfowl 59. 12
Rake 391
Rakettenkolibri 688
Rakettenfliegenvogel 688
Rakkelhanar II. 93
Rale d'eau 93. 2
Rale de genet 93. 1
Rall 928
Ralle 1138 ff.
Rallus 928. 1117. 1136. 1138 ff.
Ramphaſtos 313
Rantvan-kondea 55. 7
Ranun 114. 1

Ranz·

Ranzeule 148
Ranzugle 43. 8
Raphöne 103. 13
Raphus II. 19
Rapischkin II. 675
Raporino 59. 1
Rappe 341
Rappfink II. 372
Rapp-boena 103. 13
Rara II. 563
Räsgenkopf 746
Ratereau 114. 46
Rätschen 283
Ratschente 789
Rathsherr 900
Ratier 42. 16
Ratillon 114. 46
Ratza 67. 40
Räuber 18
Raubfalk 99
Raubkrähe 345
Raubvögel 1
Rauch 348
Rauchfuss 47. II. 93. 148 ff.
Rauchfussadler 42
Rauchfussfalke 47
Rauchfussgeyer 84
Rauchkopf 576 f.
Rauchschwalbe II. 781
Rauchsperling II. 549
Raudowa 67. 31
Raudewith 67. 31
Raudbriftlingr 1080
Raudrosa 58. 18
Raupentödter 438
Raven 50. 2
Raverin 112. 7
Ravn 50. 2
Ravn-Kaate 50. 6
Ray-Gaas 734
Razor-bill 820
Reatin 114. 49
Reatino 114. 45
Rebêtre 114. 46
Rebhuhn 1046. II. 99. f. 109. ff. 113
Rebhuhnsschnepfe 1044
Recurvirostra 1105
Re d'alipinti 109. 2
Re di Siepe 114. 45
Re di Macchia 114. 45
Re di Quaglia 93. 1
Redpole II. 526. 530
Redstaart 114. 34
Redtail 114. 35
Redwing 107. 3
Regaliolus II. 724
Regenbogenspecht 674
Regenbogenvogel 680
Regenkatze 403
Regenkuckuck 473
Regenpfeiffer 1078. 1083
Regenschnepfe 1037
Regenvogel 1021
Regenwölp 1018
Regenworp 1017. 1021
Regenwulp 1017. 1021
Regeyo 52. 1
Regillus II. 724
Regina aurarum 5
Regn-Spaaer 86. 3
Regulus II. 720. 728
Rehlein II. 493
Rehusak II. 100
Reigalbero 52. 1
Reigel 972
Reiger 969. 985
Reiger-Ente 796
Reigerfalk 99
Reihel 970
Reiher 945. 948. ff. 963. ff. 969 ff.
Reinschwalbe II. 794
Reissammer II. 433
Reissdieb II. 433
Reissfink II. 361. 434
Reissfresser II. 361
Reisskernbeisser II. 362

Reiſsmäher II. 361
Reiſsortolan II. 434
Reiſspirol 414
Reiſsvogel II. 361. 434
Reitenmeiſs II. 767
Rekbolter 107. 2
Remaſſoff 116. 12
Remes II. 778
Remez 116. 12
Remezawyptak 116. 12
Remicz 116. 12
Remiſch 116. 12
Remitſch 116. 12
Remitz II. 777
Rendeſteens-Snager 114. 11
Renomiſt 1050
Repphuhn II. 113
Reuter 1056. 1070. 1134
Reutervogel 444
Revezal 114. 34
Rexavium II. 724
Rex Warwouwarum 4
Reyger 965
Reyhengans 734
Rhaad II. 9
Rhea II. 17
Rheinente 810
Rheinreiher 972
Rheinſchwalbe II. 793
Rheintaucher 809
Rheinvogel 1123. II. 793
Rhinoceros 327
Rhyndace 615
Ribitw 76. 2
Richau 50. 7
Riche-prieur 112. 3
Ried-Meiſslein II. 768
Riedſchnepfe 1027. 1031. 1042
Riemenbein 1099
Rieſe 673. 975
Rieſengans 706
Rieſenlerche II. 233
Rieſenpelikan 845
Rieſenreiher 975
Rieſenvogel 836
Riethahn II 84
Rietmeiſe II. 774
Rietmeiſs II. 767
Rietſchnepfe 1027. 1031
Rieuſak 103. 4
Rigogalo 52. 1
Rindenkleber 617
Rinderſtaar II. 237
Rinderſtelze II. 732
Rindmeislein II. 766
Ringamſel II. 233. 707
Ringdroſſel II. 307
Ringduif 104. 19
Ringel-Duc 104. 19
Ringelfalk 98. 105. 107
Ringelfink II. 481. 546
Ringelgans 710. 732
Ringelkönig II. 719
Ringelkuckuck 517
Ringelmeve 900
Ringelrabe 326
Ringelralle 1146
Ringelſchwanz II. 168
Ringelſpatz II. 537
Ringelſperling II. 537
Ringeltaube II. 168. 172. 179 ff.
Ringente 757
Ring-Gaas 67. 4
Ring-Giäs 710
Ringkragen II. 593
Ringlerche II. 230
Ringmerle II. 308
Ring-Oie 67. 23
Ring-Ouzel 107. 23
Ringpapagey 252
Ring-pigeon 104. 19
Ring-Sparrow II. 535
Ringſperling II. 535
Ringtaube II. 173
Ringtroſt II. 309
Ringvia 874
Rinnenſchnabel 840
Ripariola II. 794

Riſet II. 523
Riſſa 896
Ritſa 76. 1
Rittelgeyer 111
Rittertaube II. 162
Rittlweyer 111. 113
Riupa II. 96
Roc 41. 1
Rocheraie II. 146
Röd-Baelle 67. 4
Rödbeen 86. 12
Röd-Hals 114. 45
Röd-Kielke 114. 43
Röd-Finke 114. 45
Rodler II. 148
Röd-Nakker 768
Röd-tiuxa 44. 25
Roek 348
Roep-Eand 67. 20
Roerdomp 84. 21
Roedſtjert 114. 34
Roeteln II. 713
Rohrammer II. 435
Rohrammering II. 437
Rohrbrüller 948
Rohrdommel 982. 983. 997
Rohrdroſſel II. 314. 435
Rohrfalke 57. 59
Rohrgeyer 71. 73. 107
Rohrgrasmücke II. 627
Rohrhahn 1125
Rohrhenne 1125
Rohrhennl 1118
Rohrhühnlein 1117
Rohrmeiſe II. 778
Rohrmeve 922. 927
Rohrmotacille II. 711
Rohrpompe 984
Rohrſänger II. 626
Rohrſchliffer II. 627
Rohrſchnepfe 1034
Rohrſchwalm 922. 927
Rohrſpar II. 437
Rohrſpatz II. 436. 555. 775
Rohrſpatzlin II. 437
Rohrſperling 922. II. 314. 435. 626
Rohrtrumm 984
Rohrtrummel 984
Rohrwrangel 194
Rohrwürger 194
Rohrzeiſig II. 746
Roi bedelet 114. 46
Roi bertaud II. 719
Roi bery 114. 46
Roi boazi 114 46
Roi de Cailles 1140
Roi de froidure 114. 46
Roi des Vautours 5
Roitelet II. 717
Roka 50. 4
Roller 391. 392
Rollier 379. 392. ff. II. 122
Romiſch 116. 12
Rondine 117. 1 ff.
Rondinella 117. 1
Rondone II. 784 ff.
Rondola 117. 1
Ronekalv 90. 1
Ronkje 670
Ronſcha 50. 7
Rooche 348
Rook 50. 4
Rooke 348
Roper 43. 1
Ror-Drum 85. 12
Rordrumb 985
Ror-Höne 91. 2
Rorreigel 984. 987
Ror-Sneppe 86. 8
Rör-Spurv II. 436
Rortrumm 984
Roſelle 107. 3
Roſenkehlchen II. 386
Ros-Gouge 87. 13
Roſpedino 116. 3
Roſsdroſſel II. 308
Roſsente 790

Rofsgeyer 13
Roffignol II. 607. 693
Roffignol moner 109. 4
Roffignol d'hiver 112. 3
Roftbürzel II. 425
Roftflügel II. 224
Roftweihe 71
Roftz 93. 1
Rotborftje 114. 45
Rötelein II. 713
Rötel-Geyer 112
Rötel-Weyh 51. 111
Rotfüfsel 1039
Rotganfen 735
Rotgel 114. 45
Rothauge II. 422. 581. 631
Rothbacken 520
Rothbart 779. II. 712
Rothbauch 316. 518
Rothbäuchlein II. 693
Rothbein 904. 1038. 1055
Rothbläfschen 1117
Rothböfter II. 526
Rothbruft 1025
Rothbrüftlein 677
Rothbrüftchen II. 712
Rothdrofchel II. 260
Rothdrofchl II. 261
Rothdroffel II. 259
Rothgeyerlein 112
Röthelgeyerlein 112
Röthelweihe 111
Rothfalke 126
Rothfink II. 350. 477
Rothfufs 1038
Rothfufsgans 730
Rothfüfsler 1039
Rothgans 733
Rothhals 669. 741. 760. 767. 891 1046
Rothhalsgans 727
Rothhälslein
Rothhänfling II. 519
Rothhuhn II. 103. 110
Rothkappe 689
Rothkehlchen II. 692. 705. 712
Rothkehlein II. 705
Rothkehle II. 714
Rothknillis 1114
Rothnuffel 1114
Rothkopf 767. II. 359. 525. 529. 684. 744
Rothkröpfchen II. 712
Rothkröpplein II. 712
Rothlerche II. 218
Röthling II. 692
Rothfchenkel 1039 f.
Rothfchlegel II. 350
Rothfchnabel 247. 911. 366. II. 741
Rothfchwanz 264. 680. II. 347. 388. 466. 692. 698. 700. f. 704
Rothfchwänzchen II. 692
Rothfchwänzlein II. 388. 577. 700
Rothfpecht 530. 535
Rothfperling II. 555
Rothfterz II. 692
Rothftiert II. 693
Rothvogel II. 329. 355. 606
Rothvögelchen II. 488
Rotges 733
Rotjes 733
Rotkropff II. 713
Rotte-Finke II. 480
Rott-Endtle 794
Rotteke 69. 5
Rötteren 76. 1
Rott-Hals 794
Rott-Hun II 104
Rott-Kopf 794
Rottroftel II. 259
Rottvogel II. 350. 490
Rottzagel II. 693
Rotzägel II. 693
Rouch 348
Roucherolle II. 314

Rouck 348
Rouge-bourse II. 715
Rouge-gorge II. 705. 713
Rouge-queue II. 700
Rough-footed Dove 104. 1. ε
Rouloul II. 170
Roupie II. 715
Rousette 110. 5
Roussalan 112. 1
Rousserolle II. 314
Roussette II. 618
Roussignol II. 610
Rouverdin II. 559
Rowert II. 482
Rubbens 103. 2
Rubecula II. 697. 705. 712
Rubeline II. 715
Rubetra II. 605. 742
Rubicilla II. 352. 387. 694
Rubicola II. 660
Rubienne 114. 45
Rubiette 114. 45
Rubin 677. II. 528
Rubinkrone II. 719
Ruch 41. 1
Ruche 114. 45
Ruck 348
Ruderente 749
Rufhuhn II. 113
Ruhrdrump 985
Ruhrspaarling II. 314. 436
Ruigpooten 104. 1. ε
Ruissenot 114. 1
Rulissar 105. 2
Rund-pigeon 104. 1. δ
Rundschnabel II. 387. 393
Rupicola II. 739
Ruses innocentes 112. 4
Rusgenkopf 796
Russignuolo 114. 1
Rusticola 1028
Ruticilla II. 694. 704
Rutte 86. 6
Rüttel-Weyh 51. 64
Ryle 1004
Rynchops 932
Rypen II. 95
Rytsa 897
Rzecholka 117. 1

S.

Saatkrähe 347
Saatlerche II. 207
Saatrabe 348
Saatvogel 1021
Säbelschnabel 1006
Säbelschnabler 1105
Sach 20
Sacre 95
Sacker 94
Sackgans 845
Säd-Giek 58. 1
Safran-bacha 45. 7
Sagan 90. 1
Säger 801. 806
Sägeschnäbler 801. ff. 806. 808
Sägetaucher 801. ff. 808
Sagyser 1004
Saisl 112. 25
Sakerfalk 94
Sakvia 101. 1
Salaczac 565
Salangane II. 786
Salbakke II. 794
Salicaria II. 627
Sallian 96. 3
Sälsort 107. 22
Samarmar II. 284. 319
Sammetente 712
Sammethosen II. 58
Sammethuhn 1142
Sammethünlein 1143
Sammetvogel 712
Sandhuhn 1111. II. 108
Sandläufer 1068. 1073. 1075
Sandläuferl 1074
Sandlo 1085
Sandloe 88. 1
Sandmartin 117. 4

Sandmuling 1084
Sandpfeifer 1063. 1073
Sandreger 997
Sandregerlein 1084
Sand-Rönne 88. 1.—117. 4
Sandſchwalbe II. 793
Sand-Sneppe 88. 1
Sandſtrandläufer 1111
Sand-Sulu 117. 4
Sandtal 923
Sandtärne 923
Sandvogel 1084. 1112
Sandvriſter 1085
Sandwachtel II. 134
Sangdroſſel II. 263. 267
Sangdruſchel II. 263
Sänger II. 268. 272. 605. ff. 634. 668. f. 671. 678. f. 688. f. 710. 726. 728
Sangkernbeiſser II. 382
Sanglarke 105. 1
Sanglerche II. 207
Sangſchwalbe II. 805
Sanſonnet II. 239
Saogouk 58. 1
Saphirkolibri 684
Sarbarſuk 87. 3
Sarcelle 752. ff. 770
Sare 112. 16
Sarguarſuk 87. 3
Saroi-bura 117. 2
Saron-baeron 117. 2
Sarpak 75. 1
Sarſir 106. 1
Saſcharei 50. 13
Saſchnga 50. 13
Sashabe 298
Sattelkrähe 351
Satyra II. 36
Saukt 112. 37
Saulocker II. 692
Savigala II. 287
Sauer-And 67. 32
Savannenfliegenfänger II. 567
Sau-Sarai 67. 121
Sav-Orre 75. 8
Sayacu II. 468 f.
Scalucher 853
Scaluer 853
Scarchir 67. 120
Scarino 112. 7
Scarzerin 112. 17
Scaut 69. 1
Schabbelſchnabel 1106
Schach 204
Schäckchen 774
Schackruthgen II. 625
Schagguta 50. 13
Schaeghagha 63. 1
Schakarnel II. 39
Schaker II. 254
Schalach 84. 12
Schalac 57. 1
Schalaſter 374
Schallente 746. 757
Schaluchorn 852
Scharbe 852
Scharbege 806
Scharlachfink II. 541
Scharlachſperling II. 453
Scharlachvogel 270
Scharlatkehlein 556
Scharlatvogel 270
Scharlattaube II. 187
Schartenſchnäbler 935
Schaſchaph 57. 1
Schattenvogel 947
Schättgen II. 531
Schaufelente 947
Scheck 1079
Scheckente 809
Scheerenfalk 55
Scheerengeyer 47
Scheerke 928
Scheermeſſerſchnäbler 819
Scheerſchnabel 819
Scheerſchnäbler 820
Scheerſchwänzel 49

Scheer-

Scheerschwanz 183
Scheidenschnabel 1131
Scheidenvogel 1131
Scheissfalke 914
Schelladler 42. 57
Schellente 757
Schellentenadler 42
Scheller 387
Scheriau 84. 4
Scherr-Endtlin 751
Schet II. 565
Schet-all II. 565
Schet be 44. 17
Schet-Vululu II. 565
Scheuneule 178
Schiebgen II. 436
Schieldrake 709
Schiffschwanz 436
Schiffsvogel 840
Schiguris 84. 4
Schild II. 129
Schildamsel II. 308
Schildente 745. 790
Schildfink II. 478
Schildhahn II. 89
Schildkrähe 350
Schildnachtigall II. 704
Schildreiher 965
Schilfdornreich II. 627
Schilfdrossel II. 314
Schilfmeise II. 774
Schilfschmätzer II. 436. 626
Schilfstaar II. 246
Schillerdrossel II. 282
Schillermerle II. 459
Schilochwostka 67. 28
Schiltkrahe 353
Schimmel 717
Schindelkriecher 617
Schingau II. 116
Schinkenmeise II. 755
Schirley II. 466
Schitscherling II. 531
Schittreiher 969
Schlachter 102
Schläcke II. 228
Schlaghan 883
Schlagtaube II. 143. 172
Schlagwachtel II. 129
Schlangenfresser 18
Schlangenhabicht 55
Schlangenhals 865
Schlangenkopf 864
Schlangenvogel 864
Schleuer-Auffe 167
Schleyer-Auffe 165
Schleyereule 161. 164
Schleyersperling II. 746
Schleyertaube II. 150
Schlicht-Endte 807
Schluchent 806
Schlucker 852
Schlupfkönig II. 716
Schmakowaja-Utka 67. 118
Schmalente 790
Schmarotzermeve 913
Schmelichen 790
Schmelvogl II. 235
Schmerl 125. 126
Schmerling 127
Schmervogel II. 215
Schmetterling 631
Schmiering 1123
Schmierlein 126. 128
Schmil-Endte 790
Schmirring 1123
Schmittel II. 725
Schmünten 760
Schnarchhuhn II. 92
Schnarf 1139
Schnarrdrossel II. 249
Schnarre II. 249
Schnarrente 750
Schnarrgans 803
Schnarrichen 1139
Schnarker 1139
Schnarrkormoran 858
Schnarrs 1139

Schnarrwachtel 1139
Schnärz 1139
Schnarrziemer II. 251
Schnatterente 749
Schnatterer 783
Schneck 314
Schneeammer II. 399
Schneedohle 355
Schneedrossel II. 308
Schneeeule 156
Schneefink II. 482. 508
Schneegacke 355
Schneegans 706. 845
Schneegeyer 137
Schneehase 96
Schneehuhn II. 94. 95. 99
Schneekönig II. 716
Schneekrähe 357
Schneelerche II. 231. 400
Schneeleschke II. 327
Schneemeise II. 770
Schneemeve 931
Schneemerkur II. 100
Schneeortolan II. 399
Schneesperling II. 399
Schnee-Vogel II. 327. 399. 405
Schneffa 86. 6
Schneiderbachstelze II. 730
Schneidervogel II. 730
Schnepf 1004. 1011. 1107
Schnepfe 1015. ff. 1026. 1057. 1070. 1080
Schnepfchen 1031
Schnepfenkuckuck 480
Schnepfenreiher 999
Schnepfensandläufer 1067
Schnepff 1027
Schneppe 1026
Schnepphuhn 1026
Schnerre II. 251
Schnerz 1139
Schnibbe 1031
Schnid II. 351
Schniegel II. 350
Schnippentaube II. 163
Schnirring 922
Schöbbeje 803
Schoenobenus II. 618
Schoeniclus 1076. II. 435
Schoffelaar 80. 1
Schoia 361
Schollenhüpfer II. 660
Scholucher 853
Schondokon 59. 1
Schonhudrossel II. 274
Schopfente 796
Schopfdrossel II. 571
Schopfheher 364
Schopflerche II. 225
Schopfmeise II. 752
Schopftaube II. 151
Schorsteinfeger II. 387
Schösserle II. 531
Schösszerlein II. 530
Schösslein II. 528
Schottengans 861
Schottische Gans 733. 860
Schreckvogel 806
Schreech-Owl 43. 8
Schreyer 42. 1088
Schreydrossel II. 269
Schreyfalk 136
Schreykibiz 1088
Schreyvogel II. 39
Schryck 1139
Schrye 86. 3
Schtschura 63. 1
Schtschurka 63. 1
Schubbe 112. 3
Schubut 139
Schubuteule 139
Schuffel 80. 1
Schuffler 939
Schufut 139
Schuhu 139 f.
Schuifuit 43. 1
Schuluer 853
Schulz von Bülau 405

Schulz von Milo 403
Schuna 59. 1
Schuppdroſſel II. 571
Schuppenente II. 778
Schupkönig II. 717
Schups 796
Schüttelkopf II. 153
Schwäderlein II. 502
Schwalbe II. 781
Schwalbenfalke 51. 116
Schwalbengeyer 23. 116
Schwalbenmeve 923
Schwalbenſchwanz 49. 54. 588 ff.
Schwalbenſpecht 509
Schwalbenſtieglitz II. 491
Schwalm II. 782
Schwan 694. ff. 705
Schwanentaucher 845
Schwangans 696. 703 f.
Schwanzeisvogel 595
Schwanzente 764
Schwanzkiwiz 1088
Schwanzmeiſe II. 770
Schwanzſperling II. 440
Schwanztaube II. 201. 203
Schwanzwiedhopf 613
Schwarzbart 252
Schwarzbärtchen II. 529
Schwarzdroſſel II. 301
Schwarzflügel 104
Schwarzflügler II. 356
Schwarzkamm 613
Schwarzkäppchen II. 662
Schwarzkappe II. 662
Schwarzkehle 453
Schwarzkehlchen 631. II. 692. 709
Schwarzkehlein II. 637
Schwarzkopf 186. 408. 549. 796. 921. 1095. II. 382. 566. 662
Schwarzköpfchen II. 763
Schwarzkragen 1089
Schwarzmeiſe II. 768
Schwarzplatte II. 663
Schwarzrücken 705
Schwarzſchnabel 818. 1057 f.
Schwarzſchwanz II. 651
Schwarzſpecht 501. 509 ff.
Schwarztaucher 1126
Schwätzer II. 324. 579
Schwederle 112. 17
Schweimer 103
Schweitzereinſiedler 387
Schweitzereremit 387
Schweitzerkiebitz 1067
Schweitzerkrähe 385
Schweitzerrabe 385
Schwemmerfalke 103
Schweymer 102
Schwienhierd II. 658
Schwimmer 49. 102. 114. 116
Schwimmſchnepfe 1025
Schwimmvögel 694
Schwoinz II. 372
Schwonez 109. 27
Schyf-Taling 67. 33
Scolopax 1015 ff.
Scops 154. 951
Scopus 947
Scrage 77. 2
Scricciolo 114. 45
Scythe bill &Heron 84. 21
Scythrops 322
Sczygiel 112. 7
Sea-Crow 78. 1
Sea-Lark 88. 1
Sea-Pheaſant 67. 28
Sea-pie 90. 1
Secretair 17
Sedge-bird 114. 8
Seeadler 30
Seeamſel II. 243
Seelſter 815
Seeente 712. 794. 796
Seefalk 59
Seefaſan 855

Seeflunder 882
Seegler II 670. 835
Seehahn 878. 883
Seehahntaucher 879
Seeheher 855
Seekrähe 855. 901
Seelerche 1058. 1083
Seemeve 901. 906 f.
Seemornell 1058
Seemöve 907
See-Orre 713
Seepapagey 283. 815
Seeparkit 822
Seepfau 949. 1050
Seepferd 834
Seerabe 802. 851. 861
Seerache 802
Seerebhuhn 1111
Seerothkehlchen 876
Seeschwalbe 599. 905. 913. 921. 930
Seeschwalm 913
Seestaar II. 283
Seetaube 824. 871. 875. 1096
Seetaucher 570. 879
Seeteufel 883
Seewasserrabe 853
Sef-Oend 884
Segler 670. 835
Sehmalis 87. 1
Seidenbracher 1007
Seidenschwanz II 323 ff.
Seidenschwanzdroßel 561
Seidenschweif II. 324
Seidenstaar II. 247
Seidenvogel II. 331
Seidenvögelchen II. 726
Sekeep 75. 19
Sekretairvogel 17
Selenoi-Kleſt 109. 1
Seleucis II. 284. 319
Selningur 1072
Selfort II 303
Semala-Kiwitis 87. 1
Semetro 114. 17
Semeur 114. 11
Senator 901. II. 724
Senegali II. 367. f. 503
Sengo 382
Senicle II. 503
Sep. Popielaty 41. 12
Septicolor II. 462
Serbak 75. 1
Serce 114. 48
Serin II. 502
Serinus II. 502
Serrant II. 515
Serrator 801. 806. 809
Serre-fine II. 757
Serre-montagnarde 107. 2
Serrurier 116. 3
Shag 72. 4
Shagareg 393. 396
Shanhu II. 274
Sharzek 106. 1
Shearwater 837. 839
Shelaw 103. 20
Sheld-appli 109. 1
Sheldrake 67. 4
She-pecuni-memewuok 50. 13
Sheregrig 395.
Shipomas-pish 43. 12
Shore bird 117. 4.
Shoveler 67. 19
Shraekke 68. 1
Shrite 107. 1
Shul-fall 112. 3
Shwapulis 109. 4
Sialis II. 705
Sichelente 751
Sichelreiher 1001 ff.
Sichelschnabel 822. 1003
Sichelschnepfe 1007
Sichler 1004
Sidenſvands 108. 1
Sidenſwanz 108. 1
Sidſe-Rönnike 112. 28
Siele-colore 112. 7

Siffleur 107. 3
Sigba 95. 1
Sigurtok 86. 7
Sihdeaſt 108. 1
Sible 116. 3. 5
Siisgen II. 517
Sikora - Zdiugim - ogonem 116. 11
Sikora - czarna - mnieyſſa 116. 7
Sikora - czubata 116. 2
Sikora - mod'ra 116. 3
Sikora - popielata 116. 8
Sikorna 116. 3
Sikvi 101
Silberfaſan II. 70. 74
Silberreiher 973
Silberſchnabel II. 450
Sildemaage 909
Sildeperris 873
Sild - Maage 76. 7
Sillawabrns 50. 7
Siltane - rääſtas 63. 1
Simmeren 107. 2
Simmerſnarre II. 251
Simon II. 681
Sincialo 247
Singdroſſel II. 259. 263
Singkernbeiſser II. 382
Singſchwan 694
Singvogel II. 139
Sino - Tytlingur 110. 1
Sinſonte II. 270
Sioelaerka 110. 1
Siokakiſtok 67. 5
Sirguerito 112. 7
Sirkſariarſungoak 87. 3
Sirli II. 218
Sirſair 795
Siſcben 112. 25
Siſelle 107. 4
Siſerre II 352
Sisgen II. 517
Siſiken 112. 25
Siska 112. 25
Siskin II. 517
Siſſerönnike 112. 29
Sitta 544. ff. 548
Sittich ſ. Sittig
Sittich - Lori 231
Sittig 222
Sittvogel 222
Siu II. 521
Siutitok 43. 3
Siutut 104. 19
Sivigio 114. 48
Sizerin 112. 29
Skade 376. II. 156
Skajite 76. 10
Skalleſluger 805
Skära 50. 13
Skarfur 72. 4
Skartſen 853
Skarv 72. 3
Skaft 31
Skata 50. 10
Skate 50. 13
Skegea - Ritur 897
Skiarre 378
Skid - Heyre 84. 12
Skierro 76. 2
Skiör 376
Skiorand 804
Skiör - Vünge 42. 15
Skiurra 50. 13
Sklav II. 463
Skoarra 749
Skodde - Fugl 87. 8
Skode - Fole 87. 13
Skoetſcb 42. 16
Skoppia 42. 26
Skorſteensſvale II. 790
Skovlarke 105. 3
Skovl - Neb 80. 1
Skovſkade 50. 7
Skovſnarre 1140
Skovſpurre 112. 37
Skovſpurv II. 555
Skowronek 105. 1

Skozzetta 105. 2
Skraap 70. 6
Skrabe 839
Skräkan 68. 1
Skräke 807
Skrake 68. 1
Skred-Heyre 84. 12
Skrie 72. 3
Skrug-Kield 1040
Skrzwan 105. 1
Skua 915
Skude 104. 19
Skur 110. 5
Skure 76. 7
Skworez 106. 1
Sky lark 105. 1
Slaetfalk 42. 13
Slaghön 42. 28
Slangen-Vreeter 42. 1
Slauſz 114. 1
Slawick 114. 1
Sliepuſchka 59. 1
Slowik-Wiekszy 114. 1
Sma 72. 4
Smalle-Bot 1063
Small green hanging-bird 113. 81
Smaragdkolibri 684
Smaragdparkit 246
Smarnza 114. 45
Sma-Spue 86. 4
Smerda Kaura 64. 1
Smerduch 64. 1
Smerillus 126
Smew 68. 5
Smilges 109. 4
Smirle 103
Smirlein 127
Smittl II. 726 f.
Smortitu 107. 2
Smyrle 127
Smyrlin 127
Snake-Hawk 42. 25
Sneedſe 116. 3
Sneefugl II. 401
Sneekok II. 401
Snee-Rype 103. 4
Sneppe 86. 6
Sneppert II. 163
Sneeſpurre 110. 1
Snee-Titing 110. 1
Snetuppa 108. 1
Sniegula 110. 1
Sniozniczka 110. 1
Snio-Tytling II. 401
Snio Tytlingur II. 401
Snipe 1015
Snippert II. 164
Snitza 116. 5
Snöfparf 110. 1
Snov-Bunting 110. 1
Snow-fleck 112. 3
Snoripa 103. 4
Snöskata 107. 2
Snovogel 110. 2
Snow-Bunting II. 400
So 103. 4
Sobmer 909
Societätsfliegenfänger II. 597
Soco 388
Soë Höne 75. 8
Soë Horre 75. 8
Soë-Konge 69. 5
Soelſkin-Stöd 86. 11
Soelſkrigger 110. 1
Soel-Skrikia 110. 1
Soë-Orre 67. 5
Soeſtierne 813
Soeſvale 926
Soke 772
Sokol 42. 13
Solandgänſe 861
Sol Bakke 117. 4
Solend 861
Solitaire II. 311 f.
Solvet 897
Sommerdroſſel 403. II. 263
Sommerente 791

Sommerhalbente 772. 774
Sommerhämpling 112. 28
Sommerkönig II. 726
Sommermerle II. 455
Sommermotacille II. 729
Sommerrötele II. 694
Sommertanager II. 455
Sommertyrannchen II. 726
Sommervogel II. 332. 455
Sommerzaunkönig II. 720
Sondenvinds - Fugl 70. 1
Songtrush II. 263
Sonnengeyer 4
Sonnenreiger 991
Soolsoort II. 303
Sopatil 87. 13
Sordonne II. 633
Soren - Iacob 69. 5
Soren - Peder 70. 1
Sorentlein 772
Soroka 50. 13
Sortbag 907
Sorte 67. 6
Sortkirre 926
Sort - Spaet 59. 1
Sort - Tärne 77. 2
Sort - Troſt 107. 22
Soſove 305
Souchet 746
Soucie II. 724
Soudaqua 42. 4
Soui II. 137
Souimanga 622. 633. ff. 637. 640. 647 f.
Soulcie II. 724
Sourcicle II. 724
Sova 431. 1
Sovalezna 43. 1
Sova - urſata 43. 4
Sovi II. 137
Sovimanga 622
Sowka 43. 5. 7
Soyka 50. 7
Spaarling II. 548
Spacsboek 42. 31
Spacziek 106. 1
Spadderi 42. 31
Spaet 59. 1 ff.
Spaet Meyſſe 59. 1
Spaltfuſs 329
Spanſk - kräka 51. 1
Sparling - Fowl 68. 1
Sparrow II. 535
Sparrow - Hawk 117
Sparverius 129
Sparviero 42. 31
Spaſsvogel 216
Spatel - Ente 745. 757
Spatelgans 939
Spatule 939
Spatz 677. II. 494. f. 539 548. 775
Spatzek 106. 1
Spatzeule 178
Specht 222. 500. 591
Spechtkrähe 502
Spechtmeiſe 544
Spechtpirol 408
Speckente 760
Speckmeiſe II. 755. 760
Speicherdieb II. 548
Speralſter 189
Sperber 54. 111. 116. 126
Sperberfalk 55. 116
Sperberſchwalbe 54
Sperbereule 174
Sperck II. 548
Sperg II. 550
Sperga 75. 7
Sperling 556. II. 313. 348. 358. 360. 363. 379. 383. 422. 427. f. 440. 442. 451. 458. 460. 504. ff. 510. 535. ff. 542. 545. 547. 560. 562. 615. 617. 741. 746. 774
Sperlingsartige Vögel II. 139
Sperlingsammer II. 416
Sperlingshabicht 111

Sper-

Sperlingspapagey 289
Sperlingsſpecht 510
Sperlingstaube II. 197
Spernuzzola 116. 2
Sperrmeiſe II. 764
Sperviera 44. 12
Sperwer 116
Spettmeyſe 546
Speyer II. 799
Speyerl II. 789
Spheniſcus 825
Spiegelente 771. 786. 790
Spiegelmeiſe II. 772
Spiegelvögelchen II. 702
Spielhahn II. 88
Spiesente 762. 764
Spiesgans 880
Spikke 114. 18
Spieſslerche II. 219 f.
Spillhahn II. 84
Spillkräka 59. 1
Spinoletta II. 220
Spinus II. 407. 515
Spipola II. 214. 715
Spipolette II. 219
Spirer 922
Spirkſchwalbe II. 789
Spirſchwalbe II. 797
Spitzgeyer 104. 107
Spitzkopf II. 736
Spitzlerke II. 631
Spitzſchwanz 762. 764. 766. II. 88
Σπιζιας 42. 31
Splinza 42. 16
Spoe 1019
Sponſa 791
Spoon-bill 80. 1
Spoon-bill-Duck 67. 26
Sporengans 705
Spornfink II. 475
Spornflügel 1131
Spornhenne II. 59
Spornvogel II. 27
Spottdroſſel II. 270. f. 273
Spötter 102. 913. II. 271
Spotte-Io 76. 10
Spottvogel 216. II. 272. 620. 625
Spov 1019
Spreedroſſel II. 312
Sprehe II. 206
Spren II. 237
Sprenzchen 116. 127
Spreuve 106. 1
Sprinz 96. 116
Sprinzl 119
Sproſſenhuhn II. 94
Sproſſer II. 611
Sproſsvogel II. 611
Spue 86. 3
Spurre II. 549—77. 2
Spurrehonge II. 726
Spürſchwalbe II. 797. ſ. Spyrſchwalbe
Spurv II. 549
Spyrſchwalbe II. 789. 791. 796
Squaiotta 981
Squakko-Reiher 979
Squaptield 86. 11
Srakoper 44. 12
Staal-Sneppe 87. 1
Staar 406. 409. 412. 425. 431. 435. 437. II. 236 ff.
Stachelſchnabel 1106
Stachelſchwalbe II. 782 ff.
Stachelſchwanz 752. II. 801
Stadtrothſchwänzlein II. 692
Stadtſchwalbe II. 782
Stalzo 103. 1
Stanchel 42. 16
Stannel 42. 16
Stär II. 238
Starda 95. 1
Stare II. 233. 236 ff.
Starik 821
Starl II. 239
Starna II. 116. — 103. 13

Stauden-Ragerl 998
Stecklick II. 488
Stechlitz II. 488
Steenbicker II. 656
Steendolp II. 653
Steendulp II. 653
Steengall 111
Steengylp 114. 15
Steenpikker II. 638
Steen-Sneppe 86. 7
Steensquette II. 653
Steensvale II. 798
Steen-Swalm 117. 6
Steenugle 43. 1
Steglik 112. 7
Stebrsts 110. 5
Steinadler 27. 33. 42. 62. 65
Steinamsel 218. f. II. 313. 320
Steinauffe 170. 178
Steinbeisser II. 342. 354. 654
Steindepill II. 653
Steindohle 385
Steindreher 1057. 1097
Steindrossel 218. II. 310. 313
Steinemmerling II. 431
Steineule 169. 172
Steinfalk 108. 109
Steinfletsche II. 627. 656
Steingällel 1068
Steingeyer 23. 43. 49. 107
Steinhänfling II. 525. 532
Steinheher 367
Steinhetz 384
Steinhuhn II. 96. 98. 110
Steinhuhntaube II. 166
Steinkautz 170
Steinkletsche II. 652
Steinkrähe 385
Steinlerche II. 215. 226
Steinmerle 217
Steinpardel 1097
Steinpatsche II. 656
Steinpicker 1076. II. 660
Steinquäcker II. 653
Steinrabe 337
Steinrappen 385
Steinröthel 217. 219
Steinröte II. 313
Steinschmack 111
Steinschmacker II. 654
Steinschmätzer 111. II. 649 ff. 706
Steinschnapperl II. 654
Steinschnepfe 1025
Steinschößlein II. 519
Steinschwacker II. 652
Steinschwalbe II. 797. 804
Steinschwatzer II. 654
Steintaube II. 198
Steintohle 385
Steintule 385
Steinvogel II. 44
Steinwälzer 1097. 1057
Steinzeisig II. 739
Steissfuss 669. 883 ff.
Stelkr 1056
Stellers Ente 745
Stellers Krähe 365
Stelzenläufer 934. 1099
Stenkneck 109. 1
Stepowron 84. 9
Steppenfalke 103
Steppenralle 1112
Steppenhuhn II. 7. 108
Steppenlerche II. 221
Sterbevogel II. 324
Sterch 959
Sterchy 84. 7
Stercoraire 914
Stercorarius 896
Sterling 106. 1
Sterna 917
Sternadler 315
Sternardt 110. 5
Sternente 811 ff.
Sterzente 789
Sticherling II. 641. ff. 666. 677. 732

Stickup

Stickup 1041
Stieglitz II. 486. ff. 495. 498
Stiftsfräulein II. 637
Stiglitz II. 487
Stilk 86. 11
Stillitz II. 489
Stinkhahn 609
Stinkvogel 435
St. Iohnsfalk 94
Stockadler 27
Stockente 746
Stockerfalk 94
Stockeule 154. 168. 178
Stockfalk 76. 95. 116
Stockhänfling II. 525. 531
Stocktaube II. 146
Stokziemer II. 308
Stolucherez 853
Stone-chatter 114. 17
Stonegall 42. 16
Stonesmich 114. 17
Stopparola II. 220. 600. 627
Stöpling II. 220
Stoppelvogel II. 220
Storch 945. 957. f. 1007
Störente 789
Storfuglen 875
Stork 84. 4
Stormfinch 70. 1
Storm-Fugl 70. 3
Storm-Stär 106. 5
Stormwaders-Fugl 70. 1
Stornell 106. 1
Storno II. 239
Stoerschek 114. 46
Storzello 103. 2
Stofsadler 18
Stöfser 49. 116
Stofsfalk 123
Stofsgeyer 49
Stofsmeve 915
Stofsvogel 49
Straber 803
Stragazzina 44. 12
Strakavel 50. 13
Strandbachstelze II. 674
Strandbekassin 1070
Strand-Elg 88. 1
Strandelster 1110
Strandhäster 1110
Strandheister 1110
Strandhühnlein 1070
Strandjäger 913
Strand-Kield 86. 11
Strandläufer 1049. 1059. ff. 1075. 1114. 1155
Strandläuferlein 1073
Strandmotacille II. 674
Strandpfeifer 1083
Strand-Pipaare 88. 1
Strand-Piper 88. 1
Strand-Ravn 720
Strandreuter 1099
Strand Rixe 93. 2
Strand-Schnepfe 1039
Strandschwalbe II. 793
Strandskade 1110
Strand-Skur 90. 1
Strand Snarre 93. 2
Strand-Sneppe 87. 13
Strand-Svale 117. 4
Strand-Swala 117. 4
Strandvogel 1057. 1078
Strafsburger Taucher 809
Straubhahn II. 51. 56
Strauchgrasmücke II. 616
Straule 76. 3
Straufs II. 10
Straufsbastard II. 17
Straufsente 754. 795
Straufsfink II. 327
Straufskasuar II. 17. 19
Straufsmeise II. 753
Straufsrabe II. 122
Straufstaucher 803. 883
Straufsvogel II. 12. 14
Strea 43. 8
Streithuhn 1050

Streit-

Streitschnepfe 1052
Streitvogel 1050
Strepet II. 6
Stresch 114. 46
Streussiein II. 721
Strichdrossel II. 268
Strichtaube II. 146. 200
Strietvagel II. 400
Strilozzo II. 407
Strix 138
Strnad 110. 5
Strobeltaube II. 152
Stroka 50. 13
Strokos 44. 12
Strömstaar II. 244
Strontjäger 914
Στρουθος II. 15
Strumpfwirker II. 405
Strunkvit 70. 1
Struntjäger 913
Strupptaube II. 152
Strupphuhn II. 51
Struthio II. 10
Struthiocamelus II. 12
Strutza 96. 1
Struntjager 76. 10
Struusshahn 1050
Strzyzyk 114. 46
Student 72. 3
Sturino 106. 1
Sturmfink 834
Sturmmeve 834
Sturmseegler 1063
Sturmschwalbe 831
Sturmtaucher 831
Sturmverkündiger 834. 839
Sturmvogel 830
Sturnus 407. 431. 435. 437.
II. 236 ff.
Stuttnefia 876
Subbuteo 123
Sucet II. 724
Südmeerschwalbe 926
Südseerabe 340
Suedes-aerla 114. 11
Suenmoodra Cavky 78. 1
Suet II. 724
Sufflator 101
Suglam 101. 3
Suguntu 41. 5
Sula 844. 861
Sula 72. 5
Sulcie 112. 30
Sultan 1119
Sultanshuhn 1119
Summvögelein 677
Sumpfbussard 71
Sumpfeule 181
Sumpffalk 103
Sumpfhacht 108
Sumpflerche II. 218
Sumpfmeise II. 766. 778
Sumpfschnepfe 1029
Sumpfschnerze 1153
Sumpfvögel 934
Sumpfweihe 64
Sunksur 67
Surglum 101. 3
Suri II. 17
Surisprakul 43. 7
Suscitator II. 126
Sussu 117. 3
Svaerta 67. 6
Svale II. 783
Svale 117. 1 ff.
Svan 696. — 67. 1
Svane 67. 1
Svart-And 67. 6
Svarbag 874
Svartbach 906
Svartbakur 874
Svart-Orre 67. 6
Svarttrut 76. 6
Svenske II. 713
Swala 117. 1 ff.
Swallow II. 783 ff.
Swänsk-papoja 109. 3
Swebtelis 84. 7

Swebtsputus 84. 7
Swenska 109. 27
Swibpuris 112. 36
Swimmern 102
Swinepipe 107. 3
Swirbulis 112. 36
Swirpis 109. 2
Swunsch II. 372
Sylvia 556. 632. 635. 646. ff. II. 313. 481. 599. 605. ff. 628. 697. ff. 705. 713. 732
Sziast 84. 8
Szpak 106. 1

T.

Taade-Hest 87. 13
Tabaduru 53. 2
Tacab-Mise 85. 1
Tacco 472
Tachmas 114. 1
Tadorna 709 ff.
Tafelente 767
Tageule 156
Tagerl 357
Tag- und Nacht-Drossel II. 242
Tagphilomele II. 606
Tagschläfer II. 808
Tagschläger II. 606
Tahe 355
Tailleur 72. 3. II. 730
Talbit II. 347
Talg-Oxe II. 756
Tal-trast 107. 3
Tamatia 458. 946
Tanager II. 449 ff.
Tanagra II. 449 ff.
Tanaombé II. 289
Tanas 114
Tangara II. 456. ff. 745
Tan-Meislin II. 723
Tannenbaumhacker 640
Tannenbaumläufer 640
Tannenelster 367
Tannenfink II. 482
Tannenheher 366
Tannenkriecher 640
Tannenmäuslein II. 723
Tannenmeise II. 763
Tannenpapagai II. 339
Tannenvogel II. 339
Tannhäger II. 344
Tann-Meisse II. 365
Tantalus 1001 ff.
Tapera II. 801
Ταὼς II. 25
Taparana 61. 26
Tape-bois 59. 1
Tapon 109. 4
Taraba 292
Tarabuso 84. 21
Tarangalo 86. 4
Tarier II. 656
Tarin II. 502. 517
Tarna 77. 2
Tarne 923
Tarrain II. 522
Tarrok 898
Tartarlerche II. 221
Taschenmaul 746
Taschitza 114. 45
Taschtza 114. 45
Tatao II. 462
Tattarak 67. 1 ff.
Tattula 50. 6
Taube 823. 838. 871 II 139
Taubendrossel II. 317
Taubenfalke 49. 76. 120
Taubengeyer 76
Taubenhabicht 76. 121
Taubensperber 120
Taubenstößer 116
Tauchente 795. 801. 809
Tauchentchen 889
Taucher 801. 819. 870. 876. ff. 1095
Taucherchen 889
Taucherlein 894
Tauchermeve 909

Tauchergans 802
Taucherhuhn 870
Taucherhühner 870. ff.
Taucherkiebitz 802
Taucheruöve 874
Taucherſäge 803
Tauchertaube 871
Tauchgans 802
Taumeltaube II. 155
Taumler II. 155
Tauza 98. 1
Tavoua 291
Taya 78. 1
Tchachert 211
Tchachert-Be 211
Tche-cou 103. 36
Tchi-perdrix 110. 3
Tchirnubo 116. 3
Tchouet 112. 37
Teal 772
Tectec II. 586
Tecurmaſhiſh 112. 1
Tedder 103. 2
Teer II. 85
Teherik II. 680
Tebil 42. 71
Teiſt 812
Teiſta 872
Teitei II. 457
Teitei 110. 3
Ten 923
Tendelöh 923
Ten-ru-julon 585
Tepetototl II. 43
Tepnyms 42. 4
Tequixquiacatzanatl 53. 7
Terck 1023
Terin 112. 25
Tern 929 ff.
Ternatanheher 588
Ternier 65. 2
Terſinne II. 333
Terterſoak 42. 9
Terzuolo 42. 31
Teſſacourbé II. 589
Teſta-nera 116. 3
Teſto-ruſſo 114. 18
Tetaru 104. 32
Tetema II. 296
Tetrao II. 83. ff. 91. 131
Tetras 102. 3
Tetrax II. 6. 230
Tetrez 103. 1
Tetrix II. 88. 429
Tetta-vacbe 118. 1
Tette-chevre II. 810
Tettera mabte 103. 2
Tetteris 103. 2
Teublin II. 196
Teucher 807
Teufelsbolzen II. 772
Textor 421
Thage 859
Thale 355
Thalk 355
Thär-ed-Sjammel 96. 1
Tharier II. 661
Tharu 26
Thaumantias 680
Thauſchnarre 1117. 1142
Thecau 290
Theghel 1133
Thenca II. 273
Therete II. 420
Therna 923
Thi-khi 101. 3
Thili II. 274
Thiſionis 101. 3
Thiſtlefinch 112. 4
St. Thomastaucher 890
Thomas im Zaune II. 717
Thomas Gierdet 114. 45
Thornkraſer 189
Thornkrätzer 189
Thotoſe cauſew 43. 4
Thouyou II. 17
Thouyouyou 96. 3
Threguel 1133

Thufu-Tytlinger II. 235
Thula 980
Thumherr II. 350
Thumpfaffe II. 349
Thurmeule 165
Thurmfalk 110
Thurmfchwalbe II. 797
Thurmwiedehopf 387
Thütvogel 1094
Thyon II. 661
Tiaadur 90. 1
Tiälderen 1110
Tia-Tia 107. 2
Tic-Tic 556
Tjeklik II. 116
Tield 90. 1
Tigermeve 931
Tigerfperling II. 365
Tije II. 741
Tije guacu Paroara II. 358
Tijepiranga II. 451
Tiglits 112. 7
Tilger 805
Tilibriccu 42. 16
Tilibrru 42. 16
Tilly II 275
Timphahn 1129
Tinamus II. 135
Tingmiarlurkfoak 42. 39
Tinnunculus 110
Tintarello 42. 16
Tintilaum 116. 3
Tinus 813
Tioquet 112. 4
Tiphia II. 647
Tirica 305
Tirin 112. 25
Titiri 201
Titit 114 3
Titlark 105. 2
Titmoufe II 767 ff.
Tittinculo 42. 16
Titys II. 696
Tiufva 76. 10
Tiur II. 85
Tlalacotl 67. 9
Tlapolcocatli 104. 35
Tlauhquechul 941
Tlauhquechultototl 580
Tlotli 42. 13
Tobaque 112. 70
Toccadorza 59. 17
Tock 46. 4
Toco 320
Tocro II. 135
Tocototl 147
Tödder II. 84
Todier 556
Todteneule 165. 178
Todtenvogel 165. 178. 627.
II. 531. 599. 655
Todtenvögelein II. 656
Todus 555 ff.
Toekan 59. 40
Tofs-Myffa 116. 2
Toborkey 61. 1
Toile 59. 1
Tok 328
Tolchiquatli 176
Tole 355
Tolfan y mynydd 112. 37
Tolocatzanatl II. 246
Toli Tolo 114. 49
Tölpel II. 19
Tolu 493
Tomineios 66
Tomlinge 116. 8
Tomme-Liden 114. 46
Tommi Liden 114. 45
Tonekurg 84. 7
Topaskolibri 662
Topasrubin 681
Topau 327
Topfkarfr 857
Toplarke 105. 6
Topmeife II. 754
Töppellerch II. 225
Töppelmeefken II. 754

Topp - Oend 68. 5
Toppertje 67. 45
Top - Skero 75. 7
Tor 104. 32
Torche - pot 548 ff.
Torcicollo 58. 1
Torcol 497
Torcol noir 107. 22
Torcollo 58. 1
Tord 69. 1
Tord - Alk 819
Tordella 107. 1
Tordello II. 265
Tordino 110. 4
Tordmule 69. 1
Tordo 57. 27. — II. 252 ff.
Tordo mezzano 107. 2. 4
Tordo Sassello 107. 3
Tordo viscado 107. 1
Torn - Irrisk 112. 28
Tornoviarsuk 776
Tornskade 199
Torquato 86. 3
Torquilla 496
Tort - aluroity 107. 3
Tortel - Duif 104. 32
Tortola 104. 32
Tortora 104. 32
Tortorella 104. 32
Tosse - Fugl 72. 5
Totanus 1039
Tottler 545
Tottovilla 105. 3
Toucnam - Courvi II. 384
Toudre 107. 4
Toukan 493
Toulu 493
Touraco 488
Tourd 107. 4
Tourdelle II. 253
Tournel 106. 1
Tourne - matte 114. 15
Tourre - buisson 114. 46
Tourterelle II. 172. ff. 178
Toute vive 114. 49
Touyou II. 17
Tovi 304
Tracas 114. 17
Trachelia 1112
Trae - Kloppe 59. 1
Trae - Pikke 59. 1. — 65. 1
Trage 107. 1
Tragopan 327
Traine 107. 1
Traine buisson 114. 3
Traine - charrue 114. 15
Trakawke 104. 32
Trana 84. 4
Trane 64. 4
Trappe II. 1
Trappenzwerg II. 6
Trappgans II. 2
Traquet II. 575. 656. 659. f. 671. 691. 735. 706. 711
Trauerammer II. 423
Trauerente 714
Trauereule 172
Trauerpirol 426
Trauervogel 322. II. 424
Traupis II. 519
Treiche 107. 1
Trembleur 43. 7
Trenka II. 273
Trespodres 103. 20
Trichas 255. 268
Trick 1097
Trictrac 107. 1
Tride - Prele 110. 3
Trie 107. 1
Triel 1098
Trieltrappe II. 6
Trillkräka 59. 1
Tringa 1049. ff. II. 245
Tris 107. 3
Trochilus 660. II. 724. 725
Troeförer 67. 30
Troglodyt II. 717

Troglodytae adfinis 638. 639. 646. 671. 675
Troglodytes 670. II. 605. ff. 717
Trogon 452 ff.
Troill 874
Troiltaucher 874
Trolldrukke 86. 7
Trombotto 84. 21
Trommeltaube II. 148
Trompeter 1155
Trompetero 1155
Trompetervogel 325. 1154
Tronfo 104. 1. 8
Trop 95. 1
Tropikente 867
Tropiker 866
Tropikmeve 868
Tropikvogel 828. 866 ff.
Trösel 772
Trost 107. 22
Trostel II. 262
Trostle 107. 4
Trotte-chemin 114. 15
Troie 107. 1
Troupial 401. 560. II. 242
Truble 80. 1
Truen 76. 10
Trulls 88. 1
Trummeltaube II. 148
Truns II. 488
Truo 848
Trupial 401. 408. s. Troupial
Trush II. 266 ff.
Truthahn II. 29. ff. 36 ff.
Trzesiogonek-biaty 114. 11
Trznadel 110. 5
Trzonek 76. 2
Trzonek mnieysry 76. 3
Tschagrawi 918
Tschagu 67. 67
Tschagrwoi 67. 67
Tsanahoei 380
Tschakwoi Assjah 728
Tschätschke II. 530
Tschanka 50. 6
Tschekantschik II. 661. 731
Tschelaata 69. 10
Tscheravi-Drost 107. 22
Tscherna 59. 1
Tschetschatka 112. 29
Tschetschewinza II. 359
Tschetzschke II. 530
Tschezke II. 529
Tschiavitle 170
Tschiavitl 180
Tschischk 112. 25
Tschokerl 357
Tschoket 86. 10
Tschötscherl II. 531
Tschudesch 58. 1
Tschuk 43. 22
Tschuri 956
Tschurkste 117. 6
Tschütscherlein II. 530
Tucan 317. s. Toucan
Tuch-Endte 807
Tuchiim 98. 1
Tucnam-Courvi II. 384
Tuddokanna 103. 4
Tudlik 75. 5
Tuglok 75. 3
Tühane 114. 48
Tui 305
Tui-Aputejuba 45. 15
Tuidara 43. 8
Tuiete 289
Tuipara 299
Tuite II. 508
Tuitirica 305
Tuju II. 17
Tukogvajok 88. 1
Tul 355
Tulkop 69. 5
Tullack 329
Tullfisch 1113
Tulpendrossel 419
Tummeltaube II. 155

Tümmler II. 155
Tun 50. 6
Tunfugl 50. 13
Tunnudliorbik 43. 3
Tupt 101. 1
Turdus 203. 403. 408. 413. 561. II. 245. 248. ff. 327. 571. 579. 683
Turdu Suerino 107. 1
Tureka Caczka 67. 16
Turkey II. 36
Türkl II. 155
Turlak 355
Turlut 105. 3
Turlutoir 105. 3
Turnstone 1057
Turoko II. 203
Turpane 712
Turtle 104. 32
Turteltaube II. 172. 177. 188. 195. 197 ff.
Turts 117. 3
Turtur II. 188
Turvert II. 181 ff.
Tutter II. 372
Tuunkonning II. 717
Tuzok 95. 1
Tuzzenu 45
Tya-jo 76. 10
Tyetzoy 61. 9
Tylas II. 259
Tympanistoe II. 145
Tyrann 202. ff. II. 567. 572 ff.
Tyrannchen II. 725 f.
Tyrannenfliegenfänger II. 572
Tyrannus 415. II. 567
Tyrk II. 157
Tytlingr II. 770
Tytlings-Blicke II. 401
Tzinitzcum 55. 2
Tzitziboba 67. 28
Tzonpan II. 273
Tzopilotl 41. 5

U.

Uansota 105. 1
Ucelli di Cypro 114. 10
Ucello del mondo novo 108. 1
Uet-Uet 1133
Uf 43. 1
Uferlerche 1083. II. 231
Uferschnepfe 1041. 1046
Uferschwalbe II. 792
Uferstrandläufer 1070
Ugla 43. 4 ff.
Uhdenis 72. 3
Uhr-Eule 150
Uhu 139. 144
Urubu 6
Ul 161
Ule 162
Ulluagolik 67. 26
Ultramarinfink II. 559
Ulu 83. 8
Ulün 43. 1
Ulula 139. 162. 169
Umbellus II. 101
Umbrette 947
Ungewittervogel 831
Ungle 765
Unglücksrabe 218
Unglücksvogel 216 ff.
Ungula-Choteny 67. 54
Unkenfresser 64
Unmiska-Apethaybisb 59. 1
Upuba 64. 1
Upupa 387. 607. ff. II. 740
Urachon Trogoi 112. 29
Uraleule 175
Urana 351
Urgaas 67. 4
Urgiüs 710
Urhahn II. 84
Uria 870. ff. 872
Uril 858
Urinator 892
Urinatrix 831. 889
Urineglia de riu 88. 1

Urogallus II. 84
Urona 50. 5
Urovang II. 317
Urrind 984
Urubitinga 62
Urutaura 18
Urutaurana 42. 34
Urutavi 18
Uſpis 43. 1
Usrind 984
Uſſatſch 116. 12
Uſſignuolo 114. 1
Utlugan 112. 25
Uveyrs-Fugl 70. 1
Uzana 50. 5

V.

Vachette 114. 11
Vachtel II. 131
Vachtelkonge 1143
Vagel Struis 96. 1
Vaginalis 1131
Vagtel 103. 20
Valeria 28
Vale Savane 44. 12
Vandhöne 1118
Vandrixe 1143
Vanellus 1052. 1101
Vanga 187
Vangoline II. 534
Vanneau 1053. 1079. 1132 f.
Vard-Höne 91. 2
Vargia 117. 6
Varuar 63. 1
Vas-Hymber 75. 5
Vatus-Ond 68. 3
Vautour 6 ff.
Vautrot 50. 7
Vaza 275
Vberſchnabel 1106
Veigezizatzh 107. 3
Velch 44. 12
Velch-Oru 50. 2
Vendagette 107. 4
Vendebals 58. 1
Venetore 61. 15
Venustaube II. 151
Verdale 110. 5
Verdan 110. 5
Verdange 105. 6
Verdelat 110. 5
Verdeelbam 109. 27
Verdere II. 375
Verdereule II. 375
Verderol 109. 27
Verdiers des prés 110. 3
Verdier II. 373. 375. 444. ff. 510. 559
Verdoie 110. 5
Verdone II. 375
Verkehrtſchnabel 932
Verla 44. 12
Verquette 107. 1
Verticella 58. 1
Vermontant 110. 5
Verturon II. 502
Verzellino II. 502
Veſtenvinds-Are 70. 1
Vetti-vetto 114. 49
Vetula 472
Veuve II. 440 ff.
Veyda-Bialla 76. 7
Veydetite 1057
Veylarcke 105. 6
Vibe 1054
Vicicilin 66
Vidarino 112. 16
Viduel 402
Vielfraſs 805. 845
Vieräuglein 754
Vierhundertzunge II. 270
Viguier II. 585 ff.
Vilgiäs 67. 9
Vinago II. 142
Vinette 114. 10
Vinterfugl II. 401
Vintſi 564
Violettfleck 651
Violetreiher 976

Vi-

Vipstiert 114. 11
Vira ombé II. 585
Virginianer 514
Virlen 1074
Viscivorus II 249
Vitifera II. 654
Vitiflora II. 654
Vitrec II. 652
Vogel 367. 405. 411. 639. 646. 1039. II. 21. 445. 454. 466. 742
Vogelfalke 116
Vogelgeyer 14
Vogelgeyerle 69
Vogelheine 845
Vogelnestjes 117. 2
Vulpanser 709
Vultur 1
Vuthamaria 69. 2

W.

Waalia II. 204
Wäänkal 58. 1
Wäbke 772
Wacholderdrossel II. 252
Wacholderschnepfe 1029
Wachtel 355. II. 122 ff.
Wachtelgeyer 103
Wachtelhabicht 116
Wachtelkönig 1138. 1149
Wachtellerche II. 214
Wächter 189
Wackelstärt II. 637
Wackstärt II 637
Wagtail II. 638. 732
Wablod 52. 2
Wahnkrengel 196
Wähpstierten II. 645
Wabrna 50. 5. — 50. 7
Walathee 189
Walcerono 114. 11
Waldauffe 163
Waldäuffel 161
Walddröscherl II. 261
Walddrossel II. 259
Waldeule 153. 178
Waldfink II. 477. 480. 482. 535. 557
Waldgeyer 55. 64. 66
Waldgrasmücke II. 618
Waldhahn II. 84. 88
Waldherr 192
Waldhoff 387
Waldhöher 192
Waldhuhn II. 83. 99
Waldjäger 1071
Waldkatze 198
Waldkautz 165
Waldlerche II. 215. 226
Waldmeise II. 764. 766
Waldnachtigall II. 610
Waldpelikan 1001
Waldrabe 384
Waldrebhuhn II. 94
Waldröthlein II. 712
Waldrothschwänzlein II. 693. 700
Waldrothschweiffl II. 694
Waldsänger II. 628
Waldschnepfe 1026. 1077
Waldsperling II. 536. 555. 557
Waldstael 368
Waldtaube II. 140. 173
Waldvogel II. 610
Waldzeislein II. 723
Waldzinslein II. 723
Waled 117. 2
Wallop 86. 3
Walghvogel II. 19
Wälscher Hahn II. 31
Wallubora 50. 11
Wanderdrossel II. 267
Wanderfalk 81. 92
Wandertaube II. 199
Wandwäher 111
Wandwehe 111
Wannags 42. 12. — 37
Wannenweher 110

Wan-Krengel 192. 194. 196. 200
Wapacuthu 159
Wapau-Whiski-Iohn 44. 12
Wapow-Esquan-Mickesue 42. 3
Warblane 112. 36
Warbler II. 687 ff.
Wardioe 60. 11
Warfogel 44. 12
Warkrengel 194. 200
Warte 783
Warten 783
Warvogel 190
Wasseramsel II. 243
Wasserblisser 932
Wasserdrossel 1063. f. II. 243
Wasserfalke 64
Wasserhenne 1117
Wasserhennl 1118
Wasserhuhn 801. 889. 1045. 1147. 1056. 1068. 1093. 1101. 1115. 1134 ff.
Wasserhühnchen 1031. 1034. 1142. 1153
Wasserhühnlein 570. 1069
Wasserläufer 1117. 1143
Wassermerle II. 243
Wassermotacille II. 617
Wassernachtigall II. 702
Wasserochs 984
Wasserpfau 949
Wasserrabe 325. f. 852
Wasserralle 1142. 1144
Wasserrebhuhn 1026
Wassersäbel 1106
Wassersäbler 1105
Wasserscherer 839. 932
Wasserschnarel 819
Wasserschneider 932
Wasserschnepfe 1031. 1041. 1047. 1073. 1149
Wasserschwalbe II. 793
Wassersperling II. 436
Wasserstaar 412. II. 243
Wasserstelze 1142. 1147. II. 637. 644. 647
Wassersterz II. 636
Wassertreter 1117. 1143
Wasservielfrass 845
Wasservögel 694
Wasservogel 64
Wästrik 112. 28 f.
Water-Hen 91. 4
Water-Ouzel 106. 5
Water-rail 93. 2
Water-Witch 75. 19
Watnstare 106. 5
Wattadraganca 72. 1
Waygeboe 60. 11
Weberammer II. 428
Weberpirol 421
Wechholter 107. 2
Wecker II. 126
Wedelschwanz II. 605 ff.
Wedknarr 59. 12
Weepstirten II. 638
Wegtaube II. 189
Wegesterz II. 637
Wegflecklein II. 702
Wegelerche II. 207. 215
Wehja-mannags 42. 31
Weichmilane 49
Weidendrossel II. 314
Weidengucker II. 626
Weidengückerlein II. 626. 702
Weidenlerche II. 235
Weidenmeise II. 723
Weidenmücke II. 626
Weidensperling II. 536. 655
Weidenzeisig II. 620. 626. 725
Weidenzeislein II. 723
Weiderich II. 626
Weidewall 402
Weihe 48. 64. 72. 104
Weihfalke 49
Weihrauchvogel 403
Weindrossel II. 258. 263
Weingartvogel II. 259

Weinlerche II. 225
Weinzapfer II. 770
Weisſarſch 1064
Weisſback 764. 766. 815
Weisſbäckchen 723
Weisſbartl II. 690
Weisſbauchadler 39
Weisſbürzel II. 653
Weisſbläſſe 1125
Weisſdroſſel II. 258. 263
Weisſflügel II. 167
Weisſfuſsadler 46
Weisſhahn II. 97
Weisſhänfling II. 524
Weisſkehlchen 645. II. 575. 628. 652. 658. 660. 711. 735. 747
Weisſkehlein II. 652
Weisſkopf 20. 23. 29. 44. 107. 251. 278. 584. 920. 166. II. 360. 403. 423. 677. 746
Weisſkragen 74
Weisſnacken II. 404. 747
Weisſſchnabel 505. 575. 635. II. 463
Weisſſchwänzel 38
Weisſſchwanz 23. 44. 667. II. 650. ff. 652
Weisſſpecht 533
Weisſſpyr II. 790
Weisſſtirn 743
Weisſtroſtel II. 263
Weisſzopf 809. 811
Wendehals 496
Wendetaube II. 163
Wenzel 635. ff. 646. ff. II. 272. 705
Weſpenfalk 68
Weſpenfreſſer 69
Wetterrabe 836
Wettervogel 1017. 1021
Wey 51
Weygehoe 560
Weyhe ſ. Weihe
Weyrauch 405
Wheat-ear 114. 11
Wheber 67. 27
Whilka 714
Whimbrel 86. 4
Whippoorwill II. 812
Whip-Tom-Kelly 113. 14
Whiſkijack 50. 16
Whiſkijohn 50. 16
Whiſtling 67. 27
White-Game 103. 4
White-Whiski-Iohn 44. 12
Whourao-roa 581
Widgeon 67. 27
Widhavogel II. 440
Widhopff 609
Wiedehopf 608. II. 739 f.
Wiedehoppe 609
Wiedewall 502
Wiedhopf 264. 607 ff.
Wiegwehen 111
Wiekſzy 44. 12
Wierzbowniozka 114. 8
Wieſelchen 807
Wieſenammer II. 430
Wieſen-Ammering II. 431
Wieſenemmerling II. 431
Wieſenknarrer 1139
Wieſenläufer 1139
Wieſenlerche II. 212. 215. 234
Wieſenſchnarcher 1139
Wieſenſchwalbe 1111
Wieſenſperling II. 540
Wieſenſtaar II. 237
Wigga 67. 45
Wihma-kul 42. 31
Wildelſter 191
Wildendtle 747
Wildente 767
Wildetul 384
Wildhuhn II. 113
Wildtaube II. 175
Wildwald 189
Wilga 52. 1

Wilwol 52. 1
Wimbrell 1022
Wind truſh 107. 3
Windvogel 1017
Windwahl 111
Winkernell 1144
Winſel II. 259
Winteptker 116. 11
Winterammer II. 421
Winterdroſſel II. 259
Winteremmerling II. 421
Winterente 764. 766. 809
Winterfalk 97
Winterfink II. 482. 543
Wintergrasmücke II. 615
Winterhalbente 769
Winterkönig II. 716. 725
Winterkrähe 351
Winterlerche II. 232. 400
Winterling II. 400
Winterrötelein II. 713
Winterrücke 803
Wintermeve 897. 900
Winternachtigall II. 611. 614
Winterſperling II. 400
Wintervogel II. 404
Winterzaunkönig II. 716
Wintze II. 259
Wipſtaart II. 638
Wippſtärt II. 637
Wippſterz II. 327
Wipsſteert II. 638
Wiſtling II. 692. 699. ſ. Wüſtling
Wittewalch 402
Wittewall 402. 421. II. 329 f.
Wittwe II. 439
Wittwall 402
Woaeſtraekia 114. 11
Wohnütz II. 372
Wollentramper II. 615
Wollhuhn II. 56
Wood-Cock 86. 6
Wood-Crow from Switzerland 50. 9
Wood-lark 105. 3
Woodpecker 503 ff.
Wood-Pelikan 85. 1
Wood Titmouſe II. 724
Woodchack 199
Woodſpite 59. 12
Worabé II. 559
Worobin 112. 36
Woron 50. 2
Worona 50. 5
Wotowe oczko 114. 46
Wou 42. 12
Woupawchou-chuckitkow 414
Wowe 42. 12
Wrakfogel 68. 1
Wrangengel 423
Wren 114. 45 ff.
Wriand 67. 27
Wrobel domowy 112. 36
Wrobel gorny 112. 37
Wrobel lesny II. 537
Wrobel troiſtego koluro 112. 74
Wrynek 497
Wullah 723
Wundarzt 1136
Wunderkolibri 670
Würgengel 189. 194
Würger 112. 182. ff. 423. II. 331. 335
Würgvogel 189
Wurmfreſſer II. 613
Wuscanitbow 109. 3
Wüſtling II. 631. 694. ſ. Wiſtling
Wuwe 51
Wy 51
Wyderle II. 627
Wynkernell 1144
Wyt 783
Wywielga 52. 1

X.
Xanthornus 409. 423. f. 432
Xaxabes 298
Xiuhtototl II. 467
Xiuxerra 114. 48
Xochitenacatl 320
Xochitototl 411. 421
Xomotl II. 327
Xura 43. 7
Y.
Yacapitzahoac 890
Yaku II. 38
Yandu 96. 3
Yapou 52. 4
Yardu 96. 3
Yayauquitototl 66. 25
Yayk-Ohreule 153
Yellow-hammer 110. 5
Yohualcuachili 1134
Yohualtototl II. 504
Yr-aderyndu 107. 22
Yrung-Chaß 67. 54
Ysvogel 61. 3
Yunx 496
Yzquautli 42. 34
Yztactzonyayauhqui 67. 43
Z.
Zagan-Goruchun 43. 1
Zagan-Schubo 43. 1
Zagelmeiſe II. 770
Zahlmeiſe II. 771
Zakid 84. 4
Zamuro 41. 5
Zanoë 380
Zapfenbeiſser II. 339
Zapfennager II. 339
Zapp 1126
Zarer II. 250
Zaritzer II. 249
Zartſchnabel II. 545. 613. 619
Zätſchker II. 555
Zaunammer II. 431
Zaunemmeritze II. 432
Zaunhüpfer II. 691
Zaunkönig II. 716. 725
Zaunſchlüpfer II. 716
Zaunſchlüpferl II. 718
Zaunſchliefer II. 716
Zaunſchlipflein II. 716
Zaunſperling II. 616
Zdzoto II. 220
Zeelawa 114. 11
Zeemala 114. 11
Zeezwalluw 77. 2
Zeglolka 109. 27
Zegzolka 50. 6
Zeher II. 250
Zehrling II. 483
Zeiſchen II. 516
Zeiſelein II. 517
Zeiſichen II. 516
Zeiſig II. 515. 739
Zeislein II. 516
Zeiſsig II. 516
Zena II. 490. 499
Zeplibrs 114. 48
Zepſte 114. 8
Zerrer II. 250
Zer-wenka 114. 45
Zetſcher II. 482
Zeuner II. 255
Zezir 106. 1
Zezula 57. 1
Zbiaelkes 75. 1
Zbiacna 59. 12
Zbierrek 77. 2
Zieba 112. 3
Ziegenmelker II. 808 ff.
Ziegenſauger II. 809
Ziemer II. 249. 252. 253. 267.
278
Ziepammer II. 430
Ziepdroſſel II. 260
Zierdroſſel II. 265
Ziering II. 250
d'Zierzba 44. 12
Zieſel II. 516
Ziesgen II. 516

Ziesschen II. 516
Ziez gale 57. 1
Zifitz 1053
Ziglis 102. 7
Zigolo 110. 5
Zibluri 105. 1
Zihluris 105. 6
Zimmermann 505. 522
Zimmetvogel II. 690
Zimorodek 61. 3
Zinsle II. 516
Zinslein II. 517
Zinzerelle II. 324
Zipdrossel II. 258. 263
Ziphur 112. 36
Zippdrossel II. 261
Zippa 105. 3
Zippammer II. 431
Zippe II. 258. 263
Ziriolu 88. 1
Zirlammer II. 431
Zirzente 774
Zischen II. 516
Zischer II. 711. 737
Zischeule 168
Ziserinchen II. 529
Zising II. 516
Zitrinchen II. 502
Zitskens 112. 16
Zittertaube II. 153
Zitzcherlein II. 530
Zitzil 669
Zufzbia 103. 1
Zivetta 43. 5
Zivolo 110. 5
Zobbose - Rääst 107. 1
Zolna 59. 12
Zonca 157
Zonecolin II. 128
Zopflerche II. 225. 226 ff.
Zoraw 84. 4
Zorca 152
Zorch 883
Zorkol 107. 2
Zorzal 107. 4
Zötscher II. 531
Zschokrell 355
Zuckerfresser 641 f.
Zuckerspatz II. 511
Zuckervogel 641. 648
Zuckervögelein II. 511
Zugdrossel II. 267
Zugtaube II. 200
Zubku 59. 18
Zuserl II. 326
Zwerg II. 393. 617
Zwergente 776
Zwergeule 177
Zwergfalke 126. 130
Zwergfliegenfänger II. 570
Zwerghuhn II. 52
Zwergkernbeisser II. 392
Zwerglöffler 942
Zwergpapagey 259. 299
Zwergpapageytaucher 825
Zwergpelikan 857
Zwergreuter 1078
Zwergtaube II. 198
Zwergtrappe II. 6
Zwergzeisig II. 748
Zwitscherling II. 529
Zwitterauerhahn II. 92
Zwitterfalk 110
Zwittertaube II. 196
Zwuntsche II. 372
Zya II. 735
Zymmer II. 255
Zyste II. 627

Einige Verbesserungen.

Im ersten Theile.

S. 73. Z. 7. l. Auftr. — Z. 11. l. F. Aeruginosus. — S. 187. nach Z. 21. setze: Latham Syst. ornith. I. p. 667. n. 1. Ampelis cinerea. — S. 191. Z. 4. l. Harpax. — S. 229. Z. 5. von unten, für *Maracana*, l. der grüne blau gescheitelte Aras. — S. 259. Z. 13. l. der langschwänzige Zwergpapagey. — S. 299. Z. 25. l. der kurzschwänzige Zwergpapagey. — S. 964. Z. 27. und 28. sind ganz wegzustreichen. — S. 1153. Z. 6. l. daurische.

Im zweyten Theile.

S. 284. Z. 19. l. Samarmar? — Z. 23. l. fuscis? — S. 499. Z. 26. l. der pomeranzengelbe Fink. — Z. 31. l. p. 346. n. 161. der orangengelbe Fink. — S. 620. Z. 4. von unten l. Kukkuksamme. — S. 742. letzte Zeile. l. führt? — S. 734. letzte Zeile, nach *nachlesen*, setze: cf. p. 235. n. 4.

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Donndorff, Johann August, 1754-1837

Zoologische Beyträge zur XIII. Ausgabe des Linneischen Natursystems

Bd.: Zweyten Bandes Zweyter Theil

Leipzig 1795

Zool. 128-2,2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10307067-7
VD18 80263054